



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

617

T 14_R

1072
10 AN.

T A C A V T I

AMBIANI VIMACI,

Dr. J. PARISIENSIS
MEDICI,

DE CHIRURGICA


Institutione libri quinque.

His accessit sextus liber de Materia chirurgica,
authore Iacobo Hollerio Stampano,
medico Parisiensi.

1072

— D.D.

IN
VIR
TUTE,



EST
PORTUNA.



LVGDVNI,
APVD GVLIEL. ROVILLIVM,
SVB SCVTO VENETO.

M. D. LX.




CHRISTIANISSIMO

Galliarum Regi Francisco, eius

nominis primo,

Ioannes Tagautius medicus

S. D.



NTER eximias præclarasq;
animi dotes, ac virtutes propè
diuinas, quibus cæteris princi-
pibus tantum antecellis, quan-
tū dignitate, opibus, potentiaq;
& imperij magnitudine illis om-
nibus præstas: ea mihi potissi-
ma semper visa est, Christianissime simul & inui-
ctissime rex, quòd nullū vnquam tēporis momen-
tum præterlabi finis, quo non aliquid cogites aut
agas, bono ac salutari principe dignū. Siquidē quic-
quid otij ac tēporis à necessaria cura corporis tibi
superest, tu id omne vel reipub. tuæ sapiēter mode-
rāde, vel honestis atq; optimis disciplinis (quæ secū-
das res ornāt, aduersas solātur) tribuis: vt ne in ve-
natione quidē ipsa, qua colligēdis & animi & cor-
poris viribus interdū vteris, tibi temperes, quin vel
de principatus tui administratione, vel de ferarū
quas persequeris, aut stirpium quæ tunc se oculis
obiiciunt, aliarūve rerum natura, ferè semper
disputes. Quo fit vt Minervam non minus quàm

E P I S T O L A

Dianam errare in montibus & syluis subinde experiaris. Sed & in mensa illa tua regia, frequenti Principum, illustriumque virorum Cardinaliũ & Episcoporum cõspectu ac confessi, semper aliquid ardui, doctique & honesti, contra morem & exemplum aliorum principum, non eorũ modò qui nũc sunt, sed qui multis antehac seculis fuerunt, è media philosophia atq; antiquitate depromitur: vt rectè æstimãti ea sapiẽtię verius officina quàm epulũ regiũ videri possit. Aut enim humanę, eadẽq; graues & te principe dignę, aut diuinę, quę animum ad religionẽ informãt, in ea recitãtur histõrię, aut de omni genere artiũ, atq; disciplinarum disputatur. Hinc factum est, vt Gallorum respub. inde adeò quòd illi præfuisi, virtute honesta, religione ac pietate integra, iure & legibus æqua, opibus firma, copiis locuples, & gloria ampla, semper fuerit. In hac autẽ assidua literarũ cõcertatione, tu quasi arbi-
ter honorarius, inter doctos homines de rebus con-
trouerfis, vt olim in encycliis & scholis suis (si par-
ua magnis cõferre phas est) facere solebãt, magistri
ac philosophi illi veteres, non minore eloquentia
quàm dignitate iudiciũ interponis, grauitẽq; de-
cernis. Quid quòd tu omnẽ omniũ artiũ materiã,
rationẽ, & instrumẽta, in numero habes, atq; ap-
positis nominibus exprimis. In quo Themistoclis,
Mithridatis, Cyriq; Persarũ regis memoriã facilẽ
superas, vel obscuras potius. Sed & cũ de re medica
(vt aliquid de ipsa separatim dicamus) disputatio
incidit (incidit autẽ frequenter) tu res medicas non
aliter tractas, quàm qui omni vita nihil aliud ege-
rit. Nec aliter statuis, quàm qui in ea disciplina
cõsensuerit: vt & præceptiones artis, & medicamẽ-
torum

N V N C V P A T O R I A.

torum , præsertim simplicium nomina & vires, ipsamque corporum anatomen (cuius speculatione incredibiliter delectaris) ad vnguem teneas; consilia curandi sapientissimè distinguas; vim remedium adnotes , quid vnumquodque profit, quid noceat, aptè & acutè definias. Quanquàm verò hoc bonarum artium studium, quod nunquàm intermittis, præposterè nati quidam & ab omni ingenij cultu alieni , tanquam parum regium irrident atque damnant. Tu tamen, Princeps longè maxime ac sapientissime , regiarum virtutum fundamentum, & clarissimum boni ac salutaris principis ornamentum ponis , verè cum Platone nobilissimo totius Græciæ philosopho diiudicans, non aliter fœlices fore respublicas, nisi si aut philosophis committeretur imperium , aut quibus imperium contigisset , philosophiam sequerentur. Salomon cum pro Dauid patre suo, regnare cœpit , tantùm sapientiam à Deo postulavit , qua rectè iudicare & populum sibi commissum sapienter gubernare posset: atque hic nihil aliud inculcabat filio suo quàm amorem ac studium sapientiæ. Nec abs re quidem: nam fato sceptræ cadunt, doctrinæ autem gloria perennis. Quod tu etiam animo reputans , nihil vnquàm charius , nihil antiquius duxisti sapientiæ studio, atque assidua eiusmodi bonarum artium tractatione: ex qua tantos iam progressus in omni virtute, atque omni disciplinarum genere fecisti, vt Imperatores illos , & belli duces clarissimos, Alexandrum Magnum, Iulium Cæsarem, Octavianum Augustum, Scipionem Africanum, non minus literarum scientia, quàm bellicis artibus præ-

EPISTOLA

stantes, facillè superaueris. Sed & hac doctrinæ cupiditate, qua semper totus sic flagras: tu nō solū eorū quibus imperas fortunis & corporibus, verū etiam animis excolēdis, multarū rerū vsu ac sciētia edoctus prudēter ac sapiēter (quod verè est imperare) cōsulis prospicisq;: dū scilicet infinitos propemodum homines, ac nobiles maximè, certatim ad studia literarum tuo exēplo excitas atq; incendis. Regum enim mores, reliqui ciues ferè sequūtor. Hinc non abs re tanquā ad certissimū rei literariæ praesidium, externi etiā homines, qui arte aliqua praestāt, ad te vnum vndiq; confugiunt, tēq; musarū patronum, ac fautorem eximium agnoscunt & praedicāt. Quæ res effecit, princeps humanissime, vt depulso metu, aucta spe, hosce de chirurgia cōmentarios tibi consecrarē: vt scilicet in ista tua foelici agricultura, qua semina omniū bonarū artium, in hūc foecundissimū agrum tuum, tū etiā in totū terrarū orbem, dispergis, aliquā operæ partē sustinerē: vtq; aliquid ex clarissimo tuo nomine patrocini j nanciscantur, auspiciatiusq; in vulgus prodeāt. Sed ad id etiam me vehementer impulit, quòd haud ita pridē, sermone in mensa illa tua semel atque iterum de chirurgia habito, quod in reliquis literis, græcis, latinis, hebræis cœperas, idem in hac quoque arte, quæ manu medetur, te facturū spondesti, tēque vnum aut etiam alterum doctū, & longo iam vsu exercitatum medicum instituturū, qui chirurgiam Lutetiæ Parisiorum diligenter, ac fideliter interpretētur. Atque hoc quidē tuum tā sanctum tāmq; salubre institutum nobis aliquando retulerunt ἀρχιτροπος Burgen-sis, Capellanus pater, & Guilielmus Milletus, medici tui clarissimi, simul & fidelissimi.

Fece

N V N C V P A T O R I A.

Fecerat idem quoque paulò antè amplissimis Cardinalis Bellaius, vir omni virtutum ac scientiarum genere cumulatissimus, ac reipu. Gallicæ longè amantissimus. Qui omnes me vehementer aliquoties hortati sunt, vt chirurgicam hanc lectionem maturè aggrederer, eam quidem tibi futuram, quàm gratissimam affirmantes, teque statuissè vnū aut alterum eius artis professorem, Lutetiæ instituere: arbitratus amplissimo huic, ac præpotenti tuo imperio, rem non vtilem modò, sed & apprimè etiam necessariam futuram. Quippe quòd deinceps chirurgos non parum multos haberes in regno tuo, vulneribus & fracturis ritè curandis, luxariisque decenter in suam sedem reponendis, maximè idoneos. Cæterum tametsi hac medicinæ parte, nulli sæpè non sit opus, nobilioribus tamen & principibus viris, atque iis etiam omnibus qui castra sequuntur, & militiæ addicti sunt, in primis necessaria est. Hic enim dum equis ad celeritatem dispositis huc atque illuc excurrunt, dum ludis equestribus exercentur, dum in bello cum hoste conflictantur, & dimicant, fracturis & luxationibus, vt interim vulnera taceam, nunquam nõ expositi sunt: quibus, nisi ritè tractentur, vel subinde periclitantur, vel membris sic affectis, suo tandem robore destitutis, reliquum vitæ tempus, miseri & imbecilles trahunt. Sed vt vnde digressa est redeat oratio, quod nondum hæ nostræ chirurgicæ institutiones erant absolutæ, tantisper distuli clarissimorum, quos supra nominaui, virorum hortationi parère, quoad hoc, qualecunque est, opus absolueretur. Dum autem cudendo nimis cunctatur typographus, hominem vt aliis medicinæ par-

E P I S T O L A

tibus præstantem, sic chirurgiæ peritia egregiè instructum, Vidum Vidium Florentinum, doctissimi vnde quaque viri, ac præstantium ingeniorum studiosissimi. D. Castellani Turelensium episcopi, singulari iudicio conquistum, maximo rei chirurgicæ studiosorum, atque eorum qui deinceps chirurgiæ præsidio indigebunt, commodo, in hanc præclarissimam urbem misisti, qui partem hanc medicinæ, propè desertam & iacentem, quod ad fracta saltem & luxata pertinebat, susciperet, atque extolleret. Librosque Hippocratis (qui primus hanc artem excoluit) inextricabilibus penè sententiis, ob fœcundam & obscuram nimis breuitatem, ubique ipsi medicinæ parenti familiarem, ne dicam affectatam, refertos: & ab eo nuper cum doctissimis atque accuratissimis Galeni commentariis, Latinos factos, magna sermonis elegantia, & rerum copia, interpretaretur. Quòd si hic, aut alius quispiam, pari doctrina & eruditione præditus, in hoc docendi curriculo perstiterit, bonis chirurgis, vt medicis, Galliam tuam breui refertam iri confidimus. Quod non mediocri mortalium bono, & cum sempiterna quoq; nominis tui gloria cueniet. Quandoquidem effectus chirurgiæ (quæ, Celso autore, pars est Medicinæ vetustissima) inter ceteras artis medendi parteis euidentissimus est & maximè necessarius, nedum utilis. Siquidem in morbis cum multum (inquit ille) fortuna conferat, eademque sæpè salutaria, sæpè vana sint, iure dubitari potest, secunda valetudo, medicinæ industria, an corporis beneficio contigerit. In his quoque affectibus in quibus medicamenti extrinsecus admodum maximè vtimur, quamuis profectus euidentior est, et

N V N C V P A T O R I A .

est, tamen sanitatem & per hæc frustra queri, & sine his reddi sæpè manifestum est. Sicut in oculis vel phlegmone, vel lippitudine arida, aut ea humorum defluxione, quam epiphoram appellant, laborantibus quotidie deprehendimus, qui à medicis, collyriis, aut alterius generis medicamentis, diu vexati: sine his aliquando sanescunt. At in ea parte quæ manu curat (χρυσουργίαν Græci nominant) euidēs est omnem profectum, ut aliquid ab aliis adiuuetur, hinc tamen potissimum manare. Quot enim morbos, eisdemque grauissimos, in rusticis & urbanis, qui delicatiores sunt & medicinam auersantur, quotidie videmus: sine illa victus ratione tam exacta, nullisque adhibitis medicamentis, naturæ duntaxat beneficio, euinci, & profligari? At si cui vel crus vel brachium fractū sit, vel luxatus humerus, aut quispiam articulus, nunquā sine manus opera, & chirurgi industria ad sanitatem perducetur. Itaque cum tanta sit eius artis dignitas, usus, necessitas, quis hoc tutum tam salubre de constituendis chirurgiæ professoribus, institutum non maximopere probauerit? Opus sanè liberali & magnifico principe dignum, & quo Romanorum olim imperatorū exempla, & laudata consilia reuocabis. Hi enim medicis (quos Reip. salutares & necessarios nouerant) amplissimum stipendium ducena & quinquagena annua sestertia, centena verò Rhetoribus & poëtis, reliquarumque disciplinarū professoribus pendebant. Intellexerunt nimirum illi semper Augusti imperatores, inter disciplinas excellentibus illustrium hominum ingeniis inuentas, & incredibili grauium virorū cura & industria perfectas expolitæque, Medicinam principem ac reginam existimari

E P I S T O L A

sine controuersia debere. Hæc enim & honestatis splendore, & vtilitatis magnitudine, & iucunditatis illecebris, reliquas omnes vincit, rebusque humanis ceu altera secundum Deum vitæ parens & vindex apprimè est necessaria, atque ideo non solum à Philosophis, aut Medicis, sed & ab ipsis quoque Imperatoribus, Regibus, atque etiam Pontificibus, aliquando non oscitanter exulta. Neque enim puduit illos primi ordinis viros studiū atque industriam in eo genere disciplinæ nonnunquam collocare. Et vt aliquot exempla proferamus: Augustus Cæsar, compositione medica à se inuenta lubenter utebatur, quam postea plerique medici in suos libros transtulerunt. Tyberius pastillū (Græci Trochiscum vocant) ad herpetas, Galeno teste, composuit. Nero imperator illaudatus quidem, sed tamen apprimè doctus, partem studij in hoc genere doctrinæ posuisse fertur. Hadriani & Iustini antidora nomine ab eis accepto, hodie quoque apud medicos celebrantur. Princeps Arabs Auicenna in remediis medicis à se conscriptis, testimonium Kabithi regis locis aliquot laudat. In Serapionis commentariis Iacibussa Medorum rex, & Kemud item Rex, velut medicinæ testes memorantur. Lysimachus, Gétius, Eupator, & Clymenus reges, medicæ artis non ignari, sua ipsorum nomina plâis indita, æterno æuo memoranda reliquerunt. Taceo Iubam Mauritaniæ regem, qui herbâ Euphorbiam nomine, miris laudibus celebrauit. Prætereo & Archelaum, Hieronem, Attalum, & Philometora reges, qui de plantis Græcè scripserunt. Ex Pontificibus autem Nicolaū quintū, & Eusebium arte & professione medicos fuisse, in historiis nostris legimus.

N V N C V P A T O R I A.

Ac de te quidem eiusmodi apud multos tam veteres quàm nostræ ætatis scriptores, facundia & eruditione per celebres, in commendationem dignitatis & excellentiæ medicæ artis, ac medicorum, longè plura literarum monumentis tradita sunt, quæ hoc loco referre & longum esset, & minime necessarium, eoque magis quod id iam cumulatè præstitit Andreas Tiraquellus tuus in curia Patiliensi consiliarius, vir optimis quibusque disciplinis instructissimus, ac linguæ vtriusque græcæ & latine, Iurisque prudentiæ, quam summa cum humanitate & morum integritate coniunxit, peritissimus: in opere quod de nobilitate & Iure primigeniorum mox in lucem est æditurus. At verò non est, *R E X* illustrissime ac sapientissime, quod peregrina iam exempla commemorem, cum tu nulla in re veteribus cedas, adeò ut qui in posterum medicinam, ac bonas omnes disciplinas (quæ te principe & autore suo splendori restitutæ sunt) autoritate principum commendare volent, non habebunt necesse veteres illos clarissimos Cæsares, Alexandros, Tyberios, Hadrianos, Iustinos, vel Reges alios, aut Pontifices amplius requirere, sed te vnum nominabunt, qui disciplinarum omnium intelligentia, & amplitudine stabilis ac præpotentis imperij, veterum nemine sis inferior. Fœlicissimam igitur Gallorum rempublicam iudico, quæ te regem tam prudentem, tamque salutarem, omnibusque virtutibus & disciplinis ornatissimum, diuino numine consequuta, rebus omnibus ad beatè degendam vitam conferentibus, ita abundat, ut hodie vniuersi terrarum orbis tractus omnes, & omnem antiquitatem

E P I S T O L A.

quitate superet. Sed multò adhuc feliciorẽ eã fore cõfidimus, si te diutius incolumẽ, & quotidianis reipu. vulneribus medetẽ, eiusque partes oẽs illustratẽ habuerit. Quamobrẽ Deũ optimũ maximum precor, vt populũ ab eo tibi cõmissum annos aduc quãplurimos, hoc salutari imperio regere possis. Quo enim ij plures erũt, plus ad cumulum fœlicitatis huius amplissimi simul & Christianissimi regni haud dubiẽ semper accesserit. Vale.

PETRI CRUSELII MEDICI

*in operũ huius commendationem
Hemlecastylabum.*

*Arts chirurgica diu malũ magistrũ
Lanfranco, Albucasi, Guidone, Bruno,
Rollando, Rogerio, Vigonioque,
Indignam malẽ passã ieruitatem
Cacũ deliturgemens tenebrũ,
Olim iam medicas duas sorores
Emersisse videns gradu citato
Ad claros studij viros, & r̃su
Illustres medicos Lueticanos
Tendit suppetias petens, opẽmque.
Cunctansur reliqui: Tagalinũ vnũ
Afflicta lacrymas dolens, vicemq̃,
Et sordes, habitũque non herilem,
Ornatũ decorat nono, reducens
Densũ è tenebrũ, vt amulari
Germanas meruĩt queat sorores.
Sic putres Arabum lacus reparat.
Nam quod Com habet senex, quod ipse
Huc spectans tot habet librũ Galenũ:
Hũc totũ poteris videre Lector
Descriptũ methodo breui. Proinde,
Summo, indice me, est honore dignũ
Vindex pæonia Tagalinũ artũ.
Quo chirurgica tam bono magistrũ
Et doctore tibi expolita prodit.*

AD LECTOREM

PRAEFATIO.



Hirurgicen Guidonis Cauliaci, abhinc centum & septuaginta annos, tanto apud medicos iuxta ac chirurgos in pretio habitam, septennium ferè eius artus candidatim praelegi. Quam cum tot passim errorum ac mendarum portentis scatentem, tamque inculta, squalenti atque impura barbarie cõspersam, ne dicã conspurcatam, reperissem: tum in animam induxi meum, opus eiusmodi, ab illis quibus ita reser- tum erat erroribus repurgare, & à vocabulis illis sordidioribus, atque ex intima ferè plebey sermonis face acceptis, si quando per ocium liceret, pro mea virili parte, vindicare. Videbam enim ple- rosque omnes, qui in disciplinis humanioribus & elegantioribus li- teris probe erant instituti, scdam eiusmodi, atque impuro nimis ser- mone traditam chirurgiã auersari, ab eiusque lectione, vel in ipso vestibulo adituque perterritos, statim se subducere. Nimirum exi- stimantes (nec abs re quidem) disciplinam omnem detractò cultu orationis sordescere. Contrà autem considerabam, chirurgicos hosce commentarios, remedia quàm plurima, ad eos affectus quæ manus operam desiderant, longè optima & efficacissima continere: ac me- thodolotum ad rectè docendum, tum ad faciliè discendum aptissima conscriptos esse. Itaque operis huius non pœnitendi, nec usque adeò (ut existimo) aspernandi provinciam, eo consilio subiui, ut ipsum à mendis, quibus scatebat, sordioribus vindicatum, velut reformarè, & quanta maxima possem diligentia ac fide recognitum, in lucem profferrem. Plurima igitur ex Galeno & Hippocrate à Guidone ipso desumpta, deprauatè ac perperam ex vetere illo barbaro in- terprete citata, vel ex doctis & fidelibus Latinis interpretibus in sensum germanum restituiimus, vel ad fidem Græci exemplaris in Romanum sermonem scilicet cõuertimus: eaque non rarò, si quã- do obscuriora adparebãt, sermone magis dilucido explicuiimus: quæ verò breuitas supprefferat, aut ambigua effecerat, sic expressimus, ut omnis ambiguitas tolleretur. Corruptas morborum penè om- nium, de quibus differebat, & remedia præsertim simplicium

voces

P R A E F A T I O .

voces propè innumeras, abiecinus & alias magis germanas, le-
 etas, & proprias, tum Græcas tum Latinas in locum illarum suffe-
 cimus. Adhæc, locos quàm plurimos densissimis obscuritatu tene-
 bris obductos, penitusque reitrosos, in lucem clarissimam, non me-
 diocri labore, & diligentia reuocauimus, Græcas item dictiones, &
 Latinas sanè multas cū barbaris & Arabicis aliud longè signi-
 ficantibus turpissimo errore confusas distinximus & explicuimus.
 Romanas quoque etymologias, Græcis vocibus ineptissime attribui-
 tas, reiecinus: ei verà illis interpretationem ex probatis autoribus
 iuxta linguæ virisq; proprietatē adiecinus. Quæ falso erant ab
 eo posita (erāt autē nō parū multa) emendauimus, & rationibus
 firmissimis, adiectis etiamnū classicorū autorū sententiis ad rē vel
 maximè facientibus, refutauimus. In reliquis, quæ crassam nimis,
 supinamque barbariè respiciebant, ea paulo tersius ac nitidius, ne
 lectori sordescerent, expressimus. Denique Guidonis cōmentarios
 de chirurgia conscripios, ex purissimis Græcorum, videlicet Hippo-
 cratis, Galeni, Pauli Aeginetæ & Aëtij Amideni fontibus, ac
 longè eruditissimis atque elegantissimis Cor. Celsi de re medica li-
 bri, ita locupletauimus et illustrauimus, à mendisq; illis sordidio-
 ribus, ac portentosis erroribus, quibus passim deformati erant, ex-
 purgauimus, vt non iam amplius Cautiaci illius opus, sed nostrum
 merito ab omnibus dici & æstimari possit. Quod & me etiam ta-
 cente facile videbunt, ac (nisi iniqui fuerint æstimatores) ingenuè
 fatebuntur, quicunque nostras has institutiones chirurgicas accu-
 ratius perlustrauerint, & eas cum scriptis Guidonis conferre non
 fuerint grauati. In quibus (fateor) ordinem illū à Guidone con-
 stitutum (quod nobis, vt supra diximus, longè optimus videretur)
 vbique fere obseruauimus. De quo nonnihil modo, quando id præ-
 sens locus postulare videtur, obiter dicemus. Itaque à definitione
 eius ipsius de quo agitur, iuxta Philosophorum præceptum, sem-
 per auspicamur. Mox quod iam definitione explicatū est, in suas
 differentias diuidimus. Post hæc causas, signa & iudicia cuiusque
 subiicimus. Denique vniuersalem curandi rationem apponimus.
 His sic absolutis, differentia illæ primæ ac (vt ita dicam) generica,
 propria etiam definitione circumscribuntur, & deinceps in suas ve-
 luti fibras finduntur, quæ notis cuique peculiaribus scitè designan-
 tur: præsagia deinceps cuiusque propria notantur, postremò cu-
 randi methodus particularis describitur. Quo sanè ordine vix alius
 (meo quidem iudicio) statui aut excogitari melior potuisset. Ce-
 terum nos tantum vniuersalem methodum eorum affectuum, qui
 chirurgiæ subiecti sunt, hic sequuti sumus: quod hæc abundè satis
 sit, in

fit, iis qui in rationali medicina probe sunt instituti, & corporum
 egrotantium, ac singularum partium affectarum temperatu-
 ram, situm, connexum, substantiam, figuram, actionem, usum,
 & si quæ sunt alia, ex scriptis medicorum, sed Galeni maxime,
 didicerunt. Itaque superuacaneum iudicavi de iis rursus affe-
 ctibus, quatenus in singulis partibus incidere consueverunt, dis-
 ferere. Anatonem quoque (cuius cognitio in primis chirurgo est
 necessaria) pratermisimus, quod hac in longè eruditissimis ac
 propè diuinis Galeni commentarijs de usu partium corporis hu-
 mani, & libris eiusdem de anatomicis administrationibus, ac qui-
 busdam etiam alijs, summa tum arte, tum eloquentia conscrip-
 tis (ut reliquos taceam, qui hac de re nostra memoria scripse-
 runt) amplissimè ac fidelissimè doceatur & exponatur. Ve-
 rumenimverò cum in eiusmodi libris plurima sint, quæ val-
 dè multis subobscura, quædam verò alijs prolixè nimis dicta, &
 parum ad chirurgum pertinentia videntur, si in postetum co-
 gnouerimus nostros hosce commentarios ab huius artis chirurgice
 studiosis hominibus probari, atque ut his accedat anatome (quod
 iam subodorati sumus) desiderari, quæ iam ante annos aliquot,
 ea qua fieri potuit breuitate & facilitate in hanc rem, quantum
 satis est chirurgo, conscripsimus, alia editione superis bene fauenti-
 bus, ne quid huic operi desit, in publicum emittemus. Quod autem
 ad stylum attinet, quo in hoc opere, quod totum ad docendum res,
 easque non indignas cognitu, est accommodatum, usus sum: non
 tam religiosus fui, ut illum tam anxium verborum delectum,
 tamque splendidum orationis cultum & ornatum ubique obser-
 uarem, qualem ab omnibus, qui in communem utilitatem aliquid
 scribunt, exigere solent, delicatuli isti lautioris eloquentiæ instito-
 res, qui omnem dictionem, atque orationem ut putidam auer-
 santur ac respuunt, quæ ex Tulliana officina deprompta non sit:
 cum tamen Tullius ipse non requirat eloquentiam à philosopho,
 quam etiam neque Seneca usquam desiderat, nisi cum paruo con-
 stat, cumque ultro adest, ut res magnas (inquit) magnificè pro-
 sequatur. Caterum etsi res ipsa etiam quas hic tractamus, oratio-
 nis cultum & ornamenta dicendi admitterent, ne vacabat quidem,
 dum hæc horis succisius commentabamur, ut singulas tum voces,
 tum sententias ita superstitionè expenderem, & adeò curiosè perse-
 querer. Sed nec licet nobis etià esse tã disertis, qui seniores Musas
 colimus: quique non ad ingenij ostentationem scribimus, aut ut
 fame uberem messem nobis comparemus, sed publicam duntaxat
 studiosorum utilitatem spectamus. Atque huius sanè rei nos sub-
 indo

P R A E F A T I O.

inde admonuit Iacobus Syluius, arctissima consuetudine vel ab ipsa fere statim ineunte adolescentia mihi semper coniunctissimus: vir cum omni arte ingenua, liberalique doctrina, tum medicinae scientia praestantissimus, ut copiose & erudite eius lucubrationes abunde testantur. Itaque, si rectè iudico, effeci ut stylus noster neque nimis neglectus, neque anxie nimis & ambitiosè elaboratus, sed temperatus & mediocriter cultus videri possit: quanquam duobus postremis libris & paulo cultior sit & aequabilior, quippe quod in eis aliquantum plus laboris & diligentia quàm in reliquis adhibuerimus, & quos sequeremur autores optimos habuerimus. Caterùm alia editione, si detur interim nobis ocium, hoc, qualecunque est, opus acrius recoquendi, & diligentius castigandi, futurum confidimus, ut in eo styli disparitas nulla, sed eadem ubique, quoad fieri poterit, aequabilitas (quod artis bene dicèdi, atque etià interpretandi primum caput est) reperiatur. Sed iam satis multa de praesentis operis materia, methodo, deq; toto labore nostro dictum sit: qui an à nobis frustrà vel rectè susceptus sit ac perfectus, aliorum esto iudicium. Restat ut paucis dicamus, cur liber sextus, ad quem toties lectorem quinque nostris prioribus remittimus, nostro nomine non fuerit euulgatus. Id fuit in causa, quod dū importunis amicorū efflagitationibus vrgerer, ut quae de re chirurgica scripseram, ea adderem, nō putabam sextū librum adiungendum: propterea quod rudem diutaxat & impolitam quandam syluam congestam habebam eorum quae ibi tractanda erant: quam negotiis plurimis & familiaribus & publicis occupatus haudquaquam recognoscere poteram. Itaque id oneri Iacobo Hollerio, lectissimo medico, doctissimoque philosopho, & arte dicèdi instructissimo, dedimus, qui sic opus rude & inchoatum à me limauit, expoliuit, locupletauit & consummauit, sicque totum immutauit, ut cum ad me rediret, meum esse nequaquam agnoscerem. Quocirca sub illius nomine, potius quàm nostro, quicquid id erat censuimus euulgandum: ne hominem mihi amicissimum debita laude, meritāque gloria fraudaremus. Tu lector, utriusque labore fuerere, & Vale.



INSTITVTIO-
NUM CHIRVRGI-
CARVM IOANNIS
TAGAVTII
MEDICI.

LIBER PRIMVS.

De tumoribus præter naturam, in
vniuersum.

Quid sit tumor præter naturam, qui vulgò generali
nomine apostema dicitur, & multiplicis eiusdem
definitionis examinatio, ac diuisio secundum re-
centiores.

CAPVT I.



VMORES omnes, qui præter na-
turam consistunt, recentiores tum
medici tum chirurgi, atque etiam
vulgus ipsum sub nomine aposte-
matis comprehenderunt. Quum
tamen ἀπίσμα Galeno & Græcis
omnibus, vna sit species tumorum
præter naturam incidentiū, quam
Latini appositè abscessum nomi-
nauerunt, & ipsa iuniorum turba, accepto ab Auicennæ
interprete vocabulo, exituram, de qua in sequentibus fu-
sius atque accuratiùs dicitur. Quanquam & recentiores
ipsi apostema nonnunquàm speciem, seu differentiam fa-
ciunt tumoris præter naturā, cū scilicet ipsum diuersum

ἀπίσμα.

Abscessus.

*Apostema
tis definitio
vulgaris.*

*Definitio
nis exami-
natio.*

*Tria mor-
borū gene-
ra tumorū
præter na-
turā essen-
tiam con-
stituentia.*

*Definitio-
nes acciden-
tales.*

Prima.

Secunda.

Tertia.

faciunt ab exitura quam vocant, & pustulis, de quibus etiā suo loco copiosius differemus. Nomine enim apostematis illi ferē eos tumores passim intelligunt, qui & in magnam fatis molem attolluntur, & ex humorum (vt loquuntur) naturalium influxu procreantur, atque ideo etiam vera apostemata vocant. Itaque cum apostema generis nomen est, omnes præter naturā tumores sub se cōplectens, Auicennæ & eius sequacibus ita communiter definitur, Apostema est ægritudo composita ex triplici genere morborū, in vnam magnitudinem aggregatorum. Quam definitionem essentialē esse contendunt: quippe quæ genere constet & differentia, naturamq; ipsius definiti sufficiēter explicet. Porro, generis definiti locum in ea obtinet ægritudinis vocabulum. Reliqua verò apposita sunt, ad differentiam aliorum morborum, qui in compositione seu constructione instrumentorum contingunt, quorum differentias Galenus recenset libro primo de morbo & symptomate.

Tria autem illa morborum genera, quæ in tumore hoc præter naturā, apostemate vulgò nuncupato, reperiuntur, vnius morbi essentiā constituentia, sunt, intemperies, quā & malam cōplexionem appellant: incommoderatio, quæ etiam mala compositio dicitur: & continui, seu continuitatis, aut vnitatis solutio: Graiis autē vocibus dicuntur. *Δυσκρασία, ἀμικρία, καὶ συνεχίσις λύσις.* Cæterum aliās multas apostematis vulgariter dicti descriptiones adferunt, verius quàm definitiones, nam neq; cum ipso definito conuertuntur, neque eius naturā satis explicant, aut eius essentiā sufficienter constituunt: proinde & accidentales eas vocāt. Cuiusmodi est hæc ex initio libri de tumoribus præter naturā à Galeno conscripti, ab eis desumpta. Apostema, seu tumor præter naturā vnum aliquid eorū est, quæ corporibus accidunt, partē quam occupat, secundū omnē dimensionem, distendens. Quæ descriptio ex iis Gal. verbis decerpta est, *ἐν τῶν συμβεβηκότων τοῖς σώμασιν ὑπάρχει, τὸ ἀναμεινόν πρῶγμα πρὸς τῆς ὀγκοῦ φωνῆς. τὸν γὰρ εἰς μὲν & καὶ πλάτος, καὶ βάθος διάστασις οὗτος ὀνομάζουσιν.* Hoc est, Quod tumoris vocabulo significatur, id eorum quæ corpori accidunt, vnu esse constat. Sic enim diffensionē in longū, latū, & profundū, nomināt. Talis quoq; erit definitio si ita dixeris, Apostema, incrementū est, naturalē statū excedēs. Item & quæ

& quæ sequitur, ex lib. 13. Therapeutices methodi deprõ-
 5 pta. Apostema tumor est, in quo partes à naturali habitu
 10 in quantitate seu magnitudine recesserūt. Sic autem apud
 Galenū legitur: ἐν τῷ δὲ τῷ τρισκαίδεκάτῳ τῆς οὐλῆς πραγμα-
 5 τείας δοτι, περὶ τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων, ἀρξάμεθα λίγην, ἐν οἷς δηλο-
 10 νότι κατὰ μέγεθος ἐξισταῖαι τὰ μὲν τῷ κατὰ φύσιν. In hoc verò
 15 totius operis tertiodécimo de tumoribus, qui præter natu-
 rā incidūt, differere incipiemus, in quibus scilicet partes à
 naturali habitu in quātitate recesserūt. Itaq; nisi his de-
 finitionibus particulā hanc addideris, actiones lædens, seu
 20 euidētē actionis noxam inducēs, nequaquā absolutē &
 essentielles erūt. Nō enim tumor omnis, distensionē in lon-
 gum, latū, & profundū, vltra naturę habitū in toto corpo-
 re, aut particula aliqua efficiēs, vel incrementū quodcūq;
 25 naturalē statū excedens, iuxta vulgarē acceptionē, aposte-
 ma, aut tumor præter naturā, statim dici debet. Siquidem,
 vt libro de tumoribus præter naturā Gal. ait, incrementū
 eiusmodi naturalē statū excedens, non ægris modò, sed &
 30 sanis etiā, tam in toto corpore, quā in qualibet particula
 accidere potest. Obesi nāq; tameti vltra naturæ habitum,
 in latū & profundū distenti sint, non tamē iam præter na-
 turā se habent, sed solū (inquit) nō naturaliter. Nondū
 enim naturę limites sunt egressi, neq; in eis adhuc est actio
 35 nis læsio, qui terminus est excessiū, qui præter naturā di-
 cuntur. Tumores quoq; illi, qui in particulis adhuc sanis
 existentibus, & citra omnem sensum doloris cōsistunt, re-
 ctē quidem supra, seu vltra naturā, non tamen præter na-
 turam, dicuntur. Vt si vtraque mamma, vel altera dunta-
 40 xat immodicē increuerit, ita tamen, vt ipsa partis essentia
 præter naturam, hic tumor dicetur, sed vltra naturam dunta-
 xat. Ergo si absolutam magis & essentialē tumoris præ-
 ter naturam, definitionē, ex Galeni mente ac scriptis eius-
 dem placet colligere, hoc pacto definies, Tumor præter na-
 45 turam, incrementum est naturalem statū in corpore exce-
 dens, & læsionem actionis inducens. Cæterum tumo-
 res eiusmodi, qui præter naturam dicuntur, in tres species
 Guidoni & illius ætatis scriptoribus, solent diuidi, in apo-
 stemata scilicet, pustulas, & exituras. Apostemata itaque
 50 tunc illi nominant tumores maiores, in quibus materia ex-

*Absoluta
 tu. præter
 naturā de-
 finitio ex
 Gal. scri-
 ptis desum-
 pta.*

*Tumoriū
 præter na-
 turam diui-
 sio, in suas
 species iux-
 ta recen-
 sitionem sen-
 tentiam.
 Aposte-
 mata.*

*Pustula.**Exitura.*

qua creantur magis copia seu quãtitate peccat, quã qualitate. Pustulas verò, exiguos quosdã tumores, quos & Bothor appellant, in quibus substantia ex qua nascitur, qualitate magis quã copia molesta esse solet, imò & plerũq; in eis (vt volunt) venenositas subest. At exituras, eos tumores vocant, quos Latinis abscessus, & Græcis ἀποστήματα rectè nominari iam suprã diximus. Sed liceat cuique nominibus quibus velit, vti, modò à rerum natura (vt Gal. ait) non discedat.

*De differentijs tumorum, qui præter naturam
incidunt.* CAP. II.

10

*Diuisio tu-
moris in su-
as differen-
tias.*



*A quibus
sumantur
differentia
tumorũ præ-
ter naturã
recentiori-
bus.*

Substãtia.

Materia.

Accidẽtia.

*Partes affe-
cta.*

Vmorum præter naturam, qui vulgò generali nomine apostemata dicuntur, variæ ac multiplices sunt differentia: Quæ omnes recentioribus chirurgis sumuntur, vel a substantia rei vel à materia, vel ab accidentibus, vel à partibus affectis, vel à causis efficiẽtibus. Differentia, quæ à substantia ipsius affectus desumuntur, his & eorum principi Auicennæ, sunt, tumor magnus, & tumor parvus. Ac magni quidem tumores illis censentur, phlegmonõsi, 15 qui in carnosis particulis tumidioribus fiunt, item ædematõsi, erysipelatõsi, & scirrhomõsi, qui in molemi effatu dignã attolluntur. Parui verò tumores eisdem dicuntur, minutæ eminentiæ, (quas pustulas & bothor appellant) in cute ac corporis superficie non infrequentius apparentes: cuiusmo- 25 di sunt lepræ Græcorum, psoræ, id est, scabies, impetigines, & id genus alia, de quibus in sequentibus latius dicemus. Materia prædictorũ tumorũ, sunt humores quatuor tam naturales (vt vocãt) quã nō naturales, scilicet pituita, & vtraq; bilis, itẽ humores qui toto genere præter naturam 30 sunt, & solida aliquãdo quædã corpora flatus quoq; & serosus humor: à quibus omnibus, aliæ sumuntur eorundẽ tumorum differentia, vt in sequẽtibus ampliùs declarabitur. Symptomata autẽ seu accidẽtia, quæ cõmuniter ipsis tumoribus superuenire solent, sunt dolor, calor, mollities, duri- 35 ties, & id genus alia, à quibus etiã differentias sumendas esse volunt. Quæ à membris seu particulis ipsis laborãtibus sumuntur, sunt veluti ophthalmia, oculi inflammatio: synanche, gutturis phlegmone: phymata, phygethla, laxarum, quas glandulas vocamus inflammationes: itẽ & bubones.

Causæ

De tumoribus præter naturam.

5

Causæ verò efficientes, à quibus & differentiæ quedam accipiuntur, sunt, congestio, & fluxio, crisis, id est, iudiciū, quod in morbis fit: ac quædam aliæ tum interiores, tū exteriores causæ, de quibus copiosius atque accuratius in sequentibus edisseremus.

Causæ efficientes.

Verumenimverò, tumorū huiusmodi præter naturam incidentium, varietates ac differentiæ omnes, ex eius quod influit natura, & substantia tumorem cōmittente, nascuntur Galeno, lib. quem de tumoribus præter naturam in-

Tumor præter naturā differentie vnde nascuntur. Gal.

scripsit. Item secundo libro ad Glauconem, & 13. methodi medendi: quibus locis scribit, omnium tumorum qui præter naturam sunt, varietatem: ex eius quod influit natura, enasci. Vbi enim (inquit) flatulenta materia copiosior accessit, flatuosi magis tumores fiunt. Phlegmonæ verò ma-

Gal. 13. Meth.

gis similes, vbi sanguis: sicut erysipelati, vbi flaua bilis: & œdematōsi magis, vbi pituita: similiter scirrhosti, vbi vel crassus, vel admodum lentus humor parti est infixus. Itaque tumores omnes præter naturam ipsi Galeno fiunt, aut ab humoribus, aut à flatuoso spiritu, qui quādoque sub cute,

quandoque sub circūossalibus mēbranis, quandoque in ventre, quandoque in intestinis, nonnunquam in medio horū, & peritonæi colligitur. Græci emphysema, Auicennas apostema ventosum vocat. Si ab humoribus tumores eiusmodi fiant, aut calidi, aut frigidi sunt, aut mixti. Calidi autem fiunt à sanguine optimo, id est, adamussim rubente,

Emphysema.

& consistentia mediocri, ac moderata qualitate, & tunc phlegmonem Græci, Latini inflammationē vocant. Aut à flaua bile, vel à sanguine feruenti ac tenui, vel sanguine & bile calidioribus: erysipelas illi, hi sacrum ignē appellāt.

Calidi tumores.

Frigidi verò vel à tenui pituita suscitantur, atque tū Græci œdema, nostri laxum tumorem vocant, Auicennæ interpreter vndimiam appellat, aut ab humore atræ bilis, vel crassa & lenta, tenaciq; pituita, scirrhosti illi, Latini duri- tiem, Arabes sephirum vocant. Ex seroso quoque sangui-

Tumores frigidi.

nis recremento quandoque tumores fiunt, vt in sequentibus dicitur. Mixti dicuntur quum miscentur simul eiusmodi humores, atque si alter alteri dominetur, ab eo qui in mixtura exuperat, nomen ipsi tumori inditur. Vt sanguine bili domināte, phlegmonem dicemus erysipelatōdē: sicuti ob flauā bilē præpollentē, erysipelas phlegmonōdes.

Tumores rosi.

Tumores complicati.

Iam verò aliarum mixtionum, similis est interpretatio, phlegmone scirrhôsa, & scirrhus phlegmonosus: œdema phlegmonosum, & phlegmone œdematosa. Atq; ad hoc exēpli, reliquos quoque tumores, etiam si trium, vel quatuor humorum inuicem commixtio sit nominabis. Porro si pares sint, atque ex equo mixti humores, ita vt alter alteri non præpolleat, tunc per copulam eorū, quos excitant, tumorū nomina cōiungemus. Vt si sanguis bili æqualiter misceatur, vitium illud per coniunctionem, phlegmone & erysipelas dicitur, vel cū Galeno, phlegmōnes, erysipelatis que specie & natura medium. Et hi quidē sunt præcipui tumores, qui ex humorum influxione fiunt Galeno: Phlegmone inquit, erysipelas, œdema, scirrhus. Ad quos innumeri alij naturæ modū excedētes tumores, reducūtur, ac sub eis cōprehenduntur, tametsi variis ex causis diuersa sortiti sint nomina. Itaque ad phlegmonarum genus pertinent, phygethlon, quod pānus, Celsō autore, a nostris vocatur, phyma, tuberculū eidē Celsō nuncupatū, terminthō, phymatis species Oribasio, sed Aëtio phygethli: dothienes, quos Celsus furunculos vocat. Itē gangrēna partis vixgōis, idest, mortificatio sed nō absoluta, & sphacelus, qui à Latinis syderatio, & ab Auicenna ascachilos, dicitur. Carbūculus quoque, Græcis anthrax nominatus: de quo scribit Auicennas capite de pruna & igne persico. Ad erysipelata verò referuntur herpes, qui specie sunt duplices miliares scilicet, & exedentes, quos ἰδισμύρας Græci appellant. Vtranq; speciem Auicennæ interpretes fornicas vocauit, sed eas cū verrucis illis, quas Græci myrmecias, Latini formicas vocāt, nominis similitudine deceptus, eodem capite turpissimo errore cōmiscuit. Eosdem herpes Celsus sub ignis sacri nomine videtur cōprehendisse. Recentiores eos inter pustulas (vt loquūtur) cholicas adnumerāt. A bile etiā ferē proueniunt, atq; ideo ad erysipelas pertinet, phlyctenæ à Græcis vocatæ, de quibus agit Auicennas capite de vesicis & inflammationibus. Ad tumores pituitæ hoc est, œdemata, referuntur nonnulli tumores sub apostematibus nomine à Græcis comprehēsi, qui ab Auicenna nodi, ab Haly Abbate selaa & dubeleta phlegmatica dicti sunt, Latini abscessus vocant. Quorum iuxta diuersas materias in eis contentas, diuersæ etiam sunt species.

Porro

Tumores
præcipui,
qui ex in-
fluxu hu-
morū fiūt.

Tumores
ad phlegmo-
nem perti-
nentes.

Erysipela-
tosi tumo-
res.

Oedemato-
si tumores.

Porro tria sunt Galeno eiusmodi abcessuum genera frequentissima, quorum singula propriam appellationem Græcè sunt sortita, ea sunt atheromata, steatomata, melicerides, à similitudine quidē contentorum in his corporū dicta, vt amplius in sequentibus declarabimus. Est & apostematum, hoc est abcessuum genus, in quo res aliæ continentur, quæ non humorū modò, sed & solidorū quorundam corporū proprietates repræsentat: verum hæc (inquit Galenus) rarius. Ac de iis quidē etiam in sequentibus, cum de abscessibus sermonem faciemus. Ad hæc autem modò dicta abcessuum genera pertinent, tumorū quædā nomina, a recentioribus excogitata, & nusquam apud antiquos scriptores reperta, vt testudo, mollis tumor caluarie inhærens, & talpa: hæc ad atheroma, illa ad meliceridem magis spectare videtur. Ad steatoma verò ferè pertinet, tumor dolore carens, quem natā, vel naptā appellant, de quibus suo loco dicemus. Huc quoque, spectant vocata à Græcis ganglia, ab Auicenna glandulæ, quæ à vocatis nodis differūt. Scrofulæ quoq; à vulgo vocatæ, à pituita fiunt, proinde & ad œdemata reducūtur: hæc Græcis charades, Latinis strumæ, dicuntur. Galenus tamen alicubi inter scirrhus, ob duritiem annumerat. Ad œdema etiā refertur Galeno ea hydropis species, quæ leucophlegmatia Græcis, & hypofarcanūcupatur. Cæterū tumores, qui ad atrā bilem spectant, & sub vocato scirrhus continentur, sunt cancri, qui à Græcis carcini, & carcinomata dicuntur, Celsus tamen cācrum à carcinomate seiūgit, vt illū ab his quæ extrinsecus incidūt, oriri dicat & serpere, hoc corrupta interius aliqua parte innasci. Idē cancrū in multas species diducit, erysipelas scilicet, gāgrænā, & vlcus nigrū. Huius quoq; farinæ est elephantus, seu elephantia aut elephantialis, à vulgo medicorum lepra vocata, & quibusdam, sancti Lazari morbus, Itaque lepræ nomen Auicennæ, & imperitæ multitudini, morbum grauissimum ac perniciosissimum significat: cum tamen Gal. Paul. Aegine. ac reliquis Græcis, leuis sit morbus, non multum à scabie differens, quæ psora eisdem dicitur. Ex scirrhoso etiam tumorum genere censentur, verrucæ ab Auicennæ interprete vocatæ Latina voce, quæ tumores sunt instar monticulorum quorundam in cute eminentes, vnde & nomen illis factum est, à vul-

14. Theri

Tumor
noua quæ
dam apu
recentiore
medicos n
mina.Testudo.
Talpa.

Struma.

Leucophle
gmata.
Scirrofi ti
mores.Cancer.
Carcinoma.Elephantia.
tiasis.

Verruca

Porra. go porra dicuntur. Huius autem generis sint, myrmecia,
Poreaulx. ac si formiculas diceret, & acrochordones, quæ nostris pē-
Myrmecia. files verrucæ dicuntur, clauus, qui callus est figura teres,
Acrochor- Græcis ἄλως: vocatus, Auicennæ almismar, thymion vel thy-
dones. mon verrucula thymi herbæ capita repræsentās, Auicen- 5
Clauus, nas videtur tusum, vel ut alia habet lectio, tarsecum nomi-
ἄλως. nasse. Ex verrucarum quoque genere sunt, vocata ab Aui-
Thymion. cenna cornua, ita quidem dicta, quod cum oblonga sint,
Cornua. instar cornuum recurvantur. Item & calli quos Græci τέλα-
Calli τέλοι. λας: vocant: hi ex labore obdurata cute gignuntur. Ad atrā 10
Dracunc- Græci appellant, Latini dracunculum ab eius nominis a-
culi. nimalis similitudine, Auic. venam medeni, Halyabbas, ven-
Dracunc- nam saniosam vocauit. De quo Paul. Aeg. c. vii. li. iiii. Hic
culi. morbus apud nos parum est frequens. Præter hosce, quos 15
~~Dracunc-~~
~~Poreaulx.~~
Pustule. iam recensuimus tumores, accidunt & alij, corporis super-
 ficem non raro occupantes, nempe parua quædam emi-
 nentia, quas pustulas & bothor appellant. Quæ licet & in-
 ter se, & ab iis tumoribus quos supra commemorauimus,
 differant: ab iisdem tamen humoribus fiunt, à quibus & 20
 magni iam dicti tumores. Proinde maioris, minorisve ratio-
 ne ab illis tantum distare videntur. Cæterum ut eiusmodi
 minuti tumores (quos sanè ignorare nō debet chirurgus)
 notiores, ac peruij magis cuique euaderent, operæpretium
 me facturum putauj, si horum nomina tum Græca tum La- 25
 tina, tum etiam Barbara, ac rudem quandam ut in maio-
 ribus fecimus) descriptionem hoc loco subiiceremus. Er-
 go ut rem ipsam aggredia nur, ex pustularum genere sunt,
Lepra. lepra Græcorum, apud Latinos nomen suum retinens, &
Psora. psora iisdem scabies appellata, affectus quidem inter se ad- 30
 modum affines: cutis enim sunt aspredines, cum pruritu &
 corporis colliuatione, ab eodem humore progignuntur,
 nempe atra bile. In hoc tamen differunt, quod lepra cum
 manifestis squammis cutem profundius in orbem depasci-
 tur. Psora verò superficiem tantum variis figuris ledit, & 35
 furfuracea quædā corpuscula remittit. Huc etiā spectat ca-
Lichene. leuis cutis infectio, quæ Græcis lichene, Latinis impetigo,
 & vulgò quibusdā (ut Manardus refert) volatica nomina-
 tur. Hæc fit mistis saniebus tenuibus & acris cum aliis
 crasis & frequenter ac faciliè in prædictos affectus, lepram
 scilicet

scilicet & scabiem, quam *psora* vocât, Galeno autore de-
 generat. Sunt tamen qui Græcorum lepram, impetiginem
 vocari à Celso contendant. Verumenimvero cum ipse se-
 orsum scribat de impetigine, & quatuor eius species faciat
 lib. quinto suæ medicinæ, euidenti argumento conuinci-
 tur, eum aliam rem per impetiginē intellexisse, quàm Græ-
 corum lichenas. Quandoquidem nullus autor Græcus le-
 gitur, qui tot genera in lichenis vnquam agnouerit.

Itaque si proprie & cum Galeno loqui velimus, lepra
 & lichene vel impetigo vnū & idem esse non possunt, alio-
 quin idem in seipsum mutaretur. Vt igitur rem omnem in
 pauca contraham, quando leuiter cutis inficitur, cum sola
 videlicet aspredine ac pruritu, id græcè *lichen*, latinè verò
 impetigo dicitur. Dum autem peior fit affectus nomen si-

cuti & formam mutat. Si enim manifestas squammas li-
 chene excitat, atque altius cutem depascitur, lepra proprie
 dicitur. Si verò per extimam tantum superficiem extendi-
 tur, & corpora furfuracea emittit, *psora* à Græcis, à nobis
 proprie scabies vocatur. Quamquam scabiei nomen vulgò

& recentioribus medicis, latius longè pateat, qui omne cu-
 tis vitium, scabiem nominant. At improprie loquuntur,
 pura enim ac vera scabies Latinis, is proculdubio affectus
 est, qui Græcis *psora* vocatur, ab Auicennæ etiam *albara*
 & *morpheâ* (cōtra quorūdam opinionem) diuersus. Nam

quod illi & Punicis ferè omnibus *albaras* dicitur: à Græcis
 & Celso *leuce* nuncupatur. Illorum verò *morpheam*, Græ-
 ci *alphon* vocant: in quo quidem affectu non tota quidem
 caro afficitur: sed corporis duntaxat superficies: veluti (in-
 quit Galenus) squammas quibusdam inspergitur. Sūt au-
 tem *alphi* ipsi Galeno genere duplices, nempe *albi* qui ex
 pituita: & *nigri*, qui ex melancholico humore prodeūt. Sed

hæc à rerum consequentia tracti diximus. Neq; enim leu-
 cæ: neq; *alphi* ipsi, inter tumores præter naturam annu-
 randi veniunt: sed potiùs inter cutis defordationes. Quæ li-
 cet minimè lædant: quia tamen dehonestant, maiori ple-
 rumque tedio (præsertim mulieribus) esse consueuerunt,
 quàm multi alii lædentes quidē: sed latētes morbi. Vtrum-
 que autē hunc affectū, *leucem* inquam & *alphon*, vitiligi-
 nis nomine Celsus (qui tres eius species facit) cōplexus est:
 quāuis alij medicinæ interpretes, Græca Latina facientes,

Quatuor
impetiginis
species.

Impetigo.

Lepra.

Psora.

Scabies.

Albaras.

Leuca.

Lib. vii. de
causis sym-
ptomatum.

Alphi du-
plices.

Vitiligo. leucem passim vitiliginem conuertant, quod cum addito aptius fieret: vt si albam vitiliginem dicas. Vitiligo itaque si genere quodam comprehendatur, sædus cutis color est, ex malo particulæ habitu proueniens, quæ nutrimentum probè sibi assimilare non potuit. Maximo enim facultatis alteratricis errore, vitium hoc contingit: cuius duplicè speciem alij constituunt. Vnam quidem, quæ solam cutim inficit: maculis (quæ illi infixæ adhærent) squammulis quibusdam similibus, alteram, quæ alius descendit, adeo vt carnem quoq; ipsam attingat, ac pilos coloretti in ea enim cani & lanugini similes enascuntur, hæc a viscosa glutinosaque pituita contrahitur. Vtraque autem albo vel nigro præcipuè colore commaculat. Prior species quæ sublimior est, siue alba siue nigra sit, Græcis eadem voce alphas dicitur, quod colorem cutis immuter, *ἀλφας*, unde *ἀλφας* originem duxit) immutare significat apud veteres Græcos: Auicennas morpheam appellat. Altera vero species, quam profundiorè diximus, Græcis & Celso leuce, reliquis Latinis vitiligo alba, Auicennæ Albaras, nominatur. Halyab. solus inter Arabes lepram nuncupauit sædum quidem & difficile curabilem affectû, non tamen perniciosum significat, apud quem hæc non vt apud Græcos leuem, & a scabie parum differentem, aut vt apud Auicennam grauissimum ac perniciosissimum, sed sædum. Ex quibus intelligi potest, quod parum nominibus sit fidèdû, nisi res adamussim fuerit explorata. Eadè enim vox sæpe apud varios auctores diuersam ac longè dissidentem habet significationē, vt passim in iis commentariis demonstratur. Hæc autè obiter, de eiusmodi maculis, & cutis defædationibus annotauimus, vt rerum cōfusio, quæ ex perperam intellectu nominibus sequi solet, effugeretur. His igitur omisissis, ad institutum reuertamur, ac reliquas pustulas breuiter, quātum fieri potest, percurramus. Ex quarū etiā genere præter iā enumeratas cēsentur Græcorū ionthi, epinyctides, hidroa, psyraces, exanthemata, Celsi papulæ, & Plinij mentagra.

Ionthi.

Ionthi, parui sunt, & duri in vultu, seu cute faciei tumores Galeno & Paulo, à crasso humore progeniti, qui vel resoluuntur, vel exiguo ingenito purè maturantur. Latinis vari dicuntur. Meminit Galenus libro quinto de medicamentis secundū locos, ionthosi cuiusdam affectus, quæ principium

esse dicit elephantiasis: sub quo affectu videtur tertium & quartum genus impetiginis Celsi comprehendisse.

Epinyctides Celsi pustulæ sunt pessimæ, colore vel subli-
uideo, vel subnigro, vel albo, fabæ magnitudinē nō excedē-
tes, in eminētibus partibus, vt tibiis & pedibus maximē, na-
scentes. Circa has vehemēs inflāmatio est, & cūm ad apertę
sunt, reperitur intus exulceratio muccosa: color est humo-
ri suo similis: dolor verò ex eis supra magnitudinē earū est.
Neque enim vt diximus, faba maiores sunt. Nomē à nocte
acceperunt, vel quòd noctū grauiori dolore torqueant, vel
(vt Celsus voluit) quòd noctu ferē oriātur. Plinius eas, pu-
stulas liuētes ac noctibus inquietātes nominat: Arabes ve-
rò, effere, fere, vel saure eiusmodi pustulas sic noctu infe-
stantes, vocauerunt.

*Epinycti-
des.*

*Vnde dicta
epinyctū.*

Quæ Græcis sunt hydroa, Latinis quibusdā sudamina & Plinio papulæ sudorū dicūtur: Auicennæ verò, plāta noctis: & Almāfori, alhasaphū. Quò fit, vt epinyctis à plāta noctis ipsius Auicennæ plurimū differat, tamen si vox ipsa Græca epinyctis (vt modo dicebamus) à nocte etiā originē trahat.

*Sudamina.
Planta no-
ctis.*

Sunt autē sudamina hæc Galeno teste lib. iij. aphorismo-
rum, Aph. xxj. ex genere pustularum, in summa corporis
parte hærentiū, quæ instar vlcerū cutem exasperāt: proue-
niūtq; vt & nomē ipsum (inquit) indicat, ob multos sudo-
res, vel biliosiores, vel mordaciores, qui cutem mordent, &
pruriginosā reddūt, ac in modū vlcerū exasperāt. Porro
hæc affectio, pueris, atque iuuenibus, sed his præcipuē, qui
naturā sunt biliosi, ætus tēpore cōmunis est, adeoque faci-
lis curationis, vt per se absq; vllō præsidio albicātibus qui-
busdā squāmulis dimissis sanescat. Auicennæ autē desuda-
tiones (vt ex earū cōstat descriptione) potius exāthemati-
bus Celsi, quā sudaminibus Galeni respōdere videntur.

*Gal. de su-
daminibus.*

*Desuada-
tiones Au-
cennæ.*

Si quis tamen nomina attendat, desudationes ipsas
Auicennæ, putabit Græcorū hydroa, quæ Latini suda-
mina vocant. Verumenimverò, nō tam nomina ipsa, apud
Barbaros & Arabicæ sectæ autores, sequenda sunt, quā
ipsæ rerum descriptiones.

Psydraces, seu psydracia, pustulæ sunt, parū supra sum-
mam cutē eminētes, phlyctænis, hoc est, bullis, quæ ab igne
excitantur, persimiles. Hæ in capite præcipuē nascuntur.
Psyzzacion corruptè legitur apud Celsum pro psydracion.
Pustulæ

Psydraces.

*Morbili.**Variolæ.**Exanthema.**Ecchyma.**ta.*

Pustulæ illæ in cute florentes, à crassiss & cuti impactis humoribus natæ, quæ vulgò morbilli & variolæ nūcupantur, Galeno, quòd turgentium ad florē gemmarum instar tumēāt, exāthemata, Hippocrati verò, quod sponte è cute erumpant, in eaque floreat, ecchymata dicuntur: *ἐκθύματα* enim, vnde exāthema fit, florē, *ἐκθύειν* verò, vnde ecchyma deducitur, erumpere significat & efferuere. Plinius papulas & interdum pituitæ eruptiones easdem pustulas vocat. Porro hæ duplices sunt, quædā enim sublimes, quædam verò latæ. Sublimiores à calidiore & tenuiore humore sūt, 10 pruritūque excitāt. Latæ verò & humiles à frigidiore & crassiore humore proueniūt, neq; pruritū cōcitant. Atque priores morbili, posteriores verò variolæ vulgaribus medicis dicuntur. Galli his nominibus præposterè abutētes, humiles istas & vix à cute extātes rubeolas, morbillos verò variolas, appellant. Hip. lib. 3. Epi. hoc pustularū genus in maiora & minora ecchymata diducit, quæadmodum & sublimiores magnos herpetas nominat, vel quia (vt Galenus ait) magnū occupant locum, vel quia cum maligna cōtingunt erosione. Hæ nanque, quandoque altero tantum, 20 quandoque vtroque modo magnæ visuntur.

Papulæ Celsi.

Cornelius Celsus libro quinto suæ medicinæ post tractatū de impetigine, meminit duplicis papulæ: vnus quidē leuioris, quæ si ieiuna salua quotidie defricatur, sanescit: alterius maioris, in qua magis cutis exasperatur, exulceraturque, ac vehemētius & roditur, & rubet, difficiliusq; sanescit. Hanc *ἀγρίων*, id est, feram dicit à Græcis appellari. In vtroque tamē genere, minus vitij, quàm in impetiginibus agnoscit, adeò vt id quod difficilius sanescit, nisi sublatum sit, in impetiginem verti, ac trāsire adfirmet. Galli (si quid iudico) genus vtrūque, sed prius maximè, dartras appellāt. 30 Id enim vitium maximè rotundū incipit, eadēmq; ratione in orbē procedit, ac tardè serpit. Quæ omnia papulæ primi generis Celsi cōueniunt. Has autem Celsi papulas, nihil à Græcorū lichenis aut Latinorum impetiginibus differre, nōnulli cōstanter asseuerāt. Eūque solū autorē inter Latinos, lichenas, papulas vertissē legimus. Mētagra, Latina vox est Plinio, qua rem omnino aliā ab impetigine, in principio libri xxvj. visus est significasse, longēque peiorē affectū, quàm eū quē Græci lichenis nomine intellexerunt: licet in

*Dartra Gallica.**Mētagra.*

cet in

- et in medicinis quâdoque Græcorû lichenas impetiginē
 fit interpretatus, & morbū eiusmodi mētagrā appellatum,
 eo loco etiā lichenas vocet. Porro refert idē Plinius, malū
 hoc Tiberij Cæsaris principatu, primū in Italiā irrepsisse,
 5 omniq̃ æuo priore vniuerſæ Europæ, nedū Italiæ, inco-
 gnitū: tanta quidē ſeditate, vt quæcūque mors huic præfe-
 renda eſſet: ita etiā cōtagione, vt osculo ſolo veloci trāſitu
 inſiceret, ſed proceres maxime. Hæc lues à mento ſerē orie-
 batur, vel id præcipuè afficiebat, vnde & nomē illi factum
 10 eſt mentagra. Hæc forſan ea eſt ſcabies quā Gallorum nō-
 nulli malam dartrā appellant. Cæterum morbū hūc agno-
 viſſe videtur Galenus. Quinto enim libro de medicamētis
 compoſitis ſecūdum locos, meminit ſœdiſſimæ cuiuſdam
 mēti impetiginis, quæ pruritus (vt ex Critone refert) ex-
 15 citat: & affligit patientes, atque in diſcrimē non mediocre
 adducit. Nam interdum, inquit, per vniuerſam faciem ſer-
 pit, & ad oculos vſque procedit, & ſerē ſupremæ deformi-
 tatis cauſa eſſicitur. Quæ impetiginis deſcriptio, per omnia
 mentagræ Plinij conuenit. Errant autem vehementer, qui
 20 ſœdiſſimum hunc lichenē, mentagram à Plinio appella-
 tum, morbum eum eſſe exiſtimāt, quem hodie vulgò qui-
 dam Gallicum, alij Neapolitanum, alij citra odium & ini-
 URIAM nationum, Venereum appellant. Hic enim veteri-
 bus & priori ſeculo omnino ignotus fuit, primūq; apud
 25 Neapolim irrepsit anno à Chriſto nato 1493. Quo tempo-
 re Carolus octauus Gallorum Rēx inuictiſſimus, alpes ſu-
 perabat, Italiam petiturus, quamuis antea non longè per
 Hispanias (vt quidam reſerunt) ſerpiſſet: quapropter tan-
 quā inde tracta origine, lues Hispanica cœpit appellari.
 30 Quæ peſtis diuina veluti vltione (vt par eſt credere) ob ſœ-
 dos, illicitos, atque à Deo vetitos concubitus, in terras im-
 miſſa, magnam generis humani partem ſua cōtagione ſœ-
 dauit, & proſtrauit. Id enim malū ſenſere magiſtratus, ſen-
 ſere mancipia, ſenſere proceres, ſenſit humilis plebs, veloci
 35 vnius ad alterum tranſitu: iamque per Hispanias, Gallias,
 Italiam; totāque Europam magno mortalium diſpen-
 dio vagatur.

Sunt & puſtule quædam præter has modò enumeratas,
 apud Auicennam libro quarto, glandoſæ dictæ, quæ nihil
 à ganglio diſſerre vidētur, niſi minoris tantum maiorisve
 ratione

Phili. 26.

Mentagrā
agnouit
Galenus.

Morbū
Neapolita-
nus.

Morbū ve-
nereus quā
do primū
in orbem ir-
reſſit.

Puſtule
gland. ſæ.

Terminthi. ratione. Mentio quoque est apud eundem Auicennā lib. 3. de quibusdam pustulis, quas ibidem iuæcturarum bothores vocat, & libro quarto almatim, quas cū nigras esse dicat, & viridibus granis similes, Græcorū proculdubio terminthi erunt, quos paulò superius inter phymatis species 5 enumerauimus. Has videtur Celsus similes varis facere, & putare à Græcis helcodes dici, id est vlcerosas.

Pustulæ albæ. Pustulæ albæ vel lactæ Rasis & Serapionis, & bothor leues Auicennæ, si earum descriptiones penitus inspiciantur, ad ionthos Græcorum, quos Latine varos nominauimus, pertinere videbuntur, quanquā eadem remedia, quæ ad illas scribit Auicennas, à Dioscoride ad ephelidas, id est, aspredines & nigrities in facie ex ardore solis prognatas, præcipiantur.

Hactenus de differentiis tumorum præter naturam, qui 15 præcipuè foris in corpore fiunt, nunc ad eorum causas transeamus.

De causis Tumorum præter naturam, extrinsecus apparentium in vniuersum. CAP. III.

Causa tumorū præternaturā. Fluxionis causa 6.



Ausæ tumorū præter naturam, recentioribus 20 medicis & chirurgis, geminæ statuuntur, generales scilicet, & speciales. Generales causæ sunt, fluxio, quod Græci πύμα vocant, & congestio. Rursus fluxionis causæ iisdem sex numero constituuntur. Nempe membri propellentis robur, 2 excipientis imbecillitas, materiæ copia seu multitudo, meatuum deferentium, (id est, per quos fit fluxio) laxitas siue amplitudo, propellentium angustia, & loci fluxionem excipientis situs inferior. Hæ autem ad quatuor reduci possunt. vtpotè ad membrum propellens, particulam suscipientem, 3 humoris fluētis cōditionē, & spatiū per quod fit defluxio.

*Pars propellens.
Particula excipiens.
Humor fluens.*

Cæterum fluxio concitatur ratione membri expellētis, vel propter robur facultatis expultricis ipsius, vel propter connexum naturalem, quem habet cum membro excipientē, vel propter propriorū meatuū angustiam. Pars verò ali qua fluxionem excipit, quia vel dolens, aut calida, vel imbecillior, vel rarior, atq; ignobilior, vel in inferiori loco sita.

Spatium. Porro ratione humoris fit defluxus in partē aliquā, quia fit copia superuacua, qualitate molestus, substantia tenuis. Spatium autem fluxionis causa existit, ob meatuū amplitudinem,

itudinem, ut potè venarum, arteriarum, & pororum. Congestionis verò (quæ altera est causa generalis tumorû qui præter naturam incidunt) causæ geminæ assignantur: nèpe error virtutis quæ alteratrix & altrix dicitur, & imbecillitas expultricis. Ex quibus colligitur, quòd tumores calidi, magna ex parte fiunt à defluxu humorum: frigidiverò eorundem congestionem potiùs excitantur.

Quomodo autem calida fluxio tumorẽ excitet, apertè ac scite demonstrat Galenus, libello illo cui titulû fecit de inæquali intemperie, ad hûc modû scribens, Calida defluxio simul atque in musculû decubuit, primû arteriæ maiores, venæque opplentur, ac distenduntur: ab iis verò minoribus, atque ita res procedit, donec ad minimas sit peruentû. In iis ubi valenter impacta fluxio est, nec amplius cõtineri potest, pars eius per ipsarum ora egreditur, pars per tunicarum foramina percolatur ac foras trãsmittitur, atque tum fluxione implentur spatia ipsa vacua, quæ sunt inter prima corpora. Sic omnia ab humore omnique ex parte incallescunt, ac perfunduntur. Sunt autem hæc, nervi, ligamenta, membranae, caro ipsa, & ante hæc arteriæ & venæ: quæ scilicet & primæ & præter cætera vario dolore afficiuntur. Quippe interiùs à fluxione tum excalfiunt, tum distenduntur, ac diuelluntur, distrahunturve. Exteriùs non modo excalfiunt, sed etiam premuntur, ac degrauantur. Reliquæ verò particulae, aliæ quidem calfiunt tantum, vel comprimuntur, aliæ utroque modo laborant. Atque hic morbus phlegmone nominatur. Hactenus Galenus. Itaque in eiusmodi tumoribus præter naturam, quæ ex humorum influxu fiunt, aliquid iam (per initia saltem & antequam resisterit fluxio) factum ac generatum est, & aliquid adhuc futurum, atque in generatione est. Quod adhuc fit, materia est antecedens, quæ adhuc in fluxu est: factum verò, materia coniuncta, quæ iam influxit, & in parte laborante impacta est. Hinc non simplex, sed cõposita, in eiusmodi phlegmone, quæ in generatione adhuc est, (veluti in reliquis aliis tumoribus ac morbis etiam omnibus, qui in gignendo adhuc sunt, necdum absolutiõnem sunt naçti) medentis sollicitudo est, Gal. lib. 13. methodi medendi, ex ea scilicet quæ providet, & ea quæ curat: sed hæc alterius sunt contemplationis.

Congestionis causa.

Quomodo calida defluxio tumorẽ creet.

Omnium morborum, qui adhuc in gignendo sunt, duplicem esse indicationem.

Cæter

Cause speciales tumorum præter naturam. Ceterum tempestiuum est, ut speciales tumorum qui præter naturam sunt, causas subiiciamus. He autem tres vulgò assignantur. Primitiæ, quæ & prægressæ & euidètes nobis dicuntur antecedentes & cōiunctæ siue cōtinètes: Græcis dicuntur *προκταρκτικαί, προνομναι, ουκ επιγει*. Prægressæ seu primitiæ causæ dicuntur, quæ dū aduersam valetudinē seu morbosos affectus creant, separantur, ut casus, percussio, fractura, distensio, luxatio, aut error qui in victus ratione committitur. Antecedentes seu præcedentes causæ dicuntur, quæ paratæ sunt morbos efficere, ut sunt humores quatuor tam naturales quàm non naturales. Naturales humores sunt, qui corpori nutriendo sunt idonei, & in massa sanguinaria continentur: proinde & vna sanguinis appellatione comprehenduntur. Qui si ex venis aut arteriis effundantur, subito concrescunt, siue extra corpus effluent, siue in ipso adhuc, quocunque loco contenti remaneant. Non naturales verò eos appellant, qui a sanguine, quo partes nutriuntur, separati inveniuntur, & ob suam prauitatem vel corruptelam, ex seipsis, hoc est, ex natura sua, inepti sunt ad corporis nutritionem, qui quantumvis etiam in aëre nos ambiente permaneant, nunquàm concrescunt. Hi autem vel quadā naturæ providentia, certi alicuius vsus gratia, in conceptacula quædam relegantur, aut foras ad corporis extima propulsi, tumores non veros, ac illegitimos appellatos abscessus, pustulas, scabies & cutis defædationes decolorationes, & sudamina generant. Interdum verò insensibili perspiratu, vel sensibilibiter per sudores digeruntur, atque exhalant. Nonnunquàm intrinsecus putrescunt, & febres excitant. Atque hi (inquiunt) æquiuoce & improprie humores dicuntur, naturaliumque nomina sibi usurpant. Solùm enim eos succos, qui ab hepate in sanguinea generatione, nutritionis, ac fluoris nostri corporis reparandi gratia conficiuntur, proprie humores censent appellandos. Cuiusmodi est sanguis verus ac purus, biliosus, pituitosus, & melancholicus, quo singulæ nostri corporis partes nutriuntur, instauranturque. Aliæ quidem puriore, & (ut ita dicam) magis sanguineo, aliæ verò biliosiore, aliæ pituitoso magis, aliæ melancholico, prout cuiusque natura exoptulat. Itaque humores vniuersi in venis & arteriis continentur, quod

quod & coloris ipsius, & consistentiæ varietas indicat, vt libro de atra bile Galenus expressit.

Porro ex iis quatuor humoribus naturalibus dictis, quatuor præcipui ac legitimi tumores præter naturam, sunt, quæ vulgò apostemata vera nominare solent. In quibus scilicet tumor ad sensum magnus est, & materia, vnde procreatur, magis quâritate peccat, quàm qualitate. Hi autem propriis nominibus dicuntur phlegmone, erysipelas, œdema, scirrhus. Ex non naturalibus verò (vt iunioribus medicis placet) abscessus, quas exituras vocant, & pustulæ oriuntur, de quibus in præcedentibus abundè diximus, atque hos tumores, abscessus inquam & pustulæ, apostemata nō vera eisdem censentur. Ad quæ, & alia duo tumorum genera reduci volūt, flatuosos scilicet & aquosos, qui ex serosa substantia procreantur, vulgò apostemata ventosa & aquosa nuncupant. Itaque sex sunt nomina simplicium tumorum, phlegmonosi, scilicet, erysipelatosi, œdematosi, scirrholi, flatuosi, & aquosi. Cōpositis verò, (quoniam horum infinita propemodum turba est) nō omnibus propria sunt indita nomina, sed illis duntaxat, in quibus humor aliquis suprâ ceteros dominium obtinere euidēti ratione deprehenditur, vt iam ex præcedētibz satis innouit, & rursus in sequentibus suo loco plenius ostendemus.

Caterum causæ coniunctæ seu continentes tumorum præter naturam, quos apostemata, pustulas, & exituras vocant, sunt materiæ, quæ in particula ipsa laborante aggregatæ & infarctæ reperiuntur, quæque adhuc permanent, postquàm tumorem excitarunt: ac dum increscunt, tumores ipsi augentur: cū decrescunt, minuuntur, & cū deficiunt, finiuntur. Causa enim coniuncta siue cōtinens, morborum omnium ac dispositionum quæ in corpore sunt, ita ab Auicenna, & vniuerso iuniorum medicorum cœtu definitur: Causa coniuncta est quæ cū præsens est, eius quoque morbus adest: cū verò tollitur, etiam morbus euanesceat. Verumenimverò quidam huius ætatis medici nō vulgariter eruditi, duas tantū esse morborū causas Gale-
no contendunt, externā, videlicet & internam, seu vt nunc loquuntur primitiuā & antecedentē. Quarum illā esse dicit eam, quæ extrinsecus corpori aduenit, ipsumq; admodum alterat, atq; immutat, quæq; dum aduersam valetu-

Ex quatuor humoribus naturalibus quatuor sunt legitimi ac præcipui tumores. Ex humoribus nō naturalibus qui tumores fiunt.

Causæ coniunctæ tumorū præter naturam.

Continens causa quæ dicitur.

dinem creauit, separatur: veluti calor, frigus scorpio pun-
gens. Internam verò quæ in ipso animalis corpore cõsistit,
& iam morbum facit: vt sunt humores præter naturam af-
fecti. Eam autem, quam coniunctam appellant, cum ne so-
mniaffe quidem: cum iuxta huius sententiam, affectus
actionem impediens, aut vitians morbus sit, & non morbi
causa; coniuncta autem illa causa: quam Auicennas eiusq;
sequaces inuenerunt (vt ex data ab ipsis descriptione con-
stat) affectus sit actionem lædens, quæ propria est morbi
definitio. Ac proinde illam à morbo nihil prorsus differre, 10
à quo primum ea, quæ secundum naturam est actio, lædi-
tur. Cæterum cum hæc de triplici causarum morifica-
rum genere opinio iam inueterauerit, & apud omnes fe-
rè nostræ etiamnum ætatis medicos irroboraucrit: non
absurdum videbitur, si eas morbosas causas passim in hoc 15
opere, dilucidioris doctrinæ gratia, tribus huiusmodi spe-
ciebus distinguamus: nempe primitiua antecedente, & con-
iuncta. Atque hæc de causis tumorum præter naturam
dicta sufficiant: nunc postulat ordo ac orationis series, vt
eorum signa, & iudicia subiiciamus: modò tamen pauca 20
de abscessuum natura & generatione præmiserimus.

*Abscessus
qui dicantur
Galeno.*

Itaque abscessus: qui Græcis ἀπορύματα, & vulgò exitu-
ra dicuntur, Galeno libro de tumoribus præter naturam,
& secundo ad Glauconem, dispositiones sunt, in quibus
abscedunt, atque inuicem distant, quæ prius se continge- 25
bant corpora. Materia enim quæ eiusmodi tumores ex-
citât, extra carnem musculi propulsa, continentia a sub-
iectis diducit, & abscedere facit. Spatium igitur (inquit
Galenus) vacuum in medio fieri oportet, quod aliquam
substantiam spirituofam, vel humidam, vel mixtam ex 30
vtriusq; comprehendit, quæ temporis diuturnitate in mul-
tiformes & varias substantias alterantur. 35

*Duplex ge-
nus absces-
sum. Gal.
lib. 1. 4. the-
rap. meth.
& lib. 2. ad
Glan.*

Duplex autem est eiusmodi abscessuum genus: vnum,
quando inflammatione in pus versa, pus ipsum tanquam
in sinu aliquo est collectum: alterum cum nulla præceden- 35
te inflammatione, humor aliquis, isque alias specie aliis,
vel spiritus aliquis vaporosus, aut substantia ex vtriusque
mixta, in parte aliqua colligitur. Quod bisariam acci-
dit: nam vel in spatio ipso, quod abscedentes interiacet par-
tes, eiusmodi substantia, sine præiua defusione generatur,

aut aliunde in ipsam laborantem particulam confluit, vel statim quidem ab initio, vel ea ratione, qua fiunt illa quæ ἀποσμήματα vocantur. Nominant verò (inquit Galenus) ἀποσμήματα sic huiusmodi dispositionem, cum qui prius vnum membrum infestabant humores, eo relicto, ad alterum transferruntur. Spatium autem sibi molitur eiusmodi substantia, quæ abscessum creat, vel inter duas tunicas, vel sub quibusdam membranis.

Porro excoriat tandem circumposita corpora, vel quia
 10 omninò acris, aut omninò ipsa copia distendens, aut putredinem quandam tempore contrahens. Sed & iam tunc acris est. Quòd si humores ipsi, quibus spatium, quod abscedentes interiacet partes, completur, & abscessus excitatur, longo interdum tempore perdurauerint, plures (vt
 15 suprà diximus) habent alterationes, atque in varias substantias transmutantur, quæ non humorum modò, sed etiam solidorum quorundam corporum proprietates representant. Nam lapidibus, arenis, testis, lignis, carbonibus, luto, amurcæ, id est olei limo, vini fæci, stipulæ, ac
 20 multis aliis talibus similia corpora, in abscessibus contenta inveniuntur: vt iam suprà de differentiis tumorum explicuimus. Quod plerique ignorantes incantationis cuiusdam vi ac potentia fieri arbitrantur.

Quæ in abscessibus inveniuntur.

25 *De signis tumorum præter naturam extrinsecus apparentium in vniuersum, & eorundem iudicijs.*

CAP. IIII.

30 **V**imores præter naturam summa corporis occupantes (quorum duntaxat speculatio ad chirurgum pertinet) iudicio sensus inspecta, ac manibus contrectata laborante particula, statimprehenduntur. In quacunque enim corporis parte incrementum apparet, naturalè statum
 35 excedens, ac præter naturæ modum particulam quam occupat distendens, eiusque actionem lædens, quod vel humor aliquis, vel substantia quepiam ex humore procreata, aut quæ humoris naturam utriusque resipiat, vel vapore spiritus excitauit, ibi & tumorem præter naturam esse necesse est. Cæterum tumores, quæ vera apostemata appellant, tumore,

Nota vniuersales tumorum præter naturam.

particula-
es notat.

dolore, & calore, magis vel minus intensis, dignoscuntur. Non vera autem, quæ pustulas & abscessus nominauimus, præter tumorem, malignitate quoque quam Græci caecoethiam nominant & sequestratione etiam maiore vel minore, determinata, deprehenduntur. Signa autem particularis cuiusque differentia, & materierum ex quibus fiunt, in sequentibus suo loco dicentur, dum scilicet de simplicibus ipsorum, qui præter naturam consistunt tumorum differentiis tractabitur. Ex quibus & compositæ facile dignoscuntur. Verumenimvero non prius ad particularia est accedendum, quam de vniuersalibus sermo fuerit, absolutus: is enim ordo in disciplinis obseruari solet: nec immerito sanè.

Nam vniuersalia ipsa atque communia manifestiora sunt nobis quam particularia: quippe quæ magis promiscua, confusioraq; sint: vt primo cap. lib. i. phycorum docet Aristoteles. Nemo igitur miretur, si passim in hoc opere chirurgico, à communioribus & plura comprehendentibus, semper inceperimus.

1
IUDICIA.

Lib. de dif.
morborum.

Sed ad propositum reuertamur, & iudicia tumorū præter naturā consistentiū persequamur. Circa quæ primū aduertendū est: omnes eos tumores quæ vera apostemata vocant, si Galeno & Auicennæ credimus, inuicē magna ex parte complicari, neq; facile aliquē eorum syncerū & purum inueniri. Nam (vt Galenus inquit) phlegmone, hoc est, inflammationi ex sanguine, magna ex parte miscetur aliquid quod vel erysipelatis, vel ordematis aut scirrhi naturam seruet. Erysipelati autē, quod phlegmones, aut ordematis, aut scirrhi speciem referat. Et ita in reliquis omnibus similiter perpende. At verò ij præter naturam tumores, quæ non vera apostemata appellitant: vt plurimū synceri ac puri reperiuntur. Cæterū simplicium ac syncerorum curationes in sequentibus persequemur, ex quibus & compositorum, & implexorum curatio facile intelligetur. Nam omnes & persequi & componere superuacaneū mihi videtur. Si enim simplices ipsos tumores omnes cognoueris, deinde quo pacto inter sese componantur didiceris, satis idoneus eris, qui in reliquis particularim te exerceas. Sed iam reliqua quæ in vniuersum de tumoribus ipsis sumuntur iudicia subiiciamus.

De tumoribus præter naturam.

21

2

Periodi, paroxysmi, & crises tumorum qui præter naturam sunt, humorum ex quibus cōstantur analogiam, (inquit Guido) sequuntur. Analogiam autem hīc interpretamur proprietatem, seu proportionem, naturam, ac substantiæ similitudinem, quam formam specificam & occultam appellant.

Tumores eiusmodi præsertim salubres, & qui ex humorum influxu fiunt, quatuor temporibus distinguuntur, principio, augmento, statu, & inclinatione. Principij nota est, cum particula incipit distendi, & fluxionis adest initium, cum dolore adhuc exiguo. Incrementum adest iudicabis, cum videris tumoris molem attolli, locumq; affectum impleri, ac symptōmata, quæ vnumquenque tumorem sequi solent, manifestè augeri. Status verò indicium est: cum prædicta omnia, tumor scilicet & symptōmata cuiusque tumoris differentię, proprium vigorem suum obtinent: nec amplius possunt incrementum assumere, quin materia faciens tumorem, in alterius generis substantiam degeneret, & transmutetur.

Declinatio autem tunc adest cognoscitur, cum tumoris moles, & propria ipsius symptōmata, imminuuntur: vel materia quæ tumorem facit, in aliam substantiam incipit transmutari. Itaque tempora eiusmodi à tribus potissimum suum discrimen accipiunt, nempe ab ipsius tumoris essentia, hoc est, magnitudine vel paruitate, à materiæ dispositione, & accidentibus, quæ curandi indicationem plurimum immutant. Cæterum quatuor hæc tempora simul aliquando coincidere videntur, propter breuem scilicet ac penè imperceptibilem vniuscuiusque durationem, ut contingit in venenosis inflammationibus nō letalibus, quæ statim vigent ac florent. Porro tumores huiusmodi, qui ex humorum præsertim fiunt influxu, nisi fieri prohibeantur reprimendo materiam influentem, vel sponte, & citra ullam manifestam occasionem intrò recurrente fluxione delitescāt, aliquo istorum quatuor terminari necessum est, in insensibili exhalatione seu resolutione, vel facta suppuratione, vel corruptione, vel induratione.

Omnium autē istorum modorū optimus, & magis expectendus, is est, qui per sensu imperceptibilem fit dissolutione: post illum verò, qui per suppurationem. At quæ per

3

Quatuor
tempora tu-
morū præ-
ter natu-
ram.

1. Principi-
um.

2. Augmē-
tum.

3. Status,

4. Declina-
tio.

Tempora tu-
morū præ-
ter naturā
à tribus po-
tissimū
sui discrim-
en assu-
munt.

Tumores
præter na-
turā qua-
tuor modis
terminan-
tur.

indurationem fit terminatio, absolute mala dicitur. Quæ autem fit per corruptionem particule laborantis, omnium pessima censenda est, ut aperte nobis Galenus insinuat, libello de inæquali intemperie, ad hunc modum scribens,

al. lib. de æquali in temperie. Itaq; duorum alterum sequi est necessarium: vel superante fluxione, corporum quæ succubuerunt, sequi corruptionem, vel ea deuicta, musculum ad naturalem habitum reuerti. Subiiciamus igitur ipsam primum fluxionem superari (rectius enim à melioribus incipitur) Duplex hic incidit curationis modus, quod scilicet vel digeretur, seu dissoluetur, quicquid humoris in particulam procubuit, vel concoquetur; verum dissolutio optabilior existit. Ad concoctionem autem hæc duo necessaria consequuntur, nempe puris generatio, & eius in aliquod spacium abscessio. Et paucis interiectis subiungit, At si victæ a fluxione particule fuerint, in tantam deuenient intemperiem, ut earum actio pereat, & ipsæ temporis processu corrumpantur. Ha-

Dissolutionis indicia. Resolutionis indicia sunt, leuitas membri, & deficiens pulsatio. Signa tumorem verti in suppurationem, indicantia sunt, dolor internus, pulsatio, & caloris incrementum. Fluxionem victricem esse, & particule laborantis corruptelam, testantur nigror, & humiditas, quibus nonnunquam & graueolentia accedit. Tumorem in lapideam abire duritiam, aperte demonstrat, tumoris imminutio, & cum hac, durities remanens. 25

Suppuratio in nota. Regressio- nis & delitescencia in dicitur. Regressio- nis vel delitescencia nota est, subita tumoris diminutio, quæ interdum propter nimiam refrigerationem, nonnunquam verò propter venenositatem nullis forinsecus ad motis reprimentibus) accidit. Ad hanc autem subitam atque affatim factam tumoris immutationem, sebris statim consequitur, ac multa alia praua symptomata. 30

Haecenus de signis & iudiciis eorum tumorum, quos vulgò apostematis nomine propriè censent appellandos. Pustularum autem vulgò nuncupatarum notæ & iudicia suo loco, cum de illis tractabimus, dicentur. Abscessuum verò (quas exituras vocant) iudicia, ac signa, quæ vel statim eos futuros denunciant, vel iam præsentibus adesse demonstrant, hæc sunt:

Signa mox futuri ab- Cum videris (inquit Auicennas) pulsationem aut duritiam, in longum iam tempus productam, vel caliditatem,

tem, aut dolorem incrementem, tunc existima proximum *scessus, ex*
 esse, vt apostema in suppurationē vertatur, & fiat abscessus. *Auic.*

Cū autem depræhenderis leuitatem quandam affe- *Note ab-*
 ctæ particulæ, & doloris sedationem, ac remissum calo- *scessus iam*
 rem, quodque tumentis loci pars aliqua cæteris emineat, *facti.*
 atque in mucronem subducatur: ad hæc cū premendo
 digitis velut inundationem (vt loquuntur) perceperis,
 viderisque gibbi illius seu mucronis colorem iam albesce-
 re, tunc iudica, pus eo loci subesse, & tumorem iam ab-
 10 scelsisse.

Vnde & ab Hippocrate rectè est iudicatum, Quod dum *Ap. 47.*
 pus conficitur, dolores ac febres magis accidunt, quàm *lib. 2.*
 iam confecto pure.

Porrò notæ eiusmodi tum iam facti abscessus, tum
 15 mox futuri, vulgaribus iis versiculis communiter expri-
 muntur:

Durities longa, pulsus, dolor, & calor aucti,
 Signant pus fieri: sed factum, dicta remissa,
 Sub digitis vndans, albescens pars, & acuta.

20 Cæterum, in pure ipso cognoscendo ac diiudicando,
 maximè te attentum esse oportet. Quandoquidem sup-
 puratio ipsa, seu puris in loco aliquo comprehensi notitia,
 sæpius occultatur, ac medicum latet, ob loci scilicet & pu-
 ris crassitudinem, vt hac aphoristica sententia nobis ex-
 25 presit Hippocrates:

Quibuscunq; suppuratio in corpore existens, non inno- *Apho. 41.*
 tescit, his ob crassitudinem puris, aut loci, non innotescit. *lib. 6.*

Atque hæc de signis abscessuū: dicta sufficiant. De ho-
 rum autem iudiciis, hæc ab Auicenna & recentioribus chi-
 30 rurgis memoriæ tradita sunt.

Abscessus, qui iuxta membrum aliquod nobile, vel pro- *Iudicia ab*
 pe iuncturas fit, atque adeò in venosis, aut neruosis ipsis *scessuum.*
 partibus, quique in imbecilli particula, & natiuo calore
 propemodum destituta, prædura quoque & densa cute ob
 35 tecta, consistit, ad hæc qui crassiore materia, & ad motum
 tardiore constat, planus etiam seu æquabilis, & in coni for-
 mulam non subductus, suspectus admodum est, ægréque
 ac tardè maturatur. Qui verò huic ex aduerso respondet, *Qui absce-*
 boni moris est, & laudabilis: citò enim & facile in suppu- *sus facile c*
 rationem vertitur, sæpiusque nullo forinsecus adhibito *coquantur*

auxilio, per se dehiscit. Itaque si abscessus tendit in acutiem, & puris substantia tenuis fuerit & acris, nec prædura aut densa cutis extiterit, natura seipsa, hoc est sua facultate alienorum expultrice, & citra aduentitium aliquod subsidium conceptum humorem foràs propellet, nisi quis ⁵ facta incisione protinus ipsam spontaneam apertionem anteuertat. Abscessus eiusmodi nonnunquam per halitum digeruntur, nulla in cute facta continui solutione, vbi scilicet pus & modicum est, & bonum, tenue quoque & non in alto delitescens. Sæpius tamen facta à natura vel arte ¹⁰ missario, conceptus humor profunditur, quam digeratur. Quæ autè à natura fit apertio, multò tutior est, ea quæ manus opera fit, quòd si arte molienda sit, securius multò & melius scalpello aut cādenti ferro illam efficies, quam adu-
utius scal-
ello, quam
uptorio ab-
cessus ape-
riuntur.
 rente medicamento, quod raptorium appellant. Ideò ¹⁵ autem apertio eiusmodi, quam in abscessibus manus & arte molimur, deterior est ea, quæ naturæ beneficio accedit, quòd sanem generet & in fistulam vertatur. Vbi tamen vrget necessitas, nec alio datur vti meliori & præsentiore auxilio, ea intrepidè aggrediunda est. Hæc autem ²⁰ modò commemorata incommoda vitabis, si facta (cū res expostulat) apertione, pus mouentia, ad reliquiarum maturationem, & detergentia laboranti particulæ, statim adhibueris. Cæterum puris optimi, ac deterrimi notas, oraculo vltimo libri primi præfagiorum, nobis expressit ²⁵ Hippocr. ad hunc modum inquit: Pus illud optimum censetur, quod album, æquale, [id est, sibi vndique simile] læuèque [tangenti] & quam minimè fœtidum est: Quod ³⁰ verò huic maximè contrarium apparet, pessimum est. Porro reliquorum aliorum, tum humorum, tum solidorum corporū, quæ in abscessibus continentur, signa & iudicia in particularibus capitibus subsequētibus explicabūtur.

De curatione tumorum præter naturam in vniuersum, eorū maximè, qui ex influxu humorū fiunt: veraq; apostemata vulgo dicuntur, & abscessuum, quas exitus vocant. 35

CAPVT V.

Tumorū omniū curationis indicatio.



Tumorū omnium, qui præter naturam sunt, iā factorū, & qui nō adhuc in generatione sunt communis ac prima curandi indicatio vna est Galeno libr. 13. & 14. meth. med. nempe vt quod præter

præter naturam in particula est, & eam in tumorem attol-
lit, totū vacuetur. Qui verò adhuc in generatione sunt,
in his prior vacuatione est, confluētis ad affectū locum hu-
moris inhibito. Proinde in illis nō simplex, sed cōposita
est, medentis sollicitudo accurandi indicatio. Hæ autem
communes indicationes pro tumore ipsius differentia, &
particulæ laborantis natura, plurimū variant, & immu-
tantur. Siquidem in omnibus iam factis tumoribus, &
qualibet corporis parte, eius quod infestat vacuatio hau-
d-quanquā similiter administratur, vt libro secundo ad
Glauconem, & locis nuper citatis docet Galenus: quod ex
sequentibus etiam euadet manifestum. Sed neque iisdem
semper auxiliis, quibuscumque incipientibus adhuc tūmo-
ribus, & quamlibet particulam occupantibus, occuri-
mus, aut quod in illis iam factum est, vacuamus: sed aliis at-
que aliis prout tumore genus, & partis affectæ natura po-
stulat, inhibentibus fluxionem, & vacuantibus quod ge-
neratum est, præfidiis vti nimirū cogimur, si rectam sal-
tem agendorum rationem sequimur. Itaque ab iis duo-
bus, nempe ab ipsa dispositione, seu morbi essentia, & par-
tis affectæ natura, tumorum qui præter naturam sunt, cu-
randi indicationes potissimū defumuntur Galeno.

Porro dispositio ipsa, de qua nunc agimus, seu mor-
bi essentia, tria in se iuxta recentiorum placita complecti-
tur: nempe quantitatem, qualitatem, & materiam, seu
substantiam quæ tumorem efficit. Quorum ratione, pri-
ma illa & communis indicatio immutatur, atque ab iis
etiamnum particulares curandi indicationes defumun-
tur. Aliter enim tumor magnus, aliter paruus curatur. Si-
quidē magnitudo & paruitas tumore (vt existimant) diffe-
rentiā constituūt. Alia enim ratione ingens phlegmone,
alia minutus herpes curatur. Aliter quoque qui per deflu-
xionem fit, & adhuc in gignendo est, quā qui per con-
gestionem procreatur, aut iam factus est. Sed & calidus
tumor vt erysipelas, alia ratione quā frigidus, vt est œde-
ma vel scirrhus, curatur. Quantitas igitur, in tumore
præter naturam curationem euarians, est, magna, parua.
Qualitas, fluxio, seu (vt loquuntur) deriuatio, & conge-
stio. Materia, humor, calidus, frigidus.

Ceterū in partium laborantium natura, quatuor po-

*Communes
curandorū
tumorū in-
dicationes,
pro tumore
differentia,
& laboran-
te particu-
la variari.*

*Curandorū
tumorū in-
dicationes à
duobus po-
tissimū
desumi.*

*Tumore es-
sentia tria
in se conti-
nere.*

indica-
ne, quæ à
tura par
m defu-
tur, 4.
tissimum
etanda
e.

tissimum spectanda sunt: temperatura, formatio, situs, virtus seu potentia. Quibus & quintum addi potest, facilitas nempe (vt ita dicam) ac difficultas sentiendi: nisi maius istud cum Galeno, sub virtute comprehendi atque includi. Hæc itaque cōmunē etiam illam, quæ per singula tumoris præter naturam, genera obseruatur, curationem plurimum euariant. Proinde & has omnes, quæ ab ipsis sumuntur indicationes, in curandis iis, qui præter naturam incidunt, tumoribus, memoria tenere oportet. Aliter namque curatur phlegmone, aut quouis alius tumor in carno-
sis partibus, quàm in neruosis: aliter in oculo, quàm in genu vel collo: aliter in adenibus, quàm in aliis partibus non glandosis. Breuiter particule ipsius laborantis, ac tumore obsessæ, temperatura, & formatio, & situs, & virtus singulas quas ipsi in morbo curando molimur operationes, commutant: communi etiamnum intentione seruata, quam
libr. 2. ad
Flauicent. semper à morbo assumendam esse Galenus edocuit. Ita-
ordo tra- que communem curandorum tumorum præter naturam
tandorum methodum, eorum præsertim, qui ex humorum influxu
n sequenti procreantur, sumpta ab ipso affectu indicatione, nulla par-
tis ipsius affectus habita ratione, tradere hîc primùm institui-
mus. Deinceps eorundem, sed maxime inflammationum, cùm in abscessum degenerauerint, vniuersalē curationem subiiciemus. Post hæc verò particularē singularū
differentiarum, simplicium præsertim (ex quarum analogia compositorum curatio facile addiscetur) curandi
rationem persequemur. Atque interim vbi locus exposu-
labit, nonnulla de curandi indicationibus, quæ à laborantibus & tumore obsessis particulis assumuntur, ex Galeno proferemus. Quibus rectē intellectis, facilē erit cui-
que rationali medico ac chirurgo, tumores quosunque quibusuis partibus insidentes, certa methodo ac ratione curare.

Inuentio oc-
cassiois prin-
cipiū est cu-
rationis tu-
morū præ-
ternaturā.

Galenum igitur imitantes, principium curationis tumorum qui præter naturā dicuntur, ex humorum influxu procreatorum, ab inuētionē occasionis ipsius affectus, sumemus, vt scilicet quæ eū excitant causæ, abscindantur: quod verò in eo iam factū est, tollatur. Itaque vnus differentię tumorum qui per defluxionem fiunt (de iis enim duntaxat modò hîc agimus) exemplo atque analogia,

ceteras

cæteras etiam differentias, quæ ex influxu humorum nascuntur, intelligamus, vnius phlegmones breuem ac commodiosam curationem hîc subiiciemus. Hæc nâque, & fre- *Phlegmone quid.*
quentissimè incidit, & febres aliæque symptomata periculosissima incitat. Nomine autè phlegmones hoc loco, non omnem calidam, ac veluti flammeâ dispositionem, quam Græci etiâ phlogosin appellant, intelligi volumus, sed eam duntaxat, quæ fluxionis sanguinæ soboles est, in carnosa corpora maximè incidens, in qua dolor est vehemens, rubor per summa vigens, calor veluti desîrens, tēsis, renixus, & cum malum increuerit, pulsationis sensus. Hanc enim inflammationem cum Galeno, & aliis, qui eam tanquàm ducem optimum sequuti sunt, Græcis scriptoribus, vt Paulo, Aëtio, & Oribasio, propriè phlegmonem appellamus. Vt igitur rem ipsam aggrediamur hæc ipsius Galeni verba sunt, Communis omnium phlegmonarum generatio, ex sanguinis influxu est, copiosioris scilicet quàm sit parti ex usu. Influit autem copiosior sanguis, alia quapiam, aliisve particulis eum aliquando mittentibus, ac ea quæ phlegmone laborare incipit, recipiente: aliquando verò particula quæ affligitur, hunc ad se trahente. Partes autem quæ mittunt, vel vt copia superuacuum, vel vt qualitate molestum, vel utroque nomine, succum propellunt. Quæ verò attrahunt, hæc morbofo calore vel dolore trahunt.

5 Sed & his coadiutrices causæ sunt, particula imbecillitas & ignobilitas, canalium seu viarum, per quas fit defluxio, amplitudo, meatuum quoque partium expellentium angustia, & situs inferior vt iam suprâ dictum fuerat.

Gale. li. 13. meth. med. Communis omnium phlegmonarum generatio.

Causæ coadiutrices fluxionis.

Itaque ex omnibus his tres colliguntur recentiorû chirurgicorum turbe, curandorum tumorum, qui ex defluxione ortum habent, intentiones.

Prima est, fluxionē auertere, ac eâ omninò intercipere.

Secunda est, dolorem demulcere, atque eam occasionem, propter quam particula fluxionem excipit, vel etiam attrahit, in totum summouere.

Tertia est, totum cum humorē, qui in partem affectam confluxit vacuare.

Cæterum quomodò prima intentio perfici debeat, appositè docuit Galenus lib. decimotertio methodi medendi, vbi modos omnes auertendæ fluxionis, ac rationem inhi-

TRES scopi in curandis tumoribus, qui ex humoris influxu fiunt, chirurgus proponuntur.

PRIMVS scopus.

*Plethora
quid.*

bendæ phlegmones, quæ adhuc in generatione est, nobis expressit, ad hunc modum scribens: Vbi æqualiter succi inter se sunt adaucti (quod Græci phlethoram vocat) imò etiam vbi purum ab excrementis totum corpus est, & succorum mediocritatem continet, dolore, & membri, in quo phlegmone sedet, calore fluxionē excitāte, sanguinis missione incipienti adhuc phlegmone succurrimus. Curatur etiā plethora, tum frequenti balneo, tum exercitatione, tum multa frictione. Præterea digerētibus medicamētis, modò febris non adfit, & præter hæc omnia inedia, ac proba victus ratione, etiā si febricitet æger. Cum vero flaua bile, vel atra, pituitave, aut serosis humoribus refertū corpus est (eum habitum Græci cacochymiam nomināt) purgatione, quæ cuique superanti succo sit accōmoda, vacuatio molienda est. Ac de iis quidem in particularibus capitibus diffusius tractabitur. Cæterum antispasmodicus, id est, in contrarium reuulsio, cōmune est in omnibus huiusmodi tumoribus auxiliū, dum fluxio adhuc valēter irruit, ut potè in principio morbi & in augmēto: in fine vero status, & in ipsa declinatione, dum scilicet iam fluxio restituit, atque in membro inhæsit, & corpus totum abundè vacuatū est, vel ab ipsa quæ affligitur particula, vel à maximè vicina, vacuatio molienda est.

Cacochymia.

Antispasmodicus.

**SECUN-
DVS** scopus.

Secunda intentio completur anodynīs remediis, id est, sedantibus dolorem, item adstringentibus, & intercipientibus fluxionē. Ad hæc relaxantibus naturales meatus, per quos membrum affectum cōsueuerat repurgari. Horum autem omnium materia lib. sexto abundè describitur.

TERTIVS scopus.

Tertiam verò intentionem assequemur, iis quæ materiam, tumorem excitantē, à loco affecto euacuant. Euacuat autē contenta iam in loco materia, non solum diaphoreticis, id est, euaporantibus seu resoluētibus medicamētis, sed etiam repellentibus quæ Græci ἀπορροιαῖ vocant. Itaque incipientibus phlegmonosis tumoribus, atque etiā aliis quibuscūque qui ex humorum influxu procreantur, magis utendum est reprimētibus, quàm euaporantibus, quibusdam exceptis casibus: ex quibus (inquit Guido) Galenus visus est quatuor posuisse.

Casus in quibus non licet repellere siue reprimere.

Primus est, quando tumor eiusmodi fit in emunctoriis. Secundus quando fit à materia venenosa.

Tertius,

Tertius, quando materia est crassa & repulsiōi inobediens. Quartus, quando vehementer est impacta. Auicennas duos duntaxat casus excipit: nempe cū tumor est in emunctoriis, aut loco aliquo, ex quo sit timendus refluxus materiæ ad membrum aliquod præcipuum & nobile. Alij vnicū tantū casum eximunt, alij sex, alij decem, alij 19, alij 23. Verumenimvero priusquam de hac re tam ambigua, quicquam statuamus, sciendum est, duplex esse genus repellentium apud recētiōres & Arabes, cōmunia scilicet, & propria. Repellentia communia, seu communiter dicta sunt, quæcunque influxus prohibent, compescunt ac refrēnāt, aut refrigerando, aut incrassando, aut offarciēdo, hoc est lento substantiæ crassamento, poros occludendo & vias intercipiēdo, aut partes confirmando. Influxum frigore compescunt, & incrassant semperuiū, lactuca, psyllium, cotyledon, id est vmbilicus Veneris, lenticula palustris, caphura. Offarciunt, id est, poros imminenti fluxioni occludunt, farina volatilis appellata, è moletrinis, ovi candidus liquor, amyllum, gluten, & gummi genera. In summa, quæ cum lentore, & sine morsu refrigerant. Confirmant ac roborant, hoc est natiuam temperiem parti restituūt, oleum rosaceum, omphacinum, myrtinum, chamæmelinū, absynthium quoque, marrubium, nux cupressi, & id genus alia, quæ affectam particulam, cui admoventur roborādo, ab imminēti fluxione eam vindicant ac tuentur. Repellentia autē propriē dicta sunt, quæ dum humores in partem aliquam irruunt, aut illabuntur, vi sua illis occurrant, ac intrō quasi postliminio redire cogunt. Hæcque sunt omnino crassarum partium, quæ admodum attrahentia tenuiū: ex his plurima sunt qualitate frigida, quædam verò calida, vtraque tamen, id est, tam calida quàm frigida, facultate pollent adstringente. Frigida propriē reprimētia dicta sunt folia vitis, plantago, solanum, diplacos, id est virga pastoris, & quæ pastoris bursa vocatur, glaucium, balaustium. omphacium, rhus, id est, sumach, terra cimolia vulgò nūcupata, & terra sigillata, & eius generis alia. Et hæc quidē simplicia, ex quibus multa componi possunt, vt oxycratū, linimentum ex bolo cōmuniter appellatum, cæterum Galeni, & similia, quorum formulæ ex sexto libro requirēdæ sunt. Repellentia autem calida propriē dicta sunt, alumen,

*Repellentia
cōmunia.*

*Repellentia
propriē dicta.*

*Frigida re-
primētia.*

*Calida re-
pellentia.*

galbu

galbulæ, id est, cupressi nuces, iuncus rotundus siue odoratus, Græcis *χίος ἀνδρ* onix, id est, blatta bizantia, lupinorum farina, & vina quædam austera, ac alia permulta. His positis, rem vniuersam de repellētibus initio fluxionū adhibendis, proloquiis duobus sequentibus Guidonis à

Primū Guidonis proloquiū in re-percutientibus.

Cauliaco complectamur. Principio omnium tumorum, qui ex humorum influxu sunt, & maximè phlegmonosorum, reprimētia propriè dicta conducunt, his decem solū exceptis. Nempè cum tumor partibus adenosis, aut cū ex materia venenosa sit, vel admodum crassa, & ad repellē-

Gale. 2. ad Glau.

dum inepta, atque etiam cū humor particulæ laborāti iam vehementer est impactus, si tumor criticus est, aut à causa primitiua excitatus, si in corpore plethorico est, aut admodum debili, si sedem habet iuxta principem aliquam partē: denique si cū vehemēti dolore incidit, tūc enim mitigato

Secūdū proloquium.

Secundum proloquium ad hunc modum habet: In principio omnium tumorum præsertim phlegmonosorū cōferunt reprimētia cōia, tribus dūtaxat exceptis. Si glandulosas partes, quas vocant, occupent, si critici fuerint, si ex

Si tumor iā factus est.

materia venenosa procreati sint. Atque in omnibus his, præcipuè verò quando ferè cōstitit fluxio, & tumor prope modum factus est, oportet materiam ipsam resolvere, ac discutere, admotis ipsi tumentis particulæ diaphoreticis, non quidem mordacibus, & valde acribus, sed lenibus potius, ac moderatè calidis & humidis, maximè verò in tribus vltimis cōmemoratis, in quibus studendum materiam attrahere ad locum tumore obsessum, ipsūque tumorem augere, & materiæ iam fluxæ & commixtæ refluxū prohibere. Quod interdum quidē facimus emplastris attrahentibus, nonnunquam verò cucurbitulis dolenti loco affixis, ut docet Auicennas. Sit ergo regula seu canon artis generalis, in principio omnium tumorū, qui ex humorum influxu creantur, exceptis tribus paulò antè memoratis, sola ac pura reprimētia esse adhibenda. In augmento verò ipsi

Artis canon generalis.

At in statu & paulò ante statum, æquis portionibus miscenda sunt reprimētia discutientibus. Cū autem declinatio, vel finis status adfuerit, solis resoluētibus & relaxantibus uti licet. Breuiter quandiu humor adhuc affluit, repellend

repellendum est: vbi verò iam restitit fluxio, digerendū. Verum si medio modo res habeat, id est, partim iā aliquid fluxerit & loco inhæserit, partim verò aliquid adhuc influat, mixtis auxiliis vti oportebit, hoc est, partim resoluentibus, partim regerentibus, siue repellentibus. Coeuntibus enim vnā contrariis indicationibus, cōpositum quoque esse præsidium oportet, vt 13. Therap. Galenus ait.

Porro hæc omnia sanè intelligenda sunt, vtpotè si tumor præter naturam resolutione seu (vt communiter dicunt) via resolutionis terminari debeat. Auxilia autem, quibus singulas modò dictas intèriones exequimur, pro vāria materia tumorem excitante, in sequētibus particularibus capitibus, & in sexto libro describentur.

De curatione abscessuum in vniuersum.

CAeterum si phlegmone, aut quouis alius tumor degeneret in abscessum eius curatio per initia præstat. Gallibro secundo ad Glauconem, per mitigatoria auxilia, quæ Græci chalastica vocant, id est, relaxantia, siue remittentia, cuiusmodi est medicamentum, quod à Galeno tetrapharmacum appellatur, molle quidem & anodynum: cui ex sententia eiusdem 13. Therapeuticæ, mellis paululum admixtum sit, oportet.

Constat autem tetrapharmacum, ex ceræ, resinæ, cōlophonix picis, seu taurini, pari portione. Procedente verò tempore, ad ea quæ concoquendi, seu maturandi, ac suppurandi vim habent, transeundum est. Quæ autem in aliam speciem, hoc est, in alienam substantiam, & toto genere præter naturam degenerauerunt, ea per chirurgiam summouenda sunt.

Porro in iis amouendis iuxta Galeni cōsiliū 14. Therap. id agere oportebit vt rationibus, quibus id fiat, quod intendis, pensitatis, optimam semper earum deligas.

Sanè optimæ rationes tripliciter indicantur: nempe temporis curandi breuitate, curando citrà dolorem, & maxime tutè curando. Rursus vt tutò cures, tria propria sunt, quibus intentus sis oportet.

Vnum primūque, vt omnino absolutionem operis consequaris. Alterum, vt sicubi hunc non consequaris, saltē cubantem non lædas. Tertium, vt vitium non

Curatio tumorū in abscessum quæ excitatur vocat degenerantium.

Tetrapharmacum.

Optimæ curandi rationē tripliciter indicantur.

non facile reuertatur. His considerationibus si optimam curationis viam indicaueris, inuenietur quidē in omnibus modò propositis tumoribus, quando potius chirurgiæ, & quando potius medicamentorum ope sit curandum. At chirurgiæ quidem studium in his potissimum, quæ nunc dicta sunt, hoc est in tumoribus, qui toto genere sunt præter naturam ad interemptionem eorum festinat, atque prorsus vt hi tollatur sibi proponit. Quòd si perficere nequeat, proximum illud consilium habet, vt vitium transferat, veluti in hypochymatis, id est suffusionibus. Quod verò ex medicamentis petitur, primum huc tendit, vt quod præter naturam est, tum in pus vertat, tum putrefaciat: hoc verò secundo loco destinat. Hæc Galenus. Itaque, vbi partes, quæ phlegmone infestantur, vehementius pulitant, sic vt iam desperetur de horum, citra pus, curatione, veteres omnes (inquit Galenus 4. Therap.) eiusmodi ad mouēt medicamēta, quæ celerrimè pus mouēt: antè verò nequaquam.

*Ex lib. 4.
The. meth*

Quamquam sicubi cataplasmate quod calfaciat humectetque [& ad suppurationem perducit] illinuntur quæ phlegmone infestantur, id nequaquam ex prima ratione fit, hoc est, vt remedium affectus, sed vt symptomaticis mitigatio, vt potè doloris. Siquidē ipsius phlegmones remedia sicciorum sunt virium. Et paucis interiectis subdit, Compensiosa obfessarum phlegmone partium curatio, per id genus præsidia [hoc est, per siccantia & resoluentia] obitur ac perficitur, quæ sanè vel affectū prorsus summovent: vel si quid exiguum quod suppuret, reliquerint, alterum medicamentum acre, quod educere pus queat, requiritur: vel si tenuis circumposita cutis sit, velisque celerius explicatum ægrum, sectione seu incisione opus est. Et hoc sanè est, quod dicebat Auicennas, nempe curatiocem apostemat

Auicennas.

Quando potissimum secandi sunt abscessus.

is, quatenus apostema est, extractionem esse materiæ extraneæ, quæ excitat apostema. Auxilia autē quibus mouere pus expedit, & alia quæ suprà dicta sunt, perficere ex particularibus capitibus, & ex libro sexto, de suppurantibus requirenda sunt. Porro suppurato iam abscessu, aut transmutato, vel valenter impactio, si pus, aut alia quæ ruis materiæ ibi contenta non discutiatur, vel si tēpore conuenienti, & dum iam tempestiua adest occasio, citra manus operam, non aperiatur, secare exitum ei quod digestionem,

non

non celsit oportet. Potissimè verò id moliendum erit, si timeatur futura aliqua erosio: vel aliud quoduis nocumentum, imò si necessitas vrget, ex aduerso etiamnum aperi debet, & quam promptissimè ac tutissimè fieri poterit, materia extrahi, ob causam superius adductam.

5 Tutius autem ferro, quàm medicamentis causticis, & adurentibus aperitur: modò nihil ex iis, quæ de aperienda vomica libro sexto dicentur, obstiterit. Communiter autem phlegmonosi eiusmodi tumores, iam in suppurationem versi, scalpello inciduntur. Porro apertio ipsa, seu puris emissarium fieri debet pro ratione tum copix materiæ ibi collectæ: tum etiam ipsius loci affecti. Quòd si com-
 10 putruisse portio aliqua suppurantis partis videbitur, excindi eam est necesse, ad formam seu similitudinem folij oliuæ vel myrri, quo facilius sanescat. Cæterùm Galenus maximas sectiones semper vitandas esse præcepit, sanabatque huiusmodi suppuratas particulas, etiam inguina & axillas sola vt plurimum incisione, & medicamentis valenter sic-
 15 cantibus. Quòd si aliquando excindere aliquid propter multitudinem, non puris modò, sed etiam corruptarum partium fuit opus, contentus erat sectione non maiore quam myrti folium magnum. Ex amplis enim sectionibus, vbi ad cicatricem perducta est particula, præterquàm quòd turpissima redditur, sit etiam imbecillior, & ad mo-
 25 tum ineptior. Fiunt autem huiusmodi sectiones, myrtaceum folium imitantes, in iis potissimum tumoribus, qui in axillis & bubonibus suppurant. Et in iis quidem longitudo per transversum ducta esse debet, non autem per cru-
 ris aut corporis rectitudinem.

30 Quippe ita cum crus aut brachium inflectimus, naturaliter cutis sibi applicatur. In aliis verò locis incisione simplici ferè semper vtimur. In ipsa autem apertione siue incisione, septem potissimum sunt attendenda iuxta recentiorum placita.

35 Primum, vt sectio fiat eo loco, quo materia continetur. 1
 Secundum, vt fiat in loco inferiori, quo melius purulenta illa colluies vacuari possit. 2

Tertiū, vt fiat secundū rugas & processum musculorū. 3

Quartum, vt vitentur nerui, venæ & arteriæ, quoad fieri poterit. 4
 Quintū, vt non tota materia semel atq; affa- 5

*Tutius ferro quàm medicamentis adurentibus suppuratus tumor aperi-
 tur.*

*13. Thera. Sectio oliuæ aut myrti foliū imi-
 tans.*

Noxa ex amplis sectionibus.

Sectio i suppuratis bubonibus cur fiat p transuersum.

Septē attendenda i apertione iā suppurati abscessus.

tim educatur, præsertim in magnis abscessibus, ne scilicet ex nimia subitaq; inanitione, & spirituum resolutione virtutis sequatur prostratio. Sextum, vt blandius, & minimo quàm fieri potest dolore, locus tractetur.

7 Septimum, vt facta apertione locus detergeatur, carne

Duo spectatur Galeno in apertione suppurati abscessus. impleatur, & ad cicatricem more aliorum ulcerum perducat. Galenus autem lib. 13. Therap. duo potissimū motus esse attendenda in sectione suppurati abscessus, ad hunc modum scribens: Sin aliquando puris copia medicamenta superet, nec ea videantur tibi totum digerere posse, secare exitum ei quod digestionem non celsit, eo potissimum loco

1 oportet, quo est editissimū. Quippe tenuissimam etiā illic

2 inuenies cutem. Memineris præterea in sectione, & alterius indicationis, quæ ad fluxum pertinet, atque ad ambo respiciens, ita quod suppurauit, incide: ac deinceps medicamentū aliquod corū, quæ sine erosione siccant, impone.

Detergentia.

Hic variat exemplaria.

Vnguenta super tumore iam apertum applicanda.

Manna & thuris res post incisionem, & eorum vires. Partem incisam prius mitiganda esse.

Quæ in retere ponenda.

Auxilia autem detergentia post apertam vomica purganda ulceri sordido accommodata, sunt mollia tormenta vel linthea, concepta linamenta, emplastra, & vnguenta, quæ in particularibus capitibus, & in sexto libro censentur. Prius diebus sufficit Guidoni vitellus oui alumine zuccharino inspissatus quo remedio etiam utebatur, Gulielmus à Saliceto. Postea verò deueniendū est ad mel rosatū, & mundificatiū ex apio: & postremo, ad vnguentū Apostolorū, & Aegyptiacū, si res ita desideret. Suprà verò admoenda vnguenta, basilicon, diachylon & diaphœnicon vulgò nuncupatum, atque alia id genus quæ ad vlcerum instituuntur. Vbi enim abscessus secueris, more aliorū ulcerū curari debetur. Galenus lib. 13. Therap. post excisam cutim in phlegmonis axillarū & inguinum, medicamento quod Græci

mannam, id est, thuris purgamentū vocant, affectam partem implebat. Hæc autem leui adstrictione prædita est.

Sed & mitigare (inquit) prius incisam partem, quantum poscere videbitur, oportebit, fomētis primū, dein cataplasmatibus, mox humectante aliquo medicamento, aut non siccante, singulis scilicet extrinsecus impositis. Nam in ipso vlcere, tum manna (vt dictum est) tum ex præditiis quæ lin-

teolis excipiuntur, primum quidē ea quæ pus citant, dein ea quæ expurgant, sunt imponenda. Post quæ si cauitas etiam mansit, quæ impleant adhibenda sunt: sin aliter, ea

quæ

quæ cicatricem inducunt. Porro si laborans nec ferro can-
dente, nec scalpello, fieri sectionem præ mollicie admiserit,
medicamentis adurētibus erit molienda apertio. Ad hoc
autem laudat Auicennas semen lini, fermentum, & ster-
cus columbinum. Hæc præstantiora efficies si cū sapone molli,
aut muccagine seminis sinapis miscueris. Cæterum rupto-
rium seu causticum, quod fit ex calce, & sapone, in hac re
principatum obtinet. Hactenus de tumoribus præter natu-
ram in vniuersum: ac deinceps de particularibus eorum
differentiis.

*De phlegmone vera, & alijs à sanguine procreatis
tumoribus.*

CAP. VI.



15 Absoluto iam in vniuersum sermone de tumo-
ribus, qui præter naturam consistunt, tempe-
stiuum est, de singulis eorum differentiis par-
ticularim differamus, à phlegmone sumentes
exordium: vt quæ & frequentissimè incidat,
& symptomata (vt Galenus ait) periculosissima exciter.

Itaq; phlegmone Galeno lib. primo de morbis & sym-
20 promatis, bifariam accipitur. Vno modo communiter, ve-
terum qui ante illum fuerunt, more pro omni partium ve-
luti inflammatione, & quadam efferuescentia, hoc est, pro
omni calida, ac veluti flamma quadà dispositione, quam
Græci propriè *phlogosin* appellant. Altero modo à Gale-
25 no & iunioribus accipitur pro tumore ex sanguine vero
ac puro, hoc est optimo, ac mediocrem crassitiem obtinen-
te procreato. Et hæc quidem generis sortitur appellatio-
nem, atque inflammatio æquiucòcè generi Latinis nomi-
natur, Græcis verò absolute phlegmone. Ea autem recen-
30 tioribus duplex est, vera scilicet, & non vera. Vera phle-
gmone fit à sanguine benigno, hoc est, qualitate, & sub-
stantia seu consistentia optimo, sed copiosiore quàm sit
parti ex vsu. Non vera & illegitima phlegmone, ex prauo
& non naturali sanguine efficitur. Est autem sanguis,
35 humor calidus & humidus ex temperatiori parte ipsius
chyli progenitus. Et hic quidem duplex est: Naturalis, &
nò naturalis. Naturalis, est humor calidus & humidus,
substantia quidem mediocris, colore verò multū rubens,
odore autem & sapore dulcis, mitis, ac benignus. Verum
non naturalis ille dicitur, qui ab isto nuper descripto de-

*Auicen-
nas, in fine
tracta. i.
sen. 3. li. 4.*

*Duplex ac-
ceptio Phle-
gmones.*

1
*Phlegmo-
ne pro phlo-
gosi.*

2
*Phlegmo-
ne pro in-
flammatione
ex sangui-
ne optimo.*

*Phlegmo-
ne duplex.*

1. *Vera.*
2. *Non ve-
ra.*

*Sanguis
quid &
quod duplex.*

*Sanguis bifariam de-
generat à
propria sua
natura.*

*Quatuor
differentiæ
tumorū ex
sanguine.*

flexit, degenerauitque: intra tamen suæ latitudinis terminos, quos si trāsgreditur, nō iam sanguis, sed alius humor venit appellandus. Hoc autem (sanguinem inquam degenerare à propria sua natura) contingit dupliciter. Vno modo (vt aiunt) in se, hoc est, ratione sui permutata propria eius substantia, citra alterius admistionem. Altero modo, per alium seu ratione alterius. Et per se quidem adhuc bifariam, nempe: vel quia eius substantia crassior est: aut tenuior quàm debeat: vel quia aduritur, & quod ex eo tenuius est in flauam bilem mutatur, quod verò crassius, in atrā, idq; absque separatione. Alterius verò ratione sanguis fit non naturalis, quādo alius humor illi permiscetur. Quod multifariam contingere potest, prout scilicet variæ species bilis, pituitæ, aut melancholiæ, cum ipso sanguine misceri possunt. Ex quibus liquet, quòd ex sanguine quatuor species seu differentiæ tumorum præter naturā procreantur. Primum ex sanguine naturali & benigno generatur vera phlegmone. Ex sanguine verò illaudabili factō per admistionem aliorum humorum, tres enascuntur differentiæ phlegmones non veræ, atq; illegitimæ: quippe quod tres alij humores (pituita inquam & vtraque bilis) ipsi sanguini permisceri possunt. Itaq; si flaua bilis sanguini commisceatur, quod ex ambobus tum est constatū, vocatur phlegmone erysipelatodes, si pituita phlegmone œdematodes, si atra bilis seu melancholia, phlegmone scirrhodes. At ex sanguine illaudabili & maligno per adustionem & corruptionem propriæ substantiæ, pro ratione tenuitatis aut crassitiei ipsius, generantur vel carbunculi, qui Græcis anthraces dicuntur, vel gangræna vel sphacellus. De quibus in sequentibus dicemus.

De causis, signis & iudicijs phlegmones.

Causæ phlegmones 3.

1. Prægressiua

2. Antecedens.

Phlegmones causæ sunt tres: vt & aliorum omnium tumorum præter naturam qui per defluxionem sunt.

Primitiua scilicet, quam & prægressam & euidentem appellamus, antecedens, & coniuncta. Euidentes causæ inflammationis, sunt occasiones externæ: vt cōtusio, disruptio, conuulsio, fractura, vulnus, vlcus spontaneum, luxatio, & alia id genus, quæ quatenus dolorem in laborante particula excitant, fluxionē accersunt. Antecedens, vt sanguinis exuberantia, probi quidem & inculpati, vt cum ad immod

immoderatam venarû repletionē venæ pertingunt. Tunc enim cogitur sanguis (veluti quid superfluum) ad partem aliquam vel imbecillam, vel plus iusto exalfectam: vel dolore affectam, effundi, ac defluere. Vbi tandem compingitur, atque impactus manet, nisi protinus ab initio reprimatur: vt iam suprà in capite vniuersali dictum est. Ad quod subinde recurrendum tibi est: vt absolutam magis particulariû tumorum, de quibus nûc agimus, intelligentiâ conseruaueris. Coniuncta causa seu continens, est ipse sanguis, qui iam loco affecto infarctus est. Phlegmones notæ sunt, tumor, seu incrementû partis supra naturalē habitû. Calor vehemens, adeò vt membrum comburi videatur. Rubor per summa vigens, qualis ex balneis, vel igne, aut quouis alio modo calfactis aduenit. Dolor vehemens, nisi membrum difficilem omninò sensum habuerit. Pulsus, seu pulsationis sensus in profundo molestus. Tensio seu extensio membri, quam nò modò ipsi tantùm deprehendimus, sed etiam ipse æger proprio sensu aduertit. Renixus partis tantum genti eam, pro tensionis modo. Et si quæ sint alia, quæ præsentem sanguinis abundantiam in parte aliqua testantur.

Phlegmone quatuor habet tempora, principium, augmentum, statum, & declinationem: nisi saltem fluxio intro recurrat, vel repellentibus medicamentis statim reprimatur. Vbi autem quatuor hæc tempora percurrerit, necesse est vt eius materia vel resoluatur atq; exhalet vel suppuretur, vel corrumpatur atq; putrescat, vel in scirrhosam ac lapideam duritiem abeat. Et horum quidem omnium signa ex capite vniuersali sunt requirenda: vbi explicatæ sunt notæ omnium temporum, & modorû terminationis tumorum præter naturam, quæ vulgò apostemata vocant.

Cæterùm phlegmonē plerunq; mala comitatur symptomata, quæ eius curandi rationem interpellant immutatq; Cuiusmodi sunt, dolor vehemens, partem admodum sensibilem occupas, recursus materiæ ex glandulis (quas Græci adenas, & vulgò emunctoria vocant) ad partes internas, item partis affectæ mortificatio (quam corruptionē esthomenicam appellant) ex nimia scilicet refrigeratione & valido infartu ipsius materiæ (quæ inflammationem committebat) proueniens, durities quoque lapidea & pene indissolubilis, vulgò sclerotica nuncupata, ex perperam

3. Coniuncta.

NOTAE
vera ac legitima phlegmones.

Lib. de tumo. præ. natur. c. 13. metho.

Phlegmones tempora 4.

IVDICIA.

Symptomata quæ phlegmones curationē interpellant

ac temerè facta: tenuioris humoris dissolutione.

Galenus. Quocircà diligenter ac sæpius quidem obseruare oportet, in curandis tumoribus, qui præter naturam consistunt, quò quisque tandem sit euasurus, & quæ inopinatè superuenerint accidentia, vt circa id quod apparet, & vrgens est, maximè insistamus.

Quod nos probè Galenus admonuit libro secundo ad Glaucōnem, & 13. Therap. ad hunc modum inquit: In morbis quidem qui difficulter resoluantur, verendum est, ne eorum reliquæ præduræ relinquantur. Quare in singulis resolutionibus attendere oportet, ad quid transmutetur omnis, cuius curatio suscipitur, tumor. Nam ea quæ cum fortiter exsiccantibus agitur, reliquias præduras operatur. Hæc Galenus. Sed tempestiuum est, ipsius phlegmones curationem aggrediamur.

Ratio curandæ phlegmones ex defluxione concitata, corpori summa occupanti.

Methodus curandæ phlegmones quæ adhuc in generatione est.

Cum inflammatio, quæ Græcis peculiariter phlegmonæ dicitur, ex influxu sanguinis, copiosioris scilicet quàm sit parti ex usu, nascatur, fluxio autem incipiente adhuc phlegmone, partim fiat, partim iam facta sit, geminus sanè erit curationis ipsius adhuc incipientis phlegmones scopus, nempe vacuandi quod influxit, & prohibendi quod influit.

I Porro fluxionem inhibebimus, si humorem influentem retraxerimus ac repulerimus, si afflicte parti robur addiderimus, & si quid fluxionem accersit, summouerimus. Retrahemus autem atque in cōtrarium humorum defluxum reuocabimus, venæ sectione, si quidē vires valeant, & ætas permiserit. Sin minùs, ad motus cucurbitulis, vel ligaturis frictionibus, vel calfactis partibus, directè affecto loco respōdētibus. Regeremus autē repellēmūsve, ad motus medicamētis quæ hac facultate prædita sint, hoc est, quæ alio fluxionem propellere ac transmittere possint. Causas vero defluxionem ad partem iam phlegmone obsessam accersētes summouemus, particulam ipsam, si imbecilla sit, confirmantes, roborantēsve, si laxa nimis, adstringētes, si calida est, vt esse solet, refrigerantes, & dolorem, si discruciat, demulcentes, ac corpus vniuersum, si sanguine abundet, & parti contagium transmittat, venæ sectione vacuan-

1. Retractio

2. Repulsio.

3. Cause summotio.

res: de quibus omnibus mox dicetur.

- Vacuamus autem quod iam influxit, & in partem affe- 2
ctam se recepit, non modò medicamentis iis quæ digerunt, *Vacuatio*
hoc est, discutiunt ac resoluunt, sed etiam quæ adstringunt, *eius quod*
5 & refrigerant. Magisque profectò (inquit Galenus) ad *ia influxit.*
incipiètes phlegmonas, frigidis, adstringentibusque, quàm *Gale. 13.*
iis quæ digerunt est utendù. Atque etiam magis, vbi cras- *Therap.*
sum quod constituit non est. Sed si sanguis in particula, quâ
phlegmoneprehendit, vehementer est impactus, non est
10 amplius repercutientibus utendù: vt in præcedentibus di-
ctum est, sed tum digerere est tempestiuù. In veterascente
quoque inflammatione, quæ post totius corporis vacua-
tionem, aliâmq; idoneam curationem, duritiem quâdam
ac nigrorem in partibus reliquit, sanguinem scarificationi
15 bus auferre (Galeno etiam autore) nō est incommodum. *Scarifica-*
Atque hæc summatim ac vniuersali quadam methòdo di- *tio.*
cta sint de curatione inflammationum, quas Græci pecu-
liariter phlegmonas appellare consueuerunt, ex humorum
defluxu incidentium. Quæ certè rationali medico, & in
20 artis operibus exercitato, satis esse possent. Verùenimuerò
quoniam chirurgiæ cãdidatis, & non ita eruditis, hæc scri-
benda suscepimus, non abs re, neq; alienum à nostro insti-
tuto factum videbitur, si quæ de phlegmonarum curatio-
ne non modò veteres medici, sed & recentiores chirurgi
25 nobis scripto reliquerunt, post hanc vniuersalem ac compẽ-
diariam methodum sermone magis peculiari, & practico
subiiciamus. Itaq; rationem curandi phlegmonem præ-
ter regimen (vt vocant) vniuersale, in quatuor scopos, seu
intentiones, particulares, reuocare solent posterioris huius
30 seculi chirurgi: nempe in debitam vitæ rationis obserua-
tionem, influxionis inhibitionem, seu materię (quod aiunt)
antecedentis auersionem, in humoris, qui iam se in parte
recepit (quam materiam cõiunctam vocant) vacuationem, 2
& in symptomatum correctionem. 3
- 35 Prima itaque intentio perficitur debita sex rerum vul-
gò non naturalium appellatarum & eorum quæ illis an- 4
nexa dicuntur administratione. *i Prima i-*
Sunt autem res non naturales à medicis dictæ numero *tentio quæ*
sex, vt statim ab initio huius operis dictũ est, aer, cibus & *est vitæ i-*
potus, motus & quies, somnus & vigilia, inanitio & reple- *stitutio.*

- Res nō naturales.* tio animi affectus, seu accidentia. Quę omnia (quoniam phlegmone subindē febres accendit) ad frigiditatem , & moderatam humiditatem spectare debent. Pro quibus sequentia subiecimur pręcepta.
- Aër.* Aërem syncerum & clarum eundēque frigidiusculum deligito.
- Cibus.* Victum tenuem frigidū & moderatē humidū seruato.
- Potus.* Vinum debile & pauciferum, id est, quod in temperando haud multam aquę mistionem sustinet (Gręci oligophoron vocant) assumito. Quod si febris vehemens (vt sæpe affolet) accesserit, abstemius esto.
- Vinum oligophoron.*
- Motus.* Partem phlegmone obsessam ne exercitato.
- Quies.* Quietem quantum potes , pręsertim si plurima succorum abundantia sit, seruato.
- Somnus.* In somno & vigiliis modum teneto. Somnū diurnum, & pręsertim meridianum, vitato.
- Repletio.* A crapula & ingluvie summoperē caueto.
- Inanitio.* Alius fusa, & mollis tibi semper esto , atque eam interdum, si opus est, clysteribus subducito.
- Animi pathemata.* Iram, clamorem, contentionem, vt inimica, fugito.
- Venus.* A veneris vsu, velut ab hoste infestissimo, te subtrahito.
- Auerfio fluxionis, quę secunda est intentio.* Secundus scopus curadę phlegmones , qui est fluxionis auersio, perficitur venę sectione, si vires & ætas ferant. Sęper autē in omnibus mēbris ē regione siue ē directo (quod Gręcē *κατ' ἰσιν* dicitur) siue reuellere, id est, in contrarium retrahere velis, siue ad latur deriuare , vena secanda est, etiam si plethora adsit: ē directo autem sunt dextra dextris, & sinistra sinistris. Ergo si ophthalmia oculum dextrum infestet, vel synanche partem gutturis dextram occupet, humeralis vena, vel eius loco, (si non appareat) alia, statim per initia fluxionis, in brachio dextro incidenda est. At si humor in genu confluat, secanda est cubiti vena, vel interna, vel media, nisi alterum crus malis scarificare , aut in eo venam pertundere, vt alicubi Galenus consuluit.
- Vena semper ē directo secūda.*
- Vena secūda electio à laborante particula indicatur.* Itaque venę secandę electio, & auersionis in contrariū (quę ab Hippocrate antispasis dicitur) inuentio, à laborante particula, & curandi membri positu pręstatur , indicatūque, vt 13. & 14. meth. med. ac sæpē alibi Gal. docet. Cęterū corpus ipsum, quod phlegmone occupatur, nō modō cūm plethoricum est, sed etiam vbi morbi magnitudo iuadet,

suadet, cum mediocritatem succorum continet, sanguinis
 emissionem vacuamus, si saltem Galeni consilium sequamur,
 qui lib. 13. metho. medendi ita fieri præcipit, inquit: Do-
 lor siquidem, & membri, in quo phlegmone sedet, calor,
 5 etiam si purum ab excrementis totum corpus sit, fluxionis
 causa sunt. Expedit autem tunc partius id efficere [hoc est,
 sanguinem detrahere] ac vacuare quidē, prout maximē tum
 ætati laborantis, tum naturæ congruit. Aestimatis præ-
 terea tum anni tempore, tum regione, tum hominis ipsius
 10 consuetudine. Conferunt etiam non parū ad retractio-
 nem sanguinis in partem affectam confluentis, motus, fri-
 ctio, & ligatura partis oppositæ, sed maximē celebrata
 prius (vt dictum est) sanguinis detractio. Itaque si in ma-
 nibus phlegmone est orta, crura exercitanda sunt, vincien-
 15 da, fricanda. Sin in cruribus, manus. Sed hæc magis ad me-
 dicum quàm chirurgum pertinent.

Tertium scopum assequimur solis, per initia phlegmo-
 nes, repellentibus (exceptis prius memoratis casibus) parti
 inflammatione laboranti admotis. Vacuatur enim (vt Ga-
 20 lenus ait) quod impletum est, non modò medicamentis iis
 quæ digerunt, sed etiam quæ adstringunt & refrigerant:
 cuius generis sunt, quæ repellentia & reagentia dicuntur.
 In augmento autem ad præsentem intentionem, id est, ad
 vacuandum quod iam influxit, simul & prohibendum ne
 25 deinceps amplius aliquid confluat, miscenda sunt digeren-
 tibus reprimentia: ita tamen vt horum copia ac potentia,
 illis adhuc præpolleat. In statu verò æquis portionibus in-
 uicem commiscenda sunt, ac mitigatoria (cum vehemen-
 tissimi tunc dolores adsint) applicanda. At in fine status, &
 30 in declinatione, solis digerentibus quod impactum est, va-
 cuare oportet, si saltem ipsa phlegmone resolutione seu di-
 scussione terminari debeat. Si verò degeneret in absces-
 sum, & fieri non possit, vt puris collectio ac eruptio impe-
 diatur, tum suppurantibus, aperientibus, ac detergentibus
 medicamentis vti licebit. Porro exiccantia conferunt in
 35 fine vtriusque affectus, hoc est, phlegmones & abscessus.
 Hæc enim quod reliquum humoris est prorsus absumunt.
 Verum facta sectione in abscessu iam suppurato, medica-
 mentum quod sine erosionem siccet imponendum est, vt in
 sequentibus dicitur. Ad incipientes autem phlegmonas

3
*Tertius sco-
 pus qui est
 humoris iam
 in parte re-
 cepti vacua-
 tio.*

*Reprimen-
 tia in au-
 gmento præ-
 po. llerede-
 bent digere-
 tibus.*

*Si phlegmo-
 ne in absces-
 sum degeneret.*

Repellentia repellendo aptissimum auxilium est Galeno oxycratorum, circa initiū quod Latini puscā aquosā nominant. Est autem mixtura ex aqua & aceto, ita quidem temperata, ut adhuc bibi possit: spongia ergo hoc ipso oxycrato perfusa atque imbuta, parti, in qua phlegmone residet, imponenda est.

1
Oxycratō. Loco autem oxycrati, Galeni ipsius consilio, sumi potest vinum aliquod austerum, vel frigida solum in particulis scilicet, quæ circa artus sunt. Galeni verba hæc sunt. In particulis, quæ circa artus sunt, sat fuerit [per mixta phlegmones] etiam spongiā vel ex frigida aqua, cui paululum aceti sit immixtū, vel aqua sola imponere, sicut etiam ex vino aliquo austero. Ad idem summè efficax est eiusdem Galeni cataplasma, ex semperuiuo, & malicorio in vino decoctis, rhu, id est, sumach, & polenta. Repellit enim quod influit stringendo, atque id quod continetur exiccando vacuat, affectāsque partes utroque nomine confirmat & corroborat. Hoc remedium a recentioribus, ex Auicenna, sub hac formula postea descriptum est: Recipe succi semperuiui libram vnā, vini quod crassè sit substantiæ, & saporis acerbi libræ semissem, farinæ hordei quar. vnum corticis malorum granatorum, & sumach pulueris singulorum vnciæ semissem, coquantur, & fiat linimentum. Aliud quod ad idem efficaciter auxiliatur, ex Halyab. Santali albi & rubri singulorum drach. tres, memithæ, id est, glaucij drach. duas, terræ cimoliæ, boli armenicæ, singulorum drach. vnā & semissem: omnia in tenuissimum pollinem terantur, & diligenter cribrentur, postea dissoluantur in succo semperuiui, aut portulacæ vel lactucæ, & fiat linimentum. Aliud ad incipientes etiam inflammationes phlegmonosas, tritum & vulgare, quod & recentibus vulneribus, & nuper acceptis contusionibus, valde vtile est. Constat oui candido liquore, rosaceo, & stillaticia rosa, hoc est, aqua rosarum. Panniculi hoc imbuuntur, parti inflammatae apponuntur, & subinde mutantur. Cæterum plurima alia tum simplicia, tum composita medicamenta, ad incipientes phlegmonas stringendo, & fluxionem reprimendo conferunt, quæ partim ex libro sexto, partim ex aliis autoribus, qui de hac re scripserunt, requirenda sunt. Sed hæc ad præsens nobis visa sunt sufficere.

- Inter remedia, quæ phlegmonarum incremento forinsecus admota subueniunt, efficaciter auxiliatur rosaceum, Græci rhodinon vocant. Hoc enim partim repellit, partim per halitum digerit: quippè quod olei rosæque mediam ad vnguē naturam obtineat. Itaque rosaceo paucula quædam inest adstrictio, quæ tenues ipsius particulas præuerrere quidem (inquit Galenus) nequit: sed ubi illæ altius penetrauerint, in ipsam iam superficiē agere incipit, pro viribus constipando, contrahēdo, ac condensando. Proinde fit, vt
- 10 rosaceum phlegmonarum augmentis optimū sit & aptissimum præsidium. Aliud Auicennæ, phlegmonarum incremento valde efficax. Cōcipit foliorū maluæ M. vnum, absinthij, rosarum, singulorum vnciæ semissem, farinæ hordei vnciam vnā, olei chamæmelini quar. semissem: coquantur, & pinsantur, ac in formam emplastri mollis redigantur. Aliud eiusdem, habet vini ad dimidias vel tertias cocti (hoc sapam, illud defrutum appellamus) quar. vnum aquæ rosacæ, aceti ana quar. semis. croci, drachmas duas: moderato igne parū ferueant, postea colentur, & panni
- 20 eo liquore imbuti parti phlegmone obfessæ applicentur, epithematis more.

¹
*Remedia
in phlegmo
narum cre
mento ad
monenda.
Libro 3. de
simp. medi.*

²
*Rosacē in
phlegmona
rum aug
mēto opti
mum esse
præsidium.*

- Porro eiusmodi præsidia, quæ in augmento inflammationis adhibentur, mixtæque ex reprimentibus & digerentibus facultates habēt, tardius amoueri, & mutari debent,
- 25 quā purā repellētia, initio ipsius phlegmones accommodata.

- Auxilia, in vigore seu statu phlegmones, & cum in ea vehementes vrgent dolores, idonea sunt Aëtio, malua priuatim, & cum modico pane, & rosaceo illita. Melilotū quoque in passo decoctum, & cum pane admotum. Idem possunt (inquit) & palmulæ in passo elixatæ & cum pane & rosacco confectæ & mixtæ. Aliud quod per halitum digerit, in vigore phlegmones summè efficax. Perdicij, id est, parietariæ, maluæ ana, M. i. furfuris subtilis, farinæ volatilis, ana. p. i. fœnigræci, aneti, ana, vnciæ semis, olei chamæmelini quart. semis. vino incoquantur, & exacto subigantur, donec in vnitatem coeant, & fiat emplastrum. Aliud ex Gale. desumptum lib. 13. Therap. Recipit medullæ panis frumentacei lib. vnā, maceratur spatio vnius horæ in aqua feruente. postea exprimitur, & huic admiscetur mellis optimi quart. vnum, formaturque cataplasma. Hoc discutit, &

Quæ in statu phlegmones conueniant.

*Emplastrū
Galeni.*

dolores

dolores mulcet. Vnguētum basilicon, & quod è succis conficitur, diachylon nominatur, in vigore phlegmones ad-mouenda esse consuluit Arabs ille Auic. verū hoc remol-liendo, illud verò maturando magis est idoneum: quan-quàm tamen vtrumque vi aliqua etiam digerente polleat. Horum autem descriptiones lib. 6. requirendæ sunt, vbi & valdè multa discutientia, tum simplicia, tum composita re-censentur, quæ in statu eiusmodi inflammationum effica-citer auxiliatur. Cæterū hæc & similia, quæ ad discuten-dum quod iam influxit, & ad dolores mitigandos, præsidia adferuntur, cum multa humiditate participant, tardissimè mutanda erunt. Porro cum ex admotis nuper memoratis auxiliis, humor in particulam phlegmone obsessam dela-psus discutitur, tumorque & extensio minuatur, dolo-résque mitiores fiunt, tunc inflammationis declinationem adesse putato, quo tempore solis discutientibus vtendum est. Cuiusmodi sunt, agrestis malua illita, & passulæ exem-ptis acinis cū panè & modico melle, & hordei farina cum melle applicata. Itè lana succida, stupæ, spongia, aut quid simile, vino calète imbuta, postea expressa & apposita: hæc enim omnia discutiendi vi pollent, & dolorè non excitant. Cæterū si ob morbi pertinaciam & difficultatem locus affectus nimis multam, & resolutioni contumacem mate-riam cōtinuerit, non idèò protinùs, vt quidam faciunt, ad chirurgiam, id est, sectionè aut vstionem, prorūpere oportet, sed eniti, vt collectus humor discussoris medicamentis per halitum digeratur. Moliri enim prius digestionè oportet, medicamentis ad id conducentibus, quam inflamma-tionem incidere. Quòd si tumor digerentibus medicamen-tis nō cedat, nullaque ampliùs discutiendi quod in eo cōti-netur, spes relinquatur, sed videatur potiùs materia ad sup-purationem spectare, ad ea quæ maturant, & pus mouent, transeūdum erit. Speramus autem tumorem (etiam si iam in abscessum degenerauerit) per halitū digeri posse, si ma-teria, quæ eum excitauit, tenuis & pauca, resoluique ido-nea fuerit: si & in loco minimè profundo delitescat, cu-tisque particulæ laborantis rara extiterit. Si verò humor multus sit & crassus atque in alto sinu reconditus, cutis ve-rò densa, exhalatio seu resolutio nequaquam speranda est. Proinde ad maturantia & pus mouentia veniendum

erit:

*Quibus sit
vtendū au-
xilijis in de-
clinatione
phlegmo-
nes.*

*Quādo spe-
randa reso-
lutio.*

*Pus mouē-
tia.*

- erit: cuiusmodi est cataplasma, quod ex farina triticea, in aqua & oleo temperatè cocta, constat: hoc enim celeriter inflammationes, quæ digestionem non cesserunt, ad suppurationem perducit, vt etiam Galen. nobis autor extitit. Si-
 5 quidem & calorem habet nostro calori per similem, nempe temperatum ac mediocrè, & ratione farinæ, & olei (quæ lentoris quippiam habent, quo meatus obstruendo partis calorem natium digeri prohibent) vi emplastica præditum est. Quæ duo maximè in maturatibus & pus mouentibus medicamentis desiderantur. Sunt qui huic cataplasmati croci momentum coloris gratia adiiciunt. Cæterum si tumor, ob infarctos in eo crassos & viscosos humores, ægrè ad suppurationem ducitur, eximiè subueniet cataplasma ex radicibus althææ, & caricarum dulcium ac pinguium
 15 decocto, quod mellis crassitudinem repræsentet, & farina triticea compositum. Ergo accipe prædicti decocti lib. vnam, farinæ triticeæ selibra, incoquantur simul, & in formam cataplasmatidis reducantur. Si autè loco farinæ triticeæ hordeacea apponatur, vel cibarius panis, quæ Græci *κυνήμις* vocant, discutiendæ inflammationi magis quam suppurandæ conueniet, vt libro ad Glauconem secundo Galenus annotauit. Aliud in declinatione phlegmones puri mouendo apprimè idoneum, quod à vulgaribus chirurgis communiter vsurpatur. Habet autem corticis radicis maluauisci, id
 25 est, althææ, radicis lilij, senecionis, Græcis erigeron dicitur, & foliorum malux singulorum M. vnum, farinæ triticeæ quart. vnum, farinæ sem. lini vnciam vnam, azungie suillæ recentis libræ semissem: coquantur herbe in aqua quantum satis esse videbitur, & tundantur cum reliquis in mortario, fiatque cataplasma. Pleraque alia puri mouendo accommodata, libro sexto descripta sunt, ex quibus peritus quisque chirurgus, & in artis huius, quam docemus, operibus exercitatus, præstantiora, & naturæ laborantis, ac particulæ cui medetur, magis idonea seligere atque in usum præsentem
 35 assumere poterit. Cæterum si collecto ac iam confecto pure, abscessus in quem phlegmone degenerauit, sponte non aperitur, scalpello, vel cauterio, aut medicamento quopiam erodente (liberis iam ab inflammatione partibus) molienda puri, quod digeri non potuit, euacuatio est. Deinde vlcer ad cicatricem, similiter reliquis vlceribus, perducendum

libro 2. ad
Glauc.

Huius ca-
taplasma-
tis meminit
Haliab.

Cataplas-
ma com-
ne.

cendum est, nempe detergendo, carne implendo, glutinando, & demum cicatricem inducendo. Porro si materia, quæ tumorem parit, crassa est, & resolutioni, atque etiam concoctioni cōtumax, vehementerque carnis meatibus impacta (qualis esse solet in diuturnis inflammationibus malè curatis, resoluta scilicet tenuiori humoris parte, & crassiore in meatibus relictà) scarificatio timenda non est, præsertim (vt 2. lib. ad Glau. Galenus admonuit) vbi durities, liuor, ac nigror, apparuerint.

4
*Symptomata
tum correctio.*

1. Dolor.

*Dolorē in
phlegmone
lenientia.*

*Libro 2. ad
Glau.*

Quartus scopus, qui in curanda phlegmone chirurgo ac medico proponebatur, est symptomatum, quæ ipsi inflammationi superueniunt, correctio, & summotio. Ea autem ferè sunt, dolor, regressus materię, ex qua tumor excutatur, ad interiora, putredo & corruptela partis suppurantis, & veluti lapidea quædam durities, ex valenter exsiccantibus & digerentibus relictà. Ergo si vehemens dolor inflammationi accesserit, modis omnibus laborandum est, vt statim mitigetur. Quandoquidem præterquam quod vires prosternt, & legitimas actiones impedit, fluxiones quoque accersit, & sanguinem ad se allicit. Itaque si dolor acrius vrget in phlegmone, confestim imponenda medicamenta sunt, quæ doloris vehementiam citra vllam noxam leuent, & demulceant. Quale est, quod ex pulso, oleo rosaceo, & paucula cera, cum his ambobus liquata conficitur Galeno: hoc autem lana succida, quæ plurimum habet œsypi, excipiendum est, ac æstate quidem frigidum, hyeme verò tepidum apponendum. Itaque medicamentum eiusmodi, sic vt dictum est attemperatum & admotum, rarefacit, extenuat, degerit, euacuat: humorem acrem, lentum, crassum, aut multum, partibus dolentibus hærentem, æquabilem reddit, vaporémque crassum, commodum exitum non habentem discutit, atque sic dolorem mulcet: nullam verò sua caliditate noxam inuehit: rosaceum namque calorem retundit. Quo fit, vt hoc remedium citra noxam vllam dolorem mitiget, & affectui non incommodet, vt aqua calida, oleum, & triticea farina, quæ in inflammatione cum dolore incidente ex vsu esse non possunt, vt testis est Galenus: hæc enim calfaciendo ac humectando relaxant, ac robur partis resoluunt, vnde & imbecillior redditur, & ad fluxionem excipien

excipiendam pronior. Ad eundem vsum (nempe ad mitigationem doloris in phlegmone) efficaciter apponuntur, rosaceum, ouorum lutea, quæ & vitellos appellant, mica panis albi, in aqua calente macerata, postea expressa, & rosaceo permixta. Præsentî etiam auxilio sunt, maluæ in aqua decoctæ, mixtæ cum furfure & rosacæo: vel oleo violaceo. Crocû autê in omnibus sedandis doloribus assumitur Auicennæ, atque aliis anodynis, id est, dolorê mitigantibus vtiliter commiscetur. Porro si tanta tamque vehemens sit doloris acerbitas, vt iis quæ à sedando, leniendoque dolore quasi suppetiis latis naturæ, propriè anodyna & paregorica dicta sunt, demulceri non possit, ad narcotica, id est, stupefacientia, transeundum erit. Inter quæ hyoscyamum admirandam opem sæpe contulisse, frequenti experimento præter quorundam auctoritatem comprobatum est. Itaque folia eius sub calidis cineribus coquito, recenti axungia misceto, & admoueto. Hoc vehementes dolores mulcet, & phlegmonosos tumores ad suppurationem perducit. Cauenda autem semper est, dum hoc moliris, nimia humectatio: quippe quæ per initia inflammationum, cum magno dolore fluxu incidente, perniciofa sit, vt paulò antè diximus. Cæterùm si metus adsit recursus materiæ phlegmonem excitantis, ad loca penitiora, & maximè versus principes partes, trahentibus medicamentis (de quibus libro sexto fusissimè egimus) vel etiam admotis cucurbitulis, quæ vehementius & ex penitioribus partibus trahunt, eam foras euocare oportet.

*Crocum.**Nota de hyoscyamo.**2. Recursus materia ad interiora.**3. Durities relictæ.**Galenî cataplasma, ad induratos tumores.*

Si verò à vehementer exiccantibus ac digerentibus inflammationi temerè admotis, reliquæ tumoris in scirrhum abierint, radices cucumeris agrestis (qui vulgò herbariis & officinis cucumer asininus dicitur) aut bryoniæ, aut asari, in aqua incoques sæpe quidem (vt præcipit Galenus) has solas, nonnunquam verò & caricas pingues adiciens. Deinde farinam cum aqua misceto, cui & aliquid adipis, præsertim anserini aut gallinacei, adiecito. Quòd si horum copia non sit, suillum addito, & cataplasma conficito. Hoc scirrhusum affectum, ex valentius exiccantibus & digerentibus medicamentis in parte, quæ phlegmone occupabatur, relictum, efficaciter sanat.

sanat. Prædictarum quoque herbarum, & cum his althææ radices, post moderatam decoctionem cum pane & adipe contritæ, & admotæ, eiusmodi induratos tumores discutiant: vt libro secundo ad Glauconem luculenter docet Galenus. Itaque si phlegmonosos tumores, qui ægrè per halitû digerûtur, nec facillè cõcoquûtur, in scirrhu mutari timuerimus, valèter digerētibus semper emolliētia remiscebimus. Sed de iis iterû libro sexto locupletius dicemus.

4 Putrefactio.

Porro si portio aliqua suppurantis particulę computruerit, eam protinus excidere oportet vel plurimis scarificationibus profundis incidere: dein aqua salsa perfundere: & demum emplastrum apponere ex fabarum, aut orobi farina cocta in oxymelite. Reliqua quoque tibi molienda erunt, quæ in curatione gangrenæ mox subiiciemus. Sed melius fuerit capita curationis eiusmodi phlegmonosi affectus, breuibus quibusdam sententiis complecti.

Capita curationis rheumaticæ, id est, ex humorum influxu factæ phlegmones adhuc incipientis, & cum dolore non vsque adeo magno, affligentis.

Ex Galeno lib. 2. ad Glauc.

- 1 **C**Orpus vniuersum congruis vacationibus, sed præsertim venæ sectione, modò nihil obstiterit, inanito.
- 2 Partem inflammata[m] his, quæ influentis humoris repellendi vim habeant, perfundito, ac illinito.
- 3 Humorem qui in affecto loco cõtinetur, admotis exsiccantibus, ac digerentibus medicamentis, vacuato.
- 4 Robur ac virtutem affectę parti, & eam circumstantibus addito.

Capita curationis eiusdem phlegmones quando cum grauiore dolore affligit.

- 1 **V**Bi inflammatiõ ex defluxione orta grauiore cû dolore affligit, doloris vehementiã citra vllã noxã mitigato.
- 2 Ergo quæ vehementer stringunt, aut quæ calfaciendo & humectando relaxât, ac robur resoluunt, ne ad moueto.
- 3 Sed quæ quod influit, mediocriter stringendo, repellunt, & quod iam affectam partem obsidet, vacuant, inflammato loco adhibeto.
- 4 Spongiam acerbo vino, aut poscâ imbutam, vt fluenti humori via præcludatur applicato.

Si hæc profecerint, & nusquam adhuc pus appareat, 5
mollibus, & iis quæ aduersus fluxiones temperantur em-
plastris, vtitor.

Ex iis autem quæ exiccare, & fluentem sanguinem re- 6
pellere citra dolorem possint, tanquam optima deligito.
Quale est, quod chalcite constat, rosaceo resolutum. Dein
de lanam puram, ex vino acerbo madentem, superponito.

Vbi verò pus in parte ipsa apparuerit, semel atque ite- 7
rum supradictum cataplasma, aut potius quod ex hordei
10 farina constat, admoueto.

Si puris, eiusq; crassi copia, medicamenta superet, adeò 8
vt nulla resolutionis spes habeatur, exitum ei quod dige-
stioni non celsit, eo potissimum loco, quo est editissi-
mum parato.

15 Post sectionem, nisi dolor vrgeat, vulnus exiccato, ac ci- 9
tra dolorem detergito.

Si post sectionem dolor vrgeat, cum fomentis primùm, 10
deinde cataplasmate, mox humectate aliquo medicamen-
to, aut saltem non siccante, mitigato.

20 Si verò pars adhuc inflammata sit, cataplasma ex lenti- 11
cula, quod vacuat, & repellit imponito.

*De carbunculo, gangræna & sphaelo, quas sanguineas
pustulas vocant. CAP. VII.*



25 **P**ostquam de phlegmone prima inflammatio
num differentia, & nostris corporibus frequē
tissimè incidente, abundè satis, quantum ad
chirurgum attinet, differuimus, consequens
visum est, vt primùm de carbone seu carbun-

30 culo, qui Græcis *ἀνδράξ* dicitur: deinde gangræna & spha-
celo (quæ vulgò cum Auicennæ interprete esthiomenon
appellant) dicamus. Ille enim ex sanguinea fluxione, vt &
phlegmone, ortum habet, febremque acutissimam infert.

Hæc verò magnas phlegmonas subinde cōcomitari solēt,
vt libello de tumoribus præter naturam, & plerisque aliis
35 locis Galenus annotauit. Itaque carbo ex influente san-
guine, nigro, crassioque, ac feculento, eodémque feruente,
atque impense calido, nascitur. Cui si tenues quædam hu-
miditates admixtæ fuerint, pustulæ quædam amбуstis cō-
similes, per summa cutis excitantur, appellaturq; tunc hæc
inflammatio, carbūculus cū pustula. Quod vitiū fanè fre-

*De carbū-
culo.*

*ἀνδράξ.
γανγραίνα
σφακελός.*

*Gāgræna
& sphae-
lus magnas
cōsequitur
phlegmo-
nas.*

*Carbūculi
generatio.
& descri-
ptio.*

*Carbuncu-
lus duplex.*

*NOTAS
carbūculi.*

1. *Vlcus crustosum.* quentissimè incidit. Interim tamen (licet rarò) & citra pustulam pustulàsve incipit: verùm omnino crustosum vlcus fit. Dixi autem, citra pustulam, pustulàsve, quoniam vna tantaxat aliquando pustula maiuscula cū hoc morbo exoritur, quā rupta, vlcus cū crusta gignitur. Sæpe verò non vna tantum pustula erūpit, sed multę exiles, veluti milij semina, crebræ in particula residentes: quibus præruptis, similiter crustaceū vlcus prouenit, quale ferramenta candentia excitant. Cæterum inter initia priusquàm pustulæ enascantur, scabunt particulam omnino. Crusta autem ipsa modò cinereū colorem, modò nigrorem præ se fert, eoq; loco leuari cutis non potest, sed inferiori carni quasi affixa est. Circumiacēs caro in summam ac feruidam peruenit inflammationem, quam Græci phlogosin appellant, & colore nigrescit, splendetq; bituminis & picis modo, veluti si plusculo rubro minus misceas nigri. Talis autem est color bilis exactæ atræ. Et hæc quidem notæ sunt carbunculi ex ipso affectu desumptæ. Quibus accedit grauis & molestus admodum laborātis particulæ dolor, perinde ac si vinculis esset vehementer constricta. Necessariò quoque qui ita sunt affecti, febricitāt, idq; etiam magis, quàm illi, quibus erysipelatoza est phlegmone. Quod si venenositas aliqua sublit (vt ferè semper assolet) nausea quoque & frequenti vomitu, vnà cū omnimoda appetitus prostratione miserè torquentur laborantes. Sed & cordis tremor, & palpitatio, & frequens animi defectio illis adfunt. Quod vitium tunc huius ætatis chirurgis peculiari nomine anthrax appellatur, à carbunculo quidem malignitate & venenositate (vt volunt) differēs. Cum tamē ἀνθραξ Græcis sit idem, quod carbo, vel carbūculus Latinis. Proindè superuacaneum est, eorum signa & curationē (quod ferè omnes chirurgi faciunt) distinguere, & in diuersis capitibus de iis pertractare. Cæterum carbunculi ipsi ex causis populatim grassantibus, magna ex parte oriuntur, & pestiferam luem consequuntur. Quocircā diligenti animaduersione circa eos opus est, tantum abest, vt negligi debeant.
2. *Pustula vna maiuscula, vel plures exigue.* fit. Dixi autem, citra pustulam, pustulàsve, quoniam vna tantaxat aliquando pustula maiuscula cū hoc morbo exoritur, quā rupta, vlcus cū crusta gignitur. Sæpe verò non vna tantum pustula erūpit, sed multę exiles, veluti milij semina, crebræ in particula residentes: quibus præruptis, similiter crustaceū vlcus prouenit, quale ferramenta candentia excitant. Cæterum inter initia priusquàm pustulæ enascantur, scabunt particulam omnino. Crusta autem ipsa modò cinereū colorem, modò nigrorem præ se fert, eoq; loco leuari cutis non potest, sed inferiori carni quasi affixa est. Circumiacēs caro in summam ac feruidam peruenit inflammationem, quam Græci phlogosin appellant, & colore nigrescit, splendetq; bituminis & picis modo, veluti si plusculo rubro minus misceas nigri. Talis autem est color bilis exactæ atræ. Et hæc quidem notæ sunt carbunculi ex ipso affectu desumptæ. Quibus accedit grauis & molestus admodum laborātis particulæ dolor, perinde ac si vinculis esset vehementer constricta. Necessariò quoque qui ita sunt affecti, febricitāt, idq; etiam magis, quàm illi, quibus erysipelatoza est phlegmone. Quod si venenositas aliqua sublit (vt ferè semper assolet) nausea quoque & frequenti vomitu, vnà cū omnimoda appetitus prostratione miserè torquentur laborantes. Sed & cordis tremor, & palpitatio, & frequens animi defectio illis adfunt. Quod vitium tunc huius ætatis chirurgis peculiari nomine anthrax appellatur, à carbunculo quidem malignitate & venenositate (vt volunt) differēs. Cum tamē ἀνθραξ Græcis sit idem, quod carbo, vel carbūculus Latinis. Proindè superuacaneum est, eorum signa & curationē (quod ferè omnes chirurgi faciunt) distinguere, & in diuersis capitibus de iis pertractare. Cæterum carbunculi ipsi ex causis populatim grassantibus, magna ex parte oriuntur, & pestiferam luem consequuntur. Quocircā diligenti animaduersione circa eos opus est, tantum abest, vt negligi debeant.
3. *Crusta color cinereus aut niger.* ipsa modò cinereū colorem, modò nigrorem præ se fert, eoq; loco leuari cutis non potest, sed inferiori carni quasi affixa est. Circumiacēs caro in summam ac feruidam peruenit inflammationem, quam Græci phlogosin appellant, & colore nigrescit, splendetq; bituminis & picis modo, veluti si plusculo rubro minus misceas nigri. Talis autem est color bilis exactæ atræ. Et hæc quidem notæ sunt carbunculi ex ipso affectu desumptæ. Quibus accedit grauis & molestus admodum laborātis particulæ dolor, perinde ac si vinculis esset vehementer constricta. Necessariò quoque qui ita sunt affecti, febricitāt, idq; etiam magis, quàm illi, quibus erysipelatoza est phlegmone. Quod si venenositas aliqua sublit (vt ferè semper assolet) nausea quoque & frequenti vomitu, vnà cū omnimoda appetitus prostratione miserè torquentur laborantes. Sed & cordis tremor, & palpitatio, & frequens animi defectio illis adfunt. Quod vitium tunc huius ætatis chirurgis peculiari nomine anthrax appellatur, à carbunculo quidem malignitate & venenositate (vt volunt) differēs. Cum tamē ἀνθραξ Græcis sit idem, quod carbo, vel carbūculus Latinis. Proindè superuacaneum est, eorum signa & curationē (quod ferè omnes chirurgi faciunt) distinguere, & in diuersis capitibus de iis pertractare. Cæterum carbunculi ipsi ex causis populatim grassantibus, magna ex parte oriuntur, & pestiferam luem consequuntur. Quocircā diligenti animaduersione circa eos opus est, tantum abest, vt negligi debeant.
4. *Carnis circumposita inflammatio cū nigrore.* inflammationem, quam Græci phlogosin appellant, & colore nigrescit, splendetq; bituminis & picis modo, veluti si plusculo rubro minus misceas nigri. Talis autem est color bilis exactæ atræ. Et hæc quidem notæ sunt carbunculi ex ipso affectu desumptæ. Quibus accedit grauis & molestus admodum laborātis particulæ dolor, perinde ac si vinculis esset vehementer constricta. Necessariò quoque qui ita sunt affecti, febricitāt, idq; etiam magis, quàm illi, quibus erysipelatoza est phlegmone. Quod si venenositas aliqua sublit (vt ferè semper assolet) nausea quoque & frequenti vomitu, vnà cū omnimoda appetitus prostratione miserè torquentur laborantes. Sed & cordis tremor, & palpitatio, & frequens animi defectio illis adfunt. Quod vitium tunc huius ætatis chirurgis peculiari nomine anthrax appellatur, à carbunculo quidem malignitate & venenositate (vt volunt) differēs. Cum tamē ἀνθραξ Græcis sit idem, quod carbo, vel carbūculus Latinis. Proindè superuacaneum est, eorum signa & curationē (quod ferè omnes chirurgi faciunt) distinguere, & in diuersis capitibus de iis pertractare. Cæterum carbunculi ipsi ex causis populatim grassantibus, magna ex parte oriuntur, & pestiferam luem consequuntur. Quocircā diligenti animaduersione circa eos opus est, tantum abest, vt negligi debeant.
5. *Dolor grauis.* Quibus accedit grauis & molestus admodum laborātis particulæ dolor, perinde ac si vinculis esset vehementer constricta. Necessariò quoque qui ita sunt affecti, febricitāt, idq; etiam magis, quàm illi, quibus erysipelatoza est phlegmone. Quod si venenositas aliqua sublit (vt ferè semper assolet) nausea quoque & frequenti vomitu, vnà cū omnimoda appetitus prostratione miserè torquentur laborantes. Sed & cordis tremor, & palpitatio, & frequens animi defectio illis adfunt. Quod vitium tunc huius ætatis chirurgis peculiari nomine anthrax appellatur, à carbunculo quidem malignitate & venenositate (vt volunt) differēs. Cum tamē ἀνθραξ Græcis sit idem, quod carbo, vel carbūculus Latinis. Proindè superuacaneum est, eorum signa & curationē (quod ferè omnes chirurgi faciunt) distinguere, & in diuersis capitibus de iis pertractare. Cæterum carbunculi ipsi ex causis populatim grassantibus, magna ex parte oriuntur, & pestiferam luem consequuntur. Quocircā diligenti animaduersione circa eos opus est, tantum abest, vt negligi debeant.
6. *Febris vehemens.* Necessariò quoque qui ita sunt affecti, febricitāt, idq; etiam magis, quàm illi, quibus erysipelatoza est phlegmone. Quod si venenositas aliqua sublit (vt ferè semper assolet) nausea quoque & frequenti vomitu, vnà cū omnimoda appetitus prostratione miserè torquentur laborantes. Sed & cordis tremor, & palpitatio, & frequens animi defectio illis adfunt. Quod vitium tunc huius ætatis chirurgis peculiari nomine anthrax appellatur, à carbunculo quidem malignitate & venenositate (vt volunt) differēs. Cum tamē ἀνθραξ Græcis sit idem, quod carbo, vel carbūculus Latinis. Proindè superuacaneum est, eorum signa & curationē (quod ferè omnes chirurgi faciunt) distinguere, & in diuersis capitibus de iis pertractare. Cæterum carbunculi ipsi ex causis populatim grassantibus, magna ex parte oriuntur, & pestiferam luem consequuntur. Quocircā diligenti animaduersione circa eos opus est, tantum abest, vt negligi debeant.
7. *Nausea.* Quod si venenositas aliqua sublit (vt ferè semper assolet) nausea quoque & frequenti vomitu, vnà cū omnimoda appetitus prostratione miserè torquentur laborantes. Sed & cordis tremor, & palpitatio, & frequens animi defectio illis adfunt. Quod vitium tunc huius ætatis chirurgis peculiari nomine anthrax appellatur, à carbunculo quidem malignitate & venenositate (vt volunt) differēs. Cum tamē ἀνθραξ Græcis sit idem, quod carbo, vel carbūculus Latinis. Proindè superuacaneum est, eorum signa & curationē (quod ferè omnes chirurgi faciunt) distinguere, & in diuersis capitibus de iis pertractare. Cæterum carbunculi ipsi ex causis populatim grassantibus, magna ex parte oriuntur, & pestiferam luem consequuntur. Quocircā diligenti animaduersione circa eos opus est, tantum abest, vt negligi debeant.
8. *Vomitus.* Quod si venenositas aliqua sublit (vt ferè semper assolet) nausea quoque & frequenti vomitu, vnà cū omnimoda appetitus prostratione miserè torquentur laborantes. Sed & cordis tremor, & palpitatio, & frequens animi defectio illis adfunt. Quod vitium tunc huius ætatis chirurgis peculiari nomine anthrax appellatur, à carbunculo quidem malignitate & venenositate (vt volunt) differēs. Cum tamē ἀνθραξ Græcis sit idem, quod carbo, vel carbūculus Latinis. Proindè superuacaneum est, eorum signa & curationē (quod ferè omnes chirurgi faciunt) distinguere, & in diuersis capitibus de iis pertractare. Cæterum carbunculi ipsi ex causis populatim grassantibus, magna ex parte oriuntur, & pestiferam luem consequuntur. Quocircā diligenti animaduersione circa eos opus est, tantum abest, vt negligi debeant.
9. *Prostratio appetentia.* Quod si venenositas aliqua sublit (vt ferè semper assolet) nausea quoque & frequenti vomitu, vnà cū omnimoda appetitus prostratione miserè torquentur laborantes. Sed & cordis tremor, & palpitatio, & frequens animi defectio illis adfunt. Quod vitium tunc huius ætatis chirurgis peculiari nomine anthrax appellatur, à carbunculo quidem malignitate & venenositate (vt volunt) differēs. Cum tamē ἀνθραξ Græcis sit idem, quod carbo, vel carbūculus Latinis. Proindè superuacaneum est, eorum signa & curationē (quod ferè omnes chirurgi faciunt) distinguere, & in diuersis capitibus de iis pertractare. Cæterum carbunculi ipsi ex causis populatim grassantibus, magna ex parte oriuntur, & pestiferam luem consequuntur. Quocircā diligenti animaduersione circa eos opus est, tantum abest, vt negligi debeant.
10. *Cordis tremor.* Quod si venenositas aliqua sublit (vt ferè semper assolet) nausea quoque & frequenti vomitu, vnà cū omnimoda appetitus prostratione miserè torquentur laborantes. Sed & cordis tremor, & palpitatio, & frequens animi defectio illis adfunt. Quod vitium tunc huius ætatis chirurgis peculiari nomine anthrax appellatur, à carbunculo quidem malignitate & venenositate (vt volunt) differēs. Cum tamē ἀνθραξ Græcis sit idem, quod carbo, vel carbūculus Latinis. Proindè superuacaneum est, eorum signa & curationē (quod ferè omnes chirurgi faciunt) distinguere, & in diuersis capitibus de iis pertractare. Cæterum carbunculi ipsi ex causis populatim grassantibus, magna ex parte oriuntur, & pestiferam luem consequuntur. Quocircā diligenti animaduersione circa eos opus est, tantum abest, vt negligi debeant.
11. *Animi deliquium.* Quod si venenositas aliqua sublit (vt ferè semper assolet) nausea quoque & frequenti vomitu, vnà cū omnimoda appetitus prostratione miserè torquentur laborantes. Sed & cordis tremor, & palpitatio, & frequens animi defectio illis adfunt. Quod vitium tunc huius ætatis chirurgis peculiari nomine anthrax appellatur, à carbunculo quidem malignitate & venenositate (vt volunt) differēs. Cum tamē ἀνθραξ Græcis sit idem, quod carbo, vel carbūculus Latinis. Proindè superuacaneum est, eorum signa & curationē (quod ferè omnes chirurgi faciunt) distinguere, & in diuersis capitibus de iis pertractare. Cæterum carbunculi ipsi ex causis populatim grassantibus, magna ex parte oriuntur, & pestiferam luem consequuntur. Quocircā diligenti animaduersione circa eos opus est, tantum abest, vt negligi debeant.
- Carbūculi lucē pestiferā ferè semper consequuntur.* Quocircā diligenti animaduersione circa eos opus est, tantum abest, vt negligi debeant.
- IVDICIA.
1. *Carbūculus quando maximè lethalis sum-* Porro tamen ἀνθραξ, seu carbunculus omnis, morbus sit acutus, periculosus & cōtagione inficiens, omnium tamen pessimus est Auicennæ, & maximè lethalis, qui in emunct

De Tumoribus præter naturam.

51

emuntoriis, & prope membra principalia enascitur. Timendum enim est ne ad interiora & partem aliquam principem materia hæc venenosa, quæ carbunculum excitauit, subito recurrat. Quod si acciderit, in maximo vitæ discrimine æger est, præsertim si mala aliquot signa se prodiderint. Quin sola illius putida, & plusquam lerneò tincta veneno exhalatio, sufficiens est hominem enecare.

- Si circa stomachum, siue œsophagum, faucésve incidat carbunculus, subito (vt ait Celsus) spiritum sæpe elidit.
- 10 Minus lethalis est carbunculus, Auicennæ, qui primum ruber, deinde citrinus apparet. Qui verò liuescit, aut nigricat, neminem ferè non iugulat, nullus tamen ex sua natura non periculosissimus censetur. Si accidentia quæ morbum hunc comitari solent, plurimum remittantur, spes aliqua nobis promittitur. Si verò magis atque magis semper intendatur, & vehementiora fiant, tunc planè est desperandum.

De curatione carbunculi.

- Carbunculi curationem (supposita conuenienti victu & ratione) statim ab initio (si nihil obstiterit ex iis, quæ venam incidere vetant) auspicandam esse à sectione venæ Gal. præcepit libro meth. med. 14. & secundo ad Glauconem: vultque sanguinis vacuationem, ad animi defectionem vsque fieri. Quippe quæ plurimum commodi hoc vitio laborantibus sit allaturamque perpetuò est obseruandum, vt vena è directo pertundatur. Venæ autem secundæ electio ex laborante particula (vt in curatione phlegmones dictum est) nobis indicatur. Quocirca ea in re consulendus est à chirurgo peritus aliquis medicus, qui vnde, & quatenus sanguis mittendus sit, probè nouerit definire. Secta vt decet vena, si nihil, vt dixi prohibuerit, alienum non fuerit eiusmodi tumorem scarificare, plagis quidem (ob infestantis succi crassitudinem) satis profundis: nempe quæ mediocribus (vt Galeno visum est) sint altiores. Sunt qui præcipiant ipsos scarificatus in crustaceo vlcere duntaxat esse faciendos. Ipsas verò incisiones aqua salsa calente statim perfundunt, ne in illis sanguis coeat, concreascitve, sed foras egrediatur. Interdum etiam erodens aliquod medicamentum imponunt, cuiusmodi est arsenicum, quod in ea re inter cætera primatum obtinet. Quidam verò loco scarificato sanguisugas admovent. Cæterum laboranti par-

ptio à loco affecto indicio.

2. Aliud indicium à loco affecto.

3. Iudiciū à colore.

4. Iudiciū ab accidentibus.

Carbunculi curatio à sanguinis missione statim auspicanda.

Vena è directo secanda.

Scarificationes profundæ.

Perfusio ex aqua salsa calente. Arsenicū. Sanguisuga.

*Fluxione
in carbun-
culo nec a-
uerti posse,
nec debere,
li. 14. The.*

*Cataplas-
mata car-
bunculo ido-
nea.*

*Cataplas-
ma de ar-
noglossa*

*Cataplas-
ma ex ma-
lis Punicis.*

Paulus.

*Medulla
nucis avel-
lane carbū-
culos matu-
rat, & rū-
pit.*

*Auxilia
atrabetia
vini.*

ticulæ (tamen si quod ad inflammationem spectat refrige-
rantia desideret) validè repellentia haudquaquam admo-
ueri debent. Nec enim eiusmodi fluxionem, propter hu-
moris crassitiam, atque etiam malitiam auertere poteris.
Et si quando id feceris, aliud quippiam (vt Galenus ait) 5
quod in alto sit corpore offendes. Atqui nec affatim afflue-
re is humor, ipso Galeno autore, permittendus est. Inqui-
renda igitur remedia sunt, quæ cum modicè reprimendo,
etiam digerere seu dissipare possint. Tale profecto est cata-
plasma, tum quod ex plantagine conficitur, tum quod ex 10
bis cocta lente constat. Sed hic admiscenda nobis erit mi-
ca panis, qui furno sit coctus. Esto autem panis (ex Galeni
consilio) nec omnino à fursure purus, nec numium eius ha-
bens. Huiusmodi autem cataplasma recentioribus appella-
tur emplastrum de arnoglossa, cuius forma apud eos est 15
talis. Recipe arnoglossi, lentium, panis furnacei, singulorū
partes æquales, coquatur in aqua. His gallas addidit Aui-
cennas, qui & ad eandem intencionem probat cataplasma,
quod constat duobus malis granatis, coctis in aceto, aut
aqua acetosæ. Et hæc quidem tum parti ipsi laboranti, tum 20
circumiacentibus imponunt. Huic sententia accedit &
Paulus Aegineta, inquit, vt radicitus carbunculos diuel-
las, dirimasq; ab adiacentium commercio, malum Puni-
cum acidū minutatim concisum in aceto coques: ubi au-
tem intabuerit, in læuorem deteres, linteoq; illitum indu-
ces: cum siccescit, aceto humectabis. Item nucis auella- 25
næ veteris, vel etiam non veteris medulla, carbunculos ma-
turat, rumpitq;. Optimum autē etiam fuerit perpetuo
circumiacentibus ipsis partibus vnguentū ex bolo Arme-
nia, rosaceo, vel myrtaceo oleo, & aceto confectum indu- 30
cere: ne scilicet intrò, qui iam fluxit humor, recurrat. Sunt
qui virus ipsum, & malignum humorem in pestilenti car-
bunculo, succu, cucurbitulis, & medicamentis attrahenti-
bus ad locū carbone obsessum euocant & alliciunt. Quod 35
sanè & faciendum consuluerim, si artus, & minoris notæ
partes, occupet, & pigrè moueatur fluxio. Si verò va-
lidè, atque affatim irruat, modicè reprimentibus (vt modò
ex Galeno adductum est) infrenandus utcumque est flu-
xionis impetus, ne scilicet ingens nimis dolor ex fluxione
tam valenter irruente in laboratē particula excutetur, atq;

- ita malum exasperetur. Super ipsum verò vlcus crustosum, *Quid super vlcus cru-*
vbi præcipuè membrum putreht, valens aliquod medica- *stosum im-*
mentum, & quod vehementer exsiccet, non autem quod *ponendum,*
concoquat, & pus moueat (quando ita putredinem parti-
culæ foueris) imponendum est. Cuiusmodi est Andronis,
5 Musæ, Pasionis, vel Polyidæ: diluicq; id vino aliquo dulci,
vel sapa, ad sordium crassitudinem debeat. Cataplasma
etiam, quod ex orobi farina, & oxymelite constat Gale-
no, rectè apponitur, vbi vlcus malignum & cum putredi-
10 ne fuerit. In communi autem vsu est vnguentum vulgò
Aegyptiacum nominatum. Quòd si hæc parùm proficiat,
ad acriora, & quæ ignis vires habeant, deueniendum erit.
Cuius generis sunt, radix dracunculi, vel aristolochiæ, ex
aceto trita, & imposta, calx, arsenicum, & sandaracha, &
15 alia huiusmodi, quæ non aliter, quàm ignis adurunt. Hæc
proficiunt satis, si protinus à viua corruptam partem re-
soluant. Quo factò, quicquid corruptum est & emor-
tuum, protinus auellere & radicitus extirpare oportet.
Cum autem sub ipsis erodentibus medicamentis sequa-
20 tur crusta, vndique à viua carne diducta, vulnus quidem,
quod ex eis excitatur, vt cætera adusta curandum est. Cæ-
terùm cum extremis morbis (vt inquit Hipp.) exquisitè
extrema remedia optima sint, cogimur aliquando (victis
scilicet malo medicamentis) malignum carbunculum, cau-
25 terio, vt vocant, actuali, hoc est, candente ferro extirpare.
Finis autem adurendi est, dum ex omni parte sensus
doloris est, vt rectè Celsus admonuit. Post hæc crusta vlce-
ribus inducta, auxiliis ad id accommodis, resoluenda est.
Quòd si adustionem laborans pati recusauerit, aliquis ex
30 humili plebe adhibendus est, qui carbonem ipsum mordi-
cùs apprehensum radicitus euellat. Quales olim erant
Psylli in Italia nominati, qui vulnera ex morsu serpentum
illata, innocuè exugebant. Porro auulso sic vel quomo-
docunque absumpto carbunculo, sinus, cessante iam in-
35 flammatione, primùm detergeri, deinde iam purus factus,
implentibus medicamentis (quæ Græci synulotica vo-
cant) curari debet. Vbi verò iam penitus fuerit impletus,
nec ampliùs quicquam illi cauum remanserit, ea quæ cica-
tricem inducunt, similiter reliquis vlceribus adhibere fue-
rit tempestiuum. Horum autem omniù materia ex lib. vj.

Cataplas-
ma ex oro-
bi farina,
& oxyme-
lite.
Vnguentũ
Aegyptia-
cum.
Adurẽtia
medicame-
ta.

Quãdo ad
rustionẽ pro
perandum.

Finis adu-
rendi.

Psylli.
Auulso vel
absumpto
carbunculo,
quid post-
eà agendũ.

*Matura-
tuum Au-
cenna.*

*Mundifi-
catium ex
apio.*

*Cataplas-
ma vulga-
re optimum
quod vsur-
patur in pa-
riorū No-
socomio.*

*Consolida
maior.*

Scabiosa.

& tractatu de vlceribus requirenda est. Cæterum si non admodum seuiat malum, nobisque aliquas dederit inducias, maturatur, & aperitur Auicennæ, admotis ficibus, fermento, & sale adinuicem mixtis. Vbi autem bis vel ter appositum fuerit huiusmodi cataplasma, locus omnino niger & dehiscens apparere solet. Atque tunc mundificatio ex apio locus detergendus erit. Medicamen quoque ex vitellis ouorum & sale confectum, si sæpius admoueatur, maturat & aperit carbunculum, vt scribit Theodoricus. Ad eundem finem in communi vsu est hodie medicamentum quod melle, sale, triticea farina, & ouorum luteis constat. Consolidam maiorem (quod Græci symphyton appellant) inter duos lapides contrita, diuino quodam (vt referunt) miraculo anthracem sanat, & ex toto intra diem vnum interimit, ita vt nulla amplius deinceps curatione egeat, præterquam ea, quæ communis est aliis vulneribus. Miranda etiam narrant alij de scabiosa: nempe quod comesta vel ex vino pota, internos tumores ad exteriora protrudit, & insensibiliter dissoluit, discutitque.

Quæ crustas vlceribus resoluunt.

*Emplastrū
escharæ re-
soluens.*

CRUSTAS huiusmodi carbunculi vlceribus resoluunt, butyrum recens, axungia porci, & alia id genus pingua. Ad id etiam mirè proficit subsequens emplastrum. Nam præterquam quod escharam, id est, crustam, citius multo quam prædicta resoluit, dolorem etiam ab acerbis & adurentibus medicamentis, vel candente ferro excitatum, demulcet, atque malignum ipsum succum, qui carbunculum creabat, potenter discutit. Habet autem farinæ triticæ & hordæacæ singulorum vncias tres. Ex quibus cum decocto maluarum, violarum, & radicum althææ fit solidū emplastrum, addendo butyri, & axungie suille liquefactæ singulorum vncias duas, vitellos quoque duorum ouorum, qui adijci debent quando ab igne remouentur: atque hæc omnia rursus cum radice & folijs prænominatis, diligenter tuis, & subactis, ac per incerniculum cretis, adinuicem miscenda sunt. Victus ratio, epithemata, opiata, & alia id genus, quæ cordi roborando dicata sunt: Item vacuationes, si quæ necessariæ sint, ad diætetice & pharmaceutice omnino pertinent. Quare in iis administrandis peritus aliquis medicus erit consulendus. In communi autem vsu est

Theriace.

vsu est apud omnes theriace, quæ ad sabæ magnitudinem exhiberi solet, ex aqua scabiose, vel si febris adsit admodum acuta & vehemens, ex aqua rosacea vel buglossi: debetque à laborante assumi sex horis à pastu. Cæterum quoniam superius facta est mentio de trochiscis Andronis, Polyidæ, Pasionis, & Musæ, quos tantoperè celebrat Galenus, non alienum fuerit, eorum descriptionem hic subiicere.

Androni trochiscus hæc recipit.

Cytinorum, id est, florum seu capitulorum mali Gratioli, drachmas decem, aluminis scissilis drachmas quatuor, chalcanthi drach. duodecim, myrrhæ drachmas quatuor, thuris, aristolochiæ, gallæ, singulorum drach. octo, salis ammoniaci drach. quatuor.

Polyidæ sphragis pastillus hæc continet.

Malicorij * pondo sex, myrrhæ pondo octo, aluminis scissilis * pondo quinque, thuris * pondo quatuor, chalcanthi * pondo trium, fellis taurini * pondo sex: vino dulci excipiuntur.

*Quod sic
*stellatim
decussatur,
nota est de-
narij, quæ
pro drach.
hic ponitur.*

Polyidæ pastillus alius.

Aluminis scissi pondo denarium trium, thuris pondo denarium quatuor, myrrhæ tantundem, chalcanthi pondo denarium duum, cytinorum pondo denarium duodecim, fellis taurini pondo denarium sex, aloës pondo denarium octo: vino austero excipiuntur.

Musæ trochiscus hæc habet.

Aluminis scissi, aloës, myrrhæ, chalcanthi, singulorum pondo * sex, croci, crocomagmatis singulorum pondo * 3. cytini pondo * 4. mulso ex falerno facto allumuntur.

De Gangræna & sphacelo.

Gangrænas nominat Gale. lib. 2. ad Glauco. eas quæ ex magnitudine inflammationis fiunt mortificationes, nondum tamen integrè factæ sunt, & iam confirmatæ. Eius mali tanta vis est ac tyrannis, ut nisi celerrimè succurras, facillè affecta pars mortis habitum representet, hoc est, promptissimè vitæ sensus & motus extinctionem contrahat. Vi verò membrum sic vitiatum, & languens, in totum sensu fuerit destitutum, ac omnino emortuum, ita ut percussum, vel sectum vel adustum, non sentiat quæ patitur, affectum hunc non iam amplius gangrænâ, sed sphacelon Græci nominant, Latini verò syderatione, recentiores esthiome-

*Gangræna
quid, & unde
de ortu habeat.*

*Gangræna
pessimus ty-
rannus.*

Sphacelus.

non appellant: quod nomen etiam ad gangrænam extendunt. Auicenna autē esthiomenon vocauit, quādo ad partes continuas trāsit corruptio, quo nomine in re alia vtuntur Græci. Quidā affectū hunc modō herpeta esthiomenon, modō cancrū vlceratū improprie tamen, nominant. 5
 Ofsium se-
 deratio. Accidit autē hic affectus etiam ofsibus, cū caro ipsis circūdata ac circūfusa tetros gignens ichoras, id est, deprauatam saniē generans hoc tetra viru ea imbuerit, ac fœtidissima putrilagine consumpserit, Cū itaq; membrū ita ex toto, vita, sensu, motūq; priuatū apparuerit, cōfestim ad 10
 Syderatiū
 membrum
 cōfestim re
 secandum. differt sphacelus à gangræna, quod ille ofsibus etiā (vt dictum est) innascatur, nedū carni & vasis, hæc verò ofsibus non adueniat: vna tamen species sphaceli est, sed proprium nomen & singulare præter cōmune sortita. Huiusmodi ab 15
 Ignis sancti
 Antonij. vulgus Gallicum appellat ignē Sancti Antonij, aliā Sancti Martialis. Accidit autē trifariam eiusmodi mēbrorū mortificatio, seu vitæ in mēbris extinctio, ac destructio. Vno modo, quando membrū non amplius potest re- 20
 Mortifica-
 tionis cause
 3. cipere vitam sibi à corde per arterias transmissam: propter dissolutionem mixtionis atque harmoniæ ipsius laborantis mēbri. Dissoluitur autē ac deperit mixtio atq; harmonia partis, vel ob nimiam frigiditatē, vt aliquando contingit per hyemē validam atq; asperā: vel ab immoderata, & 25
 Quæ mēbri
 mixtionem
 dissoluunt. inconsultē ac temerē molita inflammationū refrigeratione, aut ab excedēti ac suprā modū vehementi caliditate, & venenositate inflāationum ac malignarum (vt vocant)
 2 pustularum. Altero modo gangrænā & sphacelū fieri contingit, quādo vita in membro recepta præfocatur, atque 30
 3 extinguitur, vt nonnūquam euenit in magnis inflammationibus, quæ ita interdū venas, arterias, & poros cutis obturant, constipantq;, vt spiritus ibidē, prohibita in totum effluuij vaporosi trāspiratione, & aëris externi attractio-
 ne, strāguletur, suffocetūq;. Tertio modo, hæc mortificationes & vitæ extinctiones fiunt in mēbris, quando prohi- 35
 betur transitus atque influxus vitalis spiritus à corde ad membrū aliquod, idq; vel propter vehementē ligaturā, vel contusionē aliquā in viis, ac meatibus ipsis, per quos defer-
 tur spiritus, factā. In summa, gangræna & syderatio, quā
 Græci

Græci necrosin, & sphacelum vocant, nostris corporibus
 accidunt vel denegata parti, vitali facultate, vel natiuo cor-
 poris calore, ac temperiæ pereunte. Cæterum signa gāgræ-
 næ & syderationis, Galeno in opusculo de tumoribus præ-
 5 ter naturam sunt hæc: Primū quidem illud coloris floridū,
 quod phlegmonis, id est, inflammationibus adfuerat, in ip-
 sis extinguitur. Deinde dolor & pulsus seu pulsatio, hoc
 est, arteriarū motus ipsis ægro sensibilis, recedūt, non fini-
 ta adhuc dispositione, verū sensu iam emortuo. Vnde
 10 membrū mox nigrū conspicitur, molle quoq; & putridū
 fætorēq; expirans, cadauerosum efficitur. Quo fit, vt cum
 premitur digitis, facile cedat in profundum, nec postea re-
 uertitur aut resilit, imò apparet cutis à carne seiūcta. Hæc
 15 autem partis affectæ mortificatio, quā Græci gangrænā
 appellant, tantæ est (inquit Paulus) ferocitatis, vt nisi quis
 rupta omni mora præsentissimas tulerit suppetias, laborās
 particula facile emoriatur, & vicinas sedes inuadat, ac ho-
 minem ipsum iugulet. At si (vt refert Celsus) nondū planè
 20 tenet, sed adhuc incipit, eam curare non difficillimum est,
 vtique in corpore iuuenili, & magis etiam si muscoli inte-
 gri sunt, si nervi vel lesi non sunt, vel leuiter affecti sunt.
 Vbi verò penitus insedit hoc malum, & iam in sphacelū a-
 biit, insanabile est, plurimique sub frigido sudore mo-
 riuntur.

25 *De curatione Gangrænæ ex magnis inflammationibus
 genitæ, & sphaceli ex gāgræna creati
 extirpatione.*

Cum sanguinis copia gangrēnā generet, eius curandi
 30 ratio statim auspicanda est à copiosa corrupti sangui-
 nis, qui in mēbro laborante compingitur, vacuatione. Sed
 interim negligi non debent, quæ ad diæteticam, pharma-
 ceuticam, venæ sectionem (si necessaria fuerit) & cordis
 tutelam pertinere videbuntur, pro quibus consulendis e-
 rit chirurgus peritus aliquis medicus, qui omnia probè, &
 35 vt res exigit, norit instituere. Fit autem larga illa sangui-
 nis ita impacti (cuius occasione fiunt mortificationes) ex
 parte affecta emissio, vel vena incisa, si quæ amplior, ac
 turgens circa eandem partem conspicitur, vel cute vni-
 uersa partis affectæ, vnā cum subiecta substantia, excisa,
 vel pluribus & altis scarificationibus diuisa. Alij ad eun-

S I G N A
 gangrænæ
 & sphaceli.

I

2

3

4

IUDICIA.
 Lib. 4.

Lib. 5.

Corrupti
 sanguinis
 vacuatio.

dem finem sanguiſugas admovent, & venas minores proximās aperiunt. Verū profundæ illæ ac frequentes ſectiōnes aut ſcarificationes, multo ſunt ad eius malī curationem efficaciōres. Cæterū pro affectus magnitudine, vel maximæ ſectiōnes fiunt, vel inciſuræ (quas ſcarificationes appellamus) utræque frequentes illæ, vbi putredini viciniuſ malum eſt, hæ, vbi tantū putreſcere incipit. Quò enim vitium maiuſ eſt, eò maiore remedio, vt

Post ſcarifi- cuique conſtat, indiget. Vbi autem abunde ſanguinem ex
cationē lo- altis illis plagis emanare permiferit, locus aqua ſalſa ab- 10
cus aqua luendus erit, vt ſanguis craſſior, & qui alioqui ibidē con-
ſalſa ablue- creſceret, forās egrediatur. Deinde medicamentum ali-
duſ. quod putridiſ conſecratum, id eſt, quod putrefactionem
Medicamē- prohibeat, ac reſoluat, induci debet, quale eſt farina oro-
ta putridū bi, aut lolij (quod Franci iuriam, quod vini modo temu- 15
conſecrata. lentiam concitet, appellant) aut ſi harum facultas non ſit,

fabacea ex oxymelite, vel ſyrupo acetoſo. Vtile etiam fue-
rit, locum ſcarificatum bis in die aceto calente, ſed multo
præſertim lauare. Hæc enim ſua ſiccitate ſaniem & putri-
laginem abſumunt, eamque detergunt: frigiditate verò, 20
quod nondum vitiatum ac corruptum eſt, à putredine vin-
dicant. Vbi autem iam ipſe veluti feruor ſubſederit, ac ma-
li furia ſeſe remiſerit, vnguentum id, quod vulgò Aegy-
ptiacū appellatur, ex flore æris, alumine, melle & aceto, ad
æquas portiones mixtis & coctis compoſitum, ſuperimpon- 25
endum erit. Hoc enim putrefactionem prohibet, ac re-
ſoluit: putrefactum quoque ac corruptum ab integro &
ſano adhuc dirimit, & decidere cogit. Denique cruſtam
inducendo, quod ſanum eſt, conſeruat, ac tuetur. Quò ſi
valentiuſ atque efficaciuſ medicamen velis apponere, ſa- 30
lem prædictiſ adice: aut ſi malum magis adhuc increue-
rit, aliquem ex trochiſcis paulo antè memoratiſ exquisi-
tiſſimè tritum, aceto & vino dilutum: vt pote vel Andro-
niſ, vel Polyidæ, vel Muſæ, vel Paſionis: vel vnum ex iſ qui
recentioriſ dicuntur, calidicō, aldaron, & ex aſphodelo, 35
qui ob ſuam vim cauſticam corruptum à ſano dirimunt.
Probatur in ea re antè omnia arſenicon quod vocant ſub-
limatum, purum aut correctū, idq; vel in puluere, vel ex
vino diſſolutū, & linameto, aut xylo, quod Galli cotonem
appellant, exceptū, inter ſanū & corruptū applicatum. Hoc

cnim

Vnguenti
Aegyptia-
ci vi.

Trochiſci
cauſtici.

Arſenici
ſublimatū.

enim confestim malum sistit, & id quidem sine dolore. Quod si necessitas exigat, spathula vel specillo separandum est sanum à corrupto. In eiusmodi autem medicamentis adhibendis: ut res securius tractetur, attentos sedulo nos esse oportet circa naturam corporis ægroti, sicuti rectè nos
 5 Gale. admonuit inquiring, Si corpus rusticum fuerit, & durum natura, vehementiora desyderat medicamēta: scēmi-
 10 neum vero, & mollem carnem habens, imbecilliora. Infantes quoque vel pueri, & quicunque inter viros & balneas amant, & in otio degunt, mollia exigūt medicamina. Consideranda insuper est partium, quæ malè affectæ sunt, ne-
 dum corporis totius natura: quando abscindis, aut circuncidis id quod iam computruit. Quædam enim sunt, quæ
 15 citissimè ad putredinem veniunt, si negligenter curentur: aliæ verò tardiusculè: quædam item medicaminum vires ac beneficia tardius sentiunt, aliæ citius.

*Lib. 2. ad
Glauc.*

Porrò si nihilo magis malum his causticis medicamētis constiterit, vri id quod est inter integrum, ac vitiatum locum debet. Solent verò hæc auxilia omnia, nihil interdum
 20 proficere, atque tunc vnicum, tametsi (ut Celsus ait) miserum auxilium est, membrū quod paulatim emoritur, abscindere, ut cætera pars corporis tuta sit. Nam quod cōputruit, veneni in modum suo contactu, quod adhuc sanum & integrum est, inficit, & corrumpit. Si quando autem putrefactam huiusmodi atque emortuam partem abscideris,
 25 vel quod in mēbro quopiam computruit vsque ad sanum corpus concideris, eam quæ veluti quædam radix est, sanæ atque integræ parti adiunctam, ob maiorem securitatem, ex Galeni consilio candenti ferro adurere conuenit. Ita
 30 enim celeriter sanguinis profluuium compesces, & putredinem arcebis. Facta verò adustione, porri succo, vel (ut Paulus ait) sale cum porro utendum est, vel aliquo ex iis, quæ paulo ante diximus. Hæc enim siccant, & stringunt putredinem, atque humorum affluxum prohibent. Vbi verò tibi videbitur his remediis adhibitis cessare putredo, ut crustæ citius decident, cataplasmate utendum est ex pane vel
 35 hordeacea farina, vel triticea ex hydrelæo incocta. Itē medicamento, quod cephalicum vocat, ex melle illitum. Hæc enim detergēdo, crustā à subiecta carne resoluunt. Quin etiam medicamentū, quod tetrapharmacum dicitur, prætereā

Vfio quādo adhibenda.

Si gangrena in fistula abest.

*Lib. 2. ad
Glauc.*

Lib. 4.

Crustas à partibus exustis soluentia.

tereà & Macædonicum, pus mouendo ac emolliendo, crustas à subiectis corporibus diducunt. Quemadmodum & reliqua omnia, quæ ad suppurationē perducunt. Hæc enim præterquàm quòd emolliunt, pus sub crusta conficiunt, quod eam resoluunt, scilicet inter carnem subiectam & crustam ipsam interiacens. Panis quoque cum apio tritus, aut ocymo, optimè crustas à sanis partibus citra erosionē detergendo, detrahit. Sic & iris, vel radix panacis, vel aristolochiæ, vel acori cum melle. Solent autem vulgò ad crustas resoluendas vti butyro, aut alio quouis vinctuoso. Vbi verò crusta exciderit, locum aceto abluunt, postea sequens emplastrum admovent, quod ad Gulielmum à Saliceto refertur. Recipit autè mellis selibram, vitellos ouorum crudos tres, aut quatuor numero, farine hordei selibram: hæc miscetur in formam emplastri. Post biduum verò vel triduum, vt melior fiat mundificatio, huic emplastro addi possunt drachmæ decem myrrhæ electæ. In teneris autem corporibus ad crustæ separationē, & sordium deterfionē, abundè sufficit Galeno orobi farina cum melle, vel thure. His ritè peractis huiusmodi vlcera ad sanitatē perducenda sunt 2 medicamentis, quæ carnem producāt, & cicatricem inducant: synulotica, & epulotica Græci vocant.

Capita curationis gangrænae & sphaceli.

- 1 **V**itium sanguinem in affecta parte impactum assatum vacuato.
- 2 Post scarificatus aut sectiones, locum affectum aqua salis abluito. Deinde medicamentum putridis consecratum inducito.
- 3 Vbi mali furia se remisierit, vnguentum Aegyptiacum superimponito.
- 4 Si malum iis remediis non cesserit, id quod inter vitium & integrum est, ferro candente adurito.
- 5 Quod si hæc omnia nihil profecerint, & iam gangræna in sphacelū degenerauerit, membrū quod sic planè mortuum fuerit, vsque ad partē sanam, ita vt nihil prorsus putridi relinquatur, ocysimè abscindito.
- 6 Vbi quod computruit refecueris, quo securius mali radicem euellas, ferramenta igne flagrantia adigito.
- 7 Post exustionem porri succum, atque alia id genus, quæ siccant, stringunt, & fluxionem arcent, admoвето.

Crustam

Butyrum.

*Emplastrū
Gulielmi à
Saliceto.*

*Libro 2. ad
Glan.*

De Tumoribus præter naturam.

61

Crustam vel medicamentis adurentibus, vel ignito ferro inductam, à subiectis corporibus resolvere (solet enim inde sanguinis profluuium sequi) ne properato.

Cùm putredo cessauerit, nec amplius sanguinis profluuium reformidaueris, ea quæ crustam detrahunt, applicato. Vbi crustæ exciderint, curatione reliquis vlceribus communem adhibeto.

Qui sequuntur aphorismi, ad medicum pertinent.

10 **V**ictum tenuem, & refrigerantem, gangræna & sphacelo laborantibus instituito.

Iluxionem sanguinis missione, si nihil obstitit avertito: atque eadem plenitudinem (si ad fuerit) vacuato.

Medicamento quod catholicò appellatur, vel nigra cassiæ fistularis medulla, ad hæc tamarindorum, lupuli, ac fumaris decocto, sanguinem depurato.

Theriacam, atque id genus alia, quæ cor vitæ fontem ac principium, à putridis, & graueolentibus illis, à parte viatiata subleuatis effluuiis, tuetur, laboranti sumeda exhibeto.

20 *De erysipellate, & aliis tumoribus à bile creatis.*

C A P. VIII.

25 **E** Amersi pituita, in generatione humorû, sanguinem consequatur, maiorque eius humoris portio sit in corpore secundû sanguinem, quam aliorum humorum, quia tamen tumores præter naturam à bile procreati (quæ apostemata cholerica cõmuniter vocant) in valde multis conspiciuntur cum sanguineis: consequens est, post determinationem phlegmones, & aliorum qui à sanguine fiunt, tumorum præter naturam consistentium, de iis nunc dicamus, qui à bile excitantur, & nomine quidem communi erysipellate vocantur Græcis, Latinis verò antiquioribus ignes sacri. Est igitur erysipelas biliosæ fluxionis germen, circa cutim vtramque maximè consistens, & eam scilicet, quæ foris est, omnium partium commune tegumētum, & membranosam illam ac tenuem, quæ singulis internarû est circumdata. Nonnunquàm verò & aliquid quoque subiectæ sibi carnis occupat, sicuti & phlegmone (quæ fluxionis sanguinæ soboles est, in carnosâ corpora maximè incidens) etiam cutis aliquid apprehendit. Itaque cùm flaua bilis verè tenuis,

Pituita in humorû generatione sanguini proxima.

Erysipelas quid.

Erysipelas exquisitum.

tenuis, vel sanguis feruens & cōsistentia tenuis (qui recentioribus cholera dicitur naturalis, Galeno verò *χολή φυσική*) per solam cutem diffusus fuerit, nihil inferiorem carnem molestant, particulam tamen in tumorem aliquantum attollens, cū inflāmatione & rubore in flauū clanguescente, ac protinus ad tactum euanescente, affectus hic priuatim ac propriè Galeno verum atque exquisitū erysipelas nuncupatur. Hoc autem vnus rationis est, seu (vt dicunt) vniforme, & absque vlceratione incidit. Auicennas spinam vocauit. Cū verò amaræ bilis succus crassior acriorq; , quàm pro naturæ modo redditus fuerit, summā cuticulā (quam epidermida Græci vocant) exulcerat, excoriatve, atque aliquando cutis exulceratio spatio temporis ad profundum peruenit, ita vt inferiorem seu subiectam carnem attingat. Nuncupaturque tunc eiusmodi affectus etiam erysipelas: sed cum vlceratione, quod (Galeno autore) eiusdem generis est cum herpete. Verū enim uero, si nec planè biliosa, nec sanguinea fluxio sit, sed ex ambabus mixta, non iam tantū erysipelas, sed dispositio permixta erysipelate atque inflāmatione nominatur Galeno. Ab eo autem quod in mistura exuperat, nomen vitio indetur. Etenim vbi sanguis præcellit, phlegmone erysipelatosa dicitur. Vbi verò flaua bilis præpollet, erysipelas phlegmonosum appellabitur. Verū vbi neutrum vincit, & æqualia vtriusque apparuerint accidentia, tunc vitium id phlegmones erysipelatosque mediū vocabitur. Iam verò & aliarum mixtionum similis vtique erit interpretatio: nempe si multa bilis paucō humori pituitoso aut atrabilario remisceatur erysipelas ædematosum, vel scirrhosum dicitur.

Bilis.

Porro cum simpliciter bilem dicimus, vel biliosum humorem, more Galeni & aliorum Medicorū, nos pallidam bilem seu flauam, & amaram, nō autem acidā & nigram, inaudimus. Hæc autem naturalis cholera, & certa aliis nominatur, ex sanguine quidem tenui & feruente generationem obtinens. Atram verò bilem nunquam absolute bilem nominamus, sed semper cum adiectione humoris, appellationis colorem adiungente. Est igitur bilis, quæ *χολή* Græcis dicitur, vulgò autem cholera, humor calidus & siccus, ex tenuiori & calidiori parte chyli: vel ex sanguine tenui & feruente, vt modò diximus, procreatus. Hæc autem duplex

Spina.

Erysipelas cum vlceratione.

Erysipelas nō legitimū & eius species.

Phlegmone erysipelatodes.

Erysi. phlegmonodes.

Medium vitium.

Bilis flaua duplex.

- duplex est iuxta neotericorum diuisionem, naturalis scilicet, & non naturalis. Naturalis, est humor calidus & sic-
 5 uis, aut ruber, declinans ad quandam citrinitatem seu flavitatem, sapore verò exactè amarus, non autem acutus siue acris: ut quidam malè affirmarunt. Non naturalis verò, bilis dicitur, quæ à prædicto humore verè bilioso degenerat, intra terminos tamen suæ latitudinis continetur, quos si egrediatur, non iam bilis, sed alius humor reputabitur.
- 10 Hoc autem (bilem inquam egredi limites suæ latitudinis) contingit bifariam: vno modo (ut sic dicatur) per se, & in se: altero modo, per admixtionem. Per se, & in se adhuc dupliciter: Vno modo, quando bilis illa naturalis putrescit, & aduritur, & talis dicitur adusta per putrefactionem. Altero modo, quando bilis non naturalis vitellina dicta, igneo calore percoquitur in hepate, aut in ventriculo, aut in venis, & efficitur porracea, quam etiam prasinam vocant, vel æruginosa, quæ extremè quidem malæ sunt. Per admixtionem verò bilis efficitur non naturalis, seu præter naturam, cum alius humor illi extrinsecus accedit. Et hoc quidem fit multifariam. Nempe si phlegma tenue & aquosum illi admisceatur citrina seu crocea efficitur, si crassum & viscosum, vitellina: si verò melancholia adusta illi permiscetur, efficitur bilis adusta per admixtionem. Et sic iuxta Auicennæ placitum, sex sunt species bilis non naturalis. Apud Halyab. verò quatuor duntaxat. Nullam enim prorsus mentionem fecit de duabus speciebus adustis. Galeno autem lib. 2. de virtutibus naturalibus, nulla bilis præter naturam esse dicitur, præter vitellinam, quæ ouorū vitellis, tum colore, tum crassitudine est adsimilis. Siquidem porraceā & æruginosam ex prauis ac corruptis humoribus, propter quorundā esculentorū aut olerū cruditatē, qualia sunt, beta, cepa, brassica sæpenumero in ventriculo ait generari. Atque etiā interdū talibus nequaquā ingestis, ratione egritudinis, aut malæ alicuius dispositionis, in venis ipsis generatur. Ex iis itaque colligitur, quatuor species seu differentias inflammationū (quæ vulgus cholerica apostemata vocat) ex bile ipsa generari. Necpe ex bile vera, syncera, & laudabili (quam tenuem feruentemque sanguinem appellamus) procreatur ea species inflam-

1
Naturalis.

2
Non naturalis.

Bilis duobus modis desinit à sua natura
Vitellina
ex meracitate.

Bilis porracea.

Æruginosa.

Crocea bilis.

Vitellina, ex admixtione pituita.

Auicenn.

Haly.

Porracea bilis quò dignatur.

Quatuor inflammationū differentia, ex flava bile oriuntur.

Verū erysipelas. inflammationis, quæ Galeno verum atque exquisitum erysipelas appellatur, lib. 2. ad Glau. quod tanquam cutis solius passio est. Græcè autē *ἀνρίπις ἢ ἰσχυρίπις* nominatur. *Tria erysipelata illigima.* Ex bile verò non naturali, & aliis humoribus permixta, tres alię nascuntur differentię, utpote erysipelas phlegmonodes, erysipelas œdematodes, & erysipelas scirrholdes. Ex bile autem quæ præter naturam ex adustione facta est, pro ratione tenuitatis aut crassitie substantię ipsius, generantur vel herpes esthiomeni, id est, exedentes (qui eiusdem generis sunt cum erysipelatis, quæ cum exulceratione incidunt vel phagedænæ, quæ cum cute pariter subiectam carnem altius erodunt & exulcerati canceri, aliæque eiusmodi erodentia, & cacoethæ, id est, maligna ulcera, quæ pustule corrosivę recetioribus chirurgis dicuntur. Itaque tenuissimus quidē in eiusmodi humoribus, est is, qui exulceratum herpetem excitat: crassissimus, qui cancerum. Proximum deinceps locum occupat, quod ad crassitudinem attinet, qui phagedænas creat, ut libro 14. methodi medendi Galenus annotavit. Causæ veri erysipelatis uti & phlegmones verę, sunt tres. Prægressæ, quæ & primitivæ dicuntur, antecedentes, & coniunctæ. Cæterum raro fit erysipelas à causa prægressæ, frictions tamen violentæ, insolatio & admotio medicaminum attrahentium ipsum nonnunquam excitant.

De signis & indicijs veri erysipelatis.

N O T A E
erysipelatis. **S**igna & indicia veri atque exquisiti erysipelatis sumuntur ex collatione ipsius ad phlegmonem iuxta Galeni doctrinam, 14. Therap. & 2. ad Glauconem: ex quo aperte colligitur verum ac legitimum erysipelas veluti quandam speciem esse phlegmones, id est, inflammationis generaliter acceptæ. Notæ igitur erysipelatis sunt, color aspectu rubridus, in flauum elāguescens, qui (rubor inquam flavescentis) ad tactum, hoc est, digitorum appressu facile subterfugit, rursusque illabitur.

Tumor parvus. Tumor exiguus, in cute potius consistens, quàm altè descendens.

Calor vehemens. Calor vehemens febrem excitans maiorem, cā, quæ ex phlegmone accenditur. Siquidem calidius multò est erysipelas, quàm phlegmone. Pulsatio (quæ magnæ phlegmones proprium est symptoma) non admodum fortis.

Pulsatio exigua. Dolor

Dolor mordicās & pungens nullā (vt in phlegmone con- 5 Dolor pā
tingit) inueniens tensionem, & si quæ sunt alia bilis domi- 6 florius.

nium significantia. Quod autem ad iudicia pertinet, ery- IUDICIA.
sipelas, vt plurimum faciemprehendit, incipitque maximè 1
in ea nasci parte, quæ vulgò lepus appellatur. Deinde
mox in faciem totam expanditur, gemina quidem occa-
sione: nempe ob faciei raritatem, & ipsius bilis leuitatem.

In ossis autem exutione seu denudatione, erysipelas su- 2
perueniens, malo est, vt scribit Hippocrates Aphorif. 19.
libro septimo, hoc est, symptoma prauum est, si osse nuda- 3
to caro circumstans ab erysipelate occupari videatur. Hoc In cō. præ-
autem, Galenō teste, rarissimè accidit. Rursus sequenti dict. Aph.
aphorismo scribitur ab eodem Hippocræ, quod ab erysipe- 4
late putredo, aut suppuratio, malum. Hæc enim (inquit 5
15 Galenus) nunquàm erysipelatis superueniunt, nisi valde 6
malignis. Verum ac legitimum erysipelas quatuor habet 7
tempora, vti & alij præter naturam tumores. Horum au-
tem signa ex præcedentibus sunt requirendā. Exquisitum 8
erysipelas raro terminatur suppuratione, sed magna ex
20 parte insensibili transpiratione seu resolutione. In ery-
sipelate quædam interdum contingunt symptomata, quæ
nonnunquàm magnitudine ipsius morbi causam exupe-
rant, atque ideò curandi rationem interpellant, hoc est, 9

curationis ordinem euariant, peruertuntque, vt etiam su-
perius de phlegmone dictum est. Ad hæc erysipelas mo-
tum sequitur tertianæ febris, nam ad eius materiam quan-
dam habet analogiam. Vtriusque enim materia, humor est
biliosus. Cæterum erysipelas ab exterioribus verti ad in-
teriora non est bonum; ab interioribus autem ad exteriora,
30 bonum, vt ab Hippocr. scriptum est Aph. 25, lib. 6. Ery-
sipelata verò, quæ capiti oboriuntur, plus facessunt nego-
tij, adeoque (vt Paulus ait) periculosa esse solent, vt nisi ef-
ficax consequantur auxilium, interdum affectos strangu-
lent. Scribit etiā Hipp. lethale esse, si erysipelas sit in vtero
35 mulieris prægnantis. Facto enim sic in vtero erysipelate, foe-
tus ex necessitate moritur. Siquidē acuta febris (vt Gal. ait
in cōmentario) sæpe eum citra inflammationē interimit.

Erysipelatis curatio.

Cum erysipelas, sicuti & phlegmone, de qua paulò antè
cegitimus, affectus calidus sit, & ex humorū defluxione 40
duo.

*In cō. præ-
dict. Aph.*

3

4

5

6

7

Erysipelas

motum se-

quitur ter-

tiana fe-

bris.

8

Erysipela-

ta circa ca-

put curatio

difficilli-

ma.

9

10

Erysipelas

in vtero

prægnantis

factu ene-

cat.

Curationis

erysipela-

tis, scopi v-

niuersales

fiat, geminus etiā erit totius curationis ipsius scopus, nempe refrigeratio & vacuatio. At veluti vacuationis indicatio in phlegmone, refrigerationis indicationē vincebat, ita refrigerationis indicatio in erysipelate, magis vrget quā vacuationis. Illa enim quātitate, hoc verò qualitatē magis premit & discrutiat. Itaque erysipelas magis refrigerari, & minus vacuari: Inflammatio contrā magis vacuari, & minus refrigerari debet. Quanquam vtriusq; affectus curandi (vt inquit Galenus) commune caput sit, infestantis scilicet humoris vacuatio. Ideoq; postquā refrigeratum erysipelas fuerit, ad ea quæ digerūt seu discutiūt medicamenta conuertimur. Porro vt geminum hunc scopum vniuersalem refrigerationem inquam & humoris infestantis vacuationem, assequamur, quatuor aliis scopis particularibus iuxta posterioris ætatis chirurgorum placita, est opus.

Particulares curandi erysipelatis scopi 4.

- 1 Primus scopus, consistit in recta vitæ institutione atque obseruatione.
- 2 Secundus, humoris ad partem affectā confluentis, quem antecedentem materiam appellant, auersionem cōcernit.
- 3 Tertius in humoris, qui iam in partem ægram influxit (quem materiam cōiunctam dicunt) vacuatione consistit.
- 4 Quartus verò & postremus circa symptomatum correctionem, ac propulsionem versatur.

Primus scopus.

Primum scopum facile assequemur, si rerum omnium, quas non naturales vocant, administratio, ad humiditatem & frigiditatem (vt in febre tertiana) spectauerit. Quandoquidem erysipelas ex flaua bile ortum habet, quæ temperaturæ est calidæ & sicæ.

Aëris delectus.

Ergo aërem quoad fieri potest, frigidiorē & humidiorē deligito, præparatoque.

Ambientis præparatio.

Æstate igitur subterraneas domos frigidissimas, maxime perflatas, & ad Arcton versas, tibi deligito. Si loci huiusmodi occasio non datur, & calidior aër extiterit, ipsum sic præparato.

Aquam frigidam ex vasis in vasa subinde transfundito.

Pauimenta domus assidue aqua, quæ prorsus gelida sit, aspergito.

Rosas, & violas plurimas, vitium folia, & capreolos, salicis quoque ramulos, & reliquos flores ac germina, quæ frigidæ humidæque facultatis sunt, humi spargito, ac in aërem

aërem proiicito.

Turbā hominū conclaue laborantis ingredi prohibeto.

Pinguia, dulcia, acria, calidāque omnia vitato.

5 Lactuca, cucurbita, portulaca, oxalide, (quam acetosam vocant) hordeato, oriza, & aliis id genus, quæ sanguinem incrassant, & refrigerant, lubens vescitor.

A vino in totum abstineto.

Cremor ptissanz, aut aqua hordei tibi potus esto,

Victus temperantiam seruato.

10 Aluus tibi semper mollis esto.

Ab omni motu, præsertim vehementi atque immoderato abstineto.

Iram, contentionē, atq; omnem animi vehementiorem motū, aut perturbationem, tanquā aduersissima fugito.

15 Nitida, ac munda circa te omnia sunt.

Venerem ne exerceto,

Atque hæc de primo scopo dicta sufficiant,

20 Secundum autem scopum curationis erysipelatis cōsequemur, si succū in corpore delinquentem cōmoda vacuatione ademerimus. Ergo in vero ac legitimo erysipelate nō necessariò, vt in phlegmone, sanguinem ex vena detrahemus; sed medicamento quod flauā bilem exigat (cholagogen Græci vocant) ventrē per inferiora expurgabimus, si saltē affectus magnus sit, & corpus bile abundare videatur.

25 Itaque cū erysipelas febres accendat, & eas vehementiores quā phlegmone, medicamenta, quæ impensè calida sunt, & scammonij succū, quod recentior Græcia dacrydion vocat, recipiunt (cuiusmodi est, quod vulgò in officinis electuariū de succo rosarum appellatur) huic affectui minimè

30 idonea sunt. Ergo vel rhabarbarum offerendum est, vel porio, quæ Rasi aqua tamarindorū dicitur. Recipit autem pruna Damascena 24. tamarindorum recentiorū drachmas decem, sacchari violati quar. semissem. Cui vt efficacior reddatur, aliquid diluti rhabarbari adiici potest. Quod si exi-

35 gua sit affectio, ne hæc quidē cholagoga medicamenta necessaria erūt, sed abundè fuerit, tūc acri clystere vti, vt Gal. visum est. At in erysipelate phlegmonoso non abs re feceris (modò nihil obstiterit) si curationē à sanguinis missione auspicatus fueris. Tale autē sæpius faciē apprehēdit, vnde & Paulus protinūs ab initio venā in cubito præsertim hume-

Cibus.

Potus.

Repletio.

Inanitio.

Motus.

Animi affectus.

Venus.

*2
Secundus
scopus.*

*2, ad Glan.
In erysipelate phlegmonoso cōpetit phlebotomia.*

ralem in eo incidi iubet. Sin autē hęc non appareat, eam, quę se cōspectui magis obiiicit. Si quid verò sanguinis de- tractionem impediat, purgatione ex medicamento, quod bili ducendę dicatum est, vtendum pręcipit. Non pugnat tamen Paulus cum Galeno. Nempe cū Paulus secādam esse venam pręcepit in erysipelate, quod capiti seu faciei oboritur, de phlegmonoso erysipelate intellexit, quod se- pissimē faciem apprehendit: Galen. verò de legitimo ery- sipelate locutus est, in quo sanguinem non mittit. At in œdematoso aut scirrholo erysipelate, purgatione vtendū est, quę mistas habeat facultates, hoc est, partim flauā bilem, partim verò pituitosum, aut melancholicum succum educat. Atque in iis, quidem omnibus consulendus est

Chirurgus in ijs, quę ad phlebotomiam & purgationē attinēt, nihil attēta- re debet, ci- tra periti alicuius me- dici consi- lium.

doctus aliquis, ac prudens medicus, à cuius consilio & de- cretis ne transuersum quidē vnguē didiscere debet chi-¹ rurgus. Sitque hoc satis semel monuisse, quòd chirurgus nihil vnquā in iis, quę ad purgationē, & sanguinis mis- sionem per phlebotomiā attinent, attentare debet, citra periti alicuius medici consilium, nisi forsan siquandō vr- geat necessitas, & vbi nullus pręstō adest medicus, Ter-²

Tertia in- tentio.

tiam intentionem complent refrigerantia & reprimētia, in principio fluxionis, exceptis casibus in capite vniuersali commemoratis. Trāacto verò principio, & stata iam flu- xione, quod membro inhęsit, & impactū est, digerentibus seu euaporantibus medicamentis extrinsecus admotis, va-²

Hic Gui- do depra- uatē citat Galen.

cuandum est, per occultam scilicet censui trāspirationem. Omnium siquidem huiusmodi tumorum sic pręter natu- ram consistentium, vacuatio duplex est, Gal. 14. Therap. Vna quidem repellentiū ad alias partes: altera forās dige- rentiū, per eum, qui sensum fugiat halitum. At quoniā³

Quatenus refrigeran- dum in ery- sipelate.

erysipelas non quantitate modō affligit, sed etiā ex vhe- mēti scilicet inflāmatione, qualitate ipsa cruciat, amplio- rem refrigerationem, quā phlegmone requirit. Post ro- tius igitur corporis (vt paulō antē dictum est) vacuationē, reprimētib; auxiliis vtetur, afflicta particula, seu³ ipsā, quę paritur cutem, vt decet, refrigerātes, pręsertim cū sine manifesta aliqua occasione factū fuerit erysipelas. Est autem refrigerationis terminus, ipsa coloris muta- tio. Etenim quod purū erysipelas est, statim cum hoc quę scit. Quod non purū est, sed iam quodammodō phlegmo- nōdes,

nōdes, si plusculum refrigeres, liuidā cutim præfert. Sin ne sic quidem quis desistat, nigricat, potissimū in senili corpore: sic vt quædam ita refrigeratorum, ne digerentibus quidē postea medicamentis ad perfectionē possint sanari; sed scirrhusus quidem tumor in particula derelinquatur. Ergo satius est (inquit Gal.) vbi laborantis particula alte ratum colorē videris, à refrigerantibus retundentibusque ad contraria, id est, dissipantia, seu digerentia, & exiccantia, transire, priusquam vel liuida vel nigra prorsus fiat. Adhibenda autē semper cura est, vt quæ illinuntur, perliquida sint atque humida, cāq; sæpius cōmurentur, ac per spon-
 10 gias frigido aliquo liquore imbutas, subinde quæ admotæ sunt, abluantur. Siquidē multus particulae feruor celeriter in vaporem erūpens, hæc desiccet. Cæterum inter ea, quæ
 15 refrigerandi, atq; repellendi facultatē obtinēt, in hoc affe-
 ctu conuenientē, laudat imprimis Auicennas ex simplici-
 bus, perfusionem aquæ frigidæ. Gal. verò cōmendat succū
 solani, semperuiui, portulacæ, psyllij, alterci, id est, hyoscy-
 ami, lactucæ, vmbilici Veneris (quæ herbula Græcis coty-
 20 ledon appellatur) intybi, id est, cichorii, lēticulæ palustris,
 cucurbitæ atque alia id genus. Ceratum quoque ex aqua
 admodum frigida, quod recipiat quadruplū rosacei ad ce-
 ram albā. Sit autē rosaceū ex oleo omphacino, id est, im-
 25 maturato sine sale cōfecto, quibus in pila emollitis aquæ fri-
 gidæ superfunditur, quantū potest recipi. Si verò aceti te-
 nuis & pellucidi momentū admiscueris, præstātius atque
 efficacius medicamentum reddideris. Porro hæc omnia
 actū frigida sunt ad mouenda, & subindē mutanda, prius-
 quā manifestē incalcant, aut arescāt. Conducit etiā plu-
 30 rimū ad rem præsentē, si pars erysipelate obfessa, illina-
 tur cerusa sola, vel mista cum aceto & lycio, vel terra cimo-
 lia, aut figulari cum solano, aut argenti spuma cum rosa-
 ceo, item acacia cum aceto. Ad idem cōfert plurimū & se-
 quens cōpositio. Succī plantaginis vncia vna, rosacci, vnci-
 35 ciæ tres, lithargyri nutriti, vncia vna, cerusæ lotæ drach-
 tres, lactis muliebris semuncia, miscentur omnia simul in
 mortario plumbeo, & fit linimentū. Teri debent primū
 lithargyrum & cerusa, deinde oleū & succus paulatim &
 sensim affundi debent, donec exactē misceantur. Quod si
 ampliorem refrigerationē desyderes, his & aliis prius enu-

Lib. 14.
Therap.

Materia
refrigeran-
tia ex Gal.
Adiecta
ex Pauli.
Ceratum.

Compositiū
medica-
mentum.

*Evacuatio
coniuncta
materie, &
euaporan-
tia.
ὠμὴ λύσις.*

meratis (ex Pauli sententia) admisceri potest, opij aliquid, vel cicutæ, vel mandragoræ: Verum ab iis, & similibus, quæ stupefaciendi vim habet, abstinendū esse censeo, nisi maxima urgeat necessitas. Cæterum ubi inflammatio ægrotantis mēbri iā desit, ac feruor erysipelatis sese remittit, Galenus humore in particula receptū quam coniunctam materiam vocant, priusquā ex refrigeratione liuor appareat, discutit, imposito cataplasmate, ex hordei farina, seu ex cruda polenta, *ὠμὴν λύσιν* Græcè vocāt, & aliis in ratione curandæ phlegmone superius dictus. Quema Imodum enim signa erysipelatis sumebātur ex analogia signorū phlegmones, ita & curationis ipsius erysipelatis auxilia, ex analogia remediōrū curationis phlegmones sumēda sunt. Porro talia medicamēta, quæ dissoluendi, seu euaporandi facultatē obtinent, in hoc affectu cōuenientē, plurima tū simplicia, tum composita referuntur à Paulo Aegineta lib. 4. c. 21. Item ab Aëtio libro de re medica decimoquarto. Satis autem fuerit, nunc vnū ex multis recēdere quod omniū mihi præstantissimū visum est. Althææ nouellæ foliorum pōdo, id est, libra assumitur, concoquantur in hydrelæo: cocta verò probè teruntur, adiectōque rosacei triente, id est, vnciis quatuor, argenti spumæ, & cerusæ, singulorum vnciis duabus & semisse, id est, dimidia: iterum læuigātur cum succo coriani, aut semperuiui, aut solani: deinde micis panis adiunctis, vt emplastri formam induat, illinitur. Quod si fortè liuor iam locum occuparit, incisa antè cute, cataplasma superponendū est, perfundendūque locus, plurimum quidem (vt Galenus præcipit) aqua calida: digerit enim, & plagas abluit: sed & aqua, & muria interim conducet locum fouere, cum scilicet crassior est. Hæc enim crassitudinem incidunt, ac detergent. Quarta intentio curationis erysipelatis, quæ est accidentium correctio, perficitur vt in curatione phlegmones dictum est, cum agebatur de reditu materię, de induratione, & corruptione. Item de dolore & ardore. Hæc enim symptomata etiam erysipelati, vt & phlegmonæ accidere solent.

*Hydrelæū
est mistura
ex aqua et
oleo, seu
oleum dilu-
tum.
Si liuor iā
locum occu-
parit.*

4
*Quarta in-
tentio.*

*Doloris &
ardoris mi-
igatoriiū.*

Porro optimū doloris ac vehementis ardoris mitigato-
rium auxiliū fit, ex foliis, & radicibus hyoscyami, inuolu-
tis in stupis, & coctis sub prunis: deinde mixtis eū vnguen-
to, quod populeon vulgò appellatur, vel cum axungia, vt
superius dictum est in curatione phlegmones.

Si verò contingeret ipsum erysipelas exulcerari, curetur admotione vnguëti albi, aut vnguenti de lithargyro, quorū descriptiones ex sexto libro requirendę sunt. Quòd si illis adderetur aliquid scorix, hoc est, recrementi plumbi; optimum sanè atque efficacissimum foret remedium. Sed præstat vt totam curandi erysipelatis rationem, breuibus quibusdam sententiis in modum epilogi complectamur, vt quę diffusius à nobis suprà dicta sunt, memorię tenacius hæreant.

10 *Septem de erysipelate aphorismi, totam ipsius curationem summam complectentes, ex Galeno.*

IN exquisito erysipelate, sanguinem ne detrahit.

Si bile corpus abundet, & affectus magnus sit, ventrē medicamento cholagogo, per inferiora purgato.

15 Quòd si exiguus morbus sit, & corpus bile vacuum, à medicamento flauam bilem per aluum ducente, abstine-to, & acri clystere contentus esto.

Vniuerso, vt oportet, corpore purgato, partem affectam per initia moderatè reprimentibus medicamētis, & abunde refrigerantibus, vsque ad coloris mutationem, perfundito, atque illinito.

Vbi laborantis particulę alteratum colorem videris, & feruorē erysipelatis iam remissum, ac inflātionem desuisse, à refrigerantibus, astringentibusque, priusquàm vel liuida, vel nigra prorsus particula fiat, ad contraria, hoc est, digerentia, seu discutientia, & exiccantia transito.

Quę ex vlceribus, aliisque euidentibus causis fiunt erysipelata, primū scarificato, deinde cataplasma ex hordeacea farina imposito.

30 Si erysipelas non exquisitum fuerit, sed phlegmonodes, præsertim vbi sanguis in corpore exuberat, intrepidè sanguinem mittito.

De Tumoribus, qui cum erysipelate societatem habent, hoc est, de herpete miliari, & exedente, quę pustulę cholerice recentioribus chirurgis dicuntur.

35 **T**V mores illos præter naturam, qui cum suprà comprehenso erysipelate societatem habent, atque ad ipsum quodammodo pertinere videtur, ex bile autem nō naturali, & secreta, id est, aliis humoribus, minimè permixta, generationem obtinent, recentiores tum medici, tum

De Herp.

Pustula chirurgi, pustulas malas cholicas appellant: Græci verò,
male & (vt Hippoc. Galen. & Paulus) herpetas vocant. Quæ vox
cholice Latinis ferè sonat, malum quod serpit: ἑρπης enim idè quod
vulgo di- serpo, vnde ἑρπης serpens dicitur. Herpes tamen non abso-
lute. lutè malū quod serpit, significat apud medicos, sed certū
Herpetes: morbi genus, de quo nunc agitur. Itaque malum quod
serpit, latius pater, quàm herpes. Nam & phagedænæ ser-
penria etiam vlcera dicuntur. Huiusmodi autem vniuersas
Formice pustulas Auicénas formicas appellauit: Galenus verò eas
Auicennæ: inter inflammationes adnumerauit, sed Celsus sub ignis
Herpes sacri nomine has intellexisse videtur lib. 5. cap. 28. Fit igitur
quādo fiat: herpes, quādo flaua bilis, non naturalis, sola, & secreta,
Herpetis id est, nullo alio illi admixto humore, in particulā ali-
species due. quam confluit, atque ibidem consistit: quæ si consistentia
sua crassior sit, acriorq; totam exulcerat cutem, vsque ad
carnem suppositā, vocaturq; tunc vitium huiusmodi Hip-
pocra. & Græcis ἑρπης ἐδιδύμην. Latinis verò herpes ex-
dens, vel depascens: & decimoquarto Therap. Galeno ab-
soluto nomine herpes. Si verò tenuior & minus acris, ca-
lidāque fuerit bilis, pustulas exiguas per summam cutem,
id est, in sola superficie cutis (hanc enim tantum veluti de-
urit) milio, hoc est, milij seminibus similes excitat: ob quā
similitudinem affectus tunc Latinis miliaris herpes nomi-
natur: Græcis verò quibusdam post Hippocratis ætatem
λευχέλιος ob eandem rationem dictus est: λευχέλιος enim Græ-
cis, miliū nobis dicitur. Atque hæc species Galeno autore
lib. 2. ad Glaucon. generis fortitur appellationē, cum sim-
pliciter, & sine additione illi herpes vocetur. Alibi tamen
herpetis nomine; Galenus herpetem esthiomenum, id est,
exedētem intelligit: vt paulò post dicitur. Hic autem non
protinus vlcus facit, vt alter, qui exedens dicitur, sed vt di-
ctum est, admodum exiguas pustulas ad speciem milij ex-
citāt, quæ & ipsæ interposito spatio, ac procedente tēpo-
re, cum disrumpuntur scilicet, in vlcus abeunt. Proinde non
sine ratione Oribasio & quibusdam aliis etiam ante Ga-
leni tempora visum est, in eiusmodi vitio, bili esse aliquid
pituitæ tenuis admixtū, quæ pustulas illas minutulas pro-
creat. Vnde & nonnullis pustulosus herpes dictus est. Alter
verò, qui esthiomenos appellatur, non ita pituitæ commi-
xtus est, sed exactæ bilis, ac nullo alio humore infectæ, esse
videtur.

videtur: id eoque cum erosione accidit, affectu cutis continuitatem præhendente, vnde & nomen illi impositum est. Esthiomenos enim idem est, quod erodens vel exedens. Atque hic affectus quidem eiusdem generis est, cum pustuloso atque exulcerato erysipellate, à quo tamè differt humoris ipsius biliosi (ex quo vitium vtrumque ortum habet) tenuitate. Id quod testatur Gal. his verbis: Est enim (inquit) admodum tenuis humor, qui herpetè excitat, adeo profecto, ut non solum omnes interiores partes, quæ vtiq; carnosæ substantiâ sunt, transeat, sed etiam cutim ipsam ad summam vsque cuticulâ (epidermidâ Græci vocant) quam solam, propterea quòd ab ea remoratur, tum erodit, tum exedit: quando si hanc quoq; sudoris vice transiret, haudquaquam vlcerum excitaret. Quippe id, vlcerum quæ ex mordente humore oriuntur, quæ nimirum spontanea vocant, commune est, quòd humor qui ea facit, sistitur in exitu, ac tardat. Hætenus Gale. Vbi nomine herpetis simpliciter & sine additione, intelligit herpetem esthiomenum, ut ex ipso contextu signis, & curatione, facile est deprehendere.

Atque ita illo in loco generis sortitur appellationem, cum simpliciter, & absolute herpes nominetur: quæ admodum & in libello, de tumoribus præter naturam, vbi de eo sic idem. Gal. ad verbum scribit: Depascitur quidè & herpes, vicina, id est, ea quæ in circuitu sunt, erodens: verum solius cutis est exulceratio. Cæterum vtrâque herpetis speciem, id est, tam miliarem, quàm exedentè, sub nomine formicæ Barbari ferè omnes nosterici comprehendunt. Quibus ea in re, ut & in multis aliis, erroris occasionem primus præbuit Auicennas, qui nominis similitudine deceptus, quoniam Græci myrmecias, id est, formicas, genus quoddam verrucarum vocant, eodem capite verrucas illas cum herpetibus errore fœdissimo commiscuit. Guido tamè discrimen ponit, inter herpetem & formicam, confunditque nomen formicæ modò cum verrucis (quas myrmecias & acrochordonas Græci vocant) modò cum herpete exedente: qui (comedens inquam herpes) modò etiam illi herpestem, modò herpes absolute nominatur: putaturque eidem nihil aliud esse, quàm erysipelas pustulosum, & vlceratum. Cum tamen ille (ut ex Galeno adductum est) ab hoc differat humoris tenuitate. Tenuior enim est bilis quæ her-

Lib. 14.

met. mede.

Humor bi

liosus, quò

herpetem

excitat ad-

modum ten-

nus est.

Herpes so-

lius cutis

est exulce-

ratio.

Auicennas

myrmecias

confundit cū

herpetibus.

Guidonis

error maxi-

mus.

Herpetem

esthiomenū

et erysipe-

las vlceratū

nō omni-

no idē esse.

*Morbili ex
herpetum
sunt gene-
re.*

Variola.

*Papularū
eruptiones
Ecthyma -
ta.*

*Exanthe-
mata.*

*Herpetū
curatio tres
habet scopos
sue inten-
tiones.*

peta creat, quàm quæ vlceratnm erysipelas. Ad hoc erysipelas, quod cum exulceratione incidit, non tantū cutem, sed cum ea etiam aliquid subiectæ carnis occupat. Herpes verò, quo de hîc agitur, solam cutim apprehendit, exulceratque. Itaque tametsi hæc eiusdem sint generis (vt Galen. visum est) non tamē omnino sunt idem. Porro pustulas illas, quæ Auicennæ interpreti, & imperitæ medicorū turbæ, morbili appellantur, sub herpete cōprehendisse videtur Hippocr. lib. 3. Epidemiarū. Sunt autē morbili huiusmodi à tenuiore materia, quā pustulæ illæ, quæ vulgò variolę dicuntur. Hæc enim (vt voluit Auicēnas) ex sanguine, illiverò ex bilis sanguinisq; sūt mixtione. Si quis autē desiderat, quo nomine eiusmodi pustulæ apud antiquiores dictæ sint, diximus Latinæ à Plî. vocari papularū, & interdū pituitæ eruptiones: Græcè verò Hippocr. ecthymata lib. 1. Epidem. Gal. autē exanthemata. Cæterum vtriusq; herpetis notæ, iudicia, & causæ, ex præcedentibus satis innotescunt. Superest igitur, vt eorum curationem subiciamus.

Herpetū curatio.

IN curandis herpetibus, sicut & in aliis eiusmodi spondaneis vlceribus, quę ex mordenti & acri humore oriuntur, tres scopi communes sunt obseruandi.

- 1 Primus est, vt humoris in partem affectam confluxio inhibeatur.
- 2 Secundus, vt quicquid in laborantem particulam confluxit, & eidem inhæsit, vacuetur.
- 3 Tertius, vt sanetur vlcus.

Primus scopus. Primū scopū assequimur, totum corpus medicamine humorem (vnde vitium enascitur) educente, expurgando. Mox repurgato corpore humorē influentem reprimendo, & regerendūq;. Ergo in herpete exedente, medicamentū vtendum est, quod flauam bilem per aluū exigit. Hūc enim purus, ac syncerus (vti diximus) biliosus procreat succus. Proinde fit, vt quātum ad totius corporis euacuationem attinet, comedentes herpetas similiter vt erysipelata curare oporteat.

Herpes miliaris medicamentum desiderat. Itaq; quoniā tenuis humor est, qui id vitium creat, abunde est Gal. etiam alium leniter soluisse, vel yrinæ, per ea quæ id modicè efficiūt, citasse. In altero verò herpetum genere, quem à similitudine quam habet cum milio, miliarē & cenchriam Græcè appellari diximus, medicamento

opus

opus est, quod mixtę sit facultatis, hoc est, quod bilē simul *simul et pi-*
& pituitā educat. Quibusdā enim non sine ratione (vt *Ga tuitam edu*
lenus ait) visum est in eiusmodi vitio bili esse aliquid pitui *cat.*
tæ admixtū. Porro vacuato, vt decet, eo qui in corpore re-
5 dundat, ac vitium cōmittit, humore, medicamētis vtendū *Reprimen*
est, quæ influentem humorē reprimāt, regerāntq;. Utior *di tempus*
nanq; ac cōuenientior tunc fuerit eorū vsus. Quādoquidē *Lib. 14.*
(inquit Gale.) si quis exiguū vitiosi humoris, post ritē fa- *Therap.*
ctā purgationē adhuc in corpore remanens ad viscera, &
10 magnas venas retrudat, nullum profectō quod sensu perci-
piatur malum committet. At si eius non leuis quantitas
sit, in princeps aliquod membrū aliquando procūbit, vbi
scilicet prius naturæ viribus totū corpus expurgantis, non
sit, vel per deiectionem, vel vrinas, vel cutim, quę totū cor-
15 pus includit, vacuatus. Cæterū reprimunt quidem rege-
runtq; non solū ea quę adstringunt, sed etiam quę sine
adstrictione refrigerant. Cuiusmodi sunt lactuca, poligo-
nion, ex stagnis lens, portulaca, seris, semperuium, & id
genus alia, quę erysipelatibus valde erāt opportuna. Ve-
20 rum eiusmodi medicamenta, quę scilicet præter id quod
refrigerant, etiam humectare naturā apta sunt, herpes
præsertim depaſcentes, minimē desiderant, sed sola ea ad-
mittunt refrigerātia, quę etiā maximē possunt exsiccare.
Quę enim refrigerandi, atq; vna exsiccandi vim habēt, sed
25 mediocrem (cuiusmodi est solanum) non satis illis conue-
niunt. Apponere igitur ipsis oportet ex Gale. consilio, ab
initio quidē, ex vite capreolos, & folia rubi, & rubi canini,
& arnoglōsi. Post hæc verō & lenticulam his adiungere
oportet, & aliquando mel, & farinam hordeaceā. Item ca-
30 taplasma sine semperuiuo, quod ad phlegmonas, quę ex
fluxione eueniunt, inscribitur. Repellit enim quod influit,
atq; id quod in parte affecta continetur, exsiccat, & mem-
bra corroborat. Proinde transacto morbi principio efficax
erit remediū. Itaq; fiet huiusmodi cataplasma, ex cortici-
35 bus malorū Punicorū in vino decoctis & Rhu, siue Rhoe,
id est, semine coriarij fruticis (quod posteriori medicinę Su-
mach appellatur) & farina hordei. Cæterū hoc cataplas-
mate secundam intentionem, seu scopū curandi herpetis
probē assequeris. Quippe cū sufficienter digerere pos-
sit, quod iam in affectum locum confluxerit. Constat au-
tem,

Nō esse re-
primēdū,
si multius sit
vitiosus suc-
cus.
Regerētū
materia.

Quę refri-
gerant pa-
riter & hu-
mectāt, nō
conueniunt
herpetibus
exedētibz.
Reprimen-
tia herpeti-
bus exedē-
tibus accō-
moda.

Hæc com-
plent secun-
dam inten-
tionem.
Cataplas-
ma.
Sumach.

tem, quòd in generatione vlceris exuperare debebunt quæ reprimendi facultatem habet: vbi verò non amplius confluit in ægotatē particulam vitiosus humor, quæ digerunt. Quod ad tertiū scopum attinet, qui vlcus sanandum

3 *Vlceris curatio in herpete, quæ tertius est scopus.* proponit, summatim hæc te cognoscere oportet. Nempe, quòd omne vlcus siue sponte siue ex accidenti factū fuerit, exiccari desyderat medicamento (vt inquit Hippo.) nō aspero, hoc est, non mordente, neque vehementer irritate, præterquam vbi malignū, & cum putrilagine fuerit. Talia enim (inquit Galenus) acriora expetūt medicamina, & quæ ignis vires habeant: quale est mysi, & chalcitis, & arsenicum, & calx, & sandaracha, atque id genus alia, quæ non aliter, quàm ignis adurunt. Loca igitur exulcerata in herpete exedente, inungenda sunt pastillis, seu trochiscis, in libris, qui pharmaceutici dicuntur, ad herpetas inscriptis. Qui cū res exigit, vt illis vtamur, passo, vel vino aliquo dulci, vel si dulce non adfuerit, vino tenui & subaustero non nimis veteri (hoc est, quod non aliquam in gustu ob antiquitatem contraxerit acritudinem) aut posca aquosa (quod oxycratum vocant) diluuntur. Paulus his vtitur remediis, ad herpetem, qui sub cute affligit. Retrimētum plumbi, rutæ læuigatæ succo excipitur, aut ceratum myrteum in vicem rutæ. Aliud, Lanæ veteris illotæ, circa tedam combustæ, drachmæ duodecim & semissis, id est, dimidia, ceræ drachmæ viginti quinque, recrementi plumbi drachma, sæui caprilli curati lotique ex aqua drachmæ viginti quinque, myrtei vnciæ quinque. Ad herpetas verò acutè seu acriter depascentes, hoc remedium iubet admoueri. Corij mali Punici dulcis drachmæ sex, argenti spumæ tantundem, lanæ illotæ, tedæ seu tedaceo ligno adhærentis, & combustæ drachmæ tres, ceræ drachmæ duodecim, cerusæ drachmæ octo, thuris, aluminis scissi, singulorum drachma, vino aut myrteo excipiuntur. Iam verò in longum tempus protractis vlceribus, neque vino dulci, circuli parui, id est, trochisci, & huiusmodi alia medicamenta, quæ ad herpetas scribuntur, dilui debent: sed neque pusca adhuc aquosa, quin potius vino sat austero, præcipuè verò nigro, & si id non affuerit, albo. Medicamenta autem in hoc tempore, hoc est, in ueteratis iam vlceribus, efficacia, & maximè accommoda sunt, pastilli Mu

Ad herpetas depascentes.

Ad inueterata iam vlcerata.

stilli Musæ, & Andronis, & Polyidæ; quorum descriptiones in fine curationis carbunculi posite sunt. Itē trochisci, qui calidicon & aldaron dicuntur Auicennæ & recentioribus, quorū descriptiones ex lib. 6. requirendæ sunt. Herpetas verò, qui tantū summā cutem exulcerant, ut sunt, quos miliares diximus, nullo horum medicamentorum superius commemoratorum (si saltem Galeno credimus) inungere oportet. Vehementia enim sunt ac validè excitant: verū istis sufficiunt quæcunque vim glaucij, id est, memichæ habent, eaque diluere oportet, maxime quidem aqua. Quod si hæc nihil profecerint, etiam acerum miscendum est. Quod si etiam solani succo intinxeris, aut arnoglossi, magis adhuc iuueris. Hactenus de herpete. Ceterum quoniam de formicis nonnihil obiter in superioribus attigimus, quas turpiter (ut diximus) recentiores, & Arabes cum herpetibus confundūt, præsens locus expostulat, ut de iis & aliis in cute eminentibus excrescentiis, quas Latini verrucas vocant, pauca annotemus.

De formicis, & alijs verrucarum differentijs.

CAP. IX.

20



25

Vmores illos exiguos, seu humiles illas excrescentias, quæ instar monticulorum quorundā in cute eminentes conspiciuntur, Latini appositè verrucas appellarunt: verruca enim propriè editiorem montis partē significat. Vulgus autē porra nuncupat. Quia quādoque intra se fila quædam continent porrorum radicibus nō dissimilia. Græci nomen non habēt, quo omnia eiusmodi verrucarum genera complectantur, sed quæque proprio nomine speciem nūcupant. Hæ autem ferè sunt, *μυρμηκία*, ἀποχորδόνες, ἢ ὀδύμιον. Itaq; Myrmecia illis dicūtur verrucæ, quæ latiore sunt basi, & quasi sessiles, similē vellicantis, seu mordentis formicæ sensum, dum atrectantur, inducētes: unde & nomē illis factum est. Græci enim *μυρμηκία* formicæ cam nominant. Quare Latini eas (nomine quidē ad Græcum vocabulum sese accommodante) formicas, verrucas dixerunt. A figura verò & formatione, sessiles verrucas. Hæ nascūtur Celso, aut in palmis, aut in inferioribus partibus pedū: radices autē altius agunt ac humiliores sunt thymio durioresque, maioremque dolorē mouent: sed minus sanguinis

Si pustula miliares in vlcus abeunt quid agendum.

Libr. 2. ad Glauc.

Verruca. Porra.

Verrucarū diuersa genera.

Myrmecia.

Sessiles verruca.

Lib. 5.

Acrochordon.

Pessilis verruca.

Myrmecia et acrochordones quibus inuicē dissideant.

Clauis.

ἄλσι.

Almismar.

Thymion.

Thymia magnitudo.

Thymia in obscenis pessima.

Cornua.

Calli.

guinis mittunt, vixque vnquam magnitudine lupini modum excedunt. Acrochordon verò pensilis, & angustiore basi verruca est, hoc est, rotunda quædam in cute eminentia seu excrecentia, quæ basim, id est, partem imam ad cutem angustam habet: sic quidem dicta, quòd chordæ nexu suspensa pendere videatur. Itaq; hoc discrimine acrochordones à myrmeciis dirimuntur, quòd illi ima parte ad cutem angustiores sint, supremâ verò latiores: myrmecia contra, basi sint (vt dictum est) latiore, super autē tenues. Sed & hæ nonnunquā cum summa cute prorsus sunt æquales. Acrochordones verò semper à cute extant: vt libro decimo quarto de morbis curandis Galenus scriptum reliquit. Adhæc acrochordones Celso serè plures nascuntur, pueros maximè infestant, nonnūquam subito desinūt: quandoque verò mediocrem inflammationem excitant. Sunt itaque etiam in pus conuertuntur. Rarò autem fabæ magnitudinem excedunt: Auicennæ clauis dicuntur. Verū Latinis clauis appellantur verrucæ albæ, rotundæ clauorum capiti similes. Hi in digitis, plantisque pedū maximè contingūt, vbi dolorem, si non aliàs, tamen ingredienti mouent. Hos Græci ἄλσι vocant: Auicenna verò almismar. Ex contuso sæpius nascuntur, interdum etiam aliter. At thymion vel thymon Celso & Græcis, verrucula est, super corpus eminens, infra seu ima parte ad cutē, & ipsū (vt acrochordon) tenuis, suprâ verò latior: subdura quoque, & in summo peraspera. Idque summū, colorem floris thymi repræsentat, vnde ei nomen est, ibique faciliè funditur, & cruentatur. Nonnunquā & aliquantum sanguinis fundit, ferèque circa magnitudinem fabæ Aegyptiæ est, rarò maius, interdum perexiguū: modò vnum, modò autem plura nascuntur, vel in talis, vel palmis, vel inferioribus pedū partibus, hoc est, in plâtis. Pessima tamē in obscenis sunt, maximèque vbi sanguinē fundunt. Auicennas videtur huiusmodi verrucæ genus tusium, vel vt alia habet lectio, tarsecum nominasse. Ex verrucarū quoque genere sunt, vocata ab Auicēna cornua nō alio à cæteris distātia, quā quòd oblonga sunt, & inftar cornuū recuruantur. A clauis non magnoperè differunt calli, quos Græci vocant κάλλις, nisi quòd per se anodynī, id est, indolentes sunt, eodē quo cutis colore, neq; spontē, sed ex labore obdurata cute gignuntur.

Verruca

Verrucarum iudicia, & curatio.

EX his acrochordon & thymion sæpe etiam per se (vt *Acrochord-*
 retulit Celsus) finiuntur, & quo minora sunt, eò ma- *don.*
 gis. Myrmecia, & clauī sine curatione vix vnquàm desi- *Thymion.*
 nunt. Acrochordō si excisa est, nullam radiculā relinquit, *Lib. 5.*
 ideóque ne renascitur quidem. Thymo clauóque excisis, *Myrme-*
 subter rotunda radícula nascitur, quæ penitus descēdit ad *cia.*
 carnem, eaq; relicta, idem rursus exigit. Myrmecia latissi- *Clauī.*
 mis radicibus inhzrent, ideóque, ne excidi quidē sine vlce
 o ratione magna possunt. Clauum subindē deradere, com-
 modissima est, & aqua tepida perfundere. Nam sine vlla
 vi sic emollefcit. Ac si sanguinis quoque aliquid emissum
 est, sæpe emoritur. Tollitur etiam, si quis cum circumpur-
 gat, deindē imponat resina, cui miscuit pulueris paulum,
 15 quem ex lapide molari cōtrito fecit. Cætera verò genera,
 vt ab eodem Celso traditur, medicamentis adurēda sunt.
 Alijsq; id quod ex fæce vini: myrmeciis, id quod ex alumi- *Myrme-*
 ne & sandaracha fit, aptissimū. Paulus Aegineta, lib. 4. ca. *cia.*
 15. plurima enumerat, quæ verrucas huiusmodi, præsertim
 o sessiles & pensiles tollunt, exteruntq; Cuius generis sunt, *Verrucarū*
 elateriū (quod succus est fructus cucumeris agrestis) cum *per medica-*
 sale infricatum, thuris cortex cum aceto, grossi, id est, pri- *menta cura-*
 mitiua ficus, quæ velut præcoces nō maturefcunt, cū ace- *tio ex Pau-*
 to, farina, & nitro. Idem quoque illi præstat succus, seu li- *lo.*
 15 quer fici arboris illitus, tithymali, smaridis piscis caput sal-
 sum concretatū, ærugo cum sulphure viuo, hoc est ignem
 non experto combusta, oeymi folia cū atramēto sutorio,
 quod Græci chalcanthū vocant, sarmentorum adhuc viri- *Aqua ex*
 dium vstorū, quod distillat, finus ouillus cum aceto, hirci *fermentis di-*
 30 num fel illitum, heliotropij magni fructus per se illitus, vel *stillans.*
 cum vino applicatus, ruta cum nitro & pipere, nitrū cum
 vrina pueri impubis & nōdum Venerē experti, sterlus bo- *Sterlus bu-*
 uis gregarij, seu armentarij adhibitum in aceto. Cæterū *bulum.*
 hæc quæ ad myrmecias & acrochordonas exterendas cō-
 35 memorata sunt, serē omnia & ad clauos, & thymia etiam
 magnoperē conducunt. Tradunt etiā lacertæ caput myr- *Lacerta ca-*
 mecias, acrochordonas, & clauos tollere. Sunt qui deco- *put.*
 quant capita salforum pisciū in aqua illa, quæ distillat ex
 sarmentis viridibus, dum comburuntur: idque præstātissi-
 mum ad prædictā vitia remedium esse prædicant. Alij ad
 eadem

Aerugo eadem extendenda linimentum conficiunt ex æruginē (quæ recentioribus viride æris, & flos æris dicitur) sulphure, & aqua, seu instillatione illa sarmentorum. Atque hic vnus est curandi modus, quō vti solent ad verrucas è medio tollendas, per medicamenta scilicet erodentia, adurentiâque.

Hoc Hal- lyab. & Guido probant. Id autem vnum summa cura obseruandum est, in eiusmodi medicamentis administrandis, quod Celsus monet libro quinto: nempe quod ea quæ circa sunt, foliis contegi debēt, ne ipsa quoque exulcerentur. Alij ob eandem causam circūiacentes partes illinunt, vnguento ex bolo armenia, terra sigillata, aqua rosea, & aceto. Porro acrochordonas, myrmecia, & thymia non solum præscriptis hisce adurentibus medicamentis abolemus: sed & ignis flamma, vel

Alia curandi rationes. candente ferro, illis ritè admoto. Ea quoque nonnunquam excidimus. Interdum verò ligatura scitè illis coaptata (vt fit in vero ficu) vel primoribus dentibus, vt quidā Romæ Galeni tempore facere solebat, euellimus, ac radicitus ex-

Quomodo verrucæ sint errendæ. tirpamus. Cæterum si ignem aut candens aliquod ferrum verrucæ admoueris, lamina quædam ferrea pertusa, vel simile quidpiam, ita verrucæ adurendæ coaptari debet, vt foramen eam exactè comprehendat, adeo vt nihil circumpositæ cutis appareat. Facta verò adustione, crusta butyro vel aliquo alio vinctuoso illito resoluenda est. Deinde vl-

Myrmeciarum cū summa cute æqualiū curatio. cus similiter reliquis vlceribus curandum erit. Quo pacto autē myrmeciarum quæ à cute non extāt, sed illi prorsus sunt æquales, educi debeāt, atque excidi, pulchrè docet Galenus lib. 14. methodi medendi: vbi refert quendam fuisse Ro-

Myrmeciarum noua curatio ex Galeno. mæ suo tēpore, qui nouam huiusmodi verrucarū curationem excogitauit. Nimirum has certa primū labiorū applicatione, ceu suctu ad se trahebat, atque (quod mirū videbatur) à radice euellebat. Deinde primoribus apprehensis

Alia curatio myrmeciarum. 14. dentibus, totas simul eximebat. Acrochordonas verò, vt pote à cute extantes statim mordicis prehendebat, & ita protinùs educebat. Harum quoque & geminam aliam curandi rationem mox subiungit Galenus, inquit: Sed &

Scolopomacherion. scalpro ad myrtacei folij speciem formato, & ferramentis, quod scolopomacherion Græci vocant, quispiam manibus exercitatus, faciliè eas excidat: cum propriis lineamentis à circumposita cute circumscriptæ discernantur. Acquē verò & valente aliqua pinna, circulo

myrme

myrmeciae imposita, ipsam educimus. Debebit porro pinnae fistula esse myrmeciae crassitudini par, ut eam undique prorsus constringat. Quæ postea circumacta, ac simul deorsum impulsæ, celerrimè ita myrmeciam etiam cum ipsa radice totam educet. Constat verò, & quòd finis ipse pinnae, quæ eam circulo secabit, non tenuis modò, sed etiam acutus & firmus esse debebit. Itaque tum Galli veteris pinna, tum vel magis aquilæ, ad hunc usum est accommodata. Abscindere verò ab his tantum radicem versus oportet, quatenus reliquæ partis fistula completi myrmeciam possit. Sanè ex ipsa statim abscissione, si modò scitè fiat, etiam acumen ipsi comparabis. Hæc Galenus hæctenus. Vlcus verò quod relinquitur sic auulsa verruca, similiter reliquis ulceribus impleri debet, & ad cicatricem perducì.

Pinna scitè radicem versus abscindenda.

De œdema, & tumoribus frigidis, pituitosis, & flatuosis.

C A P. X.



Ubi de tumoribus, qui succis calidioribus procreantur, satis disputatum sit, de iis quæ a materia frigida ortum habent, nunc tractare rursum instituimus: principium quidè ab eo quod *σύνεμα* Græcis dicitur, sumentes.

Quemadmodum enim ex biliosa fluxione erysipelas, ita ex pituitosi humoris cōfluxu œdema excitatur. Est autem œdema (definitore Gale.) latus quidam atque indolens tumor, seu rara quædam atque expers doloris moles, ex pituitoso humore in particulam aliquam influente exurgens. Ita quidem Galenus censuit libro 14. Therap. de œdemate, quod morbus est, non symptoma. Equidem scimus (inquit) aliter quoque [quàm ex pituitosi scilicet humoris fluxione] œdemata provenire. Nempe ex pituitoso humore aut spiritu vaporoso, in parte aliqua collecto, & in eadem aliquândo genito, ut in cruribus & pedibus eorum, qui aquæ subter cutem affectu laborant. Et phthoë, id est, corporis habitu contabescente: & cachexia, hoc est malo habitu corporis. In illis quippe periculosis dispositionibus, œdema, affectus eius qui hominem premit, symptoma est, hoc est accidens necessariò consequens, nullam seorsum propriam, præcipuamq; curationem postulans, ut in sequentibus dicitur. Oedema, uti & phlegmone atq; erysipelas, in duas chirurgis finditur differentias, in verum scilicet

Oedema quid.

14. Thera. & 2. ad Glauco.

Oedema est symptoma est quibus maxime accidat.

Oedema duplex.

Verum. cet œdema, & non verum, seu illegitimum. Verum œdema fit ex pituita naturali, quæ certè nihil aliud est, quàm sanguis crudus aut diminutè coctus: qui in massa quidem sanguinaria inuenitur, membris pituitosis enutriendis accommodus.

Illegitimū. ² Non verū, seu illegitimū œdema, fit ex pituita non naturali. Est autem pituita naturalis (ne quid obscurum relinquamus) humor frigidus & humidus, substantia crudus, colore vergens ad quandam albedinem sapore verò, & (si licet dicere) odore ad dulcedinem. Nō naturalis pituita, ea est, quæ à modò descripta degenerat, intra tamē suæ latitudinis terminos, quos si forsā pertransseat, nō iam amplius phlegma pituitarē, sed aliud humor, dici debet. Contingit autem bifariam pituitam ipsam à propria sua natura degenerare: Vno quidem modo (vt loquuntur) in se, quādo scilicet in propria sui ipsius substantia citra alterius admixtionē permutatur. Quod sanè multifariam accidit. Aut enim in substantiam aquosam cōuertitur, aut in flatuosam, aut in admodum tenuē. Diciturq; tunc phlegma aquosum, flatuosum, aut tenue: aut crassius ac viscosius redditur: idq; tunc phlegma crassum, & mucilaginosum efficitur, & per maiorem, seu, (vt dicitur) vltiorem indurationem, gypseum, seu vitreum. Aut ipsum putrescit, & alteratur, efficiturq; tunc salsum, nitrosum, & corrosiuum. Altero modo pituita efficitur non naturalis, per admixtionem: quando scilicet alius quispiam humor illi extrinsecus accedit, verbi gratia, vel sanguis, vel bilis flaua, aut atra. Si sanguis pituitæ permisceatur, hæc dulcis efficitur: si flaua bilis, salsa: si melancholia, pōtica, & accida.

Sunt ergo octo species phlegmatis non naturalis iuxta Auicennæ placita. Halyabbas tamen quatuor tantum constituit. Gale. autem (inquit Guido) videtur duo solū genera assignare, nempe salsum & acidum. Tametsi libro secundo de differentiis febrium, & libro secundo de locis affectis, atque in multis aliis locis, mentionem faciat de vitreo, quod subinde sub acido (propter eam, quam cum eo

Galen. duo tantum pituita genera posuit. habet affinitatem ac conuenientiam) reponit. Ex iis igitur colligitur, quod ex pituita generantur octo species, seu differentie tumorum præter naturam. Primò enim ex pituita seu phlegmate naturali, fit œdema verum, ac certum, seu legitimum. Secundò ex pituita non naturali

Octo differentia tumorum præter naturam ex pituita. per

per admixtionem generantur tres aliæ differentiæ tumorum: quippe quòd tres alij humores cum ea possunt commisceri. Nominantur autem, œdema phlegmonòdes, œdema erysipelatòdes & œdema scirr hòdes. Tertiò ex pituita non naturali, per alterationem propriæ substantiæ quatuor aliæ exurgunt differentiæ. Primò namque ex flatuoso & vaporoso phlegmate fit tumor is, qui propriè Latinis inflatio, vulgò autem medicorum apostema ventosum dicitur. Secundò, ex aquoso, aquosum. Tertiò, ex crudo phlegmate, crasso, & mucoso, procreantur tumores illi, qui leues nodi quibusdam dicuntur, & abscessus pituitosi, quos vulgò exituras phlegmaticas appellant.

Auicennæ verò interpreti dubelet frigida nominantur.

Cuiusmodi sunt steatomata, atheromata, & melicerides. Ganglia quoque (quæ Auicennæ glandulæ dicuntur) & id genus alia, quæ in sequentibus declarabuntur.

Ex duro verò, seu magis indurato, & (vt sic dicatur) gypseo phlegmate, fiunt nodi omnes duri, qui in iuncturis maximè reperiuntur, & strumæ, quæ vulgò scrofulæ nominantur. Quartò ex corrupta & putrefacta pituita generantur fistulæ, & vlcera, quæ scrofulosa vocant.

Causæ œdematis, vt & aliorum tumorum præter naturam, sunt triplices. Primitiuæ, vt sunt casus ab alto, percussio, deprauata viuendi ratio. Antecedentes, vt exuberantia humoris pituitosi in partem aliquam decurrentis. Coniunctæ, ipsa pituita, in membro tumore obfesso, iam infarcta, & accumulata. Signa œdematis hæc sunt, tumor laxus & mollis, qui prementi digito cedit, & foueæ modo cauatur, nec amoto digito resilit, sed prementis vestigium

CAUSAE
œdematis
tres.

SIGNA
œdematis.

IV DICIA.

retinet. Dolor aut exiguus, aut ferè nullus. Calor modicus. Color vergens ad albedinem, hoc est, subalbidus, seu (vt volunt alij) inter album & pallidum medius. Et alia id genus, quæ pituitæ dominium testantur. Oedema, vt & cæteri tumores, quatuor habet tempora principium, augmentum, statum, & declinationem. Hoc genus tumoris vt plurimum terminatur per resolutionem seu exhalationem, rarò per suppurationem, sæpissimè per conuersionem, seu permutationem in nodos, & alias (vt vocant) excrescentias, quæ Græcis apostemata, Latinis verò abscessus dicuntur. Harum autem terminationum notæ, & agni-

- 3 tiones, superius in tractatu vniuersali dictæ sunt. Tumores hi œdematosi hyeme magis, quàm aliis temporibus, excitantur. Plurima enim tunc in corporibus colligitur pituita. Senes quoque & crapulæ deditos magis ac sæpius infestant.

Oedematis, ex pituitoso humore in particulam aliquam confluyente, curatio.

Curandi œdematis scopus duplex cum adhuc gignitur.

Quoniam œdemata, ex humorum in aliquam partem fluxione, aliorum tumorum more suscitantur, duplex etiam eorum curandi scopus erit. Alter, vt horum humorum, qui iam partem occupant, substantia dissoluatur, alter, vt fluxio cogatur, restringaturque. Atque prout alter scopus alterum superat, remedia sunt miscenda, alterum quidem cum altero copiosius, aut parcius. Vbi igitur restringendi indicatio, eam quæ vacuandum seu digerendum esse suadet, superabit, augenda restringentium vis erit. Vbi verò plus vacuandum quàm restringendum erit, digerentium seu discutientium ac exiccantium materia, & facultas præuallere in mixtione debet. Porro maiorem restringentium vim miscendam esse ostendit tum copiosior fluxio, tum parcius in affecta parte materia. Contra, exiccantium ac digerentium vberiorum modum adhibere oportet, vbi copiosior materia locum obsidet, & fluxio minor est. In inueterato autem œdemate, & quod non adhuc in gignendo est, non amplius hæc curandi ratio, mistam facultatem quasi scopum habente, sed ad digerendam difficandamque materiam declinante vtendum erit. Quod & in omnibus ferè diuturnis affectibus obseruandum est. Cæterum œdema quod symptoma est periculosos affectus sequens, vt tabem, aquam intercutem, & vitiatum corporis habitum, quem Græci cachexiam vocant, nullam seorsum (vt supra diximus) propriam, præcipuamque curationem desiderat. Curari enim, nisi affectu ex quo nascitur, profligato, non potest. Aliquid tamen ex eo remittendum est, si quidem vires demoliantur, aut primum affectum augeat, aut curationem impediat. Satis ergo fuerit, si quidem curatione egebit, ipsum tumentem locum perfricare, aliàs oxyrhodino, aliàs oleo cum sale, aut etiam oxyrhodino salem habente. Eiusmodi enim frictio tumorem remittit & dolorem, si ex nimia distensione

Oedematis inueterati curandi ratio.

Oedematis vt symptoma est curatio.

sione, (vt aliquando contingit) excitetur, demulcet.

Oxyrhodinon fluxionem arcet, oleum cum sale vim habet digerendi, & vacuandi quod impactum est: oxyrhodinon verò, cui sal admixtum est, partim digerit, & exiccat, 5 partim restringit, & humorum affluxum prohibet. Sed præmissa hac vniuersali methodo, ad propriam ipsius legitimi oedematis, quod ex tenuis pituitæ influxu ortum habet, curandi rationem, sermonem conuertamus. Hæc autem in rebus quatuor (sicuti de phlegmone & erysipelate dictum est) posterioris huius ætatis chirurgis, cõsistit. 10

Nempe, in debita viuendi ratione, in pituitosi humoris præparatione, quam æquationem vocant, & eiusdem expurgatione: influxi & iam particulam occupantis humoris, repressiõne, dissolutione, & exiccatione, & postremo in symptomatum seu accidentium ipsum oedema consequentium correctione & summotione. Hæ itaq; sunt 15 quatuor intentiones particulares, quibus duas illas generales suprapositas indicationes assequimur. Prima igitur intentio perficitur, debita ac congrua sex rerum non naturalium administratione. 20

Porro, ritè ac commodè, res ipsæ non naturales corpori laborantis adhibebuntur, si ad caliditatem & siccitatem, cum quadâ attenuatione, declinauerint vniuersæ. Ergo tenuem & siccum aërem deligito, præparatõe. Vinũ de- 25 scætarum, pellucidum, album, vel subrubellum (quod claretum vocant) in suo genere optimum, & modicè aqua dilutum, in potu assumito. Panis probè coctus, & ritè præparatus esto. Carnibus ouillis, aut ex montanis & campestribus auiculis lubens vescitor, iisque assis potius, 30 quàm elixis. Iusculis, oleribus, & offis parcè vtitor.

Ab azymis, id est, non fermentatis, crudis quoque & præhumidis, abstineto. Legumina, caseum, fructus præfertim horarios & immaturos, pisces quoque (nisi forsaxatiles, eosque vel assos, vel vino incoctos) ne gustato. Assa in vniuersum meliora sunt elixis, & iis quæ pisto- 35 ris industria præparantur. Parum comedito, ac minus bibito. In summa vitæ luxum, atque ingluuiem fugito. Si alius non responder, eam ficibus & carthamo soluito. Ergo ficus aridas quinque vel sex numero accipito, easq; medulla seminis carthami impleto, & manè vel pri-

1 Quatuor
2 scopi par
3 ticulares
in curan-
do legitimo
4 oedema-
te obseruā-
di.

1 Prima
intentio.

Aër.
Potus.
Cibus.

Repletio.
Inanitio.
Motus.

Somnus. ma mensa comedito. Corpus moderatè exerceto, si ta-
Balneū. men particula laborans citra noxam id admiserit. Som-
 2 nus brevis esto. Balneum atque omnia humectantia pror-

Secunda in tus vitato. Secunda intentio completur preparantibus seu
tentio. æquantibus (quæ vulgò digestiua vocant) & vacuantibus
 materiam illam pituitosam, qua scater corpus laborantis.
 Ergo genus aliquod oxymelitis offerendum est, quod pi-
 tuitam in corpore delitescentem possit incidere & deter-
 gere. Deinde preparata hoc modo expulsionì antecedens
 materia, medicamento aliquo phlegmagogo, id est, pitui-
 tam expurgante, experiti alicuius medici præscripto va-
 cuanda est. Quod si (inquit Guido à Cauliaco) pletho-
 ra adesset, tutò vena aperiri posset: non citra tamen peri-
 ti alicuius etiam medici consilium. At vix vnquam in
 corpore plethorico visuntur œdemata saltem legitima. 1
 Nam in eo non magis pituita, quam ceteri humores a-
 bundant. Proindè vix sola, & non aliis humoribus remix-
 tā, in particulam aliquam corporis plethorici influere po-
 test. Quare venæ sectio in œdemate saltem legitimo ne-
 quaquam ex vsu esse videtur. Tertia intentio perficitur 2
 3 *Tertia in-* in principio, ad motis repercutientibus: non iis quidem
tentio. quæ natia sua frigiditate vehementer stringendo repel-
 lunt, sed quæ non inualidè siccandi, & modicè digerendi
 vim habeant: ea aggregantia exiccationem & resolutio-
 nem vocant. In augmento verò discutientibus paulò for- 2
 tioribus. At in statu, circa eius finem præsertim, & itata
 iam fluxione, puris, iisque fortissimis digerentibus seu re-
 soluentibus. In declinatione autem absumentibus & exic-
 cantibus, si resolutione saltem terminari debeat. Si verò
 degeneret in abscessum, quem exituram vocant, maturan- 3
 tibus, & reliquis quæ in curandis abscessibus proposita
 sunt auxiliis, curabitur.

Auxilia in Porro auxilia reprimentia, siccandi simul & digerendi
principio & facultate prædita, quæ competunt initio œdematis ex pi-
dematis ad tuitosi humoris influxu creati, tribus præsertim formulis 3
movenda. comprehenduntur. Prima est Galeni libro decimoquar-
 1 to Therapeutices, & secundo ad Glauconem, vbi inquit,

Posca aquo At si ex pituitoso humore in particulam influente œde-
sa, ma constitit, abundè aliquando satisfacit sponsia, quæ ex
 aqua, in qua sit aceti aliquid, maduerit. Porro hæc ita at-
 tempe

- » temperabuntur, vt vel bibi possint: vel vt non multum su-
 » præ hoc aceti habeant. Deligare verò spongiam debebis,
 » ab inferiore parte incipiens, ac suprà finiens. Esto au-
 » tem spongia modò conductura sit, omnino noua. Huius
 5 si occasio non est [hoc est, si nouæ copia non sit] hanc de-
 » tergebis, expurgabisq; exquisitè abluendo nitro, & aphro-
 » nitro, & aqua lixiua. Auicennas iubet, vt loco spongiæ ali-
 quando admoueaturn pannus lineus duplex, aut quid simi-
 le. Secunda formula est ipsius Auicennæ. Recipit autem
 10 aquæ decoctionis baurach, id est, nitri vel spumæ nitri, &
 cinerum, & aceti, ana, quantum satis esse videbitur. Tertia
 formula est à Raze descripta ad hunc modû, Recip. aloës,
 myrrhæ, lycij, acaciæ, sief memithæ, id est, de glaucio, cy-
 peri, croci orientalis, boliarmenici singulorû partes æqua-
 15 les: pulueriscentur, & cum succo caulium, hoc est brassica-
 rum, & aceto misceantur: & fiat emplastrum. Porro ea-
 dem nuper commemorata auxilia, in huius œdematosi tu-
 moris incremento, etiam bene faciunt, adiecto saltem illis
 aceto copiosiore, vel modico alumine, in corporibus præ-
 20 sertim robustioribus, & cutem duram habentibus, atque
 vbi aquosior posca non profuerit. Ergo si sub his paulò
 antè memoratis auxiliis œdema non subsidat, quiescatve
 vbi rursus deligabis, paulò plus aceti miscebis, vt posca va-
 lentior sit: vel pusillum aliquid aluminis coniicies, ac no-
 25 uam spongiam admoue bis. Hæc enim & copiosum medi-
 camentum excipit, diùque continet, & sua substantia affe-
 ctam partem exiccat. Si nouæ copia non sit, melius est, in-
 quit Galenus eo, quod vulgus vocat elychnion vtare. Id
 verò ante omnia nolle esto: quod genus Tarsicum est, cu-
 30 ius si facultas est, audacter vtitor: vtilius enim experiere,
 quàm spongiâ. Madeat verò ex pusca, quæ & aliquid ha-
 beat, aluminis. Tunc (vt præscriptum est) deligetur, ab in-
 feriore sursum: hoc est, ligatura incipiat in imis partibus
 & desinat in altioribus. Sit autem arctatio mediocris, ve-
 35 lut in ossis fractura. Ac primæ quidem iniectiones fasciæ,
 quæ scilicet infernè incipiunt, magis arctandæ, quæ de-
 inceps sunt, sensim remittendæ: ceterum non adeò, vt la-
 xa sit aliqua deligationis pars. Remedia autem, quæ post
 vigorem status, vbi iam constitit fluxio, & in declinatione
 vniuersali admouenda sunt, si œdema tendat ad resolutio-

2

3

Emplastrum
Razæ.

Remedia
incrementi
tempore ad-
mouenda.

Libr. 14.

Therap. 6.
2. Ad Gla.

nem, sub triplici etiam formula describi solent.

Statu & declinatio- nis remedia Prima est Auicennæ: nempe spongia imbuta aqua lixi-
Spōgia lixi- uis remedia ua, ex cinere fici, vitis, & illicis, quæ species est quercus: &
nis imbuta. particulæ admota: siquidem huic magna vis inest exiccan-
 di, ac detergendi.

Linimentū. Secunda est Bruni, quam & vsurpauit Thodoricus. Re-
 cipit autem aluminis sulphuris, myrrhæ, & salis, singulo-
 rum pares portiones: miscentur hæc omnia cum rosaceo,
 & aceto, & fit linimentum, quod præcedenti remedio po-
 tentius adhuc exiccat.

Emplastrū Auicenn. Tertia rursus est Auicennæ, cuius descriptio est talis:
Vsnea quid Recipe stercoris vaccini, libræ semissimem, olibani, styracis,
 vsneæ, id est, musci arborum, qui Græcis bryon dicitur, ca-
 lami aromatici, spicæ, absynthij, singulorum semunciam:
 confice omnia cum aceto, & decocto caulium, siue brassi-
 cæ, & fiat emplastrum. Atque hæc quidem ratio est curan-
 di œdematis, quod resolutione terminatur. Si verò dige-
 stioni non cedat, sed ad suppurationem spectet, vnguen-
 tum è succis, diachylon nominatum, atque id maximè,
 quod à Rogerio compositum est, perquam vtiliter apponi-
 tur. Ad id etiam confert vel magnoperè & sequens empla-
 strum, quod recipit maluam, brancam vrsinam, (vel, si ma-
 uis dicere hircinam, quæ & achantus, & achanta dicitur)
 radicem althææ, radicem lilij, cæpas assas, limaces, fermentum,
 & semen lini, cocta, & subacta, & cum axungia vel
 butyro mixta, rediguntur in formam emplastri seu potius
 cataplasmatidis Aliud ad idem summè efficax. Accipe succi
 ebuli, sambuci, oxylapathi, quod nostrates officinæ lapa-
 tium acutum nominant, leuisti, seu ligustici, & marathri:
 ex horū singulis quantum lubet, pari tamen pōdere deinde
 vt oportet coquito vnā cū dialthea, melle, oleo, & butyro,
 atque ex iis cataplasma conficito. Maturato apostemate,
 non expectetur, donec spontè aperiatur: quoniam tardè
 admodum, vel fortasse nunquam id contingeret: sed ferro
 cādente, aut caustico aliquo medicamēto fiat apertio, qua
 pus excernatur, iuxta modū & formā superius expressam.

Hoc ad Theodoricū refertur.

Apertio.

Deinde sordes detergeantur, vnguento vulgò Apostolorū dicto, vel mundificatiuo ex apio, & succo absinthij, vel vnguento subscripto, quod pus crassioris substantiæ attrahit, & mūdificat. Accipit autem id galbani, ammoniaci, resinæ terebin

terebinthinæ, picis, sepi vaccini, olei antiqui, ana partes æ- *Vnguentū*
 quales: dissoluuntur gummi ex aceto, & liquefunt ad ignē *mundifica-*
 cum reliquis, & fit vnguentum. Post hæc verò similiter re- *tiū quod*
 liquis vlceribus sordidis curetur. Cæterum quartam inten- *ad Dium*
 tionem assequimur, pro ratione & natura accidentium su- *refertur.*
 peruenientium, vt si accidat dolor, imprimis sedâdus erit, *4*
 admota (iuxta Auicennæ doctrinam) æsipo humida: vel *Quarta in*
 vino cocto, vel cerato composito ex oleo chamæmelino, *tentio.*
 oleo de absinthio, oleo de spica, & cera. Si verò durities ad
 fuerit dissoluenda, atq; emolliēda est, medulla bubula, vel
 ceruina, vel quapiā alia simili, vt in sequentibus dicerur. *Lib. 2. Ad*
 Galenus autem in diuturno œdemate partē oleo liniens, *Glauc.*
 spongiam ex lixiuio apponebat, atque stringens arctius, *Oedemati*
 affectum perfectè curabat. *inueterato.*

15 *Capita curationis œdematis.*

Oedemati quod symptoma est, hoc est, accidens aliis *1*
 morbis superueniens, vt aquæ inter cutem tabi, & ca- *Oedema*
 chexiæ, medicamenta, quæ discutiunt, & sine molestia de- *morbi acci-*
 ficcant adhibeto. *dens.*

20 Ergo tumentem locum oxymelite, vel oxyrhodino, aut *2*
 oleo cum sale, aut etiam oxyrhodino salem habente per-
 fricato. Hac enim frictione & dolorem (si quis ex disten-
 sione excitetur) mitigabis, tumorem remittes.

Oedemati verò ex tenuis pituitæ influxu excitato si nō- *3*
 dum restitit fluxio, medicamenta quæ partim digerant, *Oedema*
 partim verò cogant, restringantque admoueto. *morbus.*

Ergo spongiam nouam, vel aliam lixiuio ablutam, ini- *4*
 tio posca dilutiore in mollioribus præsertim corporibus ma-
 dentem alligato, vinculâque (si artus tumor occupet) ab
 30 inferiori parte ad superiorem, vt in fracturis, ducito & me-
 diocriter constringito.

Quod si per hæc tumor nō remittitur, subsideatve, po- *5*
 sca, id est, oxycrato, aluminis momentum adiucito.

At si iam in vetustatem affectus inciderit, non amplius *6*
 35 remedia mistam hanc facultatem (digerentem scilicet & *Oedema in*
 restringentem) habentia: sed digerentia ac disseccantia *ueteratū.*
 potius adhibeto.

Igitur, parte oleo prius iuncta, spongiam qualem su- *7*
 præ diximus, lixiuio delibutam, imposito, ac fascias ar-
 ctius deligato.

*De tumoribus præter naturam, qui inflationes dicuntur
Latinis, vulgò autem apostemata ventosa.*

CAPVT XI.

*Inflationis
& œdema-
tis differen-
tia.*



Vnc tempestiuum est, vt de inflationibus dis-
seramus, quibus diuersa ab œdematis curatio
est. Illa namque: vt Galenus ait libr. 14. The-
rap. ex pituitoso succo ortum habent: proin-
de prementibus nobis cedunt, digitique ad-
modum altè in ipsa descendunt. Inflationes verò, ex fla-
tuofo spiritu collecto nascuntur, aliàs sub cute, aliàs sub
membranis, quæ ossibus circundantur, aut musculos, vi-
scerumve aliquod includunt. Porro colligitur aliquan-
do non parum etiam in ventriculo & intestinis: itémque
in medio spatio horum, & peritonæi: vt in aquæ (inquit
Paulus) subtercutem genere, cui nomè est tympanias. Dif-
ferunt quoque hæ ab œdematis quòd & pressè digitis non
retinent vestigium, & sonitum veluti tympanum reddunt:
itémque quòd in cauitate sensibili subinde continentur,
atque hac nonnunquam maxima. Causa huiusmodi in-
flationum est caloris natiui imbecillitas, in materia pitui-
tosa, ad flatum excitandos disposita. Calor nanq; eiusmodi
fuscitare quidem vaporem ex humida materia potest, sed
non discutere. Quèadmodum enim (inquit Galenus) in
externis rebus videmus, vt frigidissima constitutio, maxi-
mè spirante Borea, aërem sereniorè reddit, ac calidissi-
ma per æstatem constitutio ambientem nos aërem purum
efficit, mediæ verò constitutiones nebulas pariunt, ita in
animantibus accidit. Neque enim calor per extremam
imbecillitatem, neque cùm vehementes sunt ei vires, sed
cùm medium inter has affectiones obtinet, flatum gigne-
re potest. Retinetur autem flatus eiusmodi in loco quo-
piam (vt dicit Auicennas) vel propter densitatem, seu spis-
situdinem membri, vel propter ipsius vaporis seu spiritus
crassitiem. Quod & iis verbis Paulus ex Galeni senten-
tia testatus est. Membrorum (inquit) densitas, cum spiri-
tus simul crassities efficit, vt idem spiritus non dissipetur.

De signis & iudiciis inflationum.

*Inflationis
nota.*

Signa inflationum sunt, tumor renitens tactui, cū luci-
do quodā splendore, sonū vt vter: vel tympanum, dum
percu

percutitur reddens. Adhæc persæpè sentitur flatus per totum corpus, modò huc, modò illuc discurrens, ac dolorem extensuum pariens. Quòd autem ad iudicia pertinet, flatulentus seu vaporosus spiritus qui non discutitur, multa parit incommoda. Halituosus verò huc atque illud per corpus discurrens cum dolore & anxietatibus magnoperè vendendus est. Quippe qui à materia aliqua venenosa attolli videatur.

*Inflationis
prognostica.*

De inflationum, seu flatulentorum tumorum curatione.

¶ **C**um tria hæc, materia humida, caloris imbecillitas, & meatuum densitas, ad inflationis generationem (vt in præcedentibus ostensum est) concurrant, curationis ipsius scopus erit, caloris substantiam roborare, vaporem seu flatulentam materiam extenuare, & meatus corporum (in quibus vaporosus ille spiritus collectus continetur) densitatem recludere. Porro posteriora duo, nempe densi corporis rarefactionem, & crassi spiritus extenuationem, iisdem omninò auxiliis assequimur, medicamentis scilicet tenuitate partium pollentibus, siue extenuantibus, & calfacientibus, magis aut minùs, pro partium inflatione afflictarum densitate, vel raritate, & vaporum quoque crassitudine, vel tenuitate. Pro horum namque differentia facultas medicamentorum quæ admoventur, intèdi ac remitti debet. Itaque raræ partes, & vapor seu spiritus non admodum crassus, minùs: densæ verò, & vapor multa crassitie præditus, magis extenuantibus, & calidis egent. Caloris autem substantia, si periit, aut imminuta est, pro ratione iacturæ eius, refarcienda erit. Si verò alterata fuerit, ad mediocritatem reducenda. Quòd si vnà dolor excruciet ad anodyna transfundendum erit. Non absurdè igitur, inflationum (quas ventrosa apostemata vocant) curationem tribus intentionibus perfici dixerunt posterioris nostræ ætatis chirurgi: prima in debita viuendi ratione, secunda in proba cõcoctione, & tertia in flatulenti spiritus, qui in particula collectus est, discussione consistit. Itaque vitæ institutio talis erit, Abstinendum imprimis ab omnibus crassis, viscosis, crudis, pituitosis, & flatuosis. Cuiusmodi sunt, dulcia, legumina, fructus crudi, rapum, castanæ, & alia id genus, quæ spiritum flatuosum procreant. Utendum autem calidis & siccis: item attentantibus, & flatum discutientibus, vt est panis hor-

*Inflationis
curatio.*

*Tres scopi
curandarum
inflationum.*

I
*Prima intentio.
Cibus.*

deaceus,

Potus.

deaceus, qui aliquid salis & cumini receperit. Laborantis potus sit vinum album, vel subrubellum (quod claretum vocant) aut vinum Græcum. Utatur decocto cicerum alterato cum cepis, apio hortensi, quod vulgò petroselinum appellatur, calamintha, ruta, & cumino. Carnes sint assæ potius, quàm elixæ, & præsertim ex volatilibus, ut in præcedenti capite dictum est. Ut autem secundam intentionem

2

Secunda intentio.

assequaris, roboranda tibi est virtus concoctrix bonis quibusdam speciebus aromaticis, & confectionibus, atque (ut vocant) electuariis ad hoc dicatis, ut sunt, diacuminum, diacalaminthe, aromaticum rosatum, & sequens confectionio, quam dragetam appellant. Recipe anisi, maratri, carui, dauci, cymini, baccarum lauri, tritorum, singulorum vnciam vnam, glycyrrhizæ, quam liquiritiam vocant, galangæ, zingiberis albi, singulorum semunciam, charyophyllorum, cubebarum piperis longi, seminis rutæ, singulorum drachmas duas, anisi saccharo incrustati, quadrantem, id est, vncias tres, sacchari selibram, fiat pulvis. Extrinsecus verò inungatur ventriculus oleis de spica, de costis, & ruta: vel fiat epithema, quod ea recipiat, quæ & flatus discutunt, & iuuandæ coctioni dicata sunt, atque hoc stomacho admoueat. Sed hæc ad medicinam magis, quàm chirurgiam pertinent.

3

Tertia intentio.

Tertia intentio completur medicamento, cui mixta facultas sit, hoc est, quod simul concoquat, digerat, & modicè adstringat, nec dolorem augeat. Ad hæc autem consequenda instituuntur tres formulæ auxiliorum, lib. 14. Therap. Prima ad hunc modum posita est à Galeno.

1

*Ad inflationem ex co-
tusione in artubus mus-
culis, &
mēbranis,
quæ ossa cō-
tugunt.*

In artubus (inquit) & musculis, qui sub cute aut etiam membranis, quæ ossa vestiunt, inflatione orta, si citra dolorem sit, liquor aliquis tenuissimarum partium, cuiusmodi est lixiuium noua spongia exceptum, satisfecerit. Sin dolor quoque vrget, vngenda pars est oleo, quod relaxandi, remittendique vim habeat. Incidunt porrò ex percussionebus eiusmodi affectus, vbi vel musculus, vel mēbrana quæ os circuit, est contusa. Ac super membranam quidem quæ os ambit, antedicta imponenda est spongia.

*Ad muscu-
los cū infla-
tione dolen-
tes ex con-
tusione.*

Secunda formula ibidem ita descripta est. Ad musculos verò (namque hi aliquando dolent) medicamentum quod magis mitiget, est adhibendum. Quò fit, ut ad hos solo hi-

„xiuius non vtantur, sed immiffa ei tum fapa, tum pauculo
 „oleo. Satius autem fuerit in principio, non ad didiffè lixi- *Sapa.*
 „uium, fed fapa cum vino & exiguo aceto vti, ac quod me-
 „diocre fit, olei ad iicere. Vbi mixta funt, modicè excalface-
 „re, ac lanam non lotam, quam fuccidam vocant, ipfis imbu- *Lana fucci*
 „tam imponere. Quòd fi eiusmodi lanæ facultas non fit, *da.*
 „ipfius æfypus, miffellæ fupradictæ eft iniiciendus. Vbi verò *Æfypus.*
 „æfypus præfò non eft, aliquid cerati, quod ex æfypo com *Cerati ex*
 „ponitur, rectè admifcueris. Debent enim contufi mufculi *æfypo.*
 „leniri medicamento cui mixta facultas fit, quippe quæ fi-
 „mul concoquat, digerat, & modicè adstringat. Quandò fi
 „nihil habet adftrictionis, auget quando phlegmonas, ac
 „maximè in iis corporibus, quæ funt plethorica. Ergo trium
 „iam comprehenfum indicationum [concoquendi fcili-
 „cet, digerendi, & modicè astringendi] in inflatis ex plaga
 „mufculis memor, vbi dolor maior vrget, mitigatiua magis
 „ratione vteris: [plus olei & vini ad iicendo] vbi abeft, ma-
 „iore vi inflabis. Maiorem vim intelligo, cum breui via pro-
 „peratur ad finem. Porro brevis via fit, per ea quæ valentes

20 habent vires. Hæ autem maximè in lixiuius & aceto haben-
 „tur, poft hæc in vino. Quoties igitur de mitigando non la-
 „boras, horum. [lixuius inquam & aceti] plus in mixturam
 „cõiicies. Rurfus vbi repellere ftudes: vini plus quàm horum
 „immittes. Porro id optimum in hunc vfum fuerit, fi nigrũ
 25 aufferũq; fit. At fi digerere males, lixiuius plus indes. Ace-
 „tum verò fi his mifcebis, ad ambo vtiles erit mixtura, pro-
 „pterea quòd acetum mixtas habet facultates. Vbi verò mu-
 „fculus fine dolore eft, licet fanè in lixiuius penuria, pro ea
 „aphronitru immittere. Efto autem id minimè lapidofum,
 30 fed magis fpumofum. Tertia formula eft emplaflicũ, quod

„quarto. Therapeu. Quæ verò huius generis inflationes ne
 35 glectæ inueterarunt, primo quidem loco his, ea quæ ex li-
 „xiuius componuntur (vt prædictum eft) adhibeas. Secun-
 „do loco emplaflicum aliquod. Dicam autem & horum
 „exemplum. Strigmenta gymnafiorum feruefacta, perco-
 „la primũ, fic vt pura fint: deinde rurfum in cacabum
 „immiffis, calcem viuam in farina fpeciem tufam in fper-
 „ge, ad

*Aceti, vi-
ni, & lixi-
uij collatio.*

*Pro lixiuius
aphronitru*

*Si inuetera-
uerit infla-
tio.*

*Si flatuosus
spiritus ve-
nenatus
fuerit.*

ge, ad luti vsque crassitudinem. Salutare his est & medi-
camen, quod ex sycomoro componitur, aliâque id ge-
nus. Cæterum si huiusmodi flatuosus spiritus, qui infla-
tionem committit, fumosus fuerit, malus, corruptus, à
materiâque venenosa excitatus, cum dolore intolerabili,
& vehementi calore, per membra discurrens, nullum tu-
tius ac melius consilium dari potest, quàm quod ubi in
parte quapiâ subsisterit, pars ipsa protinùs infra supràque
deligetur, ac in medio nouacula, vel ferro candente tu-
mor aperiat, ita vt facilè vapor ille venenosus egredi
possit. Deinde hians plaga, implenda erit aloë, & bolo
armenia, ex rosaceo & æro dissolutis. Transactis verò
diebus tribus, aut quatuor, vulnus carne opplendum erit,
& ad cicatricem perducendum. Porro in venenosis eiu-
smodi inflationibus, victus ratio tenuior esse debet, egétque
corpus medicamêto purgatorio. Quòd si theriace fumen-
da daretur laboranti, rectè illi consultum esset.

*Victus ra-
tio.
Theriaca.*

Capita curationis tumoris flatulenti.

- 1 **I**mbecillam caloris affectæ partis substantiam roborato, deperditam instaurato, alteratam ad mediocritatem reducito.
- 2 Vaporosum seu flatulentum spiritum crassiores, vnde tumor eiusmodi suscitatus est, extenuato.
- 3 Densatos cutis, ac totius laborantis particulæ, meatus, medicamentis tenuitate partium pollentibus, recludito: deindè flatuosum spiritum discutito.
- 4 Pro locorum autem affectorum differentia, & vaporis ipsius flatuosi crassitudine vel tenuitate medicamêtorum quæ admoventur, tum materiam, tum facultatem intendo, ac remittito.
- 5 Porro si cum dolore & inflammatione tumor eiusmodi flatulentus inciderit (vt contingit in musculis ob cõrusionem flatu repletis) mitigatoria initio admovento: procedente verò tempore, quæ discutiendi vi polleant, eorû copiam paulatim augendo, adhibeto.
- 6 Inflationes quæ ob negligentiam antiquatæ fuerint, pri-
mò quidem lixiuio foueto, deinde emplastrum quodpiam
ex his quæ molliunt, & discutiunt, admovento.

De tumore

De tumore è serosa substantia creato, quod aquosum apostema nominant. CAP. XII.



Ituitam, si per vniuersum corpus increuerit, ea species aquæ intercutis, quam leucophlegmatiam vocant, comitatur, vt Galenus annotauit libro sexto de symptomatum causis.

Leucophlegmatia.

Cùm verò in vna duntaxat parte pituitosa

Serosum recrementum.

hæc substantia redundat, œdema enascitur: ita enim ap-

pellant tumorem laxum, ac doloris expertem. Serosa autem excrementa si abundant, aquam intercutem (quam ascitem nominant) generare solent. Quæ si in vnam aliquam partem incubuerint, in ea phlyctænas, id est, pustulas excitant. Porro serosum eiusmodi recrementum, rec-

Phlyctæna

centiores aquosum phlegma nominare consueuerunt.

Quemadmodum etiam & pituitam illam, quæ reperitur in pedibus & cruribus eorum, quos aqua inter cutem vexat, & in tabidis, & aliis qui malo habitu (Græci cachexiâ vocant) laborât. Ad hæc, tumores ex huiusmodi aquoso phlegmate, aut seroso iam dicto recremento procreatos, il-

legitima ac non vera œdemata vocitant. Cæterum in periculosis illis dispositionibus seu affectibus, tabem quâ, hydrope, & cachexia, œdema (vt superius ex Galeni sententia dictum est) symptomatis, ratione obtinet, non morbi: nulla quidem propria præcipuâque curatione indigens. Sola

enim frictio ex oxyrhodino, aut nonnunquam ex sale & oleo, vel etiâ ex sale & oxyrhodino, sistit ipsum, aliâque huiusmodi multa. Horum autem tumorum causæ sunt, alteratrix facultas frigida intemperie vitata, & alimentorum prauitas, ad aquositate declinâs, vt ex libro sexto de symptomatum causis facile est colligere. Signa & iudicia fere

Libro 2. ad Glauco. & 14. liber. Causa tumoru aquosorum.

eadem sunt, quæ & veri œdematis. Hoc tamen differunt, quòd in istis aquosis tumoribus latus magis tumor est, quàm in œdemate legitimo: atque ideo non tantum renititur actui, sonâtque non vt flatus, sed vt aqua potius. Ad

Aquosorum tumoru nota.

hæc aliquo modo splendere videtur, cùm ad lucem quis ipsum intuetur. Quod verò ad huiusmodi tumoris iudicia attinet, aquosus haud dubiè tumor à maiori enascitur frigiditate quàm flauosus, vt Galenus autor est, cômētario vndecimo libri quarti aphorismorû, super huc aphorismum: Quibus tormina, & circa vmbilicum labores &c.

IUDICIA.

Videtur

Afcites à Videtur autē (inquit) à maiori frigiditate generari aquo-
maiore fri- sus hydrops, quem ascitem vocant : à minore verò tym-
gduae ge- nias, quæ ab Hippocrate aqua inter cutem sicca nomina-
neratur, tur. Neque enim humida substantia in flatuosum aërem
quàm tym sine calore aliquo potest transmutari. Tumores præterea
panites, aquosi sæpius in pedibus, testiculis, scroto, capite, & iun-

2 cturis accidunt, quàm in aliis quibusvis corporis parti-
Quas par- bus : tum quòd humor eiusmodi in eas partes promptius
tes maxi- irruat, tum quòd caliditas in ipsis modica sit : quippe
mè prehen- quæ procul à calidissimis absunt partibus, vt secundo
dāt aquosi Progn. ait Galenus. Quemadmodum etiam flatuosus spi-
tumores. ritus rarò inuenitur absque humore aquoso, ita vix
 vnquam aquosus siue serosus humor in particula aliqua
 concluditur absque flatu. Hactenus de generatione, cau-
 sis, signis, & iudiciis aquosi tumoris nunc de curatione.

Aquosi tumoris curatio.

Curadi a- **C**Um aquosi tumores, ex serosi (vt diximus) recremēti
quosi tumo- fluxione excitentur, non alia certe curandi via & ra-
ris duplex tione saltem vniuersali, in illis profligandis vtendum est,
indicatio. quàm ea, quæ in aliis supra memoratis tumoribus, qui ex
 humorum in partem aliquam influxu procreantur, persan-
 andis, à nobis supra explicata est. Duplex igitur curandi
 indicatio per initia in eiusmodi tumoribus erit: nempe va-
 cuandi quod influxit, & fluxionem inhibendi. Quocirca
 & composita fuerit de talibus affectibus, veluti & de reli-
 quis morbis omnibus, quicunque in generatione adhuc
 sunt, medentis sollicitudo, ex ea scilicet quæ curat, & ea
 quæ prouidet. Itaque prima indicatio ei medicinæ artis
 parti subiicitur, quæ morbos curat, secunda verò ei parti
 subiacet, quæ futurum morbum præcauet. Porro vt ge-

Quinque minum hunc scopum vniuersalem assequamur, aliis quin-
particula- que particularibus intentionibus est opus, à nostro Gui-
res inten- done à Cauliaco in curatione tumoris aquosi hoc ordine
tionem cu- & modo qui sequitur expressis. Prima in proba vitæ in-
radī aquo- stitutione atque obseruatione consistit. Secunda in conco-
si tumoris. ctionis emendatione, seu (vt ait) rectificatione. Tertia, in
 1
 2 aquosi humoris per alium expurgatione. Quarta, in eiuf-
 3 de serosi recremēti per vrinarios meatus educatione, Quin-
 4 ta & vltima, in cōiunctæ (vt loquuntur) seu cōtente in par-
 5 ticula humiditatis aquosæ, euaporatione, atq; exciccatione.

Cæterum

Cæterum cum primæ quatuor intèriones magis ad medicum spectent, quàm ad chirurgum, quem hoc opere instituendum suscepimus, atque etiam ex iis quæ in præcedentibus dicta sunt, satis innotescant, consilium fuit, tantum de postrema, quæ topica desyderat auxilia, hoc loco agere.

Quinta igitur intentio perficitur cum exiecatibus & resoluētibus huiusmodi aquosas ac serosas humiditates, quæ in particula laborante cōtinentur. Horum autē tres communiter formulę statuūtur. Prima est Galeni libro secundo ad Glauconem & decimoquarto methodi medendinē, nempe quæ cōstat oxyrhodino, & sale, vt superius dictum est. Secunda est eiusdē, spongia scilicet noua, lixiuio perfusa, & reliqua alia auxilia, quæ suprā ad œdemata scripta sunt. Quibus vt potentius exiccent, & discutiant, addēda sunt, aphronitrū, alumen, & sulphur. Tertia formula est cuiusdam emplastri, ab Auicenna descripti in curatione scrofularū, quod Galeno attribuit in libro de cōpositione medicamentorū *ἡ ἑξήκοντα*. Hoc autem (vt ille prædicat) intra hebdomadā vnā ad summū, plerumque verò intra triduum omnē duritiem resoluit. Porro tametsi emplastrum hoc apud Galenū lib. nuper citato nō reperiatur, eo tamen cōmodē vtī possumus ad aquosam & flatuosam duritiem dissoluendā: eius autē descriptio talis est Auicennę: *Emplastrū*
 Recipe seminis sinapis, seminis vrticæ, sulphuris, spumę *Auicenna*
 maris, aristolochiæ [rotūdæ] & bdellij ana vnciā vnā, am- *discutiens*
 moniaci, olei antiqui, & ceræ, ana vncias duas. Quod si *aquosos tu-*
 hoc emplastro nō discutitur, non aliud auxiliū melius ac *mores.*
 præsentius excogitari potest, quàm vt ferro aperiatur, dein de detergeatur: & aliorū sordidorū vlcerū more curetur.

30 *Capita curationis aquosi tumori.*

Vistum attenuantem, calfactorium, & desiccatorium laboranti instituito.

Vt corpus moderatē exerceat, parcē edat & bibat, non multum dormiat, ventrēmque & vesicam sæpius ad excretionem exuscitet, imperato,

Vt probē alimēta concoquat, & status minimē gignat, curato.

Serosas humiditates, quibus laborantis corpus scatet vniuersum, per aluum, & virinarios meatus expurgato.

Serosum illud recrementum, quod in affecta parte con-

tinetur desiccato, & per halitum digerito.

- 6 Quòd si discuti non possit, scalpellum vel potius igne candens ferramentum in tumorem, si artus occupet, adigito, atque eum parte procliuiore (quò facilius inde humor emanet) referato.
- 7 Humore qui tumorem committebat, per emissarium vacuato, reliqua quæ ad sordidorum, & aliorum cõsimilis naturæ vlcera, curatione pertinent, sine mora perficito.

De glandulæ nodis, strumæ, & cæteris abscessibus, quas excrecentias phlegmaticas vocant.

C A P. X I I I.

Enumeratio abscessuum pituitosorum.



Ræcorum ganglia, chærades, id est, strumæ, quas etiam scrofulas vocant, bronchocele, quod bocium, & herniâ gutturis nominant, melicerides, steatomata, & atheromata: ad hæc testudo, talpa, & naçta siue napta, tumorum nomina à recentioribus medicis inuenta, & nusquam

apud antiquos reperta: ite fugille Auicennæ: nodi quoque & vulgaris bubo, aliæque id genus multa, quacunque corporis parte nascatur, ferè ex pituita generationem habet: atque ob id ad pituitosos tumores merito referuntur. Cæterum tamen nonnulli ex iis nuper memoratis abscessibus in tophaceam duritiem, & schirrhosos affectus aliquando degenerent, radix tamen & origo illorum parte maiore pituita exitit, ut voluit Auicennas. Quanquam non imus inficias, quin & alius humor ipsi pituitæ, cuius eiusmodi abscessus propriè soboles sunt, interdum admisceatur, atque ita cõpositi & heterogenei nascantur abscessus. Verum de simplicibus solum nobis hic sermo erit, ex quorû analogia compositorum etiam cognitio facile habebitur.

Simplicia sunt regula cõpositorum.

Hæc enim ad illa veluti ad quosdam certos canones, semper adigenda sunt, ut alibi quoque diximus. Itaque prædicti omnes tumores sub genere abscessuum pituitosorum, seu (ut vulgariû chirurgicorum more loquar) excrecentiarum phlegmaticarum, reponuntur, habentque speciales quasdam inter se differentias, ut ex sequentibus patebit.

Glandula. Glandon.

Glandula enim (ut Guido putauit) à glâdis forma, quam præ se ferre videtur, nomenclaturam accepit: estque (inquit) utcunque mollis, vnica, mobilis, & separata à partibus circumiacentibus: in emunctoriis plærunque nascens. Auicennæ

cennæ autem glandulæ nascuntur vel in manu, vel in pede, vel in loco aliquo nervis & tendinibus coniuncto, & has quidem tum vetat extirpari, ne scilicet laborans in spasmum incidat. Eueniunt quoque, ait, summæ volæ manus, & fronti, vocatque eas modò apostemata gládulosa, modò nodos. De iis enim inconsideratè tractat in diuersis capitibus, vtpotè in capite de nodis ad finem, & capite de glandulis. Itaque videntur glandulæ Auicennæ diuersæ esse à glandulis Guidonis, & Græcorum gágliis illis (Auicennæ inquam glandulis) eadè esse. Quod sequentia Pauli verba apertè testantur: Ganglium neruorum còcretio est, ex ictu aut lassitudine oboriens, in pluribus quidem corporis partibus, præcipuè motui dicatis: nempe manu summa, & pedibus. Rarius cubitum & caput occupat Aëtio, ac rarò eidem sponte prouenit. Et rursus idem Paulus lib. 6. cap. 39. quid sit ganglium, vnde nascatur, in quibus maxime partibus proueniat, quæ denique notæ ipsum continentur, aperiens, id ipsum quod diximus, confirmat, inquit. Ganglium nervi est concretio, ex ictu, aut labore proficiscens, plerumque verò in manus iunctura, qua cum brachio committitur, talo & articulamenti absoluitur: quanquam in aliis quoque partibus proueniat. Hæ comites sunt notæ, tumor concolor, renitens, indolensque. At si violenter premas, stuporis sensum exhibet, non in alto, sed ipsa sub cute radices agens, & ad latera spectans: sin autem vi adigas, tum antè, tum post, nequaquam id facit. Hæc autem Philagr. cit. Hæcenus Paulus Aegineta de gangliis. Nunc ad reliquos pituitosos abscessus, sermonem conuertamus.

Scrofulæ à vulgo vocatæ, nihil aliud sunt, quàm indurati, & intra membranulam contenti adenes, id est, glandulæ, in collo, axillis, & inguinibus præcipuè consistentes, ubi glandulæ vasis substratæ collocantur. Nonnunquam tamen, quamuis rarò ex carne eorundem locorum fiunt, quæ affinitatè quadam ad strumarum naturam vertitur, & materiæ adiectione adaugetur, vt visum est Leonidæ: Has Latini strumas vocarunt, à Græcis verò chærades dicuntur, vel à chæradibus quidem petris per marinas aquas transparentibus, vel à suis multiparis animalibus (numerosæ enim sobolis existunt, vt fues) & eo morbo frequenter affectis. Scrofulæ etenim id

Glandula
Auic. que
eadem sunt
cum gágliis
Græcorum.

Glandula
Guidonis dis
fidet à glan
dula Auic
cen. ca. 16.
lib. 4. Gan
glii quid.

Gáglii no-
ta.

Tumor etiã
est in aqua-
ris Philagr.
& Aëtio.

Scrofulæ.

Chærades
Græcorum.

- Struma.*
Cor. Celsi. est, sues, colla habent glandulosa, & magna ex parte strumosa. Struma autem Celso tumor est, in quo subter concreta quædam ex pure & sanguine quasi glandulæ oriuntur. Nascuntur eidem maxime in ceruice, sed etiam in alis & inguinibus, & in lateribus. In mammis quoque forminarum se reperisse chirurgus Meges autor est. De iis etiam Paulus in eum modum: Oriuntur (inquit) strumæ in priori ceruicis parte, aut in altera, aut utrinque una, aut duæ, aut plures. Omnes autem suis membranis includuntur, quemadmodum steatomata, atheromata, & melicerides. *Lupia.* Lupia (inquit Guido) veluti lupulus, mollis rotunda, in locis duris & siccis suam sedem præcipuè deligit, ut in palpebris, & locis nervosis: vulgus Gallicum vocat *me loupe*. Itaque si eius descriptio, atque etiam curatio, quæ in sequentibus habetur, cum ganglij Græcorum descriptione, & curatione conferatur, affectus tibi videbuntur non admodum inter se dissimiles. Verùm magno errore tenentur, qui eiusmodi lupiam eandem faciunt cum affectu, quem recentiores lupum appellant. Est enim lupus malignum vlcus, partes inferiores, sed præcipuè crura infestans, celerrimè depascens, & quasi lupus (à quo nomen accepisse videtur) famelicus, proximas sibi carnes exedens: quod vitium dubio procul de genere est phagedænarum.
- Lupus morbus.* Proindè affectus sunt longè inter se diuersi, quanquàm in nomine quandam affinitatem habeant. Nodus, tanquàm funis nodus, eidem Guidoni dicitur, rotundus, durus, & eodem in loco permanens, circa loca nervosa maxime apparens. Avicennas autem nodos definit alicubi dubelera frigida, facitque hoc nomen genus ad steatomata quæ à nostris adiposi, & adipini nodi nominantur: ad meliceridas, id est, mellitios nodos, & atheromata, quæ materia constant, pultri (quam Græci atheram vocant) simili. Cæterum cum hæc tria abscessuum genera, steatoma inquam, meliceris, & atheroma frequentissimè incidant, ac locis valde multis Galenus eorum meminerit, non abs re factum putauimus, si nactus hoc loco de iis differendi occasionem, eorum naturam, notas quibus agnoscantur, in quibus item inuicem dissideant, & conspirent, latius aperuimus. *Atheroma.* Atheroma igitur, tumor est concolor & indolens, in membrana, seu nervosa tunica humorem len


rem lentum continens, atheræ, id est, pulti similem quæ ex farina decocta conficitur. Interdum quoque in atheromatibus simul cum humore pultaceo, lapidosa quædam, duræque corpora, & alia tanquam sulphurisamenta inveniuntur, nonnunquam veluti mansa gallinarum officula, sæpe etiam tanquam pili complicati tactui occurrunt. Tumor atheromatis, specie & figurâ oblongus, & aliquantum sublatus visitur, qui digitorum appressu ob humoris lentorem & crassitudinem tardè retrocedit, & amoris digitis, tardè quoque regreditur. *Meliceris.*

10 *Meliceris* autem tumor est, simili modo dolore carens, sed rotundus, in quo nervosa etiam tunica, quam cystim appellant, inclusus humor reperitur tenuis, & mellis substantiam repræsentans: vnde & mellisauium Latine quibusdam dicitur. Itaque meliceris ab atheromate differt figurâ, & humoris substantiâ. Nam & figura rotundior est, & humoris substantia tenuior. Proinde melleus hic tumor magis quàm atheroma extenditur, pressuque digitorum celerrimè cedit, & amoris digitis pari celeritate ad situm pristinum redit. *Steatoma.*

20 *Steatoma* verò, tumor etiam est præter naturam, concolor & tactu lenis, in principio quidem exiguus, sed temporis progressu augetens, & amplior factus, in quo humor seuo persimilis, membranula similiter inclusus, subest. Hoc à meliceride & atheromate distinguitur, duritie. Nam plenum ac solidum est, tactuique renititur adeo, ut digitis prementibus minimè cedat. Sed reliqua nunc apostemata persequamur, quæ ferè ad hæc tria, de quibus modò egimus, reducuntur. *Testudo.*

25 *Testudo* ipsi Guidoni abscessus est magnus, humoralis, mollis, latiore forma, in modum testudinis: vnde nomen accepit. Quæ si in capite (inquit) nascatur, talpæria vel talpa dicitur: in collo, bocium: in testiculis, hernia: interdum autem cum purè, vel squammis, vel fistulis reperitur. Cæterum testudines & talpæ, apud antiquos,

30 neque proprium nomen, neque tractatum inuenerunt. Quidam autem ex recentioribus testudinem definiunt tumorem mollem, vel non valde durum, satis autem magnum, in quo pinguis materia, cuprea quadam obtecta, continetur, quæ cuticulari ita hæret (Est enim cutis capitis affectus) ut ipsam plerumque viriet. Hanc non dubium



Talpa.

est de numero esse abscessuum, & sub meliceride, vel atheromate contineri: videtur tamen ad meliceridem magis inclinare. Talpa verò cum albâ materiam contineat, ad atheromata potius, quam ad meliceridem refertur. Guido tamen testudinis speciē, imo verò testudinem ipsam ut modo diximus, esse affirmat, quemadmodum & herniam, & bocium, quod vocat: sed varia hæc nomina sortiri, pro varietate locorum, in quibus reperiuntur. Cæterum quod vulgus bocium, Græci propriè inuento ab interiore parte nomine, bronchocelen appellant, nostri verò herniam in gutturis, & gutturosos, qui eo morbo dehonestantur.

*Bocium.**Bröchocele.*

Est autem colli tumor grandis, & rotundus inter cutem, & asperam arteriam, in quo modò caro hebes, modò humor aliquis, melli, adipi, pulti, aquæ uic similis, includitur. Interdum etiam: ut ait Celsus in eiusmodi tumore pili

Nacta.

minutis ossibus immixti reperiuntur. Nacta (ut scribit Guido) exerescencia est magna, carnosa, veluti caro nativæ, vel anchorum diuersarum quidem formarum & magnitudinum: cuiusmodi sunt melopepon & cucurbita. Itaq; diuersa sortitur nomina pro formæ, & membri in quo est, varietate. Porro tumor hic qui nacta vel napta recentiorum turbæ appellatur, dolore caret nisi fortè adeò magnus existat, ut partes membri trahendo soluta continuitate, aliquem dolorem circumstantibus inferat. Est autem

*Nacta vel
napta ad
steatomata
spectat.
Bubo.*

& de numero abscessuum, & ad steatomata (ut supra in enumeratione tumorum præter naturâ diximus) ferè spectat. Bubo Galeno authore, laxarum partium seu glandularum (quas Græci adenas vocant) est affectus: nempe simplex inflammatio. Quare vel malè hic inter abscessus pituitosos à Guidonè annumeratur: vel aliud esse putat quam Galenus. Porro bubones, qui prolapsu, aut aliis vlceribus, aut doloribus contrahuntur, periculo vacant. Atqui in febribus pestilentialibus incidere consueuerunt, deterrimi sunt siue femora, siue alas, aut ceruicem inuaserint. Fugille (inquit interpretes Auicennæ) est de genere apostematum glandulosorum & quasi hoc nomine (ait) appropriatur illud quod fit post aurem. Ex qua descriptione non levis est coniectura, fugille Auicennæ, eum tumore esse, qui Græcis parotis dicitur, affectus quidem glandularum sub ipsis auribus. Quibusdam autè idem esse putatur fugille: quod bubo:

Fugille.

bubo: verum tunc illis aliud erit bubo, quam Galeno & *Bubo quid*
 Paulo: nempe excreſcentia multum (vt dicunt) infiltrata, *apud Gui-*
 & radicata: vt plurimum ſine cyſti, id eſt, follicullo ſeu *donem, &*
 membrana eam inuolvente, dura in morem ſcrofularum: *alios recen-*
 5 & in eo ſignificatu (vt puto) ſumitur bubo à Guidone: *tiores.*
 quando bubonem fugillinum numerat inter abſceſſus pi-
 tuitoſos. Cæterum longè adhuc plura nomina pituitoſorum
 huiusmodi abſceſſuum reperiuntur. Verum de nominibus
 10 iſtis non magna cura habenda eſt: modò id vnum de iſis
 cognoscamus, & intelligamus, quòd propter eiſmodi no-
 minum diuerſitatem; curatione & iudicium euariari con-
 tingit. Itaque eiſmodi abſceſſuum, aliæ quidem peculiari *Differètia*
 quadam membrana ſeu tunica (quam cyſtin vocant) inclu- *abſceſſuum*
 duntur: aliæ verò in carne ſunt vaſis implexæ & inſertæ. *pituitoſorum.*
 15 Quædam baſim, ſeu radicem habent gracilem, quædam
 verò latiorém. Quædam item ſunt reſolubiles, quædam ve-
 rò minimè. Quædam magnæ, quædam parvæ. Aliquæ ad
 ſuppurationem ſpectant, aliquæ non. Aliæ etiam ſunt
 ſquammoſæ fiſtuloſæ, & cancroſæ; aliæ verò nihil horum
 20 prorsus recipiunt.

*De cauſis, ſignis, & iudicijs prædicto-
 rum abſceſſuum.*

CAUſæ huiusmodi abſceſſuum ſunt triplices. Nempe *Cauſa ab-*
 25 Cprimitiua, vt caſus, percuſſio, vitæ luxus, ſiue intem- *ſceſſum qua-*
 perantia, ac deprauata viuendi ratio. Antecedentes, vt *ad pituita*
 ſunt humores non naturales, præſertim pituitoſi, & vera *pertinet.*
 œdemata, quæ in abſceſſus degenerant. Et coniunctæ, quæ *Materia*
 ſunt variæ ſubſtantix, & propriè cuiusque abſceſſus ma- *pituitoſorum*
 teriæ, in parte affecta contentæ. Continentur autem in *abſceſſuum*
 30 huiusmodi abſceſſibus, quandoque quidem humores: vel
 ſeroſi, cuiusmodi eſt vrina, vel putridi & corrupti, vel
 cœnoſi, vel mucofi, vel melli pulti, aut adipi ſimiles. Quan-
 doque verò carnes phlegmaticæ, & ſpongioſæ, atque
 glanduloſæ. Interdum quoque lapides, arenæ, oſtræca,
 35 ligna, carbones, & id genus alia ſolida corpora. Frequen-
 tiſſima autem ſunt (vt paulò antè diximus) horum ab-
 ſceſſuum tria genera; quorum ſingula propriam appella-
 tionem Græcè ſunt fortita. Ea ſunt, atheroma, ſteato- *14. Thera-*
 ma, & meliceris, à ſimilitudine contentorum in his corpo-
 rum dicta. Eſt enim aliud eorum veluti ſeuum, aut pingue

SIGNA.

NOTAE

*abscessus ve-
lamēto in-
clusi.*

IUDICIA

abscessuum

pituitosorum.

Arnaldus

*à villa no-
na.*

Auicēnas.

Quae aetates

naturae, &

corporis con-

structiones

strumis ma-

gis sint ex-

posite.

Celsus.

quiddam, aliud veluti mel, aliud pulciculæ tenui, quam atheram vocant, simile. Signa & iudicia eiusmodi abscessuum, quæ ad pituitam pertinent, ex eorum descriptionibus, & differentiis supra positis facile deprehenduntur.

Indicium autem quod velamento includantur hoc est, cysti seu pellicula, quam & antiqui tunicam nominabant, est mobilitas, & cutis separatio. Quando verò fixæ sunt, id est, eodem in loco permanentes, & carni adherentes, nulla eas inuolui membranula indicium est.

Porro recentes & tractabiles, discuti, seu resolui possunt, duræ verò & iam inueteratæ, nequaquã. Rubor au-

tem, dolor & caloris incrementum, ostendunt ipsos absces-

sus, vel suppurandos iri, vel in fistulas, aut cancerum dege-

neraturos. Numerosæ strumæ partes externas occupan-

tes, & sede subinde mutata, huc atque illuc per corpus va-

gantes, cum aduentitia quadam caliditate, planè testan-

tur, ac indicant, easdem germina esse ac sobolem chæra-

dum internarum, ut Arnaldus à villa noua quodam in lo-

co annotauit. Proinde quæ forinsecus illis admoventur

auxilia, parum, aut nihil proficiunt. Hæ autem, ut putauit

Auicēnas, ex casu & offensione, seu allusione ita in nostris

corporibus multiplicantur. Conducunt verò vel ma-

gnopere strumosis ipsis, medicamenta purgantia, potio-

nes diureticæ atque electuaria (ut vocant) resciccantia, item

ætatis mutatio in paruulis. Cæterum pueri ipsi propter

voracitatem & gulæ intemperantiam, ac corporis rarita-

tem, strumis frequentius corripuntur. Senes verò ob

causas contrarias rarius. Ad hæc qui breui atque angu-

sta sunt fronte, & compressa habent tempora, ac maxil-

las amplas, strumis sunt obnoxij. In talibus enim mate-

ria promptè deriuatur ad collum, ut ex recentioribus chi-

rurgis annotauit Henricus. Strumæ vero præcipuè (ut

Celsus ait) fatigare medicos solent, quoniam & febres

mouent, nec vnquam facillè maturescunt: & siue ferro,

siue medicamentis curentur, plerumque iterum iuxta ci-

atricas ipsas resurgunt, multoque post, medicamento

est opus. Quibus quoque accedit, quod longo spatio de-

tinent. Incisio eiusmodi abscessuum, itidem & corrosio,

magnopere verenda est, circa ventrem, collum & com-

missuras, propter propinquitatem venarum, arteriarum,

& ner

& neruorum, ac internæ etiam capacitatis. In incisione quoque magnarum glandularum, summopere vitare oportet venam, quæ ad radicem earum sita est, & illis alimoniam defert. Sæpe enim magnam hæmorrhagiam, id est, sanguinis profusionem, excitat: vnde non mediocriter sequitur periculum. Strumæ inter se differunt, magnitudine, naturâ, loco, ortu, multitudine, & vasorum complicatione, vt ex Leonida annotauit Aëtius. Itaque paræ strumæ maioribus facilius curantur, sicut mites inflammationis. Maleficæ sanari non possunt. Cum enim omnes eiusmodi strumæ cancerosæ, ac valis refertæ sint, dum curantur, profusionis sanguinis periculum adferunt: præterquam quod cum plerunque penitiores inueniantur, minime abscindi possunt. Vasa enim nobilia, venas inquam iugulares, & arterias, quæ carotides appellantur, malefica struma tanquàm radices habet.

Pro loci ratione, superficialiæ quidem strumæ profundis curatu faciliores sunt, deinde quæ in collo eueniunt, vbi tamen vocales neruos, diligenter vitari oportet. Multi enim strumas circa asperam cannam incidendo, vocalibus neruis simul excisis, reliquo deinceps vitæ tempore ægrum sine voce reddiderunt. Nam præter eius nerui excisionem, vocalia instrumenta denudata, & inter curandum refrigerata, vocis functionem violarunt. Pro multitudine strumarum, constat vnâ pluribus facilius curari posse. Sic, quantum ad ortus rationem attinet, longè citius sanescunt suspensæ, quàm quæ insertæ fuerint. Hæc de strumis ex Leonida, memorix prodidit Aëtius.

Curatio abscessuum ex materia pituita referente creaturæ, quas excrescentias phlegmaticas vocant.

30 **C**uratio eiusmodi abscessuum, qui ex pituita ferè ortum habent, gemina est recentioribus chirurgis: Vniuersalis scilicet, atque omnibus ex æquo communis, & particularis: hoc est singulis differentiis propria. Itaque vniuersalis curandi ratio erit, talem, tamque accommodam laboranti vitam instituere, vt materia, quæ tales abscessus committit, in corpore minimè coaceruetur, & materiam, vt vocant, antecedentem, & iam in ægroto corpore collectam, modis omnibus auertere, ne tandem vniatur coniunctæ, hoc est, ei quæ iam morbum creat.

Vita ratio Porro priorem huius vniuersalis curationis intentionem
qualis esse assequemur, si laborantes eam viuendi rationem diligen-
debeat in ter obseruent, quæ in præcedentibus capitibus præscripta
abscessibus est, hoc vno dempto, quod paulò tenuiorem victum, & qui
pituitosis. incidendis humoribus crassis magis sit accommodus, am-
 plecti debent. Proinde si Auicennæ consilium sequantur,
 cibos omnes pachychymos, id est, crassioris succi vitabūt,
 frigida item potionē, nimiam satietatē, immoderatā me-
 repletionem, & quæ nauseam pariat. Toleranda autem il-
 lis est quàm maximè fieri poterit inedia. Bona coctio im-
 primis erit procuranda, vitanda habitatio humida, in val-
 libus sita, paludosa, & vitiatas aquis irrigata. Potus sit vinū,
 aliquod generosum atq; optimū, vel aqua aluminosa, aut
Aqua alu- sulphurata. Aquæ enim eiusmodi minerales præsertim quæ
minose vti. vini fœculā sapore repræsentant, non solū internos hosce
 strumosos, ac pituitosos abscessus: sed externos quoque, &
 summa corporis occupantes imminuunt, ac discutunt: vt

Vacuatio Arnaldus affirmavit. Cæterū alteram partem prioris pro-
materia an cessus, nempe materiā antecedentem auertere, ne tandem
tecedentis. addatur coniunctæ, quadruplici genere euacuationum as-
 sequimur, vtpote medicamento per aluum pituitā expur-
 gante; & quandoque venæ sectione. Item iis, quæ vrinam
 cient, & demum iis, quæ collectum in alto corpore humo-

Vacuatio rem tum in halitum resoluant, tum digerant. Ad vacua-
per aluum. tionem quæ fit per aluum, laudatur à valde multis pul-
Pulvis tur- uis turbith, qui apud Auicennam recipit, turbith, zin-
bith. giberis, & sacchari, singulorum pares portiones. Ex eo
 autem exhibet drachmas duas, asseritque præter hoc,
 quod resoluit pituitam crassam, nequaquam calfacere,
 neque abraderè intestina. Razes autem, qui audacior
 fuit in purgantibus medicamentis exhibendis, huiusmodi
 puluerem conficit, capite de doloribus ventris in nō-
 no ad Almanforem, ex viginti partibus turbith, decem
 zingiberis, & triginta sacchari, offertque ex eo vice vna
 drachmas tres. Benedicta quoque, & hiera picra: item
Hiera pi- pillulæ ex agarico, & de hermodactylis maiores appel-
cra. latæ, eiusmodi affectibus magnoperè conueniunt. Ad ci-
Quæ vrina endam vrinam, vti consueuerat Guido à Cauliaco se-
cieant. quenti porione, quam ex scriptis multorum se decerpis-
Potio Gui- liaco, vrinā se ait. Concipit autem, scrofulariæ partes tres, phylipen-
 dulæ

5 dulæ partes duas, pimpinellæ, seu bipinellæ, pilosellæ, *ciens in ab-*
 tanacetæ, caulium rubrorum, qui nonnullis brassica ma- *sceßibus pi*
 rucina creduntur, rubiæ maioris, singulorum partem *suosis.*
 vnam; radicis aristolochiæ, spathulæ fœtidæ; radicis ra-
 5 phani, ana partem dimidiam: concassentur, & decoquan-
 tur in vino albo & melle; vsque ad consumptionem me-
 dietatis, & fiat colatura, ex qua tertio quoque die, hora
 matutina sumat æger quadrantem, id est, vncias tres; &
 5 potio sit tepida. Cæterum pro omnibus his auxiliis, si-
 cuti & pro venæ sectione (si aliquando fieri debeat) con-
 sulendus erit peritus aliquis medicus; qui & qualitatem
 & quantitatem, ac modum vsus eorum præscribat. Ad
 resoluendum autem per halitum, & digerendum humo- *Quæ per ha-*
 rem, qui in alto corpore collectus est, & internas glandu- *litæ dige-*
 5 las (quæ externarum sunt causæ) excitat, Galen. lib. 4. *nunt.*
 Therap. consulit theriacen, athanasiam, ambrosiam, &
 medicamentum, quod ex Cretica calaminthe est compo-
 situm: Græci diacalaminthen vocant: cuius compo-
 5 sitio requirenda est ex lib. 4. de sanit. tuen. Multa alia au-
 xilia ad huiusmodi affectus instituuntur: nempe potiones,
 electaria, & etiam olea, quæ in aures iniiciuntur. Empi-
 rica quoque permulta, à veteribus descripta & celebrata
 sunt, quorum vsus mihi non probatur. Proinde non du-
 xi illa nostris commentariis esse inferenda. Hoc vnum ta-
 5 men confidenter adfirmo, Christianissimo Francorum *Galliarum*
 Regi, diuinitus peculiari dono esse indultum, vt quàm plu- *reges diui-*
 rimos strumosos seu (vt vocant) scrofularios, solo manu- *no quodam*
 5 tactu, integræ sanitati restituat, Rex etiam Eduardus *munere*
 (vt referunt historiæ) solebat diuinitus solo tactu sana- *strumas cu-*
 5 re strumosos. Quod immortale munus iure veluti hære- *rare.*
 ditario ad Reges posteriores manauit. Nam Reges An-
 glæ etiam nunc tactu, ac quibusdam hymnis, non sine ce-
 remoniis prius recitatis, strumosos sanant. Atq; hæc qui-
 dem in omnibus suprà dictis abscessibus communia sunt.
 5 Quæ verò sequuntur, particularem, ac propriam cuius- *Quæ parti-*
 que differentię curandi rationem concernunt. Hanc au- *cularem pi-*
 tem curandi rationem propriam ac particularem, in hisce *tuitosorum*
 abscessibus diuersam efficiunt, atque immutant, tum ma- *abscessuum*
 teriæ, ex qua ortum habent, substantiæ, tum verò eorum *curatione*
 quantitas, vel minutula, vel quæ in molem valde ma- *euariant.*
 gnam

*Tēpus quid
insinuet.*

gnam excreuit. Adhæc partis ipsius laborantis, atq; etiam totius corporis natura. Temporis autem duratio licet non indicet curationē, indicat tamē nobis aliquando, atq; insinuat, qualis sit ipsa dispositio, vt Galenus annotauit lib. 4. de morbis curandis. Itaq; tamen à prædictis multæ fumi possint curandi indicationes, ac intentiones, eas tamen, quantum ad rem præsentem attinet, ad sex reduxi-
 1 mus, quas & iis sex sequentibus veluti canonibus expressi-
 mus. Quorum primus ad hunc modum habet: Pituitosos abscessus, molles, & paruos, quæ lupiæ vulgò, & Arabicæ factionis principi Auicennæ, glandulæ appellantur, si in particulis firmioribus cōsisterint, & (quia nōdum inuetera-
 uerunt) tenellā adhuc cystim, id est, mēbranā qua includū-
 tur, habuerint, comprimito, & atterito, postea deficcato.

2 Secundus: Maiores non multum duos, neque inuetera-
 ratos, more tumorum œdematosorum (de quibus supra egimus) emollito, discutito, consumito.

3 Tertius: Pituitosas eiusmodi excrementas, saniosas, & apostematosas, hoc est, quæ in suppurationē spectāt, matu-
 4 rato, aperito, detergito. Quartus: Strumas, quæ ex prædi-
 ctis auxiliis curationē non recipiūt, & mobiles sunt, blādē,
 5 morigeræ, ac tractabiles, incidito, atq; extrahito. Quintus: Immobiles, insertas, irretitāsve, seu (vt loquuntur) in-
 filtratas, hoc est, venis, & arteriis multum implicatas, ad ra-
 6 dicē, & intus latus, corroditō, detergetōque. Sextus. Te-
 nuī ac gracili radice innixas, deligato, ac euellito.

*Cōpressio,
et attritio.* Primus canon, iuxta Auicennæ sententiam absolue-
 tur, si vbi molles, ac minutos eiusmodi abscessus, quos
 Auicennas glandulas, & recentiores lupias appellant, con-
 triueris, ac vehementer compresseris, laminam plumbeam
 tumori æqualem superponas, & ne hinc inde labatur, ar-
 1 ctis vinculis in medio constringas. Hæc enim huiusmo-
 di excrementas digerit. Primum igitur lupia tandiu ma-
 nu molliter perfricetur, vsque dum aliquantulum inca-
 lescat, & seipsā mollior quodammodo fiat: postea, labo-
 2rans particula firmiter manibus apprehendatur, & fundo
 3 scutellæ, aut re aliqua solida lignea, tories, ac tam vehe-
 4 menter percutiatur, vt dispareat, & interior eius cystis, id
 5 est, membrana qua includitur, dilaceretur, disrumpatūr-
 6 ve, atque ita materia ibi contenta dispergatur. Quo facto
 protinus

*Lupia cu-
ratio.*

protinus lamina plumbea supra locum adplicetur, & fascia duarum extremitatum, seu (vt dicunt) duorum capitum, arctissimè deligetur, nec amoveatur ante nouem aut decem dies. Lamina autem, ea sit magnitudine (vt modo dicebatur) quæ proportionè respondeat lupiæ. Sunt

Lamina plumbea.

tamen qui ante laminæ eiusmodi plumbeæ applicationem, vnguentum admouent ex plumbo vsto, fuligine sambuci, aut ficus arboris, oleo, & aceto. Alij prius vtuntur emplastro composito ex aloë, acaciâ, myrrhâ, olibano, farcocolla adiecto aceto, vel oui candido, quantum ad alia excipienda satis esse videbitur. Henricus superponere solebat paruas (vt ipse, & alij eiusdem farinæ chirurgi loquuntur) plagellas, ex stupis confectas, oui candido liquore, sale, & alumine zuccharino inspissato deliburas.

Vnguentum Rogerij.

Porro Philagrius ratione non admodum dissimili, apud Aëtium ganglia (qui nerui, vt suprâ diximus, tumores sunt inæquales) curare solebat: inquit enim ad hunc modum: A gangliis chirurgicum opus [id est, sectionem] arce-
cemus, præsertim si in manibus, aut pedibus euenerint, sed medicamentis tantum curabimus. Ammoniacum enim
prope ignem, ad emplastri consistentiam emollitum illi-
nimus: deinde laminam plumbeam tumori æqualem su-
perponimus, & ne hinc inde labatur, arctis vinculis in me-
dio constringimus. Iam verò diebus aliquot transactis, vbi
prius ganglium emollitum nouerimus: nihil ægro præfa-
ti statim sublatis vinculis, dum adhuc locus incalescit, pol-
licem dextræ manus ganglio infigimus, ac reliquis qua-
tuor digitis membro innitentibus vehementissimè com-
primimus, & ganglium confestim dissoluitur. Hactenus
Philagrius. Itaque ex hac curandi ratione, facile est colli-
gere, recentiorum lupiam, Auicennæ glandulam, & Græcorum ganglion, eundem omnino affectum esse: quod & præcedentes etiam eorum descriptiones aperte satis ostendunt. Archigenes in hoc vitio calcem, vnâ cum adipe an-
serino, & terebinthina refina, apponi iussit. Idem verò
& medicamine, quod lapidem achatem recipit, sæpius
vtebatur, vt refert Paulus. At Oribasius eo frequenter
vsus est, quod recipit cerussæ, resinæ piceæ, olei veteris, sin-
gulorum vnciam vnâ, ammoniaci thymiamatis, galba-
ni singulorum parẽm modum, cæræ vncias quatuor. Ex-
tat

*Ganglij cura
ratio ex
Philagrjo.*

*Lupiam et
gangliũ eũ
dem esse af-
fectum.*

*Archige.
Lib. 4.*

*Oribasij
medicamen-
tum molli-
torium ad
ganglia.*

tat idem medicamentū apud Aëtium, sed in quibusdam pondera euariant: habet enim cerussæ, olei antiqui, & resinæ piceæ, singulorum libr. vnam, ceræ vnc. duas, ammoniaci thymiamatis, chalbanæ [id est, galbani] singulorum vnc. vnam. Cerussam cum oleo decoquito, quousque inquinandi finem fecerit, deinde tritum ammoniacum, postea resinam piceam, & ceram, postremò galbanū præmolitum coniicito. Porro insignis ille Græcæ familiæ medicus Oribasius inquam, non laminam plumbeam, ut Philagrius, Auicennas, & recentiores chirurgi, sed plumbeum orbiculum crassiore, ad instar spondylorum, id est, verticillorum quæ fuis mulierum appenduntur, ganglio ipso ampliorem imponebat, deligabátque. Siquidem (inquit) pondere suo longiori temporis spatio, ipsum dissoluit. Itaque satius est multo eiusmodi emollientibus & discutientibus medicamentis uti in gangliis curâdis, quàm chirurgico opere, id est, excisione, præsertim cum in cruribus, aut brachiis, aut summis partibus oriuntur. Periculum enim est, si ea excindantur, ne particula mutila reddatur. At quæ caput aut frontem occupant, manu tuto curari possunt, hoc est, præcidi, aut euelli. Ergo summam cutem scalpello diuidito, deinde si parua sunt, vulsella comprehensâ ex basi, hoc est à radice excindito: si maiora hamis transfixa, & sublata, circuncirca diducito, excoriatoque, & extrahito: postremo suturis oras coniungito, medicamentoque utor, quod cruentis vulneribus adaptatur. Sed hæc ad quartum canonem pertinent.

*Verticillū
plumbeum.*

*Gangliorū
per chirurgiam
cura
tio.*

2

*Discussio p
digerentia
medicamē-
ta.*

*Gal. hanc
compositia-
nem ac ce-
ptam refert
Hiera.*

Secundus canon completur (ut interim taceam medicamenta pituitosis, hoc est, œdematosis tumoribus, diducta, quæ suprâ posuimus: ad hos etiam, de quibus nunc agimus, abscessus, & herniarum omne genus, apprimè, vna cum sequentibus remediis vtilia) ad motionem cuiusdam emplastri, quod à Galeno descriptum est libro sexto de compositione medicamentorum κατὰ γένη: hoc enim ut ipse testatur, per halitum digerit, & phlegmonas propulsat, valet ad strumas, panos, parotidas. Confert etiam podagricis, & multis aliis vitiis benefacit. Recipit autem olei veteris denariū pondo centum, argenti spumæ denariū pondo quinquaginta, picis [siccæ] denariū pondo quinquaginta, ladani denariū pondo viginti quin-

gintiquinque, æruginis rasæ denariûm pondo octo, galbani denariûm pondo quatuor. Argenti spuma (quod lithargyrum vocant) ex oleo trita coquitur. Cùm autem coëunt, id est, inspissata sunt, pix & ærugo immituntur: deinde ladanum, galbanûmque, atque sic in mortarium transfusa subiguntur & molliuntur, atque vsui reseruantur. Quidam, vt boni coloris sit, & fuscum, miscent etiam squammæ denariûm pondo octo: nam alioqui sit nigerimum. Aliter inuenitur descriptum in Guidonis commentariis: nempe sub hac forma. Recipe olei antiqui vnc. 12. viridis æris, siue æruginis. drach. 14. picis siccæ vnc. 6. ladanani vncias 3. lithargyri vnc. 12. galbani vncias tres. Ad idem bene facit diachylon commune & ireatum nominatum, quorum formulæ & compositiones libro sexto infra describentur. In diachyli autem ireati libra vna malaxanda est vncia vna pulueris radices ireos. Idem efficit diachylon magnum Mesues, cuius descriptio etiam infra habetur. Sunt qui consulant, ad digerendos eiusmodi abscessus antiquum stercus caprillum, cum melle & aceto supra ignem in vnitatem ad formam emplastri redactum, dolenti loco esse ad mouendum. Item emplastrum ex fœnogræco, semine lini & brassicæ, cum viscillagine radices althææ confectum. Hoc etiam si suppurationis spes adfuerit, pulchrè maturat. Halyabbas quoque sublequens emplastrum ad eundem vsum plurimum commendat Recipe farinæ fabarum, & hordei, ana drachmas decem radices glycyrrhizæ, radices althææ & picis, singulorum, drachmas quinque, ceræ albæ, adipis anserini, cuiusque drachmas decem: terantur, & in vnum redigantur ex oleo veteri, & vrina pueri nondum venerem experti, & supra moderatum ignem fiat emplastrum. Aliud Auicennæ, quo Guido vtitur: Recipe stercoris bubuli vnc. 2. radices caulium, id est, brassicæ, radices capparû, squillæ, ficuum pinguium, singulorum semunciam, lupinorum, bdellij, ana drachmas duas, aceti, mellis, axungię suillæ, fecis olei antiqui, ana, quod satis est, fiat emplastrum. In omnibus duris tumoribus Brunus hoc sequens remedium approbavit, cuius sententiam secutus est & Theodoricus. Sume ammoniaci, bdellij, galbani, singulorum partes æquales: macerentur triduo in aceto, quibus dissolutis,

*Diachylō.**Ræses.
Stercus caprillum retus.**Halyab.
emplastrū.**Emplastrū
Auicennæ.**Bruni &
Theodorici
emplastrū
ad strumas*

*Rogeri em
plastrum.*

*Emplastrū
præceptorū
Guidonū
ex limaci-
bus.*

*Vibrariū
ac serpentum
vſus mirè
strumefos
iuvat.*

tis, & igni iam appoſitis, addatur furfuris ſubtilis, quan-
tum ſatis eſſe videbitur, & fiat emplaſtrum. Rogerius
hoc auxilio utebatur ad ſtrumas, quas vulgo ſcrofulas ap-
pellant. Accipe radicis filicis, aſphodeli, & ſi vis ebulorū,
ana quantum lubet, coquantur in vino optimo, & tundā-
tur in mortario, addendo ſulphuris viui momentum, &
fiat emplaſtrum. Qui Guidoni contigit præceptor in
Mōte Peſſulano, efficaciffimum ſæpe expertus eſt empla-
ſtrum, quod conſtabat ex duodecim cochleis (quos & li-
maces vocant) vino incoctis, aut lixiui cinerum, dictorū
vulgò clauelatorū, aut ex capitello, vt dicunt. Imò (quod
valentius erat) quotidie cochleam vnā vel ſiccā, vel
aliter præparatā, & (vt loquuntur) conſectā, ipſis la-
borantibus per os ſumēdā offerebat. Probè etiam ſtru-
mas diſcutit Paulo calx viua, id eſt, aqua non extincta,
melle, vel gymnaſiorum ſordibus, ſeu balneorum ſtrig-
mento excepta, vel oleo, vel adipe ſuillo. Idem præſtat
Aëtio ſola palæſtræ ſordes, à parietibus derafa, & probè
ſubacta, ſuper linteolo extenſa, & emplaſtri modo ap-
plicata. Ad id etiam efficaciter auxiliatur, calcis, nitrī
que par modus, cardamomi, & ſcœnugræci quadruplus
cum melle, malagmatis modo impoſitus. Strumas quo-
que diſcutit, lupinorum amarorum farina ex oxymelite
cocta & illita. Ad idem præclarè facit bubulum ſtercus
aceto incoctum, & delinitum: id enim tumores ſcirrhoſos
omnes inſtar cataplaſmatis appoſitum, mirificè diſſipat.
Groſſi etiam præcipuè capriſfici cum axungia appoſiti,
omnem tumorem diſcutiunt. Hac igitur curandi ratione,
ſtrumis inchoantibus, & nōdum inueteratis, medeberis:
tum in pueris, tum in hiſ; qui manuū opus refugiunt,
medicamentis ſcilicet diſſoluentibus, ac per halitum diſ-
cutientibus. Verū primò mollire, deinde diſcutere
oportet, vel vtrunque ſimul medicamentis mixtā facul-
tatem habentibus, efficere. Eius autem generis ſerè ſunt
auxilia omnia ſuperius deſcripta. Porro ſi digerentia me-
dicamina, nihil in eiufmodi abſceſſibus profecerint, vel
ad ſuppurationem ducendi erunt, vel exedendi, vel manu
curandi, vt in ſequentibus dicetur. Cæterū ſilentio præ-
teriri non debet, quod à quibuſdam memorię proditum
eſt, nempe ſtrumis laborantes, ſicuti & elephantiaſi, vi-
pera

perarum, ac serpentum vsu mirificè adiuuari. Itè si laserem ad ciceris quantitatem singulis diebus ieiuni potauerint. Ergo serpentè extinctū in ollā cōiicito, eāque gypso probè oblitā ac circumunitā in fornacem mittito, concremati cinerē equali fenugrēci pondere misceto, & melle excepto vtitor. Hoc enim strumosis eximiè subuenit. Aluum etiam facilem reddi, tenuemque victū adhiberi oportet strumis laborantibus, vomitumque assiduè prouocare, & per os pituitā ducere, caputq; desiccare, ac cataplasmata syncipiti applicare, quæ mediocres pustulas in cute excitare possint, veluti capparidis radix cum polenta, ac reliqua huiusmodi, smegmatisque eiusdem facultatis, & puluisculis vti.

Tertij canonis intentionem communiter etiam assequimur, vsu auxiliorum præcedentium. Omnia enim mollientia, & resoluentia, si locum aut materiam inueniant resolutioni contumacem, materiam ipsam haud dubiè maturant, & ad suppurationem perducunt: præsertim si mitis ac benigna satis fuerit, aut sanguini permixta. Halysabbus autem ad maturandos huiusmodi abscessus, ad mouet emplastrum compositum ex farina hordei, pice, & olibano, ex pueri impuberis lotio, in vnum corpus redactis. Auicenna verò ad infrigendam caliditatis vehementiā, consulit decoctum coriandri præfatæ farinæ esse remissendum. Quòd si parum hæc proficiunt, & efficacius medicamentum desideres: accipe myrrhæ partem vnā, licij partes duas, & misce cum prædicto decocto. Strumas ad suppurationem perducit, aut diffundit subscriptum medicamentum, à Paulo Aegineta lib. 4. relatum. Myrrhæ drach. decem, ammoniaci thymiamatis drach. septem, visci quercini drachmæ octo, galbani drachmæ quatuor, propolis drachma, in pila contunduntur. Cæterum ipsis iam maturatis, & ad suppurationem perductis (quod ex notis ipsis puris facile deprehendes) aperiri debent, & detergeri. Deterfio autem optimè fiet admoto vnguento Apostolorum vulgò nuncupato. Hoc enim magnæ est efficaciz in strumis malignis, & vlceratis. Ad idem multum efficacia sunt, vnguentum Aegyptiacum Rasis, emplastrum de succis, diachylôn nominant, & diapalma, quod Græcis πυρίτιον appellatur, quorum descriptiones ex libro 6. sunt requirendæ. Quòd si huiusmodi abscessus locum aliquem

3
Tertij canonis declaratio.
Suppurantia seu maturantia;

Pauli medicamentū ad strumas maturandas.

Detergentia,
Vnguentū Apostolorum.

Vnguentū Aegyptiacum.

Diachylôn
Diapalma

occupauerint, in quo caries, & quædam corruptela ossium subfit, aut prauum aliquod symptoma illis accesserit, ea vlcerum curandi ratione tractentur, cum quibus affinitatem, & commercium habent.

4 *Modus incidendi, & euellendi strumas ex Albucasi, & Leonida.* Quodd ad quartum canonem attinet, blandas, morigeras, superficialiarias, & sanabiles strumas, sic optimè, ac breuissimè tractabis. Aegrum imprimis prostratum, recumbere iubeto: sedens enim animi deliquio facillimè corripetur. Vbi laborans sic decubuerit, cruribus inter se inuicem, & ad lecti fulcra innixis, caput à ministris firmiter detineri imperato. Deinde cutim tumori adiacentem, recta, vel sub obliqua sectione incidito. Quæ enim in collo per transuersum fit sectio, prorsus inutilis est. In eo siquidem vasa & nerui recta porriguntur. Cæterum non asfatim, neque vnico impetu, totam cutis crassitudinem secabis: nihil enim violentè in hoc opere fieri volumus.

Atque in paruis quidem tumoribus, hoc est, strumis minutioribus, simplicem sectionem facito, hoc est, simplici linea cutem diuidito: in maioribus verò, cutim ad myrteï folij figuram abscidito: tum vasa, id est, venas, & arterias, paulatim, & blandè denudata seponito. Post hæc verò sectionis labra, seu oras cutis incisæ, vulsellis, seu hamulis distendito, ac dilatato, ac membranas digitis, & scalpri capulo, vel spatula, excoriato, strumamq; vbi nudata & explicata membranis apparebit, paulatim eximito. Cæterum si struma vasis implexa fuerit, summa attentione opus tractandum est, ne per incuriam copiosa sanguinis profusio sequatur. Propterea in agendo, vnum duntaxat sectionis labium vulsella protrahatur, & ita sensim à connexis corporibus scalpelli acie separetur. Cùmq; ab vno latere connexio diuulsa, ac soluta fuerit, in altero idem penitus repetatur: deinde tota basis propter nervos, & subiecta vasa excidatur. In strumis verò, quæ circa alas & inguina contingunt, ob cutis reduplicationem, sectio transuersa ducitur. Porro in sectione, quæ fit in strumis collum occupantibus, summa cura adhibenda est, ne vel arteriæ, quas carotidas vocant, vel recurrentes nerui attingantur violenturque. Si autem vase aliquo intersecandum diuiso, sanguinis profusio tuum opus remoretur, ac obturbet, vas ipsum funiculo excipito, vel nisi magnum

gnum admodum fuerit, penitus, (vt Paulus consulit) ab-
 scindito, vel præsidia sistendo sanguini (si non magno im-
 petu prorumpat) dicata, applicato. Deinde ad inceprum
 opus reuertitor. Itaque vbi in arctum strumæ basis vene-
 rit dextrè ac peritè ipsam præcidito, immissoque indice,
 locum pertractato, ac diligenter scrutator, num & aliæ
 sint strumæ adiectæ, quas & eodem quo suprâ diximus
 modo, si quæ inuentæ fuerint, extrahito. Porro modicum
 sanguinis fluorem faciliè compesces, ad motis iis, quæ fa-
 cultatem habent exiccandi: vt stupis, spongia, aut linamen-
 10 tis ex xylo, id est, cotone factis in aquam frigidam, vel
 acetum, aut in miscellam ex vtroque (quam oxycraton vo-
 cant) infusis, & postea expressis. Sin sectio incruenta per-
 fliterit, thuris polline eam repleto, linamenta que im-
 15 nito, ac pro linamentorum custodia, lanam vino maden-
 tem alligato. Quòd si vena aliqua amplior, & effatu di-
 gna, cum radice seu fundo glandulæ, vel strumæ, aut con-
 fimilis excrecentiæ pituitosæ, connexa sit non ex basi
 ipsam excindere, sed funiculo excipere ac constringere
 20 conuenit, quo particulatim citra periculum sua sponte ex-
 cidat. Quo in casu per linamenta postmodum curatio ad-
 hibenda erit. Est autem vinculum ex materia aliqua non
 faciliè putrescibili, cuiusmodi sunt fila, quæ serica nuncu-
 pantur, aut graciles chordæ testudinum. Quæ enim faciliè
 25 putrescunt, ea citò ab iis quæ exceperunt decidunt. Cæ-
 terum si peracto opere, aliquid ex folliculo, seu membra-
 na materiam prædictorum abscessuum obuoluerit, vel
 aliud extraneum quidpiam remanserit, iubet Albucasis
 illud absumendum esse, implendo vulnus primis diebus
 30 xylo, id est, cotone, vel alio consimili, aqua falsa imbuto.
 Guido autem vt reliquias illas absumeret, hiantem sinum
 implebat, primum quidem oui candido, alumine resper-
 so, & inspissato. Postea verò vnguento Aegyptiaco, vel ali-
 quo ex erodentibus, quæ in antidotario describuntur.
 35 Porro in omnibus huiusmodi operationibus apponen-
 da sunt, quæ dolorem leniunt. Inter cætera autem com-
 munitè admovent stupas oui candido liquore & rosaceo
 imbutas.

*Si vena
strumæ sit
annexa,
quid facien-
dum.*

Albucasis.

Quinti canonis scopum ita assequeris: cutim caustico, & mundi-
 id est, vrente aliquo medicamine pro ratione magnitudi-
 ficatio.

*Cauticū
ex calce &
sapone.*

nis abscessus abrupto. Verū dum id moliris, summa cura obseruandum est, ne partes alias circumiacentes medicamen adurens attingat. Perbellè autem opus hoc absolues, admoto caustico ex calce, aut sapone. Hæc enim effectum suum intra duodecim horarum spatium feliciter adimplent. Quòd si diutius permanferint, nihil inde tamen periculi aut incommodi sequetur. Itaq; caustico iam abrupta cure, & inducta eo in loco eschara, id est, crusta per medium ipsius crustæ, abscessum recta linea in longum diuidito (incides autè versus profundū, ferè ad viuum vsq;) & in sectionem, seu hians vulnus, linamentum, aliquo exedente medicamento (cuius generis est puluis asphodelorum) respersum, imposito. Porro tametsi pleriq; valde multa admoucant, quæ postea libro sexto recensentur,

Arsenicū.

arsenicum tamen in hac re primatum obtinet, modò quis nouerit eo rectè uti vsus autem ipsius certus modus describi non potest, vt lib. 3. Therap. Galenus annotauit. Proinde non temerè eo utendum est. Quàdoquidem medicamentum est supra modum vehemens ac violentum, febres excitans, & multa alia praua symptomata inducens. Adde quòd minima etiam quantitate adhibitum mirum, & ferè incredibilem effectum præstat. Communis tamen eius modus seu quantitas est, medietas grani vnus frumenti triticei, in corpore quidem robusto, & articulis à principibus membris longè semotis: in debilibus verò naturis, & locis iuxta principes partes sitis, minor quantitas admouenda erit. Vt autem in vniuersum pronuntietur, melius, ac tutius est, parum & sæpius ex eo offerre, quàm semel & vice vna quantitatem immodicam. Eius autem operatio, seu effectus durat tres dies integros. Quare toto eo tempore, laborans victu febricitantium uti debet. Membrum verò affectum, & partes circumiacentes, ad tutelam sui, & fluxionem (quam immoderatus calor excitare posset) prohibendam, vnguento quod populeon appellatur, aqua quoque vel succo solani, & aceto, aliisque id genus refrigerantibus illini, ac perfundi debent. Quando autem certò tibi constabit, glandulam iam corruptam esse, atque absumptam (quod ex duritie & tumore crustæ inductæ deprehendes) tunc crusta à viuo resoluenda erit, admoto scilicet butyro loto, & momento farinæ triticeæ

*Quàdo crusta à viuo
resoluenda.*

inspiss

inspissato, vel aliquo alio pingui, & vinctuoso non salito, vt axungia suilla: vbi verò crusta exciderit, si quicquam adhuc ex glandula, lupia, aut struma remanserit, id absfundendum erit erodente medicamento: vt puluere asphodelorum, vnguento Aegyptiaco aut alio consimile. At si nihil amplius supersit, more aliorum vlcerum ad cicatricem perducetur.

Vt sexti canonis scopum assequaris, vinculo serico, aut crinibus equinis deligandi sunt huiusmodi abscessus, qui bases seu radices habent in angustum venientes, atque indies magis ac magis prioribus vinculis, aut nouis adhibitis, stringendi, donec scilicet resiccati appareant, & sponte sua (vt de insertis, ac maioribus vasis implexi dicimus) excidant. Adiuuandum autem erit vinculum aliquo exedente medicamento & desiccante. Demulcendus quoque erit dolor oui candido liquore, rosaceo, vnguento populeo, aut quouis alio doloris mitigatorio. Vbi autem sponte deciderint funiculi, modo quem suprà explicuimus, persanentur. Atque hæc in vniuersum de abscessibus toto genere præter naturam consistentibus, à pituita præsertim ortum ducentibus, dicta sufficiant. Post quæ, non abs re factum putauimus, si propriam ac peculiarem meliceridum, steatomatum, ac atheromatum curandirationem subiecerimus: hæc enim & frequentissimè nostris corporibus incidunt, & alias quasdam sub se tumorum præter naturam species seu differentias, nouis quibusdam, atque apud veteres prorsus inauditis nominibus, à neotericis appellatas, complectuntur: vt talpam, testudinem, naftam, & id genus alia, quæ in præcedentibus à nobis explicata sunt.

De curatione atheromatis, steatomatis & meliceridis.

IN iisce tribus abscessuum generibus, quæ frequentissimè incidunt, steatomate inquam, atheromate, & meliceride, vnum commune curationis consiliū est: vt quod tunica illa, quam cystim appellant continet, discutiat, aut medicamentis totum vnà cum tunica ipsa exedatur, aut sectione auferatur. Quidam autem ex iis tumoribus triplici hac ratione curantur, ij nimirum qui liquidiorē humorem continent, qualis est meliceris: aliqui duplici

6
*Ligatura
& emissio.*

*Quot, &
quibus mo-
dis curen-
tur prædi-
cti absces-
sus.*

tantum, vt atheroma, quod & sectione tollitur, & medicamentis exeditur. Steatoma verò nec discuti, nec exedi potest: sed solâ manus operâ, hoc est, sectione duntaxat, curatur. Porro medicamentorum, quæ discutiendi ac dissipandi vim habet in huiusmodi affectibus materiam, inter hæc

*Curatio
per digerentia.*

Libr. 4.

Lib. 15.

quæ de strumis supra edocuiamus, reperies. Priuatim verò, ac propriè meliceridas dissipat Paulo, quod continet vuas passas exemptis acinis viginti, squammæ drachmas quatuor, parte fomentis prius nutrita imponitur. Aliud emplastrum ad meliceridas, quod ad Leonidam retulit Aëtius, accipit passularum detractis vinaceis, libram vnam, cumini minutissimè triti, vncias sex, nitri vncias tres: omnia simul in mortario subacta conficito, & alligato. Aliud eiusdem discussorium ad meliceridas: concipit salis ammoniaci, spumæ argenti, cerussæ, singulorum lib. 1. ceræ, terebinthinæ, chalbanæ, opopanax, singulorum vnciâ vnam, rubricæ sinopicæ vnc. 6. aceti heminam. [hoc est, vnc. 7. & semissem,] spumam argenti, cerussam, & sal ad exactum leuorem tritum, simul decoquito, deinde rubricam prius

*Curatio per
exedentia.*

Lib. 4.

ex aceto tritam iniicito, & cum vniueris liquabilia, postremo omnibus simul confectis, & refrigeratis, opopanax & chalbanam aceto soluta admisceto, & vttere. Cæterum si medicamentis exedentibus, quæ Græci septica vocant, humorem in eiusmodi abscessibus absumere volueris, eos sicuti etiam & strumas, medicamentis adurentibus cute superposita prius denudare expedit, e quorum numero (inquit Paulus) simplicius quidem est, quod constat calce viuæ, id est, aqua non extincta, sapone, & cinere lixiuæ stillatitio. Aliud varium magis, quodque reconditum diu seruari potest, capit calcis viuæ drach. quatuor, sphecles, id est, feculæ vini combustæ, nitri liquidi tostii, singulorû drach. duas, minij, seu rubricæ sinopicæ drach. vnam, cinere lixiuij stillatitio teruntur: vbi ad mellis liquidioris crassitudinem reducta fuerint, ter feruefacito, vt mediocrem consistentiam habeat, & pixide plûbea reponito, lixiuium super distillans, ne citò nimis exarescat. Ergo circumsusam cutem eiusmodi medicamentis crustam inducētibus, primùm abrupto: postquam verò crusta deciderit, exedentia adhibeto. Erodit autem validè citra vellicationem & morsum, quod habet squammæ æris drachmas

quatuor

*Medicamentum valide
exedens absque morfu.*

quatuor, sandarachæ [id est, arsenici rubri] drach. duas, hellebori nigri tantundem, cum rosaceo vtitur. Aliud ad idem valde efficax: erynaceorum combustorum, testæ sepiæ, auripigmenti, singulorum æquale pondus, rosaceo miscentur. Sed quæ adiacent, atque in ambitu sunt partes omnes, prius cerussa cum oleo delinito. Verùm enim uero, si tales abscessus, sectione curare voluerimus, in ea quidem curandi ratione, siue pultaceus, siue melleus, siue adiposus, siue cuiusdam alterius substantiæ humor, in eis contentus fuerit, vna nobis intentio perpetua est, vt scilicet tunicam qua humor concluditur, auferamus. Sed dum hoc molimur, impenso studio cauendum est, vt de strumis supra diximus, ne temerè membrana vulneretur, aut dilaceretur, vnde humor, qui in ea continebatur effusus, operationem impediatur, & portio ipsius relinquantur. Si enim dissecta tunica, ac humore profuso, tumor subsederit, difficulter admodum tunica excoriari curarique poterit. Si verò humoris aliquid relictum sit, periculum est, ne morbus renascatur, quemadmodum & struma, cum portio ipsius relictæ est. Quod si tale quid incidit, melius est, non consuere, & exedentibus medicamentis supra positis, aut consimilibus reliquias absumere. Cæterum si steatoma latiore sit apice, basi verò angustissima, tenuissimâq; omisis reliquis aliis superuacaneis auxiliis, totum à radice ipsa amputandum est. Ita enim chirurgicum opus expeditissimum erit, & vlcus paruissimum, planumque reddetur, & curatio breuissimè absoluetur.

*Curatio
per chirurgiam.*

*Aëtius
libr. 15.*

De scirrhis tumoribus, ex atra bile creatis.

CAP. XIII.

30 **D**iximus de tumoribus ex sanguine, flaua bile, & pituita excitatis, de verrucis quoque, & iis quos serosus humor, aut flatulentus spiritus procreauit: ad hæc, de abscessibus qui ex pituitosa substantia maximè ortum habent, atque aliis toto genere præter naturam consistentibus. Proinde reliquum est, vt de iis tumoribus agamus, quibus atra bilis, seu melancholicus succus generationis materiam præstat, cuiusmodi sunt scirrhi, id est, indurati tumores, & cancerosi, quos cancri apothemos vocant. Ita-que scirrhi, sicuti & phlegmones, erysipelatis, & œdema-

*Scirrhus
duplex.*

Scirrhus legitimus.

Melancholia naturalis.

Scirrhus illegitimus.
Melancholia non naturalis.

Non naturalis melancholia quatuor differentiarum.

I. Bilis atra exquisita.

Ex immodice assato sanguine melancholico, fieri bilem exquisitam nigram.

Libr. 14.

Therap. & lib. de atra bile.

Gale. cō. 21.

Li. 4. aph.

Lib. 14.

Therap.

tis, gemina est recentioribus chirurgis differentia, vno scirrhi nomine comprehensa, nempe scirrhus verus, & non verus. Porro verus scirrhus, seu legitimus illis appellatur, qui ex melancholia naturali procreatur. Est autem melancholia naturalis, boni sanguinis sex, ac veluti limosa quædam superfluitas, hoc est, crassior quidam sanguis, cuius color niger est, sapor verò acerbus, vel acidus, ut vomentibus eum non rarò innotescit: in massa quidem sanguinaria (in qua humores vniuersi continentur) existens, alendis partibus melancholicis à natura factus. Scirrhus verò non legitimus, iuxta neotericorum placita, is est, qui ex melancholia non naturali procreatur. Est autem melancholia non naturalis, quæ à modò descripta naturali degenerat, intra tamen limites suæ latitudinis permanens, quos si prætergrediatur, non iam amplius (inquiunt) melancholia, sed alius humor dicitur. Verum melancholia, si in vniuersum definiatur, humor est frigidus, & siccus, ex crassiore (ut ait Guido) ipsius chyli portione progenitus. Cæterum, non naturalis melancholix quatuor differentiarum communiter statuuntur. Prima est, quando humor ipse melancholicus, qui naturalis dictus est, & quotidie gignitur in corpore, dum animal sanitatem fruitur, in propria sua essentia adurit, & putrescit, fitque bilis atra exquisita. Talis enim (ut ait Galenus) ex humore atro supramodum adusto conflatur, habetque splendidum aliquid veluti bitumen, & pix. Hæc autem acida est, in terram effusa velut acetum feruet, & ipsam fermenti ritu eleuat, tum omni animanti iniucunda, adeò, ut ne mures quidem ipsi, aut muscæ eam gustauerint: non magis quidem, quam copiosum salem, in quo nullum animans vitam peragit, ut mare quod mortuum appellatur, indicat. Porro tum gignitur huiusmodi nigra bilis, cum ille veluti sanguinis limus, (quam melancholiam naturalem diximus) diutius moratur in corpore, & neque per aliquem sensibilem effluxum, neque occultum excernitur: verum transmutatur, corrumpitur, & putrescit. Siquidem (inquit Galenus) hic humor ubi amplius incaluerit, aut propter putredinem, aut febrem inflammantem, nigram efficit bilem: quæ quidem frigida est, quia terrestris, sed tamen caloris non expers, quemadmodum

dum & cinis, & acetum, apparétque dum per aluum (ve-
 contingit aliquando dysentericis) excernitur, splendidior,
 ac nigrior ipso sanguine crassiore, & nigriore, quem hu-
 morem melancholicum appellamus. Splendet enim veluti
 5 mortui maris bitumen, quod Iudaicum vocant. Secunda
 species, seu differentia bilis atræ non naturalis est, quæ ex
 adustione aliorum humorum nascitur, vt illa quæ fit ex fla-
 ua bile vehementer vsta. Quæ etiamnum tantæ est mali-
 tiæ, vt & terram radat, & eam more bilis exquisitè atræ, in-
 10 alium attollat. Sed & muscæ ipsam, non secus quàm ve-
 rè nigram bilem, refugiunt. Si sanguis quoque aut pituita
 in corpore vehementer incaluerint, & exurantur, efficitur
 etiam melancholicus humor, non naturalis per adustionem
 dictus, vt voluit Auicennas. Verùm duæ istæ postre-
 15 mæ species (quæ scilicet per sanguinis aut pituitæ assatio-
 nem fiunt) Auicennæ mitiores sunt. Scribit autem Gale-
 nus illam bilis atræ speciem, quæ ex flaua bile vehementer
 assata generatur, deteriores esse, quàm ea quæ ex crassio-
 re sanguine generationem habet, qui subsidenti in dolio
 20 vini fæculæ aut amurcæ, hoc est, fæci olei proportionem re-
 spondet. Hæc enim mitior est, sed potissimum, quoties
 nondum traxit in animali moram cum aliquo calore abun-
 danti præter naturam. Verùm priusquàm in exactam a-
 tram bilé transmutetur, primò in vi tellinam, secundò in
 25 porraceam, tertio in æruginosam transit.

Tertia species melancholiæ non naturalis est, quæ ori-
 ginem sortitur à lapidosa quadam concretione, vt cum ab
 imperitis medicis vel chirurgis, erysipelata, & inflamma-
 tiones (quas Græci phlegmonas vocant) aut quiuis alij tu-
 30 mores ex naturalibus humoribus procreati, ad motus ex-
 trinsecus præsidii, nimis vehementer refrigerantur, astrin-
 gunturque: vel cum iisdem tumoribus, ea quæ valenter ni-
 mis trahunt, digeruntq; medicamenta, adplicantur. Tunc
 enim toto, quod in eis subtilissimum erat, dissipato, id
 35 quod reliquum est (nempe crassius) plus iusto desiccatur,
 lapidis duritiem consequetur, atque in melancholicum hu-
 morem verteretur.

Quarta melancholiæ non naturalis differentia exurgit,
 quando alius humor ipsi melancholiæ naturali permisce-
 tur. Quod dum fit, dulcoratur, ac mitescit magis, nisi dum

2. Bilis a-
tra ex adu-
stione alio-
rum humo-
rum.

Com. 29. li.
3. Præli-
tionum
Hipp.

3. Bilis a-
tra per con-
gelationem
(vt vocât)
& indura-
tionem.

4. Bilis a-
tra ex ad-
mixture.

alterutra bilis adusta huic commiscetur. Siquidem tunc vel acefcit, vel amarefcit, & erosione non modicæ parti-

Quatuor
tumorū dif
ferētias fe
ri ex me-
lancholia.
Verus scir-
rhus nō ex
quisitus.

ceps efficitur. Ex præcedentibus igitur colligere licet, quatuor tumorum præter naturam differentias nasci ex melancholia, seu atribulario humore. Primò nanq; ex melancholia naturali (quam quotidie gigni in sanis diximus) fit verus, ac legitimus scirrhus, apud Arabes sephiros nominatus, Græcis verò $\sigma\eta\iota\rho\sigma$, & $\sigma\eta\iota\rho\sigma$ $\delta\upsilon$ $\alpha\upsilon\gamma\iota\sigma\tau\eta\varsigma$, hoc est, scirrhus non exactus, seu nō exactus, seu nō exquisitus, qui tumor quidem est prædurus, & doloris expers, non om-

ninò tamen insensibilis: Auicennæ impurus appellatur. Galenus tamē libro decimoquarto met. med. tumorem ex humore melancholico conflatum, tunc propriè scirrhum, his qui de nominibus contendunt, condonat esse appellandum, cum omninò sensus est expers. Cum verò nondum omninò factus est insensibilis, scirrhosum potius tumorem, quàm scirrhum (si velint) nominari. Secundò ex melancholia non naturali dicta per admixtionem, tres alia tumorum differentie enascuntur: nempe scirrhus phlegmonodes, œdematodes, & erysipelatodes, quæ pro vna tantum differentia hic numerantur. Tertiò ex melancholia non naturali facta per lapidosam quandam concretionem, generatur scirrhus exquisitus, durus quidem, & omnino sensus, atque doloris expers: ab Auicenna purus nominatus, qui curationem non admittit. Quartò ex melancholia non naturali per deüstionem omnis cancerorum species procreantur, tam vlcerati scilicet, quàm nō vlcerati: de quorum genere est scirrhus cancrusus nominatus. Itaque scirrhus propriè dictus, tumor est durus, & indolens, nō tamen omninò sine sensu, ab humore melancholico naturali, & minimè corrupto procreatus, vt recentiores definiunt chirurgi.

De causis, signis, & indicis scirrhi legitimi.

CAUSAE
scirrhi legi-
timi tres.

CAUSÆ scirrhi, vt & aliorum tumorum præter naturam, triplices sunt. Primitiua scilicet, vt est praua viuendi ratio, crassum, & melancholicum sanguinem generans, coaceruansque. Antecedens, vt succus melancholicus in corpore collectus, à liene (cuius officium est hepar à crasso illo, & lutofo sanguine expurgare) malè attractus, & extra corpus minimè, vt debebat, expulsus

Coniun-

Coniunctæ, humor ipse melancholicus in laborante particula impactus. Signa ipsius scirrhi præsentis, Guidoni NOTÆ
 sunt, tumor durus, & valèter renitens, color inter rubrum scirrhi.
 & nigrum medius: cuiusmodi color fuscus est. Hunc cum
 5 in corporis partibus sæpe incidat, plerique medicorum (vt
 Galenus inquit) pelidnon, hoc est, liuidum vocât. Adhæc, 14. Meli-
 si venas euidentiores membrum laborans habet, exaltatas med.
 eas à crasso, & nigriore quodammodò sanguine, cuiusmo-
 di per aluum aliquando non paucis hepaticorum excerni-
 10 tur, videre licebit. Sed iam scirrhus impurus, & cancrusus
 erit. Hæ enim notæ, quas hîc ad scirrhum accommodat Guido, cancri propriè sunt notæ apud Galenum lib. de-
 cimoquarto methodi medendi. Non ineptè tamen scirrhus
 adaptari possunt, hoc vno dempto, quòd venas tumentes,
 15 & exaltatas non habet scirrhus, vt cancer, nisi scirrhus fue-
 rit (vt diximus) cancrusus. Quippe non rarò scirrhus in
 cancrum degenerat, cum ab eadem fiant materia, succo
 scilicet melancholico. Propriè igitur scirrhi legitimi notæ
 sunt, tumor durus, pertinaxque, ac tactui resistens, in quo
 20 & hebes sensus adest. Adde, quòd & aliæ notæ apparent,
 quæ melancholicum humorem in corpore subesse testan-
 tur. Tumores verè scirrholi ab initio, & dum adhuc prima
 rudimenta concipiunt, magna ex parte exigui apparere so-
 lent: procedente verò tempore, paulatim augmentur, & ma-
 25 iores fiunt. Ex iis quidam vnum duntaxat membrum oc-
 cupant. Alij verò eo membro, quod prius infestabant, reli-
 cto, ad aliud postea transferuntur. Quod dum fit, nomina-
 tur tunc vitium ferinos Auicennæ. Præterea huiusmodi
 tumores melancholici, vt plurimum si rite tractentur, re-
 30 solutione terminantur, nonnunquam indurata manent,
 & non rarò in cancrum (quod pessimum est) degenerant,
 ac transmutantur.

*Veri ac legitimi scirrhi, non tamen exquisiti & in topha-
 ceam duritiem omnino insensilem concreti, curatio.*

35 **C** Aeterum absolutam induratorum huiusmodi tumo-
 rum præter naturam, qui veri scirrhi, non tamen ex-
 quisiti, nominantur, curationem tribus intentionibus asse-
 quemur. Prima conuenientem viuendi normam præscri-
 bit. Secunda materiam antecedentem (id est, quæ parata
 est, statim morbum efficere) tollendam monet. Tertia
 da.
 coniu

Guido no-
 tas cancri
 tribuit scir-
 rho.

IVDICIA
 scirrhi.

Ferinos.

Tres inten-
 tiones in cu-
 ratione scir-
 rhi legiti-
 mi obserua-
 da.

conjunctæ (vt vocant) materiæ, & morbum iam committentis vacuationem moliendam esse nobis insinuat. Itaque (vt in vniuersum dicatur) victus rationem eorum qui scirrho laborant, sobriam, & moderatam, & quæ ad calidum, & humidum declinet in rebus (vt dicunt) non naturalibus instituito. Ergo aliméta euchyma, id est, boni succi, & probum sanguinem generantia exhibeto. Panem itaque triticeum, probe subactum, & moderato igne in furno coctum, quique fermenti aliquid habeat, & salis quod satis est, præscribito. Vinum substantiâ tenue, & odoratum deligito: crassum verò, nigrumque vitato. Oua sorbilia, pullos, capos, gallinas, & eorû iura præbeto. Perdices, phasiani, coturnices, capreoli iuuenes, vituli lactantes, & anniculi verueces, laboranti in deliciis sumto. Ex oleribus, id quod Arabes aspanar, nos verò nomine paulum murato, spinacium dicimus, lactucas item, lupulum, boraginem, & buglossum, atque id genus alia, quæ sanguinem expurgant, & puriorem reddunt, ne aspernator. In summa, ea omnia, quæ sanguinem melancholicum suapte natura pariunt, fugito. Ea autem Galeno libro tertio de locis affectis capite sexto ferè sunt, caprina, bubulæque caro, magisque hircina, & tauрина. Sed maximè asinorum, camelorumque carnes: item vulpinæ, caninæque. Leporum quoque, sed multò magis aprorum. Præterea limaces, si frequēs sit eorum vsus, atque omnes terrestrium animalium carnes sale conditæ. Aquatiliū quoque carnes, vt thunni, balenæ, vituli marini, delphini, canis, atque cetaceorum omnium. Ex oleribus autem, brassica ferè sola huiusmodi sanguinē gignere consuevit. Quemadmodum & arborum germina, vbi vel muria, vel oxalme condiuntur, præcipue lentisci, terebinthi, rubi, & rubi canini, qui Græcis cynosbatos appellatur. Leguminum verò omnium maximè lentes, inter melancholicos cibos numerantur. Mox panis furfuraceus & qui ex typha, atque vitiatis seminibus factus est, quorum apud quasdam nationes vsus loco frumenti habetur. Præterea vina crassa, nigraque aptissima sunt, vt ex ipsis melancholicus humor fiat: præsertim, si quis abundè ipsa ingerens, oblata occasione in multo calore corpus contineat. Vetus denique caseus, vbi fortè fortuna in corpore fuerit super calefactus, facit huiusmodi parit humorē. Hæc ex Galeno

Vinendi ratio.

Euchyma. Panis optimus.

Vinum.

Oua.

Carnes.

Olera.

Carnes.

Limaces.

Pisces.

Olera.

ὄξυς fit ex acetosæ sale.

Leguminis

Panis.

Typha exile est triticum, specie filigini non dissimile.

Vinum.

Caseus.

Sanguinē adurentia.

- leno hætenus. Cauendum insuper est, à retorridis, asis quoque, & frixis vehementer exiccatis. Item salitis, acidis, & acribus (veluti sunt allia, cepe, piper, sinapi) & aliis id. *Animi & dūa. Ex.*
- 5 oportet iram, moestitiam, vigilias, sollicitudines, atque immoderatas exercitationes. Animi tranquillitas, ac lætitia magnoperè est expetenda: summæque ope nitendum, ut quotidie venter deiciat. Hætenus de primo scopo. Ut autem quod secundus scopus nobis proponit, consequamur,
- 10 præcipit. Auicennas, corpus vniuersum vacuandum esse, tum venæ sectione, si sanguis niger admodum, & crassus apparuerit, tum medicamēto purgante, quod bilem atram exagat: cuiusmodi sunt Mesuæ, epithymum, fenna, poly-
- 15 fumaria Latinis appellatur) lupulus, volubilis. Item cassia fistula, myrobalani Indi, lapis lazuli, qui Græcis cyaneus, Romanis cæruleus dicitur. Diasene, diacatholicon, hiera Ruphi. Hæc enim omnia humores melâcholicos per aluū expurgant. Sed hæc, quæ ad pharmaceuticæ & dieteticæ
- 20 attinent, chirurgi metas excedunt. His igitur medicæ artis professoribus relictis, ad tertium scopum properabimus, quem sanè nos assequemur, si quod præter naturam in par ticulari est, totum vacuetur. Quæ communis quidem, ac pri-
- 25 tumorum: in quibus utique adhuc non sunt geniti pori.

Animi & dūa. Ex.

*2
Vacuatio materia antecedentis.*

*3
Vacuatio materia cōiuncta.*

- Modus autem vacationis eius proprius est, circa quem circumspectum, & maximè attentum esse curantem oportet. Siquidem materia eiusmodi tumorū, naturæ tam malignæ est, ut in duritiem veluti lapideā abeat, si temerè re-
- 30 soluatur. Si verò plus quàm par est, eam emollias, periculum sanè imminet, ne ipsa corrumpatur, & scirrhus in can- crum degeneret. Sequendum igitur in hac re Galeni ac Pauli (qui de hac re ante Auicennam scripserunt) consi- lium est. Nempe ut scirrhosis ipsis affectibus, nullum vehem-
- 35 enter excalfaciens siccansque medicamentum applicetur. Nullum item quod duntaxat emolliēdi, atque hume- ctandi vim obtineat. Quod enim superfluum humorem habet, nihil omnino dissoluit: quod verò minimum, plus quàm oportet, exiccat. Hinc non omnino absurdè præ-
- cipiebat Auicennas, alternatis vicibus ad hos induratos tumores

Materia scirrhorum cautè tra- ctanda.

Gale. 2. ad Glauco.

tumores, modò emollientibus, modò digerētibus per halitum, vtendum esse. Verùm quoniam id & tædiosum, & factu, vt oportet, perdifficile est, satius ac tutius Galeno *Medicamēta scirrhis accomoda.* visum est, medicamentis mixtam facultatem habentibus, ad horum curationem vtendum esse. Eodem enim tempore, quod induratū est molliemus, & sensim per halitum digeremus. Illis tamen ab initio, aliquid quod modicè reprimat, erit admiscendum. Ad hanc rem Auicennas quamplurimas remediorum formulas instituit, verùm quoniam ea magis dicata sunt scirrhis ex phlegmone, aut erysipelate impendiò refrigeratis (vt in sequenti capite ostendemus) procreatis, illis relictis, assume medicamentum à Rase libro septimo ad Almanforem descriptum : facta tamen priùs ab initio aliquali influentium humorum (moderatis quibusdam repellentibus admotis) repressio- *Rasis medicamentum ad scirrhis emolliendos & discutie- dos.* 15
 Accipe bdellij, ammoniaci, galbani, singulorum partes æquales, terantur in mortario, cum oleo de ben (quod Græci balanum myreplicen, Latini glandem vnguentariam vocant) aut de lilio. Deinde sume mucaginum scæni- *Galenicæ cataplasma Theriac.* 20
 græci, seminis lini, & ficuum, pondus omnium prædictorum, terantur omnia simul, donec in vnum coeant. Galenus ad eam rem magnoperè commendat corticem radicis althææ (quam, inquit, vulgus anadendromalachen, quasi dicas, arborecentem maluam vocat) anserino, vel gallina- *Si scirrhus ad suppurationem spectet.* 25
 ceo adipe liquatam, & cum eo contusam, atque in cataplas- matis forma redactam. Quòd si tumor ad suppurationem spectet, summoperè cauendum est, ne particula laborans calorificis auxiliis, aut quouis alio modo irriteretur. Ita enim facile cancer accerseretur. Si verò aperiatur tumor, materia iam in pus conuersa, ab vsu vnguenti, quod diachylon nominatur, minimè tibi discedendum fuerit. At si in lapideam duritiem degenerauerit, ad ea auxilia, quæ sequenti capite describentur erit recurrendum. 30

*Scirrbus il-
legitimus
quomodo
generetur.*

De scirrha illegitimo non exquisito, ex vehementi refrigeratione, aut exiccatione originem sortito.

Q Vando medicorū imperitia, inflammationes (quas Græci phlegmonas appellant) aut erysipelata impendiò refrigerantur, aut admotis medicamentis, vehementer

menter trahentibus, & per halitum digerentibus, temere
 resoluuntur, tunc totum id quod in eis tenue magis erat, dis-
 soluitur, quod vero reliquum est, velut congelatur, atque
 impensius resiccatur, lapideam duritiæ assequitur, sitque
 5 tandem affectus, qui Græcis scirrhus vocatur. Caterum
 contingit quandoque particulam aliquam indurari pro-
 pter tensionem, quam sustinet ex flatibus, aut humore
 quopiam aquoso, ut supra dictum est, dum de tumoribus
 flatuosis & aquosis ageretur. Nonnunquam & tephacea
 10 durities in particulis quibusdam oboritur, propter priua-
 tionem humiditatis, & nimiam desiccationem, ut in duri-
 tia iuncturarum, & poris in articulariis morbis, ac dolori-
 bus, procreatis. Verum enimvero hæc duntaxat agemus de
 scirrhis, seu induratis tumoribus, qui ex phlegmone, aut
 15 erysipellate, paulò ante commemorato, ortum traxerunt,
 aut etiam ex œdemate impendit refrigerato, & adstricto.
 Atque eos non absurdè scirrhus ex coincidentia procreatos
 nominauerimus.

20 *De signis & iudicijs scirrhi non legitimi, ac non pro-
 prius exquisiti ex coincidentia creati.*

Scirrhi illegitimi, & non omnino exacti, notæ sunt tu-
 mor durus, vix sensibilis, id est, quasi sensus, & doloris
 expers, corporis colorem ad vnguem repræsentans, ex me-
 25 lancholia non naturali ortum ducens. Hæc nec prorsus in-
 curabilis est, nec facilem sanæ curationem admittit. Siqui-
 dem humor, unde huiusmodi vitium contrahitur, lentus
 seu glutinosus crassusque est, aut (ut Galenus ait) viriusque
 rationis particeps, qui particulis induratis infarctus, solui
 30 contumaciter repugnat. Vbi præsertim resoluta ex ipso
 subtiliori humiditate, quod reliquum est, exiceatur lapi-
 dosumque efficitur. Scirrhus verò exquisitus, & qui om-
 ninò sensu vacat, curationem non recipit. Si tamen ali-
 quo modo iuari possit, humectandi ratione id præstari
 35 debet. Durities quoque ex nimia exiccatione, & marasmo,
 hoc est, consummata prorsus siccitate, insanabilis est: satis
 enim est prohibere, ne ultra siccitas procedat. Sed & scirrhi
 in quibus pili enascuntur, quique magni sunt, ac vehemen-
 ter duri, & corporis colorem referunt, nec sanantur, nec
 unquam permutantur, ut scriptum reliquit Auicennas.

I
*Durities
 in particu-
 lis cause.*

2

3

*Scirrhi ille-
 gitimi, &
 non exquisi-
 ti note.*

IUDICIA.
I

2

*Scirrhus ex
 exquisitus
 curatione
 non admis-
 sit.*

3

*Scirrhi in-
 curabiles.*

Curatio

*Summa cu-
randorum
scirrhorū.*

CVrandi verò eius communis indicatio est: vt quod præter naturam in particula est, totum vacuetur. Modus tamen vacuationis eius proprius est, vt libro decimo-
quarto meth. Galenus annotauit. Nā detergere (inquit) id quod contumaciter inhæret, oportebit. Quod si quis iis quæ vehementer trahunt, digeruntque, medicamentis vacuare tentet, nec iis quæ excalfaciant, & humectent, molliat, ac liquet, huic paucis primis diebus egregiè processisse
10 curatio videbitur. Scirrhus enim manifesto decreuisse apparebit. Cæterum quod de affectu restabit, id insanabile erit, siquidem toto, quod in eo tenuium partium erat, digesto dissipatōve, quod reliquum est, veluti lapidosa concretio linquitur. Hac igitur de causa ad scirrhosos affectus
15 nullum vehementer excalfaciens, siccansue medicamentum idoneum est. Sed ea tantum, quæ cum molliendo, hoc est, præter quod molliant, digerere etiam commodè possunt. Cuiusmodi sunt, tum ceruina medulla, tum vitulina, tum seuum hircinum, taurinum, pardale, & leoninum.
20 Ex adipibus volucrum cōmendatur imprimis anserinus; quā proximè sequitur gallinaceus, & phasianicus. Adhæc, ammoniacum thymiana, id est, suffimem, galbanum, & bdellium vtrunque, magisque Scythicum, quanto videlicet est humentius. Styra quoque qui humentior est, &
25 pinguis. Radix etiam althææ, & syluestris maluæ, quæ passim nascitur, folia modicè antè decocta, cum anserino adipe, aut gallinaceo: vel si horum facultas non sit, suillo contusa, ad hanc intentionem apprimè sunt idonea. Prohibet autem Auicennas axungias salitas, & prædictis addi ma-
30 stichen, ladanum, œspypum humidam, strygmenta gymnastiorum, quæ sordities balneorum appellant, sterus asininum, & fæces oleorum de lilio, de alchanna, quod cyprium vocant, & de cherua, quod Græcis *κίτρινον*, Latinis verò ricininum dicitur. Cæterum curatio quæ per acetum
35 administratur, utilis est huic vitio, hoc est, scirrhu iam adulto, & cum præparata iam sub mollientibus pars fuerit: vt etiam Galenus annotauit. Siquidem (inquit) aceti vis, modo ea quis modicè & debito tempore vtatur, salutaris eiusmodi affectibus est, seu crassos humores dissecans ac
resoluens

*Medulla.
Seuæ.*

Adipes.

*Gale. 14.
meth. med.
Anadēdro
malache.*

*Strygmēta
gymnastio-
rum.*

*Oleum rici-
ninum.*

*14. meth.
medendi.*

resoluens. Sin vel immoderatus, vel in tempore non ido- *De aceti v*
 neo, tenuiores partes violenter absumens, id quod reliquū *su in varijs*
 est, lapidescere finit. Sed & si quis eo diutius vtatur, sub- *scirrhis*
 stantiam ipsam neruorum delibauerit. Ob id igitur nec *partibus.*
 5 sæpe ac inter initia, nec longo tempore, medicamentis quæ
 ex aceto componuntur, ad ligamenta & tendones est v-
 tendum. Eam ob rem Galenus Cercilij puerum, cui ex *Historia.*
 erysipelate nimis infrigidato, & vehementer adstricto, *Libr. 2. ad*
 tumor durus; ac scirrhusus in toto femore relictus fuerat, *Glauc.*
 10 ita curabat. Imprimis femur persudit oleo sabino, quod *Oleum sa-*
 omnium est tenuissimum, cuius loco hodie vtuntur oleo *binum.*
 sambacino, quod vulgus iasminum vocat. Postquam ve-
 rò partem sic fouisset, ammoniacum thymiana, hoc est,
 15 suffimentum, quod pingue, & non vetustum esset, prædi-
 ctis medullis, & adipibus remixtum adhibuit. Post hæc
 ammoniaco pinguisimo, aceto acerrimo dissoluto, cir-
 cumleuit totum femur, iussitque puerum altero crure sa-
 lire, quo plus in id alimenti ferretur. Itaque relaxantibus,
 quæ molliorem tumorem reddebant, & digerentibus, seu
 20 resoluentibus ita vicissim, ac moderate vtendo, puerum
 curauit. Verum in tendonibus, & ligamentis scirrhusus
 obductis, aceto ex Galeni consilio ad hunc modum vtend-
 um est. Lapis igni candens aceto acerrimo extinguen-
 dus est, & si quidem haberi potest, pyrites, sin eius copia *Tendonum*
 25 non est, molaris, quem Græci mylitem vocant. Deinde *& ligamē-*
 ascendente post infusum lapidi acutum yapore calido, *torum scir-*
 in hoc pars affecta commoueri debet: vt vaporem ascen- *rhusorū ca-*
 dentem recipiat, à quo scirrhus dissoluatur: atque exinde *ratio ex Ga-*
 rursus medicamen quod emolliat imponendum. Oleo ta- *le. & Pau-*
 30 men non aqua quotidie ab initio omnino laborans par- *Libr. 14.*
 ticula persundenda est, Esto autem id oleum haudqua- *Therap. &*
 quam adstringens: sed planè tenuium partium, cuiusmo- *2 ad Glauc.*
 di sabinum est. Interdum autem incoquenda *Pyrites la-*
 theæ radix, ac syluestris cucumeris, & si qua est eius gene- *pis.*
 35 ris alia. Sanè plurimi hac curationis ratione pauco tem- *Lapis my-*
 pore perfecte sanati sunt, adeo vt multis ferè (inquit Gale- *lites.*
 nus) magicum opus videretur, Ex his igitur constat, cura- *2. ad Glauc.*
 tionis quæ per molliencia fit rum in tendonibus, tum in
 ligamentis, cum scirrhusa fuerint, aliquid incidentium de
 bere admisceri. Ex quorum numero vel imprimis acetum *Lib. 6.*

est. De medicamentis autem, quæ vim molliendi durities obtinent, diffusius alibi tractabimus.

Capita curationis scirrhosorum tumorum.

- 1 **S**cirrhum, qui resoluta, atque absumpta humiditate, in stophaceam duritiem concreuit, sensûque omnino caret, cuiusmodi est, quem exquisitum Galenus vocat tanquam immedicabilem curare ne aggreditor.
- 2 Scirrho non exquisito (qui non sine sensu quidem omnino est, sed ægre admodum sentit) medicamenta, quæ tepido calore, ac mediocri humore prædita sunt, hoc est, quæ emolliendo moderate digerant, adhibeto.
- 3 Vehementer digerentia, atque immodicè exiccantia partibus scirrho laborantibus, ne vnquam admouero, iis enim subtilior humiditas resoluitur, quod verò reliquum est, exiccatum lapidosumque efficitur.
- 4 In duris ac densis partibus scirrho obseffis, cuiusmodi sunt tendones, atque aliis etiam in locis si affectus iam inueteratus est, medicamenta quæ diffecent, atque incidant, cuius generis est acetum, emollientibus, & moderate digerentibus misceto.
- 5 Scirrhosam quoque partem hanc, duram ac densam, & quamlibet aliam diuturno scirrho affectam, super vaporem calidum quem molaris lapis, igni candens æcerri-
mo aceto perfusus emittit, collocari, subindèque versari iubeto.
- 6 Quotidie etiam oleo aliquo tenuium partium, in quo cucumeris sylvestris, aut althææ radix, aut anethum viride, & recens, aut id genus aliud incoctum fuerit, affectam partem perfundito.
- 7 Eiusmodi deficcantia, incidentia ac crassos humores resoluentia modice, id est, non sæpe nec longo tempore, atque oportune, hoc est, non inter morbi initia, & interposito remollientium usu, prædictis scirrhosis partibus amoueto.
- 8 In summa scirrhos omnes, qui nondum callum contraxerunt medicamentis, quæ commode digerendo emolliunt curato.
- 9 Scirrhosi lienis atque etiam iecinoris curationem, medicorum prudentiæ committito.

De cancroso tumore, quem vulgò cancerum apostematofum
vocat. C A P. X V.



Canceri nomen medicis, & chirurgis æquiuo- *Canceri no-*
cum est, eius enim significatio ad duo mor- *mẽ ad duo*
borum genera extenditur, nempe ad cãcro- *1.) morbo-*
sum tumorem (quem vulgò cancerum apo- *rũ genera*
stematofum vocant) tam euidentem, hoc est, in *extẽditur.*

summa corporis parte hærentem, quàm absconditum, vt *2.) Cancer*
qui in penitioribus, & latentibus corporis partibus, est *ex quo hu-*
10 fede, palato, aut sinu muliebri conditus, & ad cancerum vl- *more gi-*
ceratum. Porro vterque affectus gignitur ex atra bile, *gnatur.*

hoc est, eiusmodi naturæ succo, cuiusmodi est sãx in vino,
& amurca in oleo: vt decimoquarto Therapeutices, &
libello de tumoribus præter naturam, Galenus testatum

15 reliquit. Vbi autem mitior fuerit succus huiusmodi laten-
tem, seu occultum cancerum, sine vlcere progignit. Si verò *Cãcer sine*
acrior maligniorque contingat, cutim erodit, & cancerum *vlcere.*
facit cum vlcere, de quo in sequentibus dicemus, quando *Cancer cũ*
scilicet de vlceribus agemus. Hic autem solum sermonem *vlcere.*

20 faciemus de cancro in extimis partibus constituto, &
nondum exulcerato, qui & ipse quandoque occultus Ga-
leno dicitur. Est igitur cancer, quo de hic agitur, tumor *Cancerofus*
durus, inæqualis, rotundus, venosus, id est, venas habens *tumoris de*
in circuitu turgidas: & exaltatas, liuefcens siue fuscus; & *scriptio.*

25 (vt Paulus ait) colore magis, quàm inflammatione, ni-
gricans, calidus, sed non adeo, vt inflammationes, subito
accrescens, ægros maximè fatigans: & perpetuo fere dolo-
re affligens, Græcè καρκίνος & καρκίνωμα dicitur. Hanc *Quare can-*
autem appellationem huic morbo indiderunt tam Græ- *cri nomen*

30 ci, quàm Latini, à cancro aquatico animali: quoniam cir-
ca hunc implentur & intenduntur venæ, cancerorum pe- *hoc vitium*
dibus, à glomere illo corporis descendentibus, persimiles. *sibi adopta-*
rit.

Nonnulli verò inde sic nuncuparunt, quòd difficillimè ab
his partibus, quas obsederit, euellatur, quemadmodum

35 cancer aquaticus animans: Is enim loco, quem semel ap-
prehenderit pertinaciter hæret. Adde quod & hic tumor *Canceri no-*
canceri animalis colorem repræsentat: nempe subnigrum. *ta per ini-*
Cæterùm prima canceri istiusmodi rudimenta, tam con- *tia confuse*
fusa interdum exiguæque sunt, vt vulgus ipsum latere *atque ob-*
possint: vix enim dum adhuc incipit ciceris, aut fa- *scura.*

Lib. 14. hæc magnitudinem æquat. Quare nihil miri est (inquit
Thera. mc. Galenus) si vulgus tunc lateat, non secus profectò quàm
 stirpes, quæ à terra iam exeunt: quandò hæc quoque peri-
 tis tantum agricolis agnoscuntur. Postea verò in tantam
 molem attollitur, tamque vehementia, & magna, & cun-
 ctis evidentiâ adfert symptomata, ut ne puerum quidem
 clam sint. Itaque tunc nemo de appellatione ambigit, sed
 nominant vno assensu omnes eiusmodi affectum, cæcûm:
 quoniâ (ut diximus) venæ in hoc morbo ex utraque parte
 intumescunt, distendunturque, ac figuram omnino simi-
 lem cancro repræsentant.

Signa & iudicia canceri evidentiâ, & non ulcerati.

NOTÆ
 canceri evi-
 dentiâ non
 ulcerati.

Cancrosum tumor (ut superius dictum est) duritiâ
 habet, & inæqualitatem, quæ tactu faciliè deprehen-
 ditur. Colorem præfert lividum, siue fuscum, qui inter
 rubrum, & nigrum medius est, Græci *καρκίνος* vocât. Cir-
 ca locum cancro affectum, quidam icthys, quasi punctim
 illata sentiuntur; interdum etiam torpet Celso. Venas o-
 stendit in circuitu tumentes, & exaltatas, canceri brachio-
 rum modo. Nonnunquàm etiam in quibusdam delites-
 cunt. Tactusque is locus, aliis dolorem adfert, in aliis eum
 non habet. Renixus quoque huic tumori valens est. Gale.

IUDICIA.

14. Therap. Adhæc, extraneam quandam caliditatem ha-
 bet. Cancer, seu carcinoma à toto genere morbus est gra-
 vis, & perniciosus. Vix enim unquam propter succi crassi-
 tiæ consanescit, utpote quòd nec repelli, nec discuti queat,
 nec totius corporis purgatione cedat. Sed & tanta eius vi-
 tij est malignitas, ut mitiora planè contemnat remedia,
 illisque (ut dici solet) medium vnguem porrigat, vehemē-
 tioribus verò, veluti crabro irriteretur, excandescatque, at-

2 que efferetur. Id vitium in qualibet corporis parte oriri

Celsus lib. quinto.

Gal. lib. 2.

ad Glauco.

consuevit, sed maximè in partibus superioribus circa fa-
 ciem, nares, aures, labra, & mammas foeminarum, atque
 earum præcipuè, quæ à natura purgationē menstruorum
 non habent. Sed & viris plerunque accedunt canceri, qui-

3 bus assuetæ per mariscas purgationes suppressæ sunt: per
 has enim turbidus, ac crassior sanguis (vnde prima
 tum hoc rudimenta accipit) expurgari à natura consue-
 4 uit. Porro cùm humor ipse melancholicus sæci vinariz
 proportionem respondens, in particulam aliquam defluit,

ibique

- ibique impactus manet: interdum varices facit, aliquando
verò cancrum, utpote cum ipse deferbuerit. Cum verò
ad curim vniuersam expellitur, fit is morbus, quem ele-
phantem nominant. Est itaque cancer particularis quæ-
dam elephantiasis, quam vulgus malè lepram appellat.
Quanto autem sanguis ex quo ortum habet cancer, cras-
sior fuerit, ac nigrior, tantò deterior affectus erit. Cancer
autem iam confirmatus (ut dicitur) atque inueteratus, cu-
rationem non admittit, nisi radicitus extirpetur, aut per
sectionem scilicet, aut per vstionem: verum qui in penitio-
ribus corporis partibus constituti sunt cancri, talem cu-
rationem non desyderant, ut sequente aphorismo nos edo-
cuit senior ille, medicorum facile princeps Hippocrates, *Apho. 38.*
inquirens: Cancros occultos omnes melius est non curare: *lib. 6.*
curati enim citius pereunt: non curati verò, longius tem-
pus perdurant. Experientia nanque (ut in commentario
huius aphorismi Galenus testatur) compertum est, omnes
qui huiusmodi cancos sectione, aut vstione curare ten-
tarunt, illos magis irritasse, & breui homines interemis-
se. Soli itaque cancri illi curationem huiusmodi admit-
tunt, qui in summa corporis parte hærent, quique exulce-
rati sunt, & adeò laborantes fatigant, ut ipsi ultro chi-
rurgi manum efflagitent: & simul in talibus partibus co-
sistant, quas resecare, & exurere vnà cum radicibus possis.
Voco autem radices cancri cum Galeno, eas, quæ plenæ
sunt sanguine melancholico, venas, & vndique versum ad
loca circumstantia extenduntur. Cæterum ex cancro non
vicerato, non rarò fit viceratus, putrescente scilicet spatio
temporis humore, in vasis delitescente, vel irritato à me-
dicamentis inconsultè admotis, affectu. Hunc autem exul-
ceratum cancrum pessimum esse, iudicant omnes, & ve-
ræ curationi (quæ omnia molitur, & agit, ut laborans par-
ticula ad sanitatem perducatur) prorsus ineptum. Hic en-
nim ad perfectam atque absolutam sui curationem, mor-
dientia, aspera, ac vehementia desyderaret medicamenta.
Atqui (ut diximus) talibus magis irritatur, efferaturque,
tantum abest, ut sub iis vel mitescat, vel consanescat.
Proinde satis fuerit, si cancos non viceratos, etiamnum
summa corporis occupantes, præsertim maiores, & iam
inueteratos, prohibeamus augeri, à perfecta quidem cu-

*Qui cancri
radicibus
tollidebeant,*

*¶ qui nō.
Radices cā
cri.*

*Cancer ex
ulceratus
pessimus af-
fectus.*

Quæ nota in cæcro futura exulcerationem portendant. Curatione manum subtrahentes. Quod & superiore aphorismo nos commonuit Hippocrates. Cancros enim eos, qui sine exulceratione fatigant, etiam (Galeno autore) occultos nominauit. In quibus sanè exulcerationem minantur, vehemens caliditas, & pulsatio. 5

Curatio cancri non exulcerati adhuc incipientis, & nondum inueterati, summa corporis occupant.

Triplex curatio cancri scroscopus proponitur.

Curatio cancri non exulcerati, & adhuc recentis, tres habet scopos præcipuos. Primus est, humoris melancholici generationem prohibere. Secundus est, succum melancholicum per totum corpus dispersum vacuare. Tertius, humorem, qui locum affectum occupat, vel regerendum, vel digerendum omnino: adhuc, particulæ laboranti robur adferendum esse insinuat.

Primus scopus.

Victus ratio tenuis sit, bonique succi.

1 Primus scopus perficitur ea viuendi ratione ad vnguem obseruata, quæ suprà in capite de scirrho legitimo nominato præscripta est. Id autem inter cætera maximè ac præcipuè obseruandum est, vt iis qui hoc affectu laborant, ea alimenta offerantur, quæ refrigerandi, atque humectandi vim sortita sunt: quæque probum ac tenuem succum in corpore ingesta, generant. Cuiusmodi sunt, cremor hordei, pisces saxatiles, omnis generis aues, præterquam palustres, ouorum, sed maximè forbilium (quæ Græci *φίφτα* vocant) lutea, & quæ eius generis sunt alia. Quod si caliditas effatu digna, citra febrem tamen in particula laborante adfuerit, lac bubulum, à quo butyrum fuerit extractum, vel serum lactis tuto offerri potest. Sed & olea, quæ refrigerantis, atque humectantis naturæ sunt, veluti malua, attriplex, blitum, & quando tempus tulerit, cucurbita, item citrulli, & borago, illis in cibum permittuntur. 20

Secundus scopus

Humoris melancholici vacuatio. Epithymii sensim ac blande non

2 Secundus scopus qui est, totum corpus ab humore melancholico, vnde vitium hoc originem traxit, repurgare, completur purgantibus medicamentis vacuandæ atræ bili accommodis, in capite de scirrho superius enumeratis. Inter quæ (quod ad rem præsentem attinet) principatum obtinet epithymum (quod Romani inuolucrum vocant) pondo drachmarum quatuor, in sero lactis mulsæve exhibitum, vt Galenus præcepit libro de climo quarto methodi medendi. Ea autem quantitas epithymi, vel paulò maior, 35

tertio

tertio quoque die offerenda est, vt scilicet melancholicus humor, qui in venis collectus est, & cancro generationem dedit, sic sensim atque ex interuallo vacuetur. Quando quidem vniuersum simul euacuare vix datur. Sed nec semper prohibere possumus, ne deinceps eiusmodi succus in corpore generetur, & in venis colligatur. Itaque materię eiusmodi antecedentis purgatio, sic per initia quidem simplicium aliquo, per vices molienda est. Deinde (si res ita exposulet, & simplicium exhibitione parum proficitur) compositorum aliquo, cuiusmodi est Galeni medicamentum atrę bilis vacuandę dicatum, quod ex duobus & triginta simplicibus est compositum, vel hiera Ruffi, & Auicennę, quę nigrum veratrum recipit. Nec ab iis quidem ita repetitis purgationibus prius desistendum est, quàm totus ille succus melancholicus in venis collectus eductus fuerit, & pars tumore huiusmodi cancroso obfessa ad naturalem statum omnino sit reducta. Quod si nihil obstiterit, hoc est, si ætas, & vires permiserint, non inutile etiam fuerit in canceris ipsis sanguinem mittere, demum (vt dictum est) purgare: & si fuerint mulieres, menstrua euocare, siquidem nondum quinquagesimum annum attigerint, vt libro secundo ad Glauconem Galenus nos admonuit. Hęc secunda indicatio omnium prima est Galeno, quę verò primo loco posita est secundum ordinem sibi iure vendicat. Communis nanque (inquit) indicatio curationis in cancro est, humorem, vnde vitium est natum, illico vacuare: mox verò prohibere, potissimum si fieri potest, ne de cætero eiusmodi succus melancholicus in venis colligatur. Sin id fieri nequit, saltem eum omnino ex interuallis vacuare, & simul particulam firmare, ne quid humorum redundantis ad eam confluat.

Tertia igitur indicatio (quę omnibus eiusmodi affectibus ex fluxione creatis, communis est) nobis insinuat humorem, qui in particulam affectam procubuit, vel re- gerendum esse, vel digerendum omnino: adhęc particulam firmandam esse, ne quid humorum redundantis ad eam confluat. Porro repellendi quod influxit tempus accommodum erit, in principio quidem, tam in ipso purgationis tempore, quàm antè. Vbi verò iam totum

semel, at-
que affa-
simpurgā-
dum in can-
cro.

Hiera Ru

Hiera Au

cenna.
Sanguini
missio.

Lib. 4.

meth. me

3.
Tertius
pua.

Quid
princep
et si

ipso purga- corpus exquisite purgaueris, tunc digerendi dabitur oc-
tionis sepo- casio. Verùm si mediocris tantùm purgatio præcessit,
re agendū. mixtam habere facultatem quod applicabitur medica-
Quod apu mentum conueniet, reprimentem scilicet, & digerem-
mellicamen tem. Sanè, vt has intentiones ritè assequaris, deligen-
tum cūcri. da tibi erunt medicamenta, quæ viribus quidem sunt

Lib. 14.
Therap.

mediocria, qualitate verò minimè mordentia. Talia enim huiusmodi affectibus solùm sunt idonea. Nam quæ imbecillas vires habent (vt Galenus ait) nullum operæ-
 pretium efficiunt, sed vincuntur. Quæ verò valentiore
 sunt facultate, vehementer quidem tenuiores, quæ in
 venis sunt, sanguinis partes, vel digerunt, vel retrudunt,
 crassas verò & melancholicas, quas fæci prius assimilauimus,
 nec euocant, nec repriment: quin potius eas ad
 soluendum ac discutiendum omnes contumaces reddunt. 15
 Ad sanandos igitur incipientes caneros, medicorū vi-
 rium medicamentis est opus, quæ scilicet nec propter
 imbecillitatem vincantur, nec propter effectus vehemen-
 tiam, valenter sanguinem incrassare valeant. Adhæc item
 (vt dictum est) quæ omnino haud mordeant. Quando- 20
 quidem vitij malignitas ab iis quæ mordent, irritatur, ac
 (vt dici solet) efferatur. Cæterum cum materia ex qua
 ortum habent cancri, magna ex parte crassa sit, repul-
 sioni, ac etiam resolutioni contumax, siue inobediens,
 multæque malignitatis particeps, sat fecerimus (vbi sal- 25
 tem periculum ex chirurgia timuerimus, nec curari affec-
 tus aliter possit) si vsu præcedentium medicamentorum,
 ex vstis elotisque metallicis (vt Galenus consulit) accepto-
 rum, ipsos augeri prohibeamus, & præsertim si maiores
 fuerint: aut iuxta Auicennæ sententiam, eos ab vlceratio- 30
 ne vindicemus. Ad quas intentiones libro secundo ad
 Glau. succum solani, & medicamen ex pompholyge con-
 stans, aut quod ex chalcite fit (diapalma vulgò appellā-
 tur) magnopere Gal. commendauit. Proinde & Theodo- 35
 ricus ad eam rem vnguentum instituit diapompholygos
 nominatum, quod eidem recipit olei rosarum, ceræ albæ
 ana vncias quinque, succi granorum rubrorum, solani vn- 40
 cias quatuor, cerussæ lotæ, vncias duas, plumbi vsti, & loti, 45
 pompholygos (quæ tuthia vulgò dicitur) ana vnciam
 vnam, thuris vnciæ semissem. Refert quoque Galenus li-
 bre

in ecus sold-
vi.
Diapopho-
igos.
Diapheni-
m seu dia-
alma.
nguentū.
Diapopho-
gos Theo-
rici.

- bro primo de compositione pharmacorum secundum locos, qui myamir veteri interpreti inscriptus est, vnguentum quoddam ex Apollonio, ad manantia capitis vlcerata, quæ Græci achoras vocant, institutum, quod ad eiusmodi modi cancriferos tumores adprime vtile esse adfirmat. Re-
- cipit autem olei, vel rosacei, vel omphacini, id est immaturi, heminam, quæ Græcis coryle dicitur, quod in pitam plumbeam infusum tantisper sub sole cochleario, etiam plumbeo agitari debet, aut pistillo pumbeo teri, donec nec crassescat nigrescatque, adeò, ut plumbi colorem referat. Deinde seorsum conterito, lithargyri libram vnam, ceteris tantundem, & cum oleo commisceto, ac fiat vnguentum. Porro quantum valeat facultas plumbi, præsertim combusti, & eloti in omnibus cancriferos dispositionibus, satis superque nouerunt omnes, qui de hac re periculum aliquando fecerunt, & qui attente legerunt, quæ scribit Galenus de plumbo (quod molybdos Græcè eidem dicitur) libro nono de simplicium medicamentorum facultatibus. Ad eandem morbosam dispositionem laudarunt
- Paulus & Auicennas emplastrum ex cancris fluuiatilibus, præsertim si parem modum cadmiæ receperit. Cancrorum igitur fluuiatilium crematorum, & cadmiæ par modus in pollinem coactus inspergitur, aut cancrorum cinis vnâ cum cerato inspergitur. Sed & idem Auicennas iubet
- minutos cancris, in quibus locis apprehendi possunt, radicatus esse extirpandos, excidendosve, facta verò excisione, huiusmodi crassiorē sanguinem circunquaque exprimendum esse, deinde cauterio locum esse adurendum. Hoc enim reliquias materiæ dissipat, & absomit, membrum roborat, & hæmorrhagiā prohibet. Galenus etiam ante Auicennam cancris interdum per chirurgiam extirpandos esse permisit, libro decimoquarto methodi medendi, ut de cancro vlcerato postea dicemus. Verum enim uerò, tametsi curationem hanc, quæ per chirurgiam fit,
- Galen. & Auicennas permittunt, ad vitandum tamen hæmorrhagiæ, & vlcerationis, imò verò & vitæ ægrotantis periculum, ea omiſſa, curandi rationem præscriptam, quæ solis leuibus, & quasi ad blandiētibz medicamentis fit, tanquam tutiorem, & minus calumniæ expositam amplecti, atque ea sola contenti esse debemus. Quandoquidem, si

*Apollonij
medicamen-
tum.*

*Heminaca-
pit vncias
7. & semis-
sem.*

*Plumbi vi-
mirabilis in
cancroſis tu-
moribus.*

*Paulus lib.
4. ex Ar-
chigene.*

*Chirurgia
in cancro te-
merè non
adhibenda.*

Lib. 5.

eiusmodi tumor canerosus, qui iam in molem insignem creuit, qua sanis partibus coniungitur, totus circuncidatur, statim immodicæ profusionis sanguinis, propter vasorum magnitudinem, maximèque arteriarum periculum imminet. Quas si laqueis (inquit Galenus) intercipias, con-
 sortij iure aliæ partes afficientur, & ingenti dolore cruciabuntur. Adde, quòd excisa carcinomata (vt Celsus ait) etiam post inductam cicatricem tamen reuenterunt, & causam mortis attulerunt. Sin eius mali radices exurere velis, neque hoc quidem sine graui iactura vicinarum partium fiet, præsertim si iuxta principes partes exustio fiat. Itaque cancri maiores, & qui iam inueterauerint, neque ferro temere adurendi sunt, neque scalpello excidendi, sed blande potius, ac leuiter (vti diximus) tractandi. Plerique enim nullam vim adhibendo, qua tollere id malum tentent, sed imponendo tantùm leuia medicamenta, quæ quasi blandiantur, quò minùs ad vltimam senectam perueniant, non prohibentur. Reliqua quæ ad huius operis complementum, seu absolutam de cancro tractationem attinent, ex tractatu de vlceribus, capite de cancro vlcerato requirenda sunt.

Capita curationis cancri non vlcerati adhuc incipientis, summa corporis occupantis.

- 1 **I**N cancro incipiente, & qui ex humore non admodum crasso constat, nec venas valde tumentes exerit, humorem melancholicum, vnde hoc genus vitij nascitur, a toto corpore imprimis vacuato.
- 2 Ergo, si ætas, & vires ferant, secta in cubito venâ, sanguinem primùm; quantum res ipsa efflagitat, mitto.
- 3 Deinde medicamēta bilem atram per aluum exigentia, initio quidem blanda, & mitiora, postea verò vehementiora, paulatim vim eorum augendo, laboranti exhibeto.
- 4 Si menstruæ purgationes in mulieribus ante quinquagesimum annum, aut mariscæ tum in eis, tum in viris, ex interuallis sanguinem fundente suppressæ sint, illas modis omnibus prouocato.
- 5 Interim tenuem victus rationem, & quæ probum succum ac minimè melancholicum generet, instituito.
- 6 Si prohibere non possis, quo minus succus crassus & melanc

De Tumorib. præter naturam.

139

melancholicus in venis colligatur, cum ex interuallo, tum 6
simplicibus, tum compositis medicamentis vacuato.

Præcedentes aphorismi ad medicum spectant: qui verò sequen-
5 *tur, ad chirurgum pertinent.*

Remedia affectæ parti ante purgationem, & in ipso 7
purgationis tempore, repellentia: vbi verò corpus integrè
repurgatum est, digerentia: viribus mediocria & qualita-
10 te minimè mordentia, adhibeto.

Ergo solani succum, vel medicamentum ex Pompho- 8
lyge, aut quod ex chalcite cõstat (diapalma vulgò appel-
latur) atque id genus alia dolenti loco admoueto.

Quod si per chirurgiam cancrum sanare audebis, me- 9
15 lancholico humore, prius medici cõsilio repurgato, quod
vitiatum est, prorsus excindito, & sanguinem satis mul-
tum effluere finito, crassiorémque ex vicinis partibus ex-
primito, atque affectum tandem similiter reliquis vlceri-
bus sanato.

FINIS LIBRI PRIMI INSTI-

tutionum Chirurgicarum, De Tumori-

bus præter naturam, Ioan: Ta-

gautio Vimaco, Me-

dico, autore.

*

G E N E R A L I S

DIVISIO VVLNERVM,
in librum secundum Chirurgi-
carum institutionum Io. Taa-
gautij Medici.

V Nionis soluta nomina ac differentie Galeno libro quarto metho. medendi sunt:

Trauma,

Helcos,

Catagma,

Spasma,

Apospasma,

Rhegma,

Thlasma,

id est,

Solutio quaedam ex vulnerado in
carnosa parte relicta.

Vlcus etiam in carne.

Fractura in osse.

Convulsio sine distensio, in nervo.

Avulsio in ligamento.

Ruptio in musculo.

Collisio, vel cōtusio, ī vasis pprie.

Soluunt etiam continuum.

Ecchymosis
siue ecchy-
moma.

Dicitur quasi inhumoratio, quae fit, cū san-
guis subter cutē effunditur, & coit: affectus
plurimū vnā cū cōtusione ruptioneq; incidēs.

Anastomosis, — Id est, oris vasorum apertio.

Diapedesis,

id est, transcolatio, subsultus, aut exilitio. Fit
tunica ipsa vasorum sanguinis rarefacta,
aut gracilium vasorū ore adaperto, & san-
guine tenuato. Ad anastomasin ferē redu-
citur

Anabrosis, seu
diabrosis.

Id est erosio. Venis aut arterijs intrinsecus
accidit ex succo aliquo, cui mordens natura
insit.

*Nihil re-
fert si spe-
cie, vel dif-
ferentiam
hic dixeris.*

**Species solutionis, cōtinui apud Auicennam, sen. 2. libri
primi, sunt:**
Excoriatio, & scarificatio, — In cute.
Vulnus siue plaga, — In carne recens &
cruenta

Vlcus

Vlcus, ————— In carne cum pure.
 Punctura, ————— In neruo.
 Incifio, ————— In offe fecundum latum.
 Apertio, ————— In venis & arteriis.
 Sciffura, ————— Secundum longū in offe.
 Contufio, ————— Numerofa cōtinui folutio in offe.
 Attritio, ————— In extremo mufculi.
 Ruptura, ————— In panniculis, & diaphragmate.
 Fractura, ————— In ofibus.

Et quedam alie.

VVLNERVM DIFFERENTIAE.

Plagarum, feu cruentorum adhuc uulnrum, differentie
 Guidoni, & alijs noſtræ ætatis chirurgis, à tribus po-
 tiſſimum ſumuntur: Nempe.

- 1 A natura particulari, in quibus cōſiſtunt.
- 2 Ab eſſentia ipſius ſolutionis cōtinuitatis.
- 3 A propriis differentiis ipſius ſolutionis
 unitatis, ex vulnere excitatæ.

1 Vulnrum differentie, à natura particularum ſumptæ.

Vulnus in parte ſimilari.

Vulnus in parte inſtrumentaria.

Vulnus in parte ſimilari.

Molli.

Dura.

Mediocri.

Vulnus in parte ſimilari molli.

Vulnus in carne.

Vulnus in pinguedine.

Vulnus in parte ſimilari dura.

Vulnus in offe.

Vulnus in iunctura.

*Vulnrum
 differentie
 à parte ſi-
 milari af-
 fecta.*

Vulnus

Vulnus in parte consinili mediocri.

Vulnus in neruo.

Vulnus in tendone.

Vulnus in ligamento.

Vulnus in arteria.

Vulnus in vena.

Vulnus in parte organica, seu instrumentaria.

*Vulnerum
differentia
à parte or-
ganica af-
fecta.*

Vulnus in parte principe.

Vulnus in parte principi seruiente.

Vuln^o in parte principi nō subministrāte.

Vulnus in parte principe.

Vulnus in corde.

Vulnus in cerebro.

Vulnus in iecinore.

Vulnus in parte, principi parti ministrante.

Vulnus in aspera arteria,

Vulnus in œsophago, siue gula.

Vulnus in vesica &c.

*Vulnus in parte principi alicui membro non subser-
uiente.*

Vulnus in naso.

Vulnus in aure.

Vulnus in oculis.

Vulnus in manu.

Vulnus in pede, &c.

*2 Vulnerum differentia, sumpta ab essentia ipsius solu-
tionis continuitatis.*

Vulnus simplex.

*Id est, cū nullo alio affectu
complicatum.*

Vulnus compositum.

*Id est, cum alio quopiam
vno multisve affectibus
consistens.*

*Hæc & se-
quentes dif-
ferentias la-*

Vulnerum

Generalis diuifio Vulnerum.

143

3 Vulnerū simplicium differētiæ sumptæ à proprijs dif-
ferētijs ipsius solutionis unionis, seu diuortij continui.

tunc profe-
quemur,
in tractatu
sequēti de
vulceribus.

Vulnus magnum,
Vulnus paruum.

Vulnus breue,
Vulnus longum.

Vulnus latum,
Vulnus angustum.

Vulnus in superficie,
Vulnus profundum.

Vulnus æquale,
Vulnus inæquale.

Vulnus rectum,
Vulnus obliquum.

Vulnus retortum,
Vulnus vncum.

Spatium, quātitas, seu ma-
gnitudo diuisionis.

Figura.

Sunt & aliæ adhuc differentie uulnerum, sed extrinse-
cæ accedentes Galeno, sumptæ.

- 1 A generationis ratione.
- 2 A situ, seu loco in eadem parte affecta.
- 1 Differentiæ uulnerum, à generationis ratione.

Vulnus diruptum.

Vulnus incisum.

Vulnus partim incisum, partim diruptum.

Punctio nerui.

Præcisio nerui.

Præcisio venæ.

Præcisio arteriæ.

Vulnerum

144 Institut. Chirurgicarum Lib. II.
2 *Vulnerum differentie à situ, seu loco in
eadem parte affecta.*

Vulnus secundum longitudinem.
Vulnus secundum transuersum.
Vulnus in principio musculi.
Vulnus in fine musculi.
Vulnus in medio musculi.

His accedunt & alie differentie, sed improprie dictae, à complexu uulneris.

- 1 Cum symptomate.
- 2 Cum morbo.

1 *Vulneris differentie à complexu cum symptomate.*

Vulnus crucians, seu dolorosum.
Vulnus dolore vacans.
Vulnus pruriens, id est, cum pruritu affligens.
Vulnus cum delirio.
Vulnus cum impotentia membri.
Vulnus cum syncope.
Vulnus cum sanguinis profusione.

2 *Vulneris differentie à complexu cum morbo.*

Vulnus cum intemperie,
Vulnus cum phlegmone.
Vulnus cum erysipelate.
Vulnus cum carne supercrescente, &c.

Reliqua ex diuisione de ulceribus sunt requirenda.



INSTITVTIO- NVM CHIRVRGI-

CARVM IOANNIS

TAGAVTII

MEDICI

LIBER SECVNDVS.

In quo generatim de plagis, seu cruentis
vulneribus tractatur.

Quid vulnus, quæ sint species solute unitatis, quot
vulnorum differentie, & à quibus sumantur.

CAPVT I.



VLNVS (vt recentiores definiunt
chirurgi) solutio est cōtinuitatis re-
cens, cruēta, sine pure seu putrefa-
ctione, in particulis mollioribus ex
trinfecus incidens. Hanc vnionis,
continuitatisve solutionē non mo-
dò Auicennę interpretes, sed & om-
nes cōmuniter plagam etiā appel-
lant. Cæterum in hac definitione

*Vulneris
diffinitio.*

*Diffinitio-
nis vulne-
ris exami-
natio.*

Genus.

solutio continuitatis (quę & vnitatis diuortium, ac diuisio
appellatur) generis locū sibi vēdicat, quippe quæ cōmunis
morbus sit tū simplicibus (quās & similes vocamus) tum
cōpositis, seu organicis particulis. Primò tamē ac magis
propriē similaribus particulis conuenit, atq; attribuitur,
quàm cōpositis. Reliqua quę in definitione subnectuntur,
differētię ratiōnē habent, nēpe recens, cruēta, sine pure seu
putrefactione, quæ omnia ad differētiā vlceris posita sunt:
quod quidē iuxta recentiorū placita, iam antiqua est vni-

*Galen. lib.
1. de morb.
& sympt.
Auer. 2.
& 3. collec.
Differētia*

tatis solutio cū putri quadā humorū colluue, seu putrefactione, & absq; sanguinis profusione. Postrema definitio- nis particula vtpote, in partibus mollioribus incidēs, adie- cta est propter fracturas, quæ in duris partibus, cuiusmodi sunt ossa contingūt. Porro iuxta hanc generalē particula- 5 rū corporis humani diuisionē, quidā chirurgiā bimembrē fecerūt. Alia enim est (inquiunt) quæ in carne, alia quæ in osse suas operationes exercet. Carnis enim nomine mu- sculos nervos venas, & arterias etiā intelligūt. Quæ omnia sub mollibus & mediocribus particulis alijs comprehende- 10 rūt. Dictionē extrinsecus, in fine definitionis adiecimus, ad differētiā solutionis vnitatis, quæ sit a causā interna.

*Soluta vni-
tatis varia
species a-
pud Auic.
Nomina so-
luta vnita
in Galen.
li. 4. meth.
modendi.*

Cæterum solutionis cōtinuitatis multæ sunt species, in se- cunda sen. primi canonis Auicēne enumeratæ. Vulnus in- quā vlcus, apertio, scissura, excisio, punctura, incisio, fractu 15 ra, cōtusio, & id genus alia. Quorum descriptiones & diffe- rētiæ suis locis addētur. Nomina autē solutę vnitatis apud Galenū sunt, *ἰλη*, id est, vlcus quod in carne est: *κάρχημα*, id est, fractura, in osse: *σπάσμα*, id est, conuulsio siue disten- tio, in neruo; *ἀπὸσπασμα*, id est, auulsio, vel diuulsio, in liga- 20 mento; *ῥήγμα*, id est, ruptio, in musculis: *θλάσμα* id est, colli- sio, vel contusio in vasis propriæ. Soluunt etiā continuum *ἐκχύμωσις*, siue *ἐκχύμωμα*, id est, sanguinis subtercutem effu- sio, & coitus, plurimū vnā cū contusione ruptioneq; inci- dens, de qua latius in sequētibz dicemus, *ἀπαγόμενοι*, id 25 est, oris vasorum apertio, quatenus facit ecchymosin, *Δια- πύλνοις*: id est, transcolatio, subsultus, aut exilitio, quæ ad anostoma sin reducitur, *κνάβησις*, id est, erosio, quæ & *Διά- βρωσις* dicitur. Porro non adeo magna, atque anxia cura ipsorū nominū habenda est, modò res ipsa qua de agitur 30 intelligatur. Itaq; sæpius nomen vnum pro altero ponitur.

*Vulnus &
vlcus pro eo
dem.*

Vulnus enim & vlcus apud eos, qui Græcorū libros in La- tinū sermonē conuerterūt, idē omnino significāt modoq; vnu, modò alterū pro re eadē vsurpatur. Apud eos verò, qui Arabica, Latina fecerūt, vulnus & vlcus aliquid inter 35 se discriminis habent. Hi nāq; vulnus vel plagam appellāt, vbi nondum est pus, vlcus verò, vbi iam pus adest. Et sanē qui Græcos sequuti sunt, rectius quàm qui Arabes sunt imitati, censuerunt. Vulnerū, siue vlcus dux sunt dun- taxat primæ ac maximæ differētię Galeno, in quarto libro

*Vulnerum
dne differe-
tia prime.*

Therap

Therapeutices. Omne nāq; vlcus siue vulnus, vel absente *Differētia*
 causa, quæ ipsum excitauit, consistit, vel efficientem ipsam *vulnerū à*
 causam secum annexam habet. Solutionis autē huiusmo- *tribus po-*
 di continuitatis species, sed præsertim vulneris, potissimas *tissimum*
 5 ac præcipuas suas differentias à tribus Guidoni, ac illius *sumuntur.*
 ætatis chirurgis desumunt.

Primò à natura particularū, siue à locis affectis, in qui- *1*
 bus cōsistunt. Quædā enim (vt libro tertio artis parux re- *A natura*
 fert Galenus) sunt in partibus consimilibus siue homio- *partium.*
 10 meris, quædā verò in organicis, siue instrumentariis. Aliæ *Diuisio*
 item in mollibus particulis, aliæ in duris, aliæ verò in me- *partium.*
 diocribus, id est, in iis quæ inter duras & molles ambigūt.
 25 Quæ in particulis mollibus contingūt, aliæ quidē sunt in
 carne, aliæ in adipe siue pinguedine. Ex iis verò, quæ in du-
 15 ris sunt partibus, aliæ ossiū substantiā occupant, aliæ iun-
 cturas ipsas. Denique quæ in mediocribus particulis inci-
 dunt, quædam in neruis, tendonibus, & syndesmīs, id est,
 neruis ligamentis, siue copulis, quædā in venis, & arteriis
 consistunt. Quæ autem organicas partes inuadūt, aliæ in
 20 principalibus membris sunt, vt in corde, cerebro, & hepa-
 te, aliæ verò in iis, quæ principibus ipsis particulis submini-
 strant, vt in aspera arteria, œsophago siue gula, & vesica,
 aliæ item in non subseruientibus ipsis principiis seu princi-
 palibus membris, vt in auriculis, pedibus, manibus, oculis,
 25 naso, & id genus aliis. Differunt quoq; vulnera, siue plagæ,
 pro telorum ac rerum à quibus inferuntur varietate, vt in
 sequentibus dicitur.

Secundò sumuntur differentix solutionis cōtinuitatis, 2
 sed præsertim vulnerum, ab ipsius morbi essentia, vt Gale- *Ab essen-*
 30 nus docuit libro tertio methodi medendi. Quædā enim *tia morbi.*
 solutio vnitatis simplex est, quædā verò cōposita. Ac sim-
 plex quidē appellatur, si nec morbus vllus nec symptoma
 simul adsit cum ipsa. Cōposita verò quādo duos vel plures
 affectus secū adiunctos habet vt à Galeno scriptū est, libro
 35 quarto Therapeutices: quod & in sequēti capite, ac rursus
 in tractatu de vlcēribus dicitur. Scribit autem ad hunc
 modū Galenus loco nuper citato: Omne vlcus [siue vul-
 nus] aut solū est, ipsumq; per se, nullo nec cū eo simul inua-
 dente, nec ipsum præcedente, aut sequente alio affectu: aut
 cum alio quopiam vno multisve consistit. Quorū alij non

modò statim ab initio vlcus excitatùt, sed etiam nunc maius efficiunt: alij eius sine quo non, vt ad curandi opus rationem obtinent.

3 Tertiò desumuntur vulnerum differentie, à propriis differentijs ipsius solutionis vnitatis ex vulnere excitatæ. 5
Differentia sumpta à natura vulneris. Cæterum propriæ eiusmodi solutionis vnitatis differentie sumuntur rursum ab ipsa vulneris natura, vt Galenus nobis indicauit libro tertio methodi medendi. Nèpe à spatio seu

quâtitate diuisionis, vt à magnitudine & paruitate, æqualitate & inæqualitate, profunditate, & superficie, breuitate, & longitudine. Itè à figura, vt à rectitudine, & obliquitate. Adhæc à generationis ratione, vt quia totum sit incisum, vel totù disruptù, vel pars incisa, pars disrupta: & ab id

Galen. 3. Therap. proxime sequitur, explicabuntur. Porro ab huiusmodi differentiis, iudicia, curandi indicationes, auxilia quoque, & modus curationis omnino desumuntur, vt ex sequentibus

Indicatio que à morbo sumitur principium tantu est methodi, que de medendo instituitur. manifestu euadet. Itaq; nò satis est primas illas indicationes, quæ ex affectibus desumuntur nouisse. Hæ nâq; principium tantum sunt, & (vt sic dicatur) carcer, vnde medendi ratio promouet. Nulla autem prorsus ipsius medicinæ artis portio, aut certè nec magna, nec propria, aut ratione digna, sed quæ etiam plebeiis sit communis, & nota. Non ergo satis est nosse, quid ex prima indicatione agendum

Cognitio que habetur per ipsius rei naturam, que perpendat. sit, sed & particulares indicationes diligenter considerandæ sunt: cuiusq; scilicet particulæ substantiâ estimâdo, tum actionem, tum vsum situmq;ue. A quibus procedens, non solum quod sanari non potest, præuidebis, sed etiam quod recipere sanitatem potest, de inueniendis ei remediis facile deliberabis. Solus igitur is meritò morborum

Morboru verus curator quis. est curator, cui facultas est illa remedia inueniendi, ex quibus perfici possit, quod à prima indicatione suggeritur.

Primu artis opus esse vt cognoscas an sperari possit quod destinas. Eritque hoc ipsum primum artis opus, vt intelligas, sperare id quod tendis debeas, an secus. Eius autem rei duplex cognitio est, nec potest addi ratio tertia. Altera per experientiam, cui longo vsu est opus. Altera per ipsius rei naturam, quam ratione quadam, & methodo disquirimus, perpendendo scilicet non modò corporis vniuersi, sed etiam afflictæ particulæ temperamentum, & reliqua quæ modò diximus.



Amethi Galenus libro secundo de morbis & symptomatis, omnes solutæ unitatis (qui morbus est omnibus partibus communis) causas summam in duas reuocat (aut enim inquit, extrinsecus irruunt, aut ex ipso corpore oriuntur): recentium tamen vulnerum, prout huiusmodi, id est, quatenus recentes ac cruentæ plagæ sunt, 10 causæ censentur, quæcunque extrinsecus aduenientia vulnerare, perforare, incidere, abrumpere, contundere ac distendere possunt. Has autem vulnerum causas speciatim expressit Halyabbas sermone quarto regalis dispositionis dum ait: Vulnera fiunt, vel à corpore inanimato, 15 vt ense, baculo, lapide, aut alio quouis simili, aut ab animato, vt venenatorum animalium punctura, aut ferarum morfu. Ex quibus aliæ rursus sumuntur vulnerum differentiæ. Quandoquidem alia incisiones, alia contusionis, alia verò morsuræ dicuntur. A quibus etiam curandi indicationes nobis suggeruntur, per accidens tamen. 20 Demonstratum namque est à Galeno libro quarto methodi medendi, nullam externarum, vel (vt nunc loquuntur) primitiuarum causarum, curationis indicatricem esse, sed huius indicationem ab ipso affectu initium habere. A nullo enim, inquit, eorum quæ adhuc non permanent, indicatio sumi eius quod ex usu sit, potest. Verum quoniam ad eum affectum noscendum, qui omnino tum rationem, tum sensum lateat, sæpe cogimur de externa causa inquirere, opinatur vulgus hanc quoque sanationis 25 rationem indicare: quod planè secus est. Nam quod adhuc non est (vt causa externa) curationem non desiderat.

*Solutæ com
tinnitatis
causæ uni-
uersales 2.*

Haly.

*Externa
causa cura-
tionem non
indicat, sed
affectum.*

*Rei præsen-
tis est cura-
tio non ab-
sensu.
3. met. sta-
tim ab ini-
tio.*

Quippe rei præsentis tantum est curatio, vt eius quod futurum est prouidentia. Quod si id, quod amplius non est, curationem non postulet, neque sanè ab eo vlla sumi potest curandi indicatio. Siquidem absurdum sit (vt Galenus ait) aliud esse quod curandi rationem præscribat, aliud quod curetur, & e contra. Nihil igitur ad curationis indicationem conducit, externa causa cognita, si- cuti nec tempus ipsum, sed ad præsentis duntaxat affectus (qui nostram fugit notitiam) cognitionem. Quare di-

cere indicationem curationis ab externa causa, quæ vulnus excitauit, desumi, omni modo est absurdum. Quod enim nec nunc lædit, nec læsurum timetur, id ab utroque artis munere, tum eo quod curat, tum eo quod prouidet, excessit. Itaque (vt breuiter dicam) vbi præsentis affectus nihil latet, nulla iam externæ causæ, sicuti nec temporis, est utilitas.

De signis, & iudicijs vulnerum. CAP. III.

NOTAE
 & iudicia
 vulnerum
 vnde petan-
 tur.



Otæ vulnerum non aliunde petendæ sunt, quàm ex iudicio sensus, sed visus maxime. Iudicia verò seu signa prognostica ipsorum, sicuti etiam & omnis solutionis continuitatis, desumuntur ex substantia, vñu, atque actione affectæ cuiusque particulæ. Et præterea, ex propria ipsius dispositionis siue affectus essentia. Item ex symptomatis, quæ vulneribus ipsis accedunt, vt ex sequentibus patebit.

*Vulnera trifariam
 gna & gra-
 uia reddi.*

Itaque iudicat Gale. lib. 4. Therapeutices, quod magna & graua vulnera non mediocre adferunt periculum. Trifariam autem vulnera ipsa, vt & reliqua omnia vitia, graua magnæque redduntur. Nempe vel propter afflictæ partis præstantiam siue præcellentiam, vel propter affectus magnitudinem, vel propterea quod sunt cacoëthe, id est, maligna, contumacia, ac rebellia. Hinc vulnera quæ in capite accepta sunt, aut intra thoracem, intrâve etiam peritonæum penetrauerunt, non paruum periculum aduehant, potissimum si quid interiorum vnâ sit vulneratum.

*Vulnera in
 articulis ca-
 coëthe esse.
 Lib. 14.
 Therap.*

*Vulnera
 quæ futuris
 indigêt, pe-
 riculo non
 vacare.*

*Præstantia
 partiu.
 18. Lib. 6.*

Quinetiam cacoëthe esse, quæcunque in articulis accepta vulnera sunt, id quoque (vt Galenus inquit) omnes ferè sciunt: Empirici quidem ex sola ipsa experientia. Qui verò corporis naturæ scientiam comparare studuerunt, ex ipsa vulneratarum partium natura. Vbi enim tendones, & nerui, & carne vacua, atque ossea loca sunt, hic doloris, vigiliarum, conuulsionis, & delirij periculum instat. Adhæc vulnera, quæ ad eò magna sunt, vt futuris indigeant, aut si non his, certè deligatura, periculo non vacant. Cuiusmodi sunt ea, quæ principales musculos per trāsuersum penitus diuidunt, magnasque venas, neruos, & arterias, atque etiam medullas ipsas discindunt, ac contundunt. Primum (nempe partis lææ præstantiam) hoc aphorismo nobis expressit Hippocrates. Vesica discissa [id est magno atque profun-

- 20 profundo vulnere diuisa] aut cerebro, aut corde, aut se-
 22 pro transuerso, aut aliquo ex tenuioribus intestinis, aut
 24 ventriculo, aut iecore, lethale est. Tertij verò utpote cacœ-
 26 thix, mentionem fecit ille idem ἀρχιτρίτος alius in aphorismis: ubi tradit eos, quibus tumores in vlceribus apparent,
 28 non admodum conuelli, neque insanire, verum his de repente euanescentibus, quibusdam conuersiones, & distentiones fieri, quando scilicet vulnera à tergo infestant: quibusdam verò insaniam, vel lateris dolorem acutum, vel sup-
 30 purationem, cum scilicet in partibus anterioribus, quæ venosæ sunt, atque arteriosæ, vulnera contigerint: vel intesti-
 32 norum difficultatem (quam sanguineam nominant) si tumores sunt rubicundi, id est, sanguinei. Idem mox subiungit, quod si in vulneribus præualidis, siue fortibus & præ-
 34 uis, tumor non appareat, malum est ingens, hoc est, noxa est magna. Etenim in his suspicari licet materiam, quæ vulneribus decumbere affolet, auerri, ac transinutari in sedem aliquam principem. Vulnera autem praua hinc appellari ab Hippocrate (ut Galenus ait in commentario) existimandum est, quæ sunt in capitibus, aut finibus musculorum, & maximè neruorum. Nam in capitibus musculorum, musculis nerui adnascuntur, ex finibus autem tendones oriuntur. Ceterum nomine periculi in præcedentibus, intelligitur mors, vel totius corporis, vel particularis membri, quæ quidem vitæ est priuatio: aut (ut dicunt) maleficium, aut læsæ partis impotentia perpetua, & inexpugnabilis, hoc est, priuatio sensus, ac motus, ac propriæ actionis ipsius: adeò, ut non amplius membrum aut particula corporis propriè nuncupetur, sed denominatiue (ut aiunt) & æquiuocè veluti lapideus oculus, aut æreus: ut voluit Aristot. libro secundo de anima, & quarto Meteo.

Porro iudicij huiusmodi vulnerum cognitio, apprimè necessaria est cuicunque chirurgo, sed ei maximè, qui ex decreto magistratus, super acceptis vulneribus in prohibito conflictu, ac illicita pugna, iudicium ractum, ac æquum ferre compellitur. Itaque ante omnia scire debet chirurgus, quæ vulnera lethalia sint ac insanabilia, quæ difficilem curationem habeant, quæ præptiorem. Est enim prudentis hominis (ut rectè nos admonet Celsus) primum eum qui seruari non potest, non attingere, nec subire spe-

Apho. 65.

lib 5.

Tumores de repente detumescētes, malum possunt.

Apho. 66

lib. 5.

Præua vulnera.

Nominē periculi quid significetur.

Vtilitas ac necessitas doctrinæ prognosticæ vulnerum.

Lib. 5.

ciem eius, vt occisi, quem fors ipsius peremit. Deinde vbi «
 grauis metus, sine certa tamen desperatione est, indicare «
 necessariis [id est, familiaribus, & amicis periclitantis] in «
 difficili rem esse: ne si victa ars malo fuerit, vel ignorasse, «
 vel fefellisse, videatur. Sed vt hæc (inquit) prudenti viro «
 conueniunt, sic rursus histrionis est, paruam rem attollere, «
 quò plus præstitisse videatur. Cæterum (vt ad propositum «
 reuertamur) scire oportet ex mente Galeni in commen- «
 tario aphorismi paulò antè citatis, vesica discissa, &c. vul- «
 nerum quædam esse valde, & ex necessitate lethalia: quæ- 10
 dam verò non ex necessitate, sed magna ex parte talia es-
 se: contrà verò quædam omninò sanabilia, quædam vt plu-
 rimùm.

*Vulnera ex
 necessitate
 lethalia.
 Cordis vul-
 nus est le-
 thale.*

Lethalia sunt ex necessitate, ac insanabilia, quæ cordis
 substantiam penetrant. Hæc enim protinus hominem evi- 15
 ta tollunt. Quandoquidem corde sic percussio, totus
 sanguis, ita imperante natura, affatim ad ipsum, veluti ad
 præcipuam vitæ arcem, confugit, ac ex omnibus corporis
 partibus, vt læsæ partiferat suppetias, transmittitur, vnde
 maxima statim fit sanguinis profusio, quam & spirituum re 20
 solutio mox consequitur, vel in percusso viscere tumor præ-
 ter naturam, maximè autem phlegmone, excitatur: vel tã-
 ta fit sanguinis collectio, obstructioque tam insignis, vt
 vitalis spiritus in corpus vniuersum, vt oportebat, amplius
 diffundi non possit. Quò fit vt venis & arteriis languē- 25
 scentibus, pallecente vultu, & frigido, malique odoris
 oborto sudore, extremisque partibus frigidis apparenti-
 bus, matura mors sequatur. Cor enim neque solutionem
 continui diu, neque (vt inquit Auicennas) apostema vita
 permanente perferre potest. 30

2. primi
 c.5.

*Cerebri
 vulnera.*

Sed & mortem etiam adferunt inuitabilem magna, ac
 profunda vulnera substantiæ cerebri, iocinoris diaphra-
 gmatidis, stomachi seu œsophagi, ventriculi, asperæ arteriæ,
 pulmonis, lienis, cystis fellis, renum quoque, & tenuium
 intestinorum, præsertim eius quod ieiunum appellatur, 35
 atque id genus aliorum membrorum principalium, aut
 ipsis principalibus membris seruientium, ministerio qui-
 dem, ceu ad vitam necessario. Ideò autem vulnera eius-
 modi lethalia ex necessitate dicuntur, quoniam nullus ex
 eis seruatur vnquam, mortemque concinnant inexcusa-
 bilem,

fabilem, vt in sequentibus demonstrabitur. Seruari etiam non possunt Celso, quibus in spina, medulla percussa est, & quibus circa fauces grandes venæ vel arteriæ præcisæ sunt.

- 5 Vulnera verò ea non ex necessitate, sed secundum plurimum mortalia dicuntur, quæ ad regionem prædictarum partium perueniunt, vel eas leuiter, ac superficiè tenus duntaxat attingunt, non autem præaltè adiguntur, nec effatu digna sunt. Adhuc quæ in capite musculorum accepta
- 10 fuerunt. Ob id autem mortalia vt plurimum, at non ex necessitate dicuntur, quoniam vulneratis, nisi ritè tractentur, prorsus ex eis commoriendum sit. Si verò in nullo peccatum sit, illos interdum sanari contingit. Hinc Guido sequendam vidisse affirmat, qui in parte postica capi-
- 15 tis vulnus acceperat, ex quo parua quædam portio substantiæ cerebri exierat (vt ex memoriæ læsione cognitum est) & tamen is à tali vulnere conualuit, restitutaque est illi ex integro post curationem vulneris, memoria. Non tamen asserit illum superstitem permanere potuisse, si tota vna
- 20 cellula, seu totus vnus ventriculus, per vulnus exiisset: vt de quodam Cellaçio refert Theodoricus. Sed nec Galenus etiam adfirmat, in illo adolescente, quem vulneratum vidit Smyrnæ in Ionia, viuentem adhuc præceptore suo Pe-
- 25 lope, aliquid substantiæ cerebri ademptum fuisse, sed duntaxat eum vulnus effatu dignum accepisse, in altero anteriorum ventriculorum cerebri: quos ob id geminos natura condidit, vt si alter ipsorum læsus fuerit, reliquus adhuc subseruiat. Sed & hoc tanquàm admirabile, ac stupen-
- 30 dum quoddam incredibileque spectaculum, seu naturæ miraculum narrat idem Gale. libro octauo de vsu partium corporis humani: ipsùmque adolescentem tandem sanatum fuisse refert, Dei potius, vt credebatur volūtate, quàm arte. Quòd si (inquit) ambo ventriculi simul fuissent vulnerati, ne temporis quidem momentum, is viuere potuisset. Vnde colligit ibidem geminitatis. (vt sic dicam)
- 35 quorundam organorum necessitatem. Cerebrum itaque insigniter, & ad ventriculos vsque vulneratum sanari, rarissimum est, & penè incredibile, vt in commentario aphorismi superius citati, Galenus adseuerat: vbi verum esse scribit, quòd magna vulnera, quæ consuevit Hippocra-

Vulnera magna ex parte lethalia.

Guido.

Com. 18. lib. 6. apho.

Adolescens ex vulnere cerebri conualuit.

18. lib. 6.

tes nominare discisiones, & præcisiones, in prænominatis particulis mortem adferunt inevitabilem: faterique omnes, quòd vulnera, quæ usque ad aliquem ventriculorum cerebri penetrant, proculdubio internecant, mortemque adferunt præproperam.

Vulnera cerebri & lethalia.

Porro vulnera cerebri, & membranarum ipsum obvolvuntium (quas Græci *μηνιγγες* vocant) ideò lethalia sunt, quoniam ad læsionem ipsius cerebri, & membranarum ipsum continentium, sequitur læsio, & interdum abolitio actionis musculorum thoracis, & aliorum membrorum respirationi subserviuntium. Horum autem actione deperdita, perire simul respirationem necesse est. Vnde cordis quoque temperamentum soluitur. Quo fit tandem, vt etiam animalis ipsius necessario sequatur interitus, vt libro quinto de locis affectis scribit Galenus. Cerebro igitur læso insigniter, aut meningibus ipsum continentibus discisis, homini, atque omni animanti prorsus commoriendum est.

Hepatis vulnera.

Guido à Cauliaco asserit hepatis vulnera, etiam circa fibras ipsius, non admodum tamè profunda, nec cù ablatione alicuius portionis substantiæ ipsius, glutinari, & prorsus sanari. Qua in re Galenū sequutus est, qui in commentario decimo octauo lib. sexti aphor. haudquaquã veritati consentanea eos dixisse refert, qui non solum vulnera, quæ in summa iecinoris parte consistunt, sanari posse affirmabant, sed & profunda quoq; in fibris eius facta, imò & fibras ipsas abscissas. Causa autem ob quam vulnera iecinoris magna ex parte lethalia sunt, est, quia propter defectū nutritionis cor languet, ac emoritur, atq; ita tandem deperit animans, sed non illicò. Quandoquidè ob virium hepatis imbecillitatem, sine alimento permanens, diutius etiam sufficere potest: vt Galenus est autor libro quinto de locis affectis, sic inquiens. Vbi iecur affectum est, tum ob inediam moriuntur animalia: verum pròlonga temporum spacia, in huiusmodi affectibus vitam protelare possunt. Sed de intemperie & morbis in compositione hoc loco potius agit Galenus quàm de vulnere. Si autem vulnera hepatis magna, ac profunda sint, venaq; porta dicta iecinoris cauo commissa, vel concaua ab ipsius gibbo prodies, dissecta fuerit, larga sanguinis profusione moriuntur,

qui ita

qui ita sunt vulnerati, priusquam vulnera agglutinentur.

Vulnera quoque diaphragmatis, prorsus incurabilia sunt, maxime si in parte eius nervosa fiant. Hac enim parte exangue est: adhuc, in continuo est motu. Quæ duo sanè prohibent, ne labra vulneris agglutinentur. Nervosa namque corpora semel diuisa, nunquam coeunt, ea præsertim, quæ in perpetuo sunt motu, cuiusmodi est septum transversum. Quippe tamen dici solet, quod vulnera quæ sananda sunt, utique quietem requirunt, non solus tamen motus diaphragmatis, etiam si perpetuus, vulneris agglutinationem impedit, sed & nervosa quoque cum ipso substantia. Quod abundè testatur Gale. his verbis: Transuersi septi vulnera, in carnolis quidem partibus subinde coalescere sunt visa, eius motu non obstante. Quæ verò in nervosis eius hærent, insanabilia sunt. Sanè difficilis gravisque curatio est etiam eorum, quæ in carnosus sunt partibus, si has iam phlegmone occupavit. Accidit autem hæc curandi difficultas ob eam rem, quod in ea vulnera sanies defluat, quæ impedimento est, ne labra solutæ unitatis coalescant.

Vulnera autem, quæ pulmonibus incidunt, ideo curatu sunt difficillima, imo magna ex parte insanabilia: quoniã promptissime phlegmonem excitant, quæ si semel occupaverit, exigua (inquit Galenus) vulneris glutinandi spes est. Adde quod ea quæ sanandis ulceribus idonea sunt medicamenta, contingere illa integris saltem viribus non possunt. Accedit præterea & illis sanandi difficultas, quod respirando mouentur, & tussiendo lacerantur.

Cæterum vulnera trachæ, id est, asperæ arteriæ effatu digna, & maxime quæ cartilagineâ eiusdem substantiam occupant, rarò etiam ad sanitatem perducuntur. Particula enim hæc dura est, & exanguis, assiduâque per vulnus fit respiratio, quæ sanè impedimento est, quominus labra coalescant.

Magna quoque œsophagi vulnera, inter exitialia atque insanabilia numerari solent, tum ob cibi ac potus per eum transitum, qui sanè agglutinationem prohibet: tum quod eiusmodi vulnera duntaxat (ut Galenus ait) contactu medicamentorum in transitu fruuntur, sicuti & quæ in ore, seu orificio ventriculi consistunt. Verum his quæ ori ipsius ventriculi insident, sensus quoque acumen sanationi obstat,

Iugula

*Vulnera
diaphrag-
matis quæ
do insana-
bilia.
Nervosa
substantia,
& motus
agglutina-
tionem im-
pediunt.
Li. 5. meth.
med.*

*Pulmonis
vulnera.*

*Tracheia
arteria vul-
nera.*

*Œsophagi
vulnera.*

*Venarū in-
gularium
vulnera.* Iugulares venæ (quas & sphagitidas vocant) grandi vul-
nere percussæ, egrè & rarò curationi cedunt: tum quòd lar-
ga sanguinis profusione, hominem vitali spiritu exhau-
riant: tum quòd ligaturam stringendo ac sistendo, sangui-
ni necessarias, propter imminens suffocationis periculum, &
sustinere non possint.

*Ventriculi
vulnera.* Ventriculi discisiones, & tenuium quoque intestino-
rum, sed omnium maximè ieiuni, matricis, renum vesicæ,
Ieiuni. & folliculi fellis, modo quo supra diximus, ob id lethales
Matricis. sunt, quòd hæ omnes particulæ nervosæ sint & exangues, 10
Renum. per easque vitiosarum ac superuacancarum humiditatum
Vesicæ. transitus fiat. Adde quòd earum vsus perpetuò vitæ confer-
Cystis fellis uandæ est necessarius, nedum utilis. Adhæc, medicamen-
ta his locis penitioribus non possunt commodè admoueri.

Porrò per verbum discisiones, magna (vti superius di- 15
ximus) ac profunda vulnera intelligimus, & ad sinum vs-
que interiorē longè latèque penetrantia, qualia esse cer-
nuntur in iis, quæ penitus sunt excisa. Hac autem dictione
ex industria vsi sumus, ne quis putet vulnus quodcunque
in prænominatis partibus exitiale esse atque insanabile. 20

*Gale. com.
18. lib. 6.
aphor. 5.* Ventriculus nanque & tenuiora intestina, quia non pa-
rum participant carnosæ substantiæ, si in summa parte dun-
taxat vulnerata sint, sæpenuerò agglutinantur, & velut
collato fœdere in robur substantiæ corpulentæ concordi 25
concretionē coalescunt. Sic & vesicæ cervicem siue collum
quotidiè sanari videmus, cum ex ea lapis extrahitur, quo-
niam ex parte carnosæ est. Idem & de aliis partibus iure cre-
di potest, si per summa corporis seu substantiæ earum vul-
nus duntaxat acceperint.

*Ieiuni vul-
nus cur in-
sanabile.* Verumenimuerò ieiunum intestinum vulneratum om- 30
nium maximè inter tenuia incurabile esse omnino a Ga-
leno, & Paulo prædicatur, tum propter vasorum, quæ in
eo sunt, magnitudinem multitudinēque: tum quòd tu-
nica præternis, nervosæque existat. Adde quòd & bilem
*Lib. 6. the.
Lib. sexto
cap. 42.* synceram hoc intestinum ex cholagogis poris recipit vni- 35
uersam, & omnium maximè iecori vicinum habetur.

*Gale. lib. 5.
de vsu par.
Lienis vul-
nera.* Lienis vulnera, cum munus habeat toti corpori appri-
mè utile, ac propè necessarium, sitque (vt nonnulli dixe-
runt) veluti alterū hepar, periculosa sunt, non adeò tamen,
vt aliarum modò dictarum particularum.

Hi quo

Hi quoque in præcipiti sunt, in quibus vsque ad cauitatem membrorum intus conditorum vulnera perueniunt. Hæc enim vt plurimum lethalia sunt, tum quia aer externus, & nos ambiens, per ea nõ alteratus ingrediens, internas partes non parum offendit: tum quia per eadem internus exhalat spiritus, quo sic expirante & euanescente, virtutis robur insigniter offenditur, & dissoluitur, multoque imbecillius redditur. Accedit huc, quod huiusmodi vulnera haud commodè detergeri possunt: quodque ea tandem degenerant in fistulas, & empyemata, id est, purulentas collectiones excitant: vnde & mors ipsis vulneratis demum accidit. Signa autem, quibus prædictarum partium internarum vulnera deprehendi possint, tediousæ prolixitatis vitandæ gratiâ, in hac vulnerum vniuersali methodo, consulto prætermisimus.

Cæterum vulnera, & puncturæ, quæ in capite musculorum fiunt, vbi nerui, tendones, & ligamēta ferè carne nudantur: item quæ tribus digitis à iunctura distant, & quæ prope tempora accepta sunt, magna ex parte lethalia existunt. Nerui vero, & tendonis punctura, propter sensus vehementiam, & quoniam hæc pars principio, id est, cerebro continuatur, prompta est ad neruorum conuulsionem excitandam: ac tum præsertim, cum nihil extrorsum expirat, obsecrato cutis vulnere: vt Galenus annotauit in opusculo cui titulum fecit *περὶ τῆς κεφαλῆς*. Proinde huiusmodi punctio mortem accersit. Noxa enim quæ cerebro illata est, statim communicatur organis respirationi seruientibus, vt iam supra dictum est. Quocirca quinto libro aphorismorum scripsit Hippocrates, Conuulsio ex vulnere lethalis est. Non quidem (vt Galenus ait in comment.) ex necessitate, sed admodum crebrò: lethalis enim nomine hic, vt & in plerisque aliis aphorismis, vsus est Hippocrates pro periculosa, & ad mortem sæpius perducente. Fiunt autem ex vulneribus conuulsionem, siue spasmi, ratione subsequenti ea inflammationis, vbi neruosas partes attigerit. Et primum quidem videntur conuelli quæ directo sunt partium inflammatione laborantium: deinde sic postquam & principium attigerit passio, ad totum extenditur corpus.

Membra autem particularia ex accepto vulnere iudicantur

*Vulnera penetran-
tia.*

*Vulnera in
capite mus-
culorum.*

*Nervi &
tendonis pun-
ctura.*

*Spasmus ex
vulnere le-
thalis. i. val-
de pericu-
losus.*

*Spasmi ex
vulnere
causa.*

*Vulnera
membrorum
particulari-
um quan-
do ipsis mor-
talia.*

cantur emortua, quando principes ac maiores venæ, arteriæ quoque & ossa, à quibus vitam, nutritionem, & fulcimentum accipiebant, penitus excisa sunt & destructa: incipiuntque liuescere aut nigrescere, mortis habitum induere, ac cadaueris formam representare, non secus quàm in gangræna & sphacelo, vt videre est in excisione brachiorum & tibiærum.

Vulnera quando mēbris impotētiā adferunt.

Iudicantur itidem mēbra ad vsum à natura institutum fore inepta, & pēperuō impotentia, quando nerui, tendo, nes, & ligamenta (quos Græci syndesmos vocant) penitus sunt abscissa & destructa: suamque protinus actionem perdunt, ac relinqui, & tabescere incipiunt.

Vulnera tiorē curationē habentia. Cor. Cel.

Vulnera ea omnium tutissima sunt, & omnino (vt dicunt) sanabilia, quæ in euchymis, id est, boni succi corporibus, & in locis carnosissimis accepta sunt, vbi & nerui paucissimi, & venæ, & arteriæ non multæ reperiuntur. Ad hæc quæ diuisionis magnitudinem non habent, hoc est, longitudinem, latitudinem aut profunditatem non multam. Periculum enim facit vulnus, quodcunque magnum est. Ratio autem ob quam hæc vulnera tutiorē habent curationem, omniumque minimè formidanda sunt, est, quoniam ea nec febris, nec praua aliqua symptomata sequi consueverunt, modò saltem rectè, & vt res expostulat, tractentur. Quocirca rectè ac prudenter feceris, si in tuis renunciationibus, seu (vt dicunt) depositionibus hoc præfatus fueris, atque etiam addideris: dummodo nihil aliud superuenerit, quod nec impræsentiarum apparet, nec in talibus accidere solet.

Vulnera plurimū sanabilia.

Vulnera autem, quæ vt plurimum sanabilia dicuntur, mediāque inter duo dicta extrema (nempe omnino sanabilia, & ex necessitate lethalia) naturam sortiuntur, ea sunt, quæ in capite musculorum carnosorum longe à iuncturis & temporibus: item quæ in caluaria, quàm Græci *κεφαλή* nominant, thorace & ventre incidunt. Hæc enim rectè, atque ex arte tractentur, adhibeatūque diligens cura, & laborans obediens se præstiterit, in nullo propriè indulgens voluptati, exterioraque omnia ritè ad sint apparatus, curationem indubiè recipere possunt. Si verò in iis peccatum sit, eorum curationem intercipi contingit, hominemque tandem ad interitum deduci. Proinde

inde cum de illis ferre iudicium volueris, huius rei mentionem (vt nomini tuo consulas) te facere oportet.

Cæterum si coactus fueris à magistratu, super aliquo vulnere sententiam ferre, eiusque euentum, quantum ars permittit, prædicere, imprimis annotandum tibi est, in schedis tuo chirographo obsignandis, quòd ex mandato ipsius magistratus, vulneratum inuiseris, & vulnus seu vulnera omnia, si plura fuerint, diligenter & accuratè inspexeris. Deinde vulnus aut vulnera nomine expresso ac proprio, vnà cum affecto loco exprimere debes. Postremo tuæ censuræ causam, ac iudicij per te lati, rationem te subiicere oportet. At verò interim te admonitum velim, ne iudicium tuum in hac re præcipites, sed maturè, prudenter, ac circumspectè omnia definias. Quandoquidem (vt ait ille), omne in præcipiti vitium stetit. Et vt à seniore illo Hippocrate bonarum artium primario autore scriptum est, iudicium est difficile. Itaque tamen si terminus vltimus vulneri sit quadragesimus dies: primus verò intra septem dies consistat, & medius (iuxta formam & naturam acutorum morborum) ad decimum quartum protèdatur, in suspectis nihilominus ac dubiis vulneribus, expectandus est dies septimus, priusquam aliquid de illis decernas, aut iudices. Solèt enim vt plurimum intra id tempus apparere accidentia, tum bona tum mala, quæ post accepta talia vulnera superuenire consueuerunt: febris inquam syncope, mentis alienatio, ac perturbatio, spasmus, & id genus alia. Sed & interim diligenter considerandæ sunt virtutum actiones, ex pulsu, lotio, vomitionibus: & aliis id genus, quæ foras excernuntur. Contemplari etiam oportet laborantis appetentiam, tolerantiam, vultum siue faciem, & consimilia. Ex iis itaque, & consimilibus præsagiis, quæ ab Hippocrate & Galeno memoriæ prodita sunt, diligenter perpenſis & examinatis, robur virtutis, morbi magnitudini conferes. Deinde tacitus apud te omnia recolliges, vt præſagire possis, ac iudicium ferre, num moriturus sit æger ex accepto vulnere, an tandem conualiturus. Quia in re cautè ac prudenter te geres. Nec est quod dicas, si non fuisset vulneratus nunquam interiisset, quantumuis in victus ratione peccasset. Sed nec satis fuerit, si dixeris: vulneratum mortem nunquam

Formula feriendi iudicii de vulneratis ex scripto.

Aplio. 1.

Apho. 1.

quam appetiisse, si sibi consulisset: ac omnia effecisset secundum rationem: scriptumque esse ab Hippocrate, quod non solum medicum præstare se oportet oportuna facientem: sed & ægrum, & assidentes, &c. Quandoquidem non solum famæ tuæ consulere, & te ab obloquentium calumnia vindicare debes, sed nihil etiam vel dicere coram magistratu, vel scripto annotare, aut renuntiare quod cedat in damnum vel detrimentum laborantis, & consanguineorum, aut liberorum eius, culpam omnem sic in eum reiiciendo. Eorum namque quæ fortuito contingunt, tametsi nulla sit ars præseruatrice, est tamen ars aliqua curatrix. Siquidem ut variis periculis nostra corpora exposita sunt, ita & modis plurimis, ubi in ea inciderint, seruari possunt. Itaque, ut scribit Auicennas libro quarto de extractione sagittarum, licet vulnera quædam suâ naturâ le-

Auicennas.

*Vulnerati
nō sunt re-
linquendi si-
ne auxilio.*

thalia sint, non tamen ob id relinquendus est vulneratus absque auxiliis: quin omnia aggredi ac tentare debet chirurgus, quæ ex arte, & secundum rationem fieri possunt, dummodo saltē ab assidentibus amicis, & consanguineis ipsius ægrotantis obnixè rogatus fuerit, ac de futuro rei exitu coram eis antequam vulneratum attingat præiaguerit, ut se ab indoctorum & oblocutuleiorum calumnia & maledicentia vindicet. Plerique enim præter spem medicorum modo quodam mirabili, ac stupendo, mortem interdum euadunt, ac sanitati restituuntur. Igitur cum sepe etiam præter expectationem quædam eueniant, curatio aggrediunda est. Quod si vulneratum ipsum omni auxilio destitutum relinqueremus, & inde mors sequeretur, impij, ac inhumani merito & diceremur, & haberemur. Sed iis omisis, reliqua vulnerum iudicia persequamur.

*Plurima in
morbis præ-
ter expecta-
tionem cō-
tingunt.*

Vnio in

*partibus or-
ganicis se-
mel diuisis
est impossi-
bilis.*

Igitur præter hæc te nosse oportet, quod vnio in partibus instrumentariis, semel continui diuortium perpeffis, est impossibilis: ut Galenus adserit libro artis medicinalis cap. nonagesimo. Cuius assertionis ratio est: quia abscisis omnino poris, seu meatibus, venis inquam, nervis & arteriis, per quos veluti per canales quosdam, alimentum sensus, & vita, in ipsum membrum organicum diffundebatur, promptissimè expirant, exhalantue, tum spiritus, tum virtutes, ob substantiæ scilicet quâ habet tenuitatem (quod nō cōtingit in animalibus iis, quæ imperfecta

vocantur,

- vocantur, atque etiam in plantis ipsis) non autem propter impotentiam, aut repugnantiam medicamentorum: ut rectè asseuerat Haly, in commentario loci nuper ex Galeno citati. Adhuc vnio in parte carnosa possibilis est, etià iuxta primam intentionem, ut dicunt. In osse verò ex secunda duntaxat intentione. Vocatur autem hic prima intentio, quando partes diuisæ, atque inuicem distantes, rursus vniuntur, & coalescunt, ut prius vnitæ erant, idque absque medio aliquo heterogeneo, sed ratione quadam ac beneficio nutrimenti, facta scilicet modica quadam cõuersione ipsius alimonij in carnem omnino vniformem, & consimilem priori. Secunda verò intentio hic intelligitur, quando ea quæ diuisa sunt, & vnionis diuortium perpeffa, alia quapiam interueniente substantia, cœu glutino, quodã alligantur, atque inuicem coniunguntur. Porro huiusmodi medium, cuius interuentu partes ossis fracti, seu diuisi ad alligantur, adglutinaturve, Latine callus, Græcè verò porus sarcoides nominatur. Qui quidẽ ex succo paulò crassiore fit, quàm is ex quo os concrefcit. Causa autẽ propter quam fractum os nequeat coalescere, prima saltem intentione, est ipsius ossis durities: cum mollium tantum corporum (ut Galenus ait) in vnũ coeundi sitabilitas: ut tum in externis videre licet, nullo nec lapide cũ lapide, nec testa cum testa coeunte: tum verò in nobis ipsis. Altera causa est, imbecillitas facultatis alteratricis, quæ altrix nũcupatur (ossa enim particulæ sunt exangues ac frigidæ) nõ autem inopia materiæ seminalis, seu spermaticæ, ut quidam putauerunt. Ossa nãque præsens semper habent alimentũ spermaticum, quod quidẽ alterant, & in suam conuertunt substantiam, ac sibi assimilant. Nervi autem, venæ, & arteriæ, inquit Auicenas, Galeni autoritate fretus in quinto Therapeutices, mediam fortiuntur naturam inter carnem & ossa. Neque enim tam facillè coeunt, ut caro, neque tam difficillè conglutinantur ut ossa. Siquidem eorum natura mediocritatem obtinet inter molliem & duritiẽ. Proinde de vnienda eorũ sectione, utique desperandum non est, vbi tum ipsa sit parua, tum hominis corpus natura molle: si verò sectio magna fuerit, & in duro corpore, nulla prorsus eius glutinadæ spes est. Vnde Galenus loco nuper citato ad hunc modũ ait: Videtur autem experientia quoque

*Callus.**Porus sarcoides.**Quare os fractũ non coalescat.**Nervi, venæ & arteriæ inter carnem & ossa coeunt.*

Arteriā ipsa rationi subscribere. Cum & in pueris & in mulieribus, propter corporum humiditatem, & mollietatem, eam incisam ali quando r- viri, [arteriam intelligit] viderim glutinari, & in vno iuvene agresti, cui exigue erat incisa. Qui autem eā inciderat, inquit ille, medicus admodum iuuenis erat, & operum artis parum peritus, venamque se incidisse putabat. Cum enim brachium hominis, venam incisurus, deligasset, contigit attolli veluti in gibbum arteriam, atque ita hanc pro vena diuisit. Hanc autem incisionem Galenus curiosè coniunxit, cōglutinauit, & perlanauit: Verum brevis sanè (vt dictum est) incisio erat. Quod si vtique magna, atque effatu digna fuisset, nulla certè ratione perlanari poruisset. Quod Hippocratis testimonio confirmatur sexto aphorismorum sic inquentis: Cum discissum fuerit os, aut car-

Aphor. 19. tilago, vel neruus, aut genę particula tenuis, vel præputiū, neque augetur, neque coalescit: hoc est, neque talis aliqua regignitur substantia, qualis abscissa est, neque vnquam discissi corporis labra agglutinātur. In hoc autem aphorismo, vox discissum, diuisionis magnitudinem significat.

Discissa Discissa nanque (vt Galenus ait in comment.) diuisionem 20
que dicantur. habent vsque ad finem peruenientem.

Ossa puero rum fracta coalescunt. Cæterum nihil aduersus prædicta pugnat obiectio, quæ de ossibus pueroꝝ adferri posset, quod scilicet coalescere possunt, vt libro artis medicinalis Gale. adserit: quia mollietatem habent, & virtutis robur, ob propinquitatē suę nativitatē. Sed nec prius asserta infirmat, quod de dēribus obici solet, quod scilicet renascantur, non solum in pueritia, sed etiam in alijs ætatibus. Quoniam non generantur

Albertus Bononianus. (inquit Albertus) ex materia ordinata, sed ex superfluitate, non quidē à virtute prima conformatrice, sed nutritoria inducētē actum generatiuæ. Postremò iudicat Hippocrates sexto libro aphorismorū, quod vulnera in corpore eorū, quæ aqua inter cutem laborant, non faciliē sanātur. Nō prius enim curātur vulnera aut vlcera, quā ad cicatricem perducantur. Non possunt autem ad cicatricē perducī, nisi sufficienter exiccetur: quod non factū est facile in iis, quos aqua inter cutem malè habet, ob humiditatis immoderatiā, vt docuit Hippocrates in libro de vlcēribus: & Auicēnas his verbis: Solutio cōtinui, & vlcēratio, & id genus alia, faciliē ac cito curationē recipiunt, cum in partibus sunt,

lis sunt, quæ bona præditæ sunt temperatura. Contra vero, si membra cacochema occupauerint, plurimum refistuntur curationi, nec nisi tempore longo possunt ad sanitatem perducī. Sed multo adhuc difficilius curatur, quando corporibus eorum incidit, qui vel hydropē laborant, vel lepra [id est, elephantiasis] aut aliqua alia praua temperatura. Præterea in quinto aphorismorum Hippocrates sic ait: Ulceribus frigidum quidem mordax, cutim obdurat, dolorem insuppurabilem facit, liuorem obducit, rigores febiles, conuulsiones, distensiones. Adhuc insignes continui solutiones male curatæ, præsertim circa iuncturam, maciem inducunt sequenti particule. Et hoc quidem, propter obstructionem, & virtutis debilitatē, ut iam semel dictum est, & infra adhuc dicitur. Plurima adhuc alia præter supra dicta, iudicia diligenti animaduersione obseruanda sunt, quæ in sequentibus, & in tractatu de ulceribus (quod tam his quàm vulneribus sint communia) recensentur. Itaque finem his de vulneribus iudiciis imponemus, si quæ de his docte, breuiter, atque ornate scripsit Celsus, subiecerimus. Hæc enim vice anacephaleosis & compendij erunt eorum ferè omnium, quæ de iudiciis vulnerum hactenus dicta sunt: verba autem illius sunt hæc.

*Lib. 5.
Quæ vulnera insana-
bilia sint
Celsi.*

*Quæ vulnera difficile
curationē
habeant.*

*Periculosa
vulnera.*

*Malum
vulnus.*

Seruari non potest, cui basis cerebri, cui cor, cui stomachus, cui iecinoris portæ, cui in spina medulla percussa est, cuique aut pulmo medius, aut ieiunum, aut tenuius intestinum, aut ventriculus, aut renes vulnerati sunt: cuiue circa fauces grandes venæ, vel arteriæ præcisæ sunt. Vix autem ad sanitatem perueniunt, quibus vlla parte pulmo, aut iecinoris crassum [quod Græci πᾶσις vocant] aut membrana, quæ continet cerebrum, aut lienis, aut vluæ, aut vesica, aut vllum intestinum, aut septum transuersum vulneratum est. Hi quoque in præcipiti sunt, in quibus vsque ad grandes, intusque conditas venas in alis, vel poplitibus mucro defecit. Periculosa etiam vulnera sunt, ubicunque venæ maiores sunt: quoniam exhaurire hominem profusione sanguinis possunt. Idque euenit, non in alis tantum, atque poplitibus: sed etiam in his venis, quæ ad anum testiculosque perueniunt. Præter hæc malum vulnus est, quodcunque in alis, vel feminibus, vel inanibus locis, vel in articulis, vel inter digitos est: item

*Que vulne-
ra tutiore
habeat cu-
rationem.* quodcūque musculum, aut neruū, aut arteriam, aut mem-
branam, aut os, aut cartilaginem læsit. Tutissimum om-
nium, quod in carne est: & hæc quidem loco vel peiora, vel
meliora sunt. Modo verò periculum facit, quodcūque ma-
gnum est. Hactenus de iudiciis vulnerum.

De curatione vulnerum in vniuersum.

C A P. I I I I.

*Communis
salutis vni-
uersæ curandi
indicatio.*



Communium solutionum continuitatis, nedum
vulneris, communis quidem curandi indica-
tio, est vnitio, vt Galenus ait libro artis me-
dicalis cap. nonagesimo. Et ea quidem est
prima indicatio omnibus nota, ab essentia
ipsius affectus desumpta, quæ præcipit, atque insinuat, cō-
trarium per suum contrariū propellendum esse. Hæc autē
prima ac generalis indicatio, perficitur à duobus, nempe à
natura, tanquā à præcipuo agente, & causa effectrice,
adiuta suis virtutibus, & alimento conuenienti, & à me-
dico tanquā ipsius naturæ ministro, quatuor intentio-
nes sibi unicam (quod aiunt) subalternatas in animo ha-
bente, dum opus suum exercet, vt curationis finem pro-
positum tandem assequatur.

*Intentiones
in curandis
vulneribus
obseruande.*

- 1 Prima iubet extrinsecus incidentia (si qua forsan labris
ulceris intercitant) amouenda esse.
- 2 Secūda præcipit applicāda esse extrema distantiū partiū.
- 3 Tertia docet ea in vnum iam conuulsa & coacta ita
conseruare.
- 4 Quarta suadet ipsam partis læsæ substantiam tueri, ac
salubrem seruare.
- 5 His & quinta non absurdè superaddi potest, quæ docet
accidentia vulneribus succedere consueta, corrigere, ac
propulsare.

*Prima in-
tentio.*

Primā intentionē assequemur dilatando vulnus, si non
satis dehiscat, aut si eius labris aliquid intercitat extra-
heū, vt puta vel ossis particula aliqua pūgēs, & aspera, aut
telū aliquod infixū, vt sigitta: vel mucro, vel aliquod aliud
extrinsecus incidens, cuiusmodi sit spina, vel harūdo. Atq;
vbi satis diducta fuerint labra vulneris, digitis, aut volfel-
la, vel forcipe, aut alio id genus instrumēto à te, vt res ex-
posita, excogitato, quod infixū est, aut labris ulceris in-
tercidit, apprehēdi debet, & leuiter, ac (si fieri possit) ci-
tra dolorem euelli, vt in sequentibus docebitur.

*De sagittis, & quibuscunque alijs telis
à corpore extrahendis.*

VT sagittas, aut quævis alia tela in corpus defixa, se-
cundum rationem, & ex arte possis eximere, inue-
niendum tibi primùm est, quo instrumento id queas effi-
cere. Modus autem inueniendi instrumenta, habetur ex
contemplatione naturæ, ac diuersitatis tum læsarum par-
ticularum, tum rerum defixarum. Itaque ex horum duo-
rum, partis scilicet læsæ, & rerum infixarum, accurata
consideratione & cognitione, tertium statim se offert:
nempe modus euellendi tela in corpus infixa, qui certè va-
rius & multiplex est, vt ex sequentibus patebit. Cæte-
rùm tametsi discrimina, seu differentiæ telorum ac rerum
infixarum, propemodum sint infinitæ, nec scriptis facile
mandari possint (proinde & formæ proiectorum ab hosti-
bus, diligenter à chirurgo perquirendæ sunt) Auicennas
tamen conatur eas omnes differentias ad octo reducere.

Has autem senario numero placuit nunc complecti. *Sex telorū
Itaque differunt tela, quæ nostris corporibus infiguntur, differentia.*

Sex telorū
1. materia, figura, magnitudine, numero, habitu, viribus.
Materia quidem, quatenus ea quæ imponuntur, & hosti-
lia vocantur, aut lignea sunt, aut arundinea. Ipsa verò
tela, aut ferrea sunt, aut ærea, aut stannea, aut plumbea,
vel cornea, vitrea quandoque, aut ossea: quin etiam arun-
dinea, aut lignea conspiciuntur. *A materia
sumpta dif-
ferentia.*

Figura autem euariant, *Differentia
sumpta à
figura.*
quatenus alia sunt rotunda, alia angulosa, nempe trian-
gula. Alia sulcata, alia trisulca, hoc est, tribus ex parti-
bus acie prædita. Nonnulla item sunt spiculata, seu spi-
culis cincta, quæ vulgò barbulata vocant: nonnulla spi-
culis carent. Atque ex spiculatis, hæc posteriora spectan-
tibus seu retrò vergentibus spiculis munita sunt, vt dum
extrahuntur, contra defigantur. Illa in anteriora vergen-
tia habent spicula, vt propulsata idem faciant; hoc est,
infigantur, & lanient. Sunt etiam quædam quibus vtro-
que versum, fulminis instar, spicula extant, vt & dum
extrahuntur, & dum introduuntur propelluntur: cor-
pus dilanient, & in obiecta infigantur. Sunt item qui-
bus ferrum quibusdam cardinibus seu verticulis ita mo-
uetur, vt spicula in impulsione contracta, in extrahio-
ne explicentur, atque ita telum extrahi prohibent. Ma-

Telorum gnitudine quoque variant tela, quatenus alia magna sunt, ut trium digitorum longitudinem expleant: alia parua, ut vnum digitum æquent: alia verò medium inter hæc locum occupent. Numerus etiam in his diuersitatem adfert, quatenus nonnulla simplicia sunt, nonnulla composita. Te-
discrimina *sumpta à* *magnitu-*
dine. *Numerus.* nua siquidem quædam ferramenta, siue ferrea frustula ipsis imponuntur, ac si innexa sunt, ut in teli euulsione
Habitus. facillè lateant, & in imo relinquuntur. Habitu differunt tela, quatenus alia ferrum acutum ligno seu hastilibus habent infixum, alia concavum, ita ut hastile in ferri tubu-
 lum insertum habeant: atque hoc alia firmiter, alia negligenter, ut dum euelluntur, relictum intus remaneat.

Vires. Viribus demùm & facultate differunt, quatenus veneno quædam sunt oblita, alia verò minimè. Atque hæc quidem sunt telorum differentiz. Nunc de instrumentis, quibus tela, & res extraneæ nostris corporibus infixæ extrahuntur, dicendum est. Nam de sedibus, in quas tela ipsa penetrarunt, postea agemus, dum scilicet de modo euellendi tela, alia quæ infixæ, sumpta à sede affecta indicatione, commentabimur. Itaque instrumenta, quæ à telorum alio-
 rumque infixorum differentiis, & à particularum in quas penetrarunt varietate, excogitantur, inueniunturque licet valde multa sint, octo tamen apud Guidonem, & recentiores chirurgos sunt magis communia.

8. *instrumē*
ta telis atq;
infixis alijs
rebus ex-
trahendis
accom-
moda.

1. Primum, sunt forcipes seu, ut vulgò loquuntur, tenacula Avicennæ, quæ denticulatæ sunt, & capita habent ad instar limæ. 4. Fen. lib. 4.
2. Secundum, sunt forcipes Albucasis, in modum rostri auis, etiam denticulatæ.
3. Tertium sunt forcipes in modum cannæ siue arundinis, aut scriptorij calami concavæ, quas vulgò tenaculas cannulatas vocitant, ad sagittas spiculis cinctas (quas barbيلات nominant) extrahendas accommodæ.
4. Quartum est, terebellum inuersum, quod in ferri infixi tubulum (quam doliam appellant) imponitur: ubi autem sic tubulo immissum, ferrum apprehenderit, leuiter ferro sequaci educitur.
5. Quintum instrumentum, est terebra in longum portectæ, dilatandis ossibus (quibus tela firmiter inhaerent) apprimè idonea.

Sextum,

De Plagis, seu cruentis vulneribus.

169

Sextum, est excisoriū culter, ad amplificanda carnis 6
vulnera, quò facilius infixā eximantur.

Septimum est propulsorium instrumentum, quod ge- 7
minum est, nempe cauum, & solidum siue surdum: illud
5 scēminam, hoc marem appellant. Iis tela protudimus, do-
nec ab altera parte apprehendi, & extrahi possint.

Octauum est in modum arcus illius, quem balistam vo- 8
cant. Hoc autem, iētum telum excutitur. Horum autem
aliquot formulas in sequentibus depictas inuenies.

10 Cāterū extrahendorum telorum, quæ illata corpori-
bus intus hæserunt, modus est duplex, per attractionem
vnus, alter per protrusionē, seu impulsionem. Attractio fit
ab ea parte maximè qua venit telum, sed interdum etiā &
ab ea in quam tetendit. Protrusio autem fit in partem op-
15 positam ei, ex qua venit, infixūque est. Horum autem
modorum indicationes desumendæ sunt, tum ab ipsis te-
lorum generibus, quæ suprà commemorauimus, tum ex il-
lis sedibus, in quas illa penetrarunt. De quibus mox di-
cam, si communia quædam præmiserō in extrahendis telis
20 sedulò obseruanda. Si itaque telum in conspectu sit, sic vt
se habet protinus extrahendum est: sin occultatum est, ita
faciendum Hippocrates præcipit. Corpus vulnerati, (si
tamen ipse poterit) in ea figura constitui debet in qua erat
eo tempore quo vulnus accepit, atque ita quo tetende-
rit telum, specillo explorandum est. Si æger id non po-
25 test, iacens saltem ita debet collocari, vt quam proximè
fieri potest, ad eam figuram accedat. Si telum aliquod
defixum primis conatibus commodè ac salubriter euelli
non possit, sic eousque dimittere debes, donec circum-
30 posita caro emarcescat, putrescatque. Deinde intermis-
sum opus aggredere, telum ipsum quod infixum est, mo-
dò huc, modò illuc agitando, ac manibus vel forcipi-
bus leuiter ipsum contorquendo: ita enim leuius multò
ac facilius telum extrahes: vt rectè præceperunt Aui-
35 cennas, Brunus, & Albucasis. Quanquam aliter visum
sit Henricò. Hic enim voluit statim ac sine morā, tela
quocunque modo fixa extrahi. Si armatus homo telo
ictus fuerit, nec possit leuiter, ac faciliè telum manibus
euelli, vulneratum protinus suis armis exui iubeto, &
rite apparatis omnibus, quæ ad opus eiusmodi condu-

*Modus ex-
trahēdi te-
la infixa
duplex.*

*1 Attra-
ctio.*

*2 Propul-
sio.*

*Cōmunia
quædam in
extrahen-
dis telis se-
dulò obser-
uanda.*

*Consilium
Celsi.*

*Methodus
eximendi
tela, sum-
pta indica-
tione ab ip-
sorum dif-
ferentijs.*

cere videbuntur, emissioque ac præfatio (vt suprâ dictum est) præfatio, forcipe communi apprehensum telum (præsertim si sagitta est) ipsum leniter contorquendo extrahito. Quod si communi hac forcipe nihil promo-
ueris, fortiores assumito. Si telum carni infixum retrò, hoc est, ea parte qua venit, recipiendum sit, nec aliter educi possit, amplificanda scalpello, aut nouacula pla-
ga est, quò facilius id sequatur, quòque minor oriatur inflammatio: quæ maior quidem sit, si ab illo ipso telo dum redit, corpus laniatur. Item si ex alia parte vul-
nus aperitur, laxius esse debet, quàm vt telo postea trans-
eunte amplificetur. Summa autem vtrique parte ita habenda cura est, ne neruus ne vena maior, ne arteria incidatur. Quod si horum aliquid detectum fuerit, exci-
piendum hamo retuso est, abducendumque est scalpello. Vbi autem satis incisum est, telum eximendum est: tum quoque eodem modo, & eadem cura habita, ne sub eo, quod eximetur, aliquid prædictorum lædatur. Si autem telum ita firmiter ossi infixum sit, vt nulla vi extra-
hi possit, terebello (vt vocant) directo diuisionem ampli-
ficabimus, ac modo infrâ scripto telum liberabimus. Telo à corpore euulso, non alia est vulneris medicina, quàm quæ esset, si corpore intacto nihil infixum esset. Ergo vulnus ipsum, vt & cætera alia vulnera, tractari ac curari debet, hoc vno addito, quòd qui ab infixo telo alteratus est sanguis exprimi, ac educi debet, vt vulnus ipsum à putrilagine vindicetur. Ac perfundi quidem debet oleo calente, maxime si doloris adest suspitio. Si inflammationem experiat, ad eam tollendam insuccatis lanis, fomentis cataplasmatibus, & consimilibus vtetur. Sive rò inflammatione vacauerit, futuris (si opus fuerit) adhibitis, impositoque medicamento, quod cruentis statim vulneribus iniici solet, curandum est. Cæterum his communibus prælibatis, tempestiuum est, propria quædam de telorum extractione subiiciamus: & quan-
do, ac quomodo attractione, vel propulsione, sit vtendum, sumpta primùm (vt propositum est) indicatione ab ipsorum telorum generibus seu differentiis, deinde ab ipsis sedibus affectis. Itaque tela, quæ iaci ac vibrari solent, magna ex parte sunt vel oblonga, & angusta,

angusta, cuiusmodi sunt sagittæ, vel lata, vel rotunda, aut angulosa, vt plumbea glans, vel ferrea, aut lapis, aut simile aliquid, quod perrupta cute integrū intus insedit. Telum si oblongum est & angustum, cuiusmodi sagitta est, & facile in corpus conditur, & altissimè insidit. Sz- *Sagitta se-*
 pius iraque alia parte, quàm qua venit, sagitta educenda *pitu antrox*
 est, præcipuè que: quia ferè spiculis cingitur, quæ magis la- *sum educen-*
 niant si retro, quàm si contra trahuntur. Sed inde aper- *da.*
 tâ viâ, caro diduci debet, ferramento ad similitudinem fa-
 10 cto Græcæ literæ ψ. Deinde vbi apparuerit, si mucroni a-
 rundo inhæret, propellenda est sagitta, donec ex altera
 parte apprehendi, & extrahi possit. Si iamilla, arundo
 inquam seu hastile decidit, solūmq; intus ferrum est, mu-
 cro vel digitis apprehendi, vel forcipe, atque ita educi de-
 15 bet. Neque alia ratio extrahendi est, vbi ab ea parte qua
 venit, euelli magis placuit. Nam ampliato vulnere, aut a-
 rundo si ineat, euellenda est aut si ea nō est ferrum ipsum.
 Porro eximetur ferrum vel terebra inuersa in tubulum
 (quam doliam vocāt) immissa, vel forcipe, qua dentes at-
 20 que eorum radices euelluntur, vel ferramento, quod à te-
 lo extrahendo belulcum Græci vocant: aut alio quopiam
 instrumēto ad id accommodo. Nonnunquam etiam car-
 nem prius incidentes, si vulnus instrumentum non reci-
 pit. Quod si spicula apparuerunt, eaque breuia & tenuia
 25 sunt, forcipe ibi comminui debent, vacuūque ab his te-
 lum educi. At si ea maiora valentioraque sunt fixis scri-
 ptoriis calamis, vt cōsuluit Celsus contegenda sunt, ac ne
 quid lacerent, sic euellenda. Alij spicula ipsa forcipibus
 seu tenaculis (vt vocant) cannulatis apprehendunt, atque
 30 ita telum eximunt. Quod si telum spiculis vtroque ver-
 sum spectantibus cinctum in neutram partem sequatur,
 iuxta ipsum alia incisione patefaciendus locus est, nisi ve-
 na aut tale aliquid impediat, atque inde ferrum vndiqua-
 que explicarum modestè, ac sine vlla vulsione tollendum
 35 est. Quidam etiam spicula eiusmodi fixis calamis, seu exi-
 guis arundinibus, prius contegunt, ne quid lacerent de-
 inde ita euellunt, ea scilicet parte, quæ educationi magis
 congruere videbitur. Latum vero telum si conditum est, *Latū telū*
 ab altera parte educi non expedit, ne ingenti vulnere, ipsi *ab ea parte*
 quoque ingens vulnus adiciamus. Euellendum ergo est, *qua venit,*
extrahēdū.
 genere

*Rotundum
telū aut an-
gulosum.*

genere quodam ferramenti, quod Diocleum graphiscum Græci vocant, quoniam autorem Dioclem habet: quem inter priscos, maximosque medicos fuisse memoriæ produrum est, ut Cornelius Celsus annotauit libro septimo, capite quinto. Terrium quoddam genus telorum est ro-
tundum, ut diximus, aut angulosum, ut lapis, plumbea-
glans, aut simile aliquid, quod ex funda aut tormētis bel-
licis mittitur & perrupta cute integrum in corpus defigi-
tur, ac later. Tela autē eiusmodi intus condita esse his no-
tis deprehendes. Moles aspera, atque inæqualis, (si cōtre-
ctetur) subesse sentitur. Plaga seu diuisio non omnino in
rectum tendit, sed & maior etiam ac amplior apparet: ca-
ro item contusa liuidaque cernitur. Dolor præter ea cum
grauitate quadam infestat. In omnibus his, latius vulnus
aperiendum, idque quod inest ea qua venit, aut vncis ad-
uersæ scalpelli parte, aut vulneratio spicillo recipiendum
est, aut denticulata forcipe, si fieri potest, & eam vulnus
admisit, extrahendum. Quod si telum infixum sic intus
lateat, ut nullo modo reperiri possit, aut non satis cōmo-
dè extrahi, tantisper dimittendum est, donec natura ipsum
protrudat, aut manifestet. Interdum verò tela infixā inte-
gra intus cicatrice obducto vulnere citra noxam aliquam
diu deliruerūt. Deinde longiore temporis spacio partem
eam abscessu occupatē ac disrupto exiliere, quo facto vul-
nera mox ad sanitatem perducta sunt, ea illis curatione
adhibita, quæ aliis debetur vulneribus. Quod multis cōti-
gisse vidit Albucasis, ut refert parte secūda suæ chirurgiæ.
Hactenus de telorum extractione, sumpta ab ipsorū diffe-
rentis indicatione: nunc de re eadem dicemus, sumpta ab
ipsis affectis sedibus indicatione.

*Tertiū ge-
nus telorū
ea parte
qua venit,
extrahendū.*

*Tela inter-
dum diu in
corpore de-
litescūt, per
sanato vul-
nere.*

*Methodus
extrahendi
tela infixā,
sumpta à se-
de affecta
indicatio-
ne.*

*Si telum in
summa car-
ne infixum
est.*

Itaque sedes in quas tela penetrarunt, vel caro sunt, vel
ossa, vel articulus. Atque in iis quidē partibus, vel altè telum
infect, vel in summo duntaxat, aut saltē non admodū al-
tè, & citra mediū infixum est. Adhæc vel membrū vnum
duntaxat telo ictum est, vel particule plures simul cōmix-
tæ sunt, ita ut particula vna telo traiecta, alteri affigatur.

Igitur si in summa carne telum impactum est, aut certè
magnas venas, & loca neruola non transibit, nihil melius
est, quàm qua venit, id euellere. Similiter etiam quod aliè
inhabuit, obiectæ verò partes, id est, quæ ex diuerso respon-
dent,

dent, si conuulneretur, vel ex sanguinis profusione, vel ex aliorum membrorum consensu, & consortij lege periculū inuehant, euulsione qua parte infixum est, eximi debet. Illud autem digitis, vel ipsius teli arundine, seu hastili (quod plerunque ligneum est) in ferri tubulum immisso, extrahemus. In quibus verò altè telum in carne infixum est, & plus est, hoc est, longius spacium, per quod telo reuerrendum, quàm quod perrumpendum est, iamque venas neruósque id pertrāsīuit: breuiter cūm parum admōdum integræ carnis ex aduersa parte superest, neq; aliquid obstat quominus contra mucronem incisio commodè fieri possit, melius est aperire quod superest, eaque propulsatu telum educere. Nam & propiūs petitur, & tutius euellitur, & in maiore membro, si medium mucro transiit, facilius sanescit quod peruium est: quia vtrinque medicamento fouetur. Protrudi autem debet, vel hastili ipso, si inhæreat, vel si exciderit, propulsorio instrumento, cauo quidē, vel solido: quod & surdum quidam vocant) prout res exigit. Porro si telum acumen (quod *ὑπαχον* vocant) habeat, (hoc autem specillo deprehendimus) propulsorij instrumenti fœminam, si verò tubulum seu concauitatē habuerit, marem demitemus, atque ita ferrum inserto instrumento protrudemus, quoad educi facillimè possit. At si etiam in opposita, seu vltèrius telū processerit, nec ea parte ipsum possit extrahi, qua infixum est, diuisis iis, quæ opposita sunt, per illa ipsum eximemus, vel euellentes, vt dictum est, vel per eam partem in quam tetendit, vt modò diximus, propellentes, summa cura (vti monuimus) semper habita, ne vel neruum, vel tendinem, vel maiorem venam, aut arteriam incidamus. Turpe si quidem est, dum telum extrahimus, maiorem noxam inferre, quàm telum ipsum effecerit.

Si telum altè in carne insedit.

Si telum in opposita processerit.

Si telum ossi inhæsit, nō nisi attrahendo ipsum eximere tutum est. Eò autem vsque mouendum est, donec is locus laxetur, qui mucronem momordit, & tum vel manu, vel forcipe telum extrahendum est. Quæ ratio in dentibus quoque eiciendis est, & vix vnquàm ita telum non sequitur: sed si morabitur, excuti quoque ictum aliquo ferramento poterit. Quidam tenaculis (vt vocant) seu forcipibus alligant arcum, quem vulgò balistam nominant, & laborante

Si telū ossi inhæsit.

laborante bene stabilito, intensum ipsius instrumēti neruum, seu chordam, remittunt & ita telum extrahunt.

Si telum altius in osse demersum sit.

Quod si telum altius in osse defecerit (quod cognoscimus, si firmiter id infixum, nulla vi moueatur, aut labet) excisorio cultro, osse quod iuxta est, exemplo, aut etiam terebra (si crassum sit) prius perforato, telum ipsum extrahemus. Sunt qui ab eo foramine terebra facto ad speciem literæ ψ contra telum os excidunt, sic ut lineæ, quæ diducuntur, ad telum spectent: quo facto, id necesse est, labet, & facile auferatur. Quod remedium vltimum est. Alij 10 terebra in rectum ac longum porrecta, quæ illis directæ vocatur, ossis percussi rimas cōnuentes, & telum infixum mordicis prehendentes, diducunt, atque ita facile quod infixum est, extrahunt.

Si telum in articulo se inter duo ossa demersum sit.

Inter duo verò ossa, si per ipsum articulum telum per- 15 ruperit, circa vulnus duo membra fasciis habenisve deliganda, & per has in diuersas partes diducēda sunt, ut tendones, ligamenta, & nervos distendant. Quibus extensis, 20 laxius inter ossa spacium est, ut sine difficultate telum recipiatur. Sed illud quoque videndum est, sicut in alijs locis seu particulis supra monui, ne quis nervus, aut vena, aut arteria à telo lædatur, dum extrahitur, eadem scilicet ratione quæ supra posita est.

Si particule plures cōfixæ fuerint.

At si particule plures cōfixæ fuerint, hoc est, si membrum aliquod telo traiectum, alteri affigatur, verbi causa, brachium 25 thoraci, aut cubitus alicui alteri corporis particulæ, aut crura inter se, hoc modo faciendum est. Si non per totum vtrunque membrum penetret sagitta aut hasta, eā ab exteriori parte, perinde atque in vno fieri consuevit, apprehensam extrahemus. Sin penitus ambę partes transfixæ fuerint, dimidia ligni parte serra resecata, eas ligni 30 partes quā facillimo fieri poterit modo, sigillatim eucleraus.

Si venenato telo quis ictus est.

Porro si venenato quoque telo plaga facta est, iisdem omnibus, si fieri potest, etiam festinantiùs actis, adicienda 35 curatio est, quæ vel epoto veneno, vel à serpente, aut quouis alio venenato animante ictis adhiberi solet. Ceterum quod ad chirurgiam attinet, totam carnem, quæ veneno iam mutata est, si quidem fieri potest, præcidemus. Agnosces autem eā, quod à sana carne multum diuersa sit. Pal-
lida

lida enim supra modum, subliuida, & veluti mortua apparet. Sin carnem totam à veneno immutatam circuncidere non possis, non alienū erit circa vulnus scalpello incidere, hoc est, scarificare, quò plus viriati iam sanguinis extrahatur. Dein venenum admota vulneri cucurbitula, extrahendum est. Si cucurbitula non est, tum quodlibet simile vas, quod idem possit. Si ne id quidem est (quod tamen vix incidere potest) homo vilis aliquis adhibendus est, qui vulnus exugat. Sed illud ne intereat, antè debet attendere, quò vulnus exuxerit, ne quod in gingivis, palatove, aliave parte oris vlcus habeat: hoc pacto enim & ipse tutus erit, & tutum hominem vulneratū præstabit. Si quidem venena (vt Celsus ait) non gustu, sed in vulnere nocent. Verum priusquam hæc aggrediamur, telum ipsum vti docuimus, eximendum erit. Atque hætenus tradita est methodus de telis è corpore extrahendis. Cæterum Nicodemi incantamenta, & infusurationes, quas & coniurationes vocant, quæ à Theodorico, & Gilberto referuntur, ne pili quidem facio, vt quæ meræ nugæ sint, & Christianū hominem non deceant. Medicamenta autem ea, quæ extrahendi infixis dicata sunt, subindè Guido vsurpare solet, in spinis, piscium ossiculis, lapidibus, vitri fragmentis, surculis, & ossium frustulis eximendis: atque frequenti experimento se edoctum medicamentum ab Auicenna descriptū, inter cætera præstantissimū esse, & efficacissimū.

Venena nō gustu, sed in vulnere nocent.

Recipit autem fermēti, mellis optimi, aut alueariū sordicici (quæ Græcè propolis dicitur) singulorum libram semis, visci quercini quart. vnum, ammoniaci quart. semis, olei quart. vnum: ex quibus omnibus cōficitur emplastrū, quod loco cui fixum intus inhæret, superponitur.

Emplastrū Auicenna, infixa statim extrahens.

Rogerus adserit multiplici experimento comprobatum, quòd radix arundinis contusa cum melle, & apposita, infixa sine dolore extrahit. Pleraque alia sunt in antidotario descripta, quæ vim habent attrahendi, & infixa euellendi, cuiusmodi sunt, dictamnium, thapsia, sagapenū, ammoniacum, aristolochia, ranæ combusta, & id genus alia.

Hoc idem & Paul. Aeg. testatur.


SEQUEVNTVR FORMULAE

aliquot instrumentorum, quæ telis extrahendis idonea sunt.

Forcipes

Forcipes denticulatæ, ad euellendum
 spinas, ossicula aspera & pungen-
 tia, aculeos quoque, & mu-
 cronos infixos, aliâque
 id genus acuta.

Forcipes
 Albucæ
 sis, sub
 hac dupli-
 cis formu-
 la depi-
 ctæ repe-
 riuntur, in
 variis ex-
 emplari-
 bus. Hæ
 autem sunt
 secundum
 Guidon-
 is instru-
 mentum.



Hoc genus for-
 cipis, rostrum
 coruinum quæ-
 busdam appel-
 latur, aliis ser-
 pentinū instru-
 mentum; quod
 ad secundum
 Guido. instru-
 mentum perti-
 nere uidetur.

De secunda intentione curationis Vulnerum.

Secundam intentionem in curandis vulneribus (quæ est commissio dissidentium, seu distantium partium coniunctio) assequimur per orarum adductionem, seu labiorum vulneris inuicem distantium attractionem, & applicationem, membrum ipsum læsum quam fieri poterit lenissimè tractando. Dissidentium namque coniunctionem seu agglutinationem præcedit necessariò orarum adductio.

Quæ autem diducta sunt, in idem adducuntur, aut vinctulo ex duobus initiis circumdato, aut sutura, aut fibulis (quas Græci ἀγυτήραι vocant) impositis, aut horum quibusdam, aut omnibus. Quòd si vulnus (vt proposuimus) simplex sit, hoc est, solùm continui in carne diuortium, cum quo neque affectus ullus, neque symptoma ullū adfit, nec valde magnum sit, sola fascia orbiculatim circumdata, diductæ partes committendæ sunt. Ita enim vulnus procul dubiò coibit, & citra aliquam aliam extrinsecus adhibitam curam coalescet. Huius autem conditionis & coalescentiæ effectrix causa, sola certè est natura. At si magnum vulnus sit, aded vt diductæ partes in totum, atque exactè prædicta deligatura committi nequeant, suturis ipsæ adducuntur: deinde vbi sic deligatæ, aut suturis adductæ fuerint, glutinatoriis prædidiis vtetur, quæ collectam humorum subluuiem desiccare, & consumere queant: alià verò ne influat, prohibere. Plaga autem ea sui potissimùm debet, quæ in molli parte accepta est, maximeq; si discissa auris ima est, vt Celsus ait, vel imus nasus, vel frons, vel bucca, vel palpebra, vel labrum, vel circa guttur cutis, vel venter: vix enim iis partibus deligaturam vulnus admittit.

Si verò in carne vulnus est, hiatque, neque in vnum oræ facile attrahuntur, sutura quidem aliena est, imponendæ verò fibulæ sunt. quæ oras paulùm tamen contrahunt, quò minus lata postea cicatrix sit: ferè autem fibulæ latius vulnus esse patiuntur.

De tertia intentione.

Tertius scopus, qui in curando simplici vulnere chirurgico proponitur, est, vt diductorū oræ, ita vt in vnū per adductionem coniunctæ sunt, conseruetur, & maneāt. Cōseruabūtur autē optimè huiusmodi extrema, quæ in vnū coacta sunt iisdē ferè auxiliis, quibus & in idem adducta sunt:

2
Dissidentium
coniunctio.

Lib. 3. The.
Trifariam
distantes o-
ra vulneris
in idē addu-
cuntur.

Vulnus sim-
plex ex so-
la partium
commissio-
ne aggluti-
nari potest.

1
Deligatu-
ra.

2
Sutura.

3
Fibula.

3
Commissorū
cōseruatio.

*Dupliciter
cōiuncta ma-
nere quæ cō-
mittuntur.*

nempe, decenti ligatione, appposito membri situ, & suturis, si necessariæ videbuntur. Porro bifariam simul manent, & adglutinantur quæ commissa sunt, alia enim per se, alia ope aliorum subsistunt ac manent. Per se quidem, quæcunque secum concrescunt, ac coalescunt, aliorum ope, ut ea quæ colligantur, & quæ glutino aliquo tenentur: ac quæ concrescant coalescāte omnino mollia naturaliter sint oportet. Talis sanè est (inquit Galenus) tum caro ipsa, tum quæcunque carnea, ex ipsa constitutione sunt. Quæcunque verò dura siccæque sunt, eorum diuise partes coire simulto nequeunt, alienum enim terminum nequaquam admittunt, sed glutinum aliquod vinculumve, quo commissa maneant, requirunt. Et talium quidem sanatio in sequentibus præcipietur. Nunc de iis quæ per se vniri possunt, inceptum sermonem peragamus, & quomodo vulnus ligari conueniat, primùm dicamus.

Quomodo vulnus ligari conueniat.

*Triplex ge-
nus deliga-
tura.*

*Incar-nati-
ua seu ad-
glutinato-
ria deliga-
tura.*

Deligaturæ modi seu differentię tres sunt apud Aui-
cen. Fen. quarta lib. quarti. Nempe incarnatiua, ex-
pulsiva, & retentiua: ita enim eius interpretes, & recentiores
chirurgi eas nominant. Incarnatiua, quæ magis propriè
adglutinatoria diceretur, recentibus tum vulneribus, tum
fracturis accommodatur. Debet autem fascia in hoc ge-
nere deligaturæ à duobus initiis versus medium eiusdem
circumuolui et principium deligaturæ fieri ex parte ad-
uersa loci vulnerati ducendo, atque iniiciendo alterum fa-
sciæ principium versus partem superiorem membri, alte-
rum versus inferiorem. Ea verò latitudine esse debet fascia
ipsa, ut semel iniecta, non vulnus tantum, sed vsque ad ali-
quid vtrinque etiam oras eius comprehendat, quantum
videlicet videbitur necessarium. Si ab altera parte caro ma-
gis recessit, ea melius attrahitur. Si æque ab utraque trans-
uersa comprehendere oras debet, aut si id vulneris ratio
non patitur, media primùm iniicienda est, & tum in vtran-
que partem ducatur. Cæterum arctior esse debet ligatu-
ra super locum læsum, quàm in partibus adiacentibus. Ca-
uendum tamen semper est, ne vel nimis arcta, vel nimis la-
xa sit. Quandoquidem quæ laxior est, non continet, quod
autem non continetur, elabitur. At verò quod vehemen-
tius est adstrictum, dolorem premendo excitat, & proinde
fluxio

fluxionem proritat, & phlegmonem accrescit, quandoque etiam gangrænam. Danda igitur opera est, vt vitato ambarum incommodo, vtriusque fruamur commodo. Id fiet (vt Galenus ait) si quod nimium est declinabimus. Ergo
 5 nec adeò arctare deligaturam debebis, vt iam comprimat, nec adeò remittere, vt laxa sit. Et vt summatim dicā, deligaturæ terminus, sit bona laborantis tolerantia. Cæterum extrema fasciæ acu affluenda sunt. Nam nodus (inquit Celsus) vlcus lædit, nisi tamen longè est. Et si necessitas
 10 desideret, plures fasciæ iniiciantur, & modo qui suprà dictus est, reuoluantur. Itaque hoc deligandi modo vulneris labra adamussim committuntur, & quominus circa vulnus excitetur phlegmone, (cuius rei curam imprimis habere oportet) prohibetur vt libr. sexto methodi Gal. annotauit.
 15 Sunt qui pannum lineum duplicatum adaptant vulneri, & stringendo acu desuper assuunt. Hæc de prima ligaturæ differentia.

Secunda deligaturæ differentia, quæ expulsoria dicitur, antiquis vlceribus & sinibus (quos cauernosa vlcera vocant) propriè dicata est, hoc enim commodi præstat in illis, quòd à fundo ad os collectam humorum colluuiem extrudit, & ne quid amplius in locum affectum confluat, validè prohibet. Hæc autem fit fascia ab altero tantum principio reuoluta, incipitque ab inferiore parte membri laborantis, vbi arctior esse debet. Ab hinc ad superiorem partem facta circumuolutione, eam paulatim soluendo, dispensatur: si saltem os per quod sanies emanat, ad superiorem partem porrectum sit. Interdum enim inferius spectat. Voco autem hinc partem superiorem cum Galeno, quæ
 25 versum cor, aut hepar vasorum radices spectat. Rursus radicem vasis appellamus, priorem eius partem, quæ iocinori priorior est, vel etiam cordi. Porro huiusmodi ligatura adaptari solet membris inæqualibus, id est, quæ non sunt æqualis crassitudinis, cuiusmodi sunt tibiæ, scindendo fasciā ipsam, singulo quoque palmi interuallo, & eam validè acu
 35 affluendo, ab ea parte maximè, quæ gibba est, seu, vt dicunt, arcuata, laxè verò à parte altera dorsali. Hoc autem genus ligaturæ vtilissimum est in antiquis vlceribus, vari-
 cibus, & tibiæ inflationibus.

Deligatura quæ retinet medicamenta, accommodatur

Deligatura retinēs. membris, in quibus non potest fieri arctatio, seu strictura, neque alia deligatura, vt in collo, & ventre, atque omnibus abscessibus, & dispositionibus dolorificis. Hæc autem perficitur, linteolo, seu fascia vnicum finem, seu (vt dicunt) caput habēte, vel quæ sit multorum caputium seu brachiorum, prout res exigit. Atque eius deligaturæ principium, super locum affectum innicietur, & in parte opposita, vel nodus, vel potius sutura fiet. Talis autem deligatura leniter, & citra dolorē, cum appeteret tempus, solui debet. Quod si linteola nimis adhæreant, ea tanti per vino madefacito, donec facile separari possint: fascia vero ad vulnus deligandum, linteola aptissima est Galeno libro sexto Therap. quæ nec nimium mollis, nec nimium dura sit. Quod enim molle nimium est, & algæ ritu fragile, non tuto continet. Quod verò durum nimis est, premendo offendit. Si igitur ex panno veteri, non tamen nimis detrito, suauis, lenis, & mundo: eaque latitudine, & longitudine, quam naturā partis desiderat. Vt si humerus tibi deligandus sit, fasciam quæ latitudinem sex digitorum habeat assumes: at si femur, quinque, si tibia, quatuor, si brachium, trium digitorum. Si verò digitus ligari debeat, vnius digiti latitudine fascia assumenda erit. Eius verò longitudo sit, pro ratione numeri iniectionum, hoc est, pro necessitate reuolutionum. Hoc igitur, vt & multa alia, quæ scriptis mandari non possunt medici, ac chirurgi ingenio, quod (vt Damascenus ait) tum artem, tum naturam operantem magno opere adiuuat committitur. Sed & ad hoc non parum confert cognitio conformationis ipsius particulæ laborantis, vt quarto Therapeutices Galenus his verbis expressit. Diligere (inquit) commodè egram particulam non possis, nisi prius vel ex figura, vel politura, vel vtriusque indicationem sumpseris. Hactenus de modo deligandi. Nunc de qualitate, & modo suendi.

De sutura in vulneribus faciendâ.

Sutura triplex.

Vsus suturæ agglutinatorie.

Triplex sutura comuniter fieri solet in vulneribus, agglutinatoria, quam incarnatiuam vocant, suppressoria sanguinis, & labiorum in vnum adductorum, ad tempus conseruatricis. Sutura agglutinatoria omnibus his plagis seu vulneribus in molli parte acceptis, competit, quorum labra sic inuicem dissident, vt solâ ligatura in vnum adduci

adduci non possint & quibus nihil iam extraneum inter ipsas oras intercipitur. Sed & recentia esse debent vulnera, quibus hoc genus futura accommodatur, vel saltem si vetera fuerint, ac dura, callosâque labra habuerint, per scarificationem, aut cutis ablationem, sanguine emisso renouata. Hec autem fit quinque modis. Primò, filo forti, æquali, & læui, cuiusmodi est sericum in communibus saltem vulneribus, primum punctum faciendo in medio diuisionis vulneris, deinde alterum in medio spacio vtriusque lateris, & ita deinceps procedendo vt inter duo quæcunque puncta punctum intercedat donec, vulneris labra ritè commissa fuerint. Itaque neque nimis rara, neque nimis crebra futura esse debet. Si enim nimis rara est, non continet. Si nimis crebra est, vehementer afficit. Quia quo
 15 sæpius acus corpus transiit, quòque plura loca iniectum vinculū mordet, eo maiores inflammationes (inquit Celsus) oriūtur. Sic igitur futura oras iungat, vt ne ipse quidē inter se ex toto cōtingant. Quòd scilicet, si quid intus humoris cōcreuerit, si qua emanere, ac effluere possit. Solēt autē cō
 10 muniter vnus digiti trāuersalis spaciū inter iniecta vincula relinquere. Porro acus longa, ac leuis esto, cuspidē triangulari, cauda verò excauata, vt in ea filū recōdatur, & trāsitum acus nō remoretur. Ita enim mitius corpori insidet.

Modi quinque futurse agglutinatione.

Libr. 5.

Acus qualis esse debeat.

Cæterum cannula habeatur fenestrata, cui incumbat,
 25 ac innitatur altera pars labij vulneris, ne scilicet huc atque illuc euagetur, dum acus intromittitur: & vt per fenestellam videri possit, quando acus pertransierit. Atq; vbi iam acus traiecta fuerit, vnâ cum filo trahatur: sed interim vulneris labrum, quod propè filum est, specillo huic parti applicato, veluti fulcimēto, & adminiculo innitatur, ne dum
 30 filum extrahitur, labrum etiam consequatur. Ligetur autem primò duabus inuolutionibus, secundò vna duntaxat, deinde filum scindatur, aliquantulum remotè à nodo.

Secundo modo fit futura incarnatiua, seu agglutinatio
 35 ria acubus, aut pinna cum acu introducta. hac autem utimur in magnis vulneribus, & profundis, in quibus labra plurimum inter se distant. Atque tot numero acus imponendæ sunt, cum filo in eas intromisso, quot necessariæ videbuntur. Filum autem circa eas reuoluendum est, eo modo quo mulierculæ facere solent, dum suas acus super

Secundus modus futurse agglutinatione.

manicas aut capitia asseruant, atque hoc modo relinquuntur usque ad vulneris consolidationem.

*Tertius
modus suturæ
incarnali-
us.*

Tertio modo fit sutura hæc agglutinatoria dicta veruculis æqualibus ex stupis vehementer contortis, & gracilibus ad modum scriptorij calami, vel festuæ, longitudine ferè mediij digiti. Quòd si velimus futuram longo tempore perdurare, pinna seu scriptorius calamus, loco stuparum assumi debet: fit autem ad hunc modum, Vtraque vulneris ora traici debet, acu filum ducente. Deinde factò per idem foramen recursum, ex ea parte qua venerat recipienda est: sic quidem, ut ansa vna remaneat, ea parte qua remanuit.

Ansa.

In qua alterum veruculi extremum imponendum erit. Postea fines amborum filorum, euntis inquam & redeuntis, constringito, & super alterum veruculi caput ligaturam facito, ibique fila rescindito, & veruculum hoc pacto usque ad perfectam vulneris coitionem relinquito.

*Quartus
modus suturæ
agglutinatoriæ.*

Quarto, eiusmodi sutura fit, fibulis (quas Græci ἀντή-
ξας nominant) disiunctas, atque hiantes vulneris oras committendo. Sunt autè fibulæ ipsæ vel maiores, vel minores, pro ratione partis vulneratæ: ab utraq; vero parte recur-
unt, figaturque hamus vnus in altero vulneris libro, & ver-
sus alterum ducatur, in quo & alter hamus infigatur, ut fa-
cere solent qui pannos tundendo apparant. Hæ autem (fi-
bulæ inquam) quibus hiantis plagæ oras sic contrahimus, nullam vim desiderant, sed eatenus viles sunt, quatenus cu-
tis ducentem quasi sua sponte subsequitur.

*Quintus
modus suturæ
incarnati-
væ.*

Quinto modo diductæ vulneris oræ committuntur, pannis utrinque ad moris, qui figuram triangularem refe-
rant, & ea sint magnitudine, quæ membro læso congrue-
re videatur. Qui suturæ modus, in iis maximè locis
conuenit, in quibus volumus cicatrices, facta vulneris
agglutinatione, non apparere, ut in facie. Panni au-
tem eiusmodi, viscoso linimento, ac pertinaciter adhæ-
rente oblini debent quòd recipiat puluerem sanguini
draconis, thuris, & mastiches, sarcocollam, picem,
& pollinem, id est, farinam volatilem molendinari-
am. Quæ omnia cum oui candido liquore subigi de-
bent, & in vnitatem redigi. Atque vbi linimenti for-
mæ iam induerint, supra dictos pannos extendi de-
bent,

bent, qui vtrinque postea ad latera vulneris, ad pollicis vnus distantiam supra vulneratam partem agglutinandi sunt. Vbi autem hæc panni frustula sic linimēto oblita, deficcata fuerint, ingeniosè, & vt oportet, consui debēt. Quo facto, vulneris labra coibunt, & agglutinabuntur.

Sutura sanguinem suppressens, fit acu filum trahente, traiectis oris vulneris vtriusque, per modum reuolutionis, vt pelles consui solent. Ea autem vtimur, quādo alia non datur vti, propter magnum ruētis sanguinis impetum, ac cepto in venis vulnere. Sed & hæc utilis est ad transfluenda intestina, cū sauciata sunt: ad panniculos quoque vulneratos, & loca carne destituta. Verū non admodū tutus est hic cōsuendi modus. Quandoquidem disrupto puncto vno, cætera relaxantur.

²
*Sutura san-
guinem sup-
primens.*

Sutura quæ laborum in vnum attractorum est conseruatrice, fit vt & reliquæ aliæ: verū non æquè arcta esse debet. Eo enim duntaxat nomine fit, vt simul maneant quæ commissa sunt, tantisper dum vulnus coaluerit. Competit autem huiusmodi futura vulneribus in carne, aut molli

³
*Modus su-
tura ter-
tius.*

parte acceptis, in quibus magna facta est dilaceratio, & carnis deperditio. Hac enim facto vnionis diuortio, seiunctæ partes in vnum adducuntur, quo citiùs coalescant. His etiam vulneribus rectè accommodatur, è quibus in posterum aliquid extrahendum est. Illud autem de futuris ac fibulis in vniuersum diligenter obseruandum est, vt illis nunquam vtamur, antequam vulnus intus purgatum sit (nisi cū magna sanguinis profusio suppressenda est) ne quid tibi concreti sanguinis relinquatur, id enim & in pus vertitur, & inflammationem mouet, & glutinari vulnus prohibet. Sed ne linimentum quidem, quod suppressendi sanguinis causa inditum est, mihi relinquendum est, nam id quoque inflammat. Comprehendi verò futura vel fibula, non cutē tantū, sed aliquid etiam ex carne (vbi suberit hæc) oportebit, quò valentiùs inhæreat, neque cutem abruptat. Vtraque optima est vt voluit Celsus) ex acia molli, non nimis torta, quò mitius corpori insidat. Sed neque rara nimis, neque nimis crebra (ob superius adductas rationes) futura aut fibula iniicienda est. Neutra etiā vim vllā desiderat, sed eatenus utilis est, qua cutis ducentē quasi sua sponte subsequitur. Cæterū tunc appetit tempus remoueri

Lib. 5.

Tēpus, & modus reponend. susu re. remouendæ futuræ, cum ea, quem desideramus effectum præstiterit. Modus autem remouendi talis est: Specilli eadem, id est, angustum mucronē, filo supposito, filumque ipsum mox abscondito. Postea latum ipsius specilli mucronem, labro vulneris per quod filum educitur, superponito. Ita enim pulchrè vitabis, ne quid filum euellendo laceretur.

Modus conficiendi puluillos, & eorum vsus.

Vsus puluillorum.

TEmpestiuum autem est, de puluillis (qui vulgaribus chirurgis plumacoli nuncupantur) aliquid obiter dicamus: hi enim ad multa viles sunt. Quandoquidem dissolutas ac diductas partes fulciunt, & comprimunt, membri, quod sue unionis diuortium patitur, genuinum calorem fouent, & conseruant. Denique a graui molestoque vinculorum ac fasciarum pondere, vulneratâ particulam tuentur. Ieri autem quondam solebant ex pluma inter duos pannos candidos, & mundos confuta, vnde

Ratio nominis.

& nomen illi à veteribus inditum est. Verum quoniam eos subindè mutare, & innouare (quod valde tediosum erat) coge-
bat necessitas, magis postea placuit eiusmodi puluillos ex stupis cannabinis conficere, præsertim diligenter, ac

Materia puluillorum.

studiosè pexis, emundatîque. Inunt etiam interdum ex lana vel xylo, quod cottonem appellant. Plerique autem hodie loco puluillorum, panniculos admovent læues, id est, non asperos, duplicatos, aut triplicatos, alij vero spon-

Numerus.

giam adaptant. Porro duo, vel tres, plurève, prout res expostulat, apponuntur. Quandoque quidem sicci, ac nullo madentes liquore, nonnunquam verò imbuti oui candido, vel vino, vel posca, aliquoties etiam oleo, iuxta ipsius dispositionis exigentiam. Inueniuntur autem hu-

Figura.

iusmodi puluilli ex triplici differentia, quod ad figuram attinet. Alij enim triangularem, alij rotundam, alij verò quadratam habent. Qui figura constant triangulari, glutinandis vulneribus (vt placuit. Auicennæ) sunt dicati. Ita autem disponi debent: vnus ex utroque latere orarum, seu labrorum vulneris, constituitur ita, vt super plagam, inter se iungantur lateribus. Qui rotundam habent figuram, sicci aliis superponuntur natiui caloris particulæ læsæ conseruandi gratiæ, & vt saniosam proluuiæ, ac sordidos ichores in

Triangulares.

Rotundi.

res in

res in se recipiant. Sed qui quadrati sunt, ideo apponuntur, vt partem læsam à fasciarum & vinculorum iniuriis vindicent. *Quadrati.*

De penicillis sue turundis (quas tentas vulgò appellant) & linamentis formandis, deque eorum vsu multiplici.

Turundas seu penicilla; & linamenta maximo esse vsui in curandis vulneribus, & præcedentia luce clarius ostendunt, & omnibus in aperto est. Proinde quando, quomodo, & ad quos fines illis sit vtendum, chirurgo haudquaquam est ignorandum. Adhæc ex qua materia, & qua figura formari debeant. Itaque illis vtimur, in iis octo præsertim vulnerum generibus.

In quibus vulneribus videtur turunda, & linamentis.

Primò, cum vulnera vel amplianda sunt, vel detergenda, vel cum aliquid ab eorum fundo vacuandum est: vt in profundis vulneribus, in quibus necessum est alibi vulnus aperire, vt ex fundo, & sinu ipsius, ichores, id est, saniosa colluuiæ, inibi collecti vacuentur.

1

Secundò illis cogimur vt, in cauis vulneribus, in quibus necessaria est carnis deperditæ regeneratio.

2

Tertiò in vulneribus alteratis ab aëre, & sordidis quæ deterfione egent.

3

Quartò in vulneribus contusis.

4

Quintò prædictorum vsus utilis est, in vulneribus, quæ cum phlegmone, aut quouis alio tumore præter naturam fatigant.

5

Sextò in vulneribus, quæ per morsus fiunt. Talia nanque vulnera non sunt festinanter agglutinanda, & ad cicatricem perducenda. Quin potius longo tempore aperta & hiantia manere debent. Quandoquidem morsus ferè omnīs (vt Celsus ait) quoddam virus habet, quod foras semper euocandum est, non intrò repellendum, nec occluso vulnere intus relinquendum. Sed de his fusiùs in sequentibus dicetur.

6

Lib. 5.

Omnis ferè morsus habet quoddam virus.

Septimò turundis, & linamentis vtimur, in vulneribus, in quibus persanandis circa ossa manus admouenda est.

7

8

Octauò in vulneribus, quæ iam vetustate in vlcera defluxionibus scaturientia degenerauerunt. Porro in omnibus aliis reliquis vulneribus, inducendæ cicatrici studemus, absque eiusmodi turundis, & linamentis. Aduertendum autem est, in iis diuersitatem nõ paruam esse, pro ratione

Vsu, & materia turundarum & linamentorum.

*Tenta can-
qule.*

ratione finis, cuius gratia fiunt, & admoventur: fiunt au-
tem interdum, vt diximus, ad detergendas sordes vulne-
rum, atque tum ex panni non asperi, & presertim veneris,
laciniis, vel floccis euulsis, formantur. Nonnunquam verò
ideo fiunt, & in vulnus immittuntur, vt ipsum hians, &
apertum maneat. Ac tunc quidem ex stupis bene pexis, &
à sordibus ritè emundatis, vel ex prædicti panni frustulis,
efformantur, vel etiam ex xylo (quem cottonem vocant)
vt Razes facere solebat. Sed & ex canna ænea, vel argen-
tea perforata fiunt penicilli ad eundè finem, vt verbi gra-
tiâ, in naribus, ad aëris inspirationem, & in altis vulneri-
bus, vt sanies, & purulenta colluio, per hâc velut emissi-
arium feratur, & foràs egrediatur, non autè intus retinea-
tur. Quandoque etiam hæc, linamenta inquam, & peni-
cilla, plagæ inferuntur, vt ipsius os magis dehiscat, & am-
plietur, fiuntque tunc aut ex spongiolis vehementer com-
pressis, & intortis, aut ex radice gentianæ, hæc enim dum
multum humorem, quo scatet vulnus, combiberint, tur-
gescunt, & ita magis hiantem plagam reddunt. Cæterùm
forma linamentorum æqualis esse debet, turundarum ve-
rò inæqualis, in modum clauiculi lignei, quem Latini im-
pagem vocant, ne scilicet intrò labantur. Hæc autem ali-
quoties quidem sicca, quandoque vero quopiam delibuta
vnguento admoventur, prout res ipsa exigit. Reliqua quæ
ad eiusmodi operationes spectant, medentis consilio, & so-
lertiz committuntur.

*Impages,
cheuille.*

*Substantia
partiu cōser-
uatio.*

De quarta intentione curandorum vulnorum.

Quartà intentio in curandis recenter acceptis vulne-
ribus est, particulæ læsæ substantiam conseruare, ac
prohibere ne ipsa dolore, vel phlegmone, aut aliquo alio
prauo symptomate (quod vulneribus ipsis accidere solet)
infestetur. Hunc autem scopum assequimur, admodis em-
plastris, & linimentis, ex oui candido, & aliis huiusmodi
refrigerantibus, vt rectè docuit Razes, primis saltem die-
bus. Postea verò vino styptico particula perfundenda, &
figura aptissima collocanda est. Apertio quoque eaque in-
terdum ex aduerso in vulnerata parte molienda est. Neces-
saria etiam est nonnunquam sanguinis missio, item & pur-
gatio: vt mox docebitur. Sed & proba victus ratio (quam
statim præscribemus) imprimis est obseruanda, si quartum
hunc

hunc scopum cupis assequi. Porro nihil aduersus hæc, quæ commentatur, pugnat, quod plerique obiciunt, vulnera scilicet inquantum vulnera, iis tam variis, tamque multiplicibus auxiliis non indigere. Hoc enim dictum solum
 5 locum habet in paruis occasionibus, & eucratis, id est, bono habitu præditis corporibus. In magnis verò occasionibus, & in plethoricis corporibus, vel vitioso succo refertis, necessum est ad prauorum symptomatum (quæ recētibus vulneribus superuenire consueuerunt) præcautionē, præ-
 10 dictis vti auxiliis. Quod Galenus innuere videtur libro
 „ sexto methodi medendi, his ferè verbis : Fingamus quem-
 „ piam ad nos venire, cui tantum cutis acu sit puncta, hunc
 „ hominem, si is sit cui facile [ob bonam corporis habitudi-
 „ nem] vlcera sanescant, etiam si citra medicamentum, nu-
 15 dōque membro, ad opera consueta dimittas, nihil sentiet
 „ mali: sin ex eorum numero sit, qui difficulter sanentur
 „ (quia scilicet vel plethoricus sit, vel vitiosis succis prematur,
 „ vel acris sit sensus, vel horum quibusdam, omnibūscū pre-
 „ matur) primum quidem dolebit, post etiā tum pulsu par-
 20 ticula infestabitur, tum phlegmone. Porro in omni mem-
 bro carnofo, quod suæ vnionis solutionem patitur, nerui,
 venæ, & arteriæ reperiuntur, quæ praua quædā accidentia
 inducere possunt: nempe dolorem, phlegmonē, sanguinis
 profusionem, cōuulsionē, & id genus alia. Quibus summa
 25 diligentia medentem occurrere oportet. Occurret autem
 facile, si ea præsentierit, & præcognouerit, vt primo libro
 præsagiorum testatus est Hippocrates ad hunc modū scri-
 bens, Nihil perinde medico conducibile est, quàm vt fu-
 30 tura præsentiat: ita enim (vt Galenus locum hunc inter-
 pretans ait) de longinquo obuiam it malis.

*Gal. lib. 6.
meth.*

De sanguinis detractione in vulneribus.

„ **O** Mni recens facto vulnere (nisi in ventre sit) expedit
 „ (inquit Galenus) ex ipso statim sanguinem plus, mi-
 35 núsve effluere. Quippe hoc modo phlegmone minùs ten-
 „ tabitur, tum vlcus ipsum, tum quæ circumposita loca
 „ sunt. Itaque si medicum imitatore esse oporteat, nō na-
 turæ tantum (vt subinde nos monet Hippocrates) sed etiā
 eorum, quæ cum sua sponte veniant, conferunt, in recēter
 40 autem acceptis vulneribus præsertim magnis, & præuali-
 dis, ex

*Li. 4. met.
ex Hipp.*

*In vulneri-
bus præuali-
dis, ex*

dis sagui-
nē mitten-
dum esse.
Vulnera
trifariam
magna red-
duntur.

dis, expedit (vt diximus) sanguinem effluere, hic certē si minimē, vel minus quam par sit, effluxit, quod deest, ipsi adicias oportet, sanguinem scilicet ex vena detrahendo. Porro trifariam vulnera, vt & reliqua omnia alia vitia magna grauiāque redduntur, vt Galenus ait libro quarto, methodi medendi: nempe vel propter afflictæ partis præstantiam, vel propter affectus vim, seu magnitudinem, vel propter quod sunt cacoëthe, id est, maligna. Cuiusmodi quæcunque in articulis accepti vulnera sunt. Hec enim doloris, vigiliarum, conuulsionis, & delirij periculum afferunt. Quod scilicet ibi tendones, & nerui, & carne vacua, atque ossea loca sunt. Vulneris igitur magnitudo, vna cum virium robore, mittendum sanguinem indicat: quanquam qui vulneratus est: prorsus redundantiæ sanguinis sit expertus. Quo fit, vt in artis operibus errent, qui in sola sanguinis abundantia, ipsius detractionem consulunt. Porro nos sanguinem detrahimus, in recentibus, & nuper acceptis vulneribus, non solum ne pars læsa, aut circumposita loca (vt superius dictū est) phlegmone tententur, sed vt impetum quoque ruentis sanguinis cohibeamus, & nimium profluuium impediamus. Hi enim sunt precipui scopi mittendi sanguinis in recenter illatis vulneribus. Cæterum si

Que san-
guine mit-
tendum in
dicet in vul-
neribus.

Sanguis cur
in recenter
acceptis vul-
neribus mit-
tatur.

Li. 4. met.
med.

Si fluxio
valēter ir-
ruat ad cō-
traria re-
uellendum.

Modus va-
cuationis
ex quibus
indicetur.

Vena secan-
da electio
ex parte
vulnerata,
indicatur.

perpetuū est, quod ab Hippocrate (vt Galenus ait) didicimus, incipientem inquam fluxionem ad contraria trahendam, & reuellendam esse, sicam: verō iam in laborante, particula, vacuandam esse, vel ab ipsa particula quæ affligitur, vel a maximē vicina, in promptu nobis, & de sanguinis detractione colligere nunc est, quod in principio hæc ē longinquo, postea ab ipsis exulceratis partibus sit emollienda. Modum verō, seu quantitatem vacuationis, tum ex redundantia modo, tum ex copia sanguinis, qui in vulnere effluxit, inuenies. Ad hæc ex ætate, natura, tempore anni, regione, & consuetudine, & ante hæc, ex ipsa laborantis virtute. Venæ autem secundæ electio ex laborante particula indicatur. Vt si vulnus in capite, collo aut facie acceptum sit, humeralis in cubito, vel manu, secunda est. Si ea non cernitur, media, quæ ex ea deriuata est. Interiorem verō (quam basilicam vocant) incidere vtile est, in iis, quibus inferiores collo partes vsque ad renes & vmbilicū vulneratæ sunt. Hac non comparente, certē media, quæ

ab ipsa

- ab ipsa diducta in iuncturę apparet flexura, diuidenda est.
- „ Vbi enim vena (vt Galenus ait libro de phlebotomia)
- „ quę parti affectę propria est, obscurior fuerit, & ad media
- „ rum aliquam aperiendam accedis, omnino tibi conadum
- 5 est, vt eam, quę à propria diducitur, potius incidas. Est
- verò, & quę inferiores sunt cubiti iunctura, eas scilicet,
- quę in vlna existunt, nihil secare prohibeat, vbi nimirum
- quę in cubito sunt, non appareant. Sed eas certę, quę in
- rectũ sunt, id est, è directo sitę, & à venis quas in cubito si
- 10 apparuissent, alioqui secassemus, diductę. Porro quemad-
- modum prædictę omnes partes, vbi sic vulneratę fuerint,
- vt sanguinis, ob causas superius adductas, egeant detractio-
- ne, in cubito secta vena iuuantur, vt dictum est, sic quę re-
- nibus inferiores sunt, illis quę per poplites, & malleolos
- 15 decurrunt. Ac perpetuò quidem in omnibus, dũ sic reuel-
- lere studes, aut vacuare, & phlegmonem prohibere, vena
- quę è directo est, secada venit. Manu tamen vulnerata, vt
- & eadem incipiente phlegmone laborante, sanguine valen-
- ter ac nimis copiose in eā irruente, crus quod è directo est,
- 20 reuulsionis gratia tibi scarificadum erit. Altero verò cru-
- rum sic ex vulnere malè habente, reliquum crus scarifica-
- bis, aut in eo poplitis, aut malleoli venam secabis, vel certę
- potius (vt consulit Aëtius) ex brachio quod è directo est,
- sanguinem detrahes. Si autem renes, vel partes illis adia-
- 25 centes, recens vulnus acceperint, quod sanguinis emissio-
- nem desideret, vel propter ipsius affectus magnitudinem,
- vel ne phlegmonē tententur, vena in cubito interior in-
- cidi debet, tamen si renes ipsi ambigant, quibus partibus,
- superioribusne, an inferioribus adscribi debeant, vt Gale-
- 30 nus annotauit, libro de curadi ratione per sanguinis mis-
- sionem. Verisimile enim est, plus sanguinis ad ipsos ex su-
- perioribus partibus, quàm ex inferioribus cõfluere. Non
- negauerim tamen, quin & ex cruribus sanguis commode
- detrahi possit. Cæterum in hac re tam ardua, tamque
- 35 magni in arte medēdi momenti, nihil vnquàm moliri de-
- bet chirurgus, citra periti alicuius medici cõsiliũ, vt iam
- alibi semel, atque iterum monuimus.

De purgatione in vulneribus molienda.

SI vulneratus aluo fuerit adstricta, ea indita glande, aut in vulnere-
sclystere injecto subducenda est: vel cassia aut manna bua.

aut aliquo eiusmodi leniente medicamento per os accepto, citanda. Porro si vitiosi succi in vulnerato corpore subsit abundantiā, vel vulnus prævalidum sit, puro etiamnum existente corpore, & citra cacochymiam, iis lenibus modò dictis auxiliis nequaquam contentus eris, si saltem Hippocratem ducem sequutus fueris, & eius interpretem Galenum: sed fortioribus pharmacis, purgationem per aluum molieris. Scribit namque Hippocrates, & post eum Galenus (qui nec cassiam, nec mannam nouerant) purgationem per aluum his vulneribus valde utilem esse, quæ in capite sunt acceptæ: item quæ in ventre & articulis. Præterea in iis quæ suuntur, aut deligantur, id est, quæ adeo magna sunt, ut futuris indigeant, aut si non his, certè deligatura. Sic autem ad verbum scribit Hippocrates: Purgatio per aluum plerisque vlcenum prodest: præterea vlcenibus, quæ in capite sunt acceptæ: item quæ in ventre, tum inferiore, tum superiore (qui sub thorace est) & articulis. Adhæc iis in quibus ossi caries impendit. Præterea quæ suuntur, & exeduntur, & quæ serpunt, & reliquis, quæ viscera diuturna reddunt, etiam quæcunque deliganda sunt, per aluum purganda sunt. His itaque verbis (ut Galenus ait, locum hunc Hippo. exponens) clarè docuit Hippocra. vlcenibus, omnibus & vulneribus, quoties prævalida sunt, purgationem esse utilem. Atqui purgantia medicamēta, quæ Galeno & Hippoc. in usu erant, multo sunt vehementiora (ut ex eorum scriptis constat) quàm vel cassia, vel manna, vel etiam rhabarbarum, quæ priscorum seculo ignota fuerunt. Si ergo illos imitari voluerimus, fortioribus medicamentis corpora non modò in diuturnis vlcenibus, sed in recentibus quoque vulneribus repurgabimus. Quanquàm ea non probentur recentioribus medicis, ob eas causas, quas mox subiungemus. Meminit autem eo loci Hippocrates seorsum, eorum omnium, propter quæ, non modò vulnera ac vlcera, sed etiam reliqua alia omnia varia, grauiam magnaque reddunt. Nempe præstantiæ partis, cocoethiz, & magnitudinis affectus. Purgationis igitur in vulneribus adhibendæ, duæ porissimæ sunt, veluti & missionis sanguinis, indicationes. Nempe morbi magnitudo (quam omnium primus adinuenit Hippocrates) & vitiosi succi abundantia, quod Galenus

*Purgatio
quando in
vulneribus
necessaria.*

*Hipp. li. de
vlcenibus.*

*Morbi ma
gnitudine
indicatrice
esse purga
tionis adhi
bende in vul
neribus.*

*Duæ pur
gationis in
vulneribus
adhibendæ,
indicatio
nes.*

Galenus quarto Methodi Medendi iis verbis expressit.
 „ Purgatio non in sola vitiosi succi abundantia conue-
 „ nienter suscipitur, sed sicut missio sanguinis, vel propter
 „ ipsius abundantiam, vel propter morbi magnitudinem,
 „ ita purgatio, & propter abundantiam alterius cuiusquam
 „ succi, & propter vim morbi adhibetur. Igitur cum in vul-
 „ nerato corpore vincit sanguis, eius redundantiā venæ se-
 „ ctione statim vacuabis. Cum verò succorum vitium a-
 „ bundat, pharmacum adhibebis, quod ad flauam bilem, vel
 „ atram, vel pituitam educendam vim habet. Sed & per
 „ vomitum quandoque vacationem molimur in ipsis vul-
 „ neribus, si saltem Galeno assentimus. Si enim (inquit) flu-
 „ xio valenter irruat, reuellere ad contraria studebimus, vi-
 „ que si in superioribus vulnus consistat, per inferna pur-
 „ gantes. Sin autem in inferioribus sit, superiorem vētrem
 „ vacuantes. At si iam fluxio restitit, atque in membro in-
 „ hæsit, deriuare per vicina magis expedit. Quibus verbis
 „ nos docet Galenus, purgationem interdum adhiberi in
 „ recentibus vulneribus reuulsionis ad contrarium (quam
 „ Græci antispasin vocant) gratia. Quæ etiā conuenien-
 „ ter suscipitur, tamen si nulla in corpore sublit vitiosi succi
 „ abundantia, quam vacuare intendamus.

*Vomitum in
vulneribus
vtilis.*

Li. 4. Ther.

*Scopus 4-
lius purga-
tionis in
vulneri-
bus.*

*Antispas-
sis.*

De Potionibus, quæ vulneratjs exhiberi consueverunt.

25 **Q**Uāquā autem Gale. & Hipp. purgationem in vul-
 „ neribus, per valida etiam medicamenta, quæ suis
 „ temporibus in vsu erant, adhibendam esse præcipiāt. Nos
 „ tamen eiusmodi valentibus medicamentis, in recentibus
 „ vulneribus, nec vti consueuimus, nec cuiquam vtendū esse
 „ 30 consulimus. Sicuti neque aliis potionibus, quas nonnulli
 „ recēns vulneratis propinant. Quandoquidem purgantia
 „ istiusmodi medicamenta & pocula (vt sic dicam) vulnera-
 „ ria, quæ communiter offeruntur, facultate calida sunt, &
 „ aperientia. Proinde & sanguinem commouēt, & hæmor-
 „ 35 rhagiam concitant, vulnusque ad inflammationem atque
 „ abscessus disponūt. In diuturnis tamē vlceribus, fistulosis,
 „ & cancerosis, illis audacter vtimur. Adhæc, cum sanguis
 „ in interaneis in grumos concreuit, & cum purulenta
 „ colluies in pectore collecta est. In glandulis quoque in-
 „ terioribus, strumis, ac herniis, seu (vt dicunt) crepaturis,

*Valentia
medicamē-
ta purgan-
tia in vul-
nerib. recē-
tibus susce-
pta esse.*

vt suis locis dicitur, quādoque purgationem cōcedimus.

Qui tamen Guidonē præcefferunt chirurgi, vt Rogerius,

& quatuor illi famati magistri, in omnibus indiscrimina-

tim vulneribus, isidē & in fracturis omnibus potiones of-

ferebant, cōfectas ex rubia, seu erythrodanio, quam vulgò

rubeā maiore vocant (ex qua plus quā ex cæteris assumūt)

tanaceto, seu athanasia, cânabe, brassica rubra, myrrhide

(quæ species est geranii, vulgo herba Roberti nuncupata)

geranio albero, qui nostris herbariis pes colūbinus appel-

latur, symphyto, quam aperta significatione (licet nō satis re-

concinnē posteriores Latini consolidā vocant: plātagine,

cynoglossō, hoc est, lingua canis, pimpinella, elatine, quæ

pilosella vulgò nominatur, caryophyllata, & cōsimilibus.

Ex quibus quidē succum exprimebāt: vel ea in aqua vino,

& melle decoquebāt. Et vnoquoq; die, ex succo aut deco-

cto ipsorū, quantitatē fescuncię, id est, vncię vnius & semis

mane ieiunis offerebāt. Super vulnus verò mane etiam, &

vesperē foliū brassicę rubentis inuersum apponebāt, & fa-

cta decēti ligatura mane rursum, & vesperē ipsum cōmu-

tando, ita relinquebant. Afferunt autē eiusmodi Empirici 20

vnū: quod ego planē ridiculū iudico. Nēpe quod si portio

assumpta, vomitione reiiciatur sinistrū quid portendi. Si

verò eā ventriculus cōtinuerit, & talis per plagā egredia-

tur, qualis per os assumpta est, faustū, ac bonū quoddam

omen portendi. Sed hæc si diis placet, vera sunt. Cæterum 25

in maiore adhuc errore versantur, Theodoricus, & Héri-

cus, qui recēter vulneratis, præsertim in capite, & pectore,

fortissima quædā & calidissima pigmenta (ita enim vocāt

potiones quasdam ex melle, vino, & puluere res multas ve-

heméter calidas recipiente, cōpositas) cum quibusdā exor-

cismis, seu adiurationibus propinabant: aut ex iisdē rebus

veluti puliculam cōficiebant, quam in modum emplastri

super linteolum extensam, vulncri apponebant.

De ratione victus in vulneribus, & continui solutione, ob-

seruanda, à medico præscribenda.

Victus te-

nuus.

Vulneratis primis septem diebus (intra quos vt pluri-
mum securi esse solent à febre & inflammatione) vi-
ctum tenuem, & parcum, frigidum quoque, & humidum
præsertim si iuuenes, & plethorici fuerint, atque ambiens
calidus instituito.

Vinum

Vinum omnibus, dum febris, dum inflammatio est, in- *Vinum.*
terdico.

A carnibus duris, & valentibus, piscibus magnis, & *Carnes.*
prauum succum generantibus, pane non fermentato (quē
5 azymum vocant) male subactō, & improbē coctō, eos
arceo.

Casēum, præsertim salsum, & veterem, fructus fere om- *Casēus.*
nes, allia, cepas, sinapi, salita omnia, & acria, nec nō species *Fructus*
omnes aromaticas, ne gustent, admoneto. *&c.*

10 Perdices autem, pullos, atque auiculas, quæ in dumeris *Auicula.*
versari solent, aqua rosarum alteratas, ptissanam hordea- *Ptissana*
ceam, quam vulgò hordeatum, & hordeum mūdātum ap- *hordeacea.*
pellant: item lac amygdalinum & quod auenatum vocāt:
iura quoque, carniū simplicia, aut cum ouis præparata,
15 illis in cibum permittito.

Ex oleribus, lactucā, portulacam, boraginem, (quæ bu- *Olera.*
glossum est hortulanū) præterea olus, quod Arabes aspa-
nar, nos verò nomine parum mutato, spinatiū, & spinar-
gium dicimus, & alia id genus, illis concedito.

20 Aqua cocta illis potus esto: sed in qua cibarius panis, *Aqua pro*
qui Græcis syncomistos appellatur, vel plurimum fursu- *potu.*
ris habens, sordidus dictus, maceratus fuerit. Vel eius aque
simplicis loco, cremor ptissanæ, aqua hordei, vel (si debi-
les, aut senes fuerint) vinum aliquod stypticum, id est, au-
25 sterum, quod crassæ sit substantiæ, plurimā aquā dilutum:
aut si tenue concedatur, illud sit oligophoron, id est, pa-
rum aquæ sustinens.

Breuem ac frugalem illis cœnam imperato.

Cœna.

Leuem frictionem, sed his partibus, quæ longius absunt *Frictio.*
30 à vulnere adhibeto.

Vt quiescāt, iubeo. Optimum enim illis (inquit Cel- *Quies.*
sus) medicamentum quies est. Moueri autem, & ambulare *Motus.*
alienum est, sed iis præsertim, qui in inferioribus partibus
vulnerati sunt.

35 Vt venerem summopere deuitent, submoneto.

Venus.

Itē irā, contentionē, & omnes vehemētes animi motus.

Affectus

Cæterum vbi vulneratus à phlegmone, & abscessu fue- *animi.*
rit affertus, pleniore victu tutò uti potest, & ad pristinā cō-
suetudinē paulatim redire. Vtatur igitur tunc vino aliquo *Victus pa*
generoso, & carnibus probū sanguinem generantibus, & *plenus*

*quādo vul-
nerati con-
cedendus.* naturam, hoc est vires refocillantibus. Cuiusmodi sunt
carnes gallinarum, caponum, & veruccum, seu castrato-
rum arietum, & quæ eius generis sunt. Quod autem talis
victus ratio utilis sit, & accommoda vulneratis, ex eo com-
probatur, quoniam virtutem fulcit, & corroborat, neque
febrem commouet. Sed nec phlegmonas, nec hæmorrha-
giam concitat, ac præter hæc, alimonium utile & conue-
niens sumministrat. Proinde hanc summo perè commen-
dant, in recens acceptis vulneribus, tum celebres medici: vt
Galenus, Haly, Razes, Auicennas tum etiam recentiores
chirurgi, Brunus inquam, Gulielmus a Saliceto, & Lan-
francus, à quorum sententia, & opinione detinuerunt,

*Vulnerati
à vino per
initia ab-
stineant.* Theodoricus, & Henricus, qui ab initio diætā vinosā,
& calidissimā vulneratis præter rationem imperabant.
Aiebant enim vulneratorum imbecillā virtutem protin-
nus firmandā, ac roborandā esse, idque vini potione

*Vires in
morbis non
esse augen-
das, sed dū-
taxat fouē-
das, & ser-
uandas.* commodè præstari. Quorum nimirum sententiæ in totum
aduersatur Galenus libro primo Aphorismorum com-
mentario quarto, sic inquit, In ægorantibus raro acci-
dit, vt robur corporis maius reddere, quàm acceperimus,
studeamus. Magna verò ex parte properamus in longis
quidem morbis fouere vires, in acutis verò parum debili-
tatas conseruare. Et subdit: Nam si eas tales, quales accepi-

Therap. 7. mus, properemus in istis seruare vel etiam augere, semper
addemus ad morbum. Quibus verbis aperte docet Galenus
non semper vires in ægris augendas esse, aut roborandas,
sed satis esse interdum: si eas conseruemus, & fulciamus.
Nisi forsā adeo imbecillæ ac prostratæ fuerint, vt quæ ab
illis sumitur indicatio, cæteris aliis indicationibus sit præ-
ferenda. Quod sanè in omnibus vulneribus non cōtingit.

*Galen. 8.
verb.* Adde quod vbi contrariæ, & ex aduerso pugnantes inter
se sunt indicationes, committendum non est, vt dum alte-
ri nimis sis intus, alterius omnino obliuiscaris: sed
vtriusque memor, quoad licebit, miscere eas oportet, vt li-
bro septimo meth. med. Galenus nos edocuit. Quod præ-
ceptum (inquit) vbiq; memoria teneri velim. Vnde & cir-
ca finem octauæ prædictæ methodi sic inquit: Ergo tum exer-
citatum in omnibus, tum natura prudentem esse medi-
cum conueniet, quo cuiuscunque indicationis potestate
diligenter cōsiderata, omnibus inter se collatis, vnā ido-

nei victus summam, quæ laboranti sit commoda compa- *Vini vsus*
ret. Itaque, vt semel dicam, vulneratis per initia, vsque ad *interdicen-*
diem septimum (intra quod tempus ferè solet phlegmone *duo vulne-*
in locis vulnere affectis excitari) *rati vsque*
5 Nisi tamen ex largo sanguinis profluuiio, viribus destituti *ad diem se-*
intermorientes appareant. Tunc enim ante vllam cura- *ptimum.*
tionem (vt Celsus ait) vino reficiendi sunt, quod alioqui
inimicissimum vulnere est. Transacto verò die septimo, il-
lis (si nihil aliud prohibeat) innocuè vinum modicum, &
10 aqua multa dilutum exhiberi potest. Nam si adhuc vsque
diem nec phlegmone tentetur, nec dolore afficiatur, in
posterum tutus erit. Atque hæc de quarta intentione, quæ
læsæ particulæ substantiam conseruandam esse indicabat,
dicta sufficiant.

15 *De quinta intentione, quæ medico chirurgico proponitur, in
curandis vulneribus, quæ est symptomatum correctio.*

Quintam intentionem, quæ est accidentium superue- *Symptoma*
nientium correctio, & profligatio, assequimur, reme- *tum corre-*
dia cuique propria, prout res desiderat ad mouendo. Sym- *ctio.*
20 ptomata autem seu accidentia, quæ consueuerunt euenire
post accepta vulnera, & solutam vnionē, hæc ferè sunt: Do- *Symptoma*
lor, phlegmone, discrasia seu intemperies, febris, pruritus, *ta, quæ vul-*
cōuulsio, paralysis, syncope, mentis alienatio seu delirium, *neratis ac-*
durities, atque impotentia membri vulnerati. Itaque vul- *cidunt.*
25 nera nunquam ad integram curationem perducī possunt,
nisi eiusmodi symptomata prius abigantur. Symptomata *Symptoma*
enim quæ magnitudine superant suas causas, ordinem cu- *ta interdū*
rationis sæpè peruertunt, immutant, atque interpellant: vt *curationē*
libro primo ad Glauconem: & duodecimo methodi me- *peruertit.*
30 dendi Galenus annotauit. Itaque operæ pretium duxi-
mus, de horum singulis ordine, & continuata serie pertra-
ctare, à dolore sumentes initium.

De sedando dolore in vulneribus.

Dolor omnis præsertim vehemens: etiam si purum ab *Dolor phle-*
35 excrementis totum corpus fuerit, fluxionis causa est. *gmonas &*
Particula namque quæ dolore affligitur succum, atque *fluxiones e-*
in vulnere sanguinem maximè ad se trahit, copiosio- *cit.*
rem, scilicet quàm sit illi ex vsu: vnde & phlegmone
in ea frequenter excitatur. Proinde summa cura proti-
nus adhibenda est, vt dolor demulceatur, ac in totum,

Dolorē se- si fieri potest, sedetur. Dolorem autem commodè se-
dantia in damus in vulneribus, aut saltem mitigamus facto ad par-
vulnerib⁹ ticularam læsam foru, vel ex rosaceo, si præsto autuerit,
 vel si eius copia non sit sex oleo communi, quod modicè incaluerit. Quibus si oui candidum, vel potius luteum (vbi magna non fuerit inflammatio, seu vehemens caliditas) adiiciatur, præstantius adhuc auxilium efficies, neque ita vulnus inquinabis. Quòd si tam vehemens dolor extiterit, vt necessitate coactus fueris, aliquantulum vulneratam, ac dolentem particulam stupefacere, oleum papauerinum admoueabis. Et si maior cogat necessitas, opij momentum, vel mandragoræ (vt quidam rectè consuluerunt) adicies. Quatuor illi celebres magistri ad eum finem laudant radicem solani tritam, & axungia porci exceptam. Theodoricus plurimum cōmendabat emplastrū ex foliis maluz coctis, & in mortario contritis, cumque fursuris cribratura commixtis. Quòd si rosacei momentum prædictis adieceris, melius adhuc medicamentum reddideris. Medulla etiam panis triticei in aqua feruente macerata, ad sedandos dolores (vt suprà diximus) efficacissima est. Porro si dolor admodum vehemens est, nec vllis, quantumuis generosis, auxiliis mitigetur, neruum tunc læsum esse significatur. Proinde tunc ad ea quæ postea ad vulnera neruorum scribuntur, tibi recurrendum erit. Sed de iis, quæ dolorem leniunt, iterum ac multo fufius libro sexto agemus.

Curatio aduersus vulnerum inflammationes, & abscessus.

Inflam- Inflammatio in vulneribus tum maximè timenda est,
atio quæ ma- cum vel os, vel neruus, vel cartilago, vel musculus, læsionem accepit, aut vbi parum sanguinis pro modo vulneris fluxit. Ergo quoties quid tale erit, sanguinem maturè suppressere non oportebit sed pati fluere, dum tutum erit aded, vt si parum fluxisse videbitur, mitti quoque ex brachio debeat: vtique (inquit Celsus) si corpus iuuenile, & robustum, & exercitatum est, multòque magis, si id vulnus ebrietas præcessit. Quòd si musculus læsus videbitur, præcidendus erit. Nam percussus punctusve, præsertim in eius capite, mortiferus est: præcisus verò per transversum, sanitatem recipit, hoc est, ab inflammatione, & conuulsione vindicatur. Aliquis tamen ex particulæ motibus vitiabitur.

Empla-
strum.

Theodor.

Rosaceum.

Medulla

panis.

Inflam-
atio quæ ma-
ximè vul-
neribus ac-
cidat.

Lib. 5.

3. meth.

vitabitur. Verum melior est (vt Galenus ait) læsio, quam *Melior est*
 mors. Sic & neruum punctum sæpe cogimur transuersum *læsio quam*
 præcidere, quoties scilicet, vel conuulsiones, vel deliria, vel *mors.*
 ambo magna ægréque sanabilia superuenire vulnerationi
 5 cernimus. Porro si iam inflammatio, aut tumor aliquis
 præter naturam, in vulneribus concitatus fuerit, cu-
 rari debbit iuxta methodum superiore libro à nobis tra-
 ditam, in quo de tumoribus præter naturam abundè dis-
 seruimus. Cæterum tamen si pro locorum differentia (vt
 10 libro primo de locis affectis Galenus ait) curationem quo-
 que variari contingat, Auicennas tamen omnibus indi-
 scriminatim partibus à capite ad pedes, emplastrum mirè
 ab eo commendatum admouet, quod constat malo Puni-
 15 nico dulci, incocto in vino styptico, & postea in morta-
 rio subacto, atque in emplastri formam redacto. Cæterum
 si enatus tumor nec reprimentibus, nec per halitum dige-
 rentibus medicamentis cesserit, pus mouentia seu matu-
 rantia, admouenda erunt. Cuiusmodi ea sunt, quæ ad ma-
 turanda apostemata supra retulimus. Huius rei gratia iu-
 20 bet Rogerius fieri forum ex maluis, absinthio, arthemisia,
 & farina triticea, vino incoctis, quibus & mellis momen-
 tum adiiciendum est, axungia verò quod satis esse videbi-
 tur. Quod si pus per vulnus non vacuetur, aliud loco com-
 modiore illi moliendum erit emissarium.

Emplastrum
Auicenna,
ex malo
Punico dul-
ci.

25 *De tollenda in vulneribus intemperie, quam*
discrasiam vocant.

SI flammea quædam citra humorum affluxum disposi-
 tio, quam discrasiā calidam vocant, vulnus occupa-
 uerit (quod ex rubore & veficatione facile deprehendes) *Si calida*
 30 affectum locum infrigidare oportet, non hyoscyamo qui- *ad sit intem-*
 dem, aut mandragora, quoniam plus iusto refrigerant, *peries.*
 sed rosas potius, & plantagine, atque vnguento albo, quæ
 præter id quod desiccant, moderatè etiam refrigerant. *Si frigida*

Si autem frigida intemperies locum obsederit (quam *intemperies*
 35 mollicies, & cutis liuidus color ostendunt) ipsum excalfac- *vulnus ob-*
 cies, non resina, vel pice, aut asphalto, quod dæmonis ster- *sederit.*
 cus appellant, sed vino, & vnguento nigro, aut fusco, vel *Horæ vng.*
 eo, quod basilicon vocant. Quod si cuiusmodi sympto- *descrip. ex*
 mata vulnus, seu plagam degenerare faciant in vlcus, re- *li. 6. requæ-*
 currendum erit ad ea quæ de viceribus sequente libro *rèda sunt.*

*Si febris
vulnerato
acciderit.*

traduntur. Porro si humida vel sicca adfuerit intemperies, suo quoque contrario profliganda erit. Et ita de compositis intemperiebus ages, vt suo loco postea dicetur. Quod si febris vulneratum apprehendat, victu refrigerante, qualem in calidis præter naturam tumoribus descripsimus, laborans vti debet. Sed accersendus erit huius rei gratia peritus aliquis medicus, qui & congruam illi victus rationem præscribat, & reliqua ad febrem auxilia ex arte instruat, habita ratione ætatis, temperaturæ, regionis, temporis, consuetudinis, & id genus aliorum. Cæterum ne febris quidem ipsa terrere debet, si in magno vulnere, dum inflammatio est, permanet. Illa verò perniciosa est Celsio, quæ vel leui vulnere superuenit, vel vltra tempus inflammationis durat, vel delirium mouet, vel si neruorum rigor, aut distentio, quæ ex vulnere orta est, eam non finit.

L. 3.

De spasmō, id est, conuulsione vulnere accedente.

Spasmos Græcè, conuulsio Latinè est, vbi nervi, atque musculi præter voluntatem conuelluntur, in eamque dispositionem veniunt, quam etiam in motibus secundum arbitrium factis assumpserunt. Per hunc enim affectum, actio nequaquam ablata est, vt est in paralyfi, sed solum immutata, ac vitiata, vt abundè testatur Galenus libro quinto de symptomatum causis, ad hunc modum scribens, si Græca saltem Latina feceris: Conuulsio neruos, musculosque ad eundem cogit affectum, in quem ab animali facultate cum naturalem habitum seruari ent, ducebatur. Vt igitur voluntarius motus interim intentis versus principium, id est, cerebrum, musculis, interim ab irruente spiritu impletis perficitur, ita conuulsio quoque accidere solet. Nam & spiritus inflare potens, in ipsis generatur, & complures etiam affectus, qui illos intendere queant, quemadmodum phlegmone. Itaque spasmus siue conuulsio, motus est deprauatus, voluntariæ facultati motrici accedens, à solo morbo (vt ibidem ait Galenus) seu morbosa dispositione proueniens. Proinde & nervosa est ægritudo, qua mouentur lacerti, id est, musculi, ad suum principium, & extensioni sunt inobedientes: vt tertio canonum annotatur ab Auicenna. Neque enim ad syndesmos, id est, copulas, seu ligamenta, conuulsio, sicuti neque paralyfis, propriè refertur, sed (vt Galenus ait tertio de locis

*Spasmus
quomodo
fiat.*

Galeno.

*Spasmus
quid.*

*Conuulsio
sive morbi
est opus.*

*Fen. 2. ter-
tij, ca. pro-
prio.*

de locis affectis) eorum neruorum, qui volūtatis imperio. obediunt; affectio est. Auerrois spasmum definiuit, cum membra sic contracta & rigida facta sunt, vt neque flecti, neque extendi quouis modo possint. Porro omnes
 5 conuulsionis causæ, seu affectus omnes qui conuulsionem pariunt, Galenus, & Hippocrates in duo capita reuocarunt: nempe in plenitudinem, & inanitionem, corporum videlicet neruorum, à quibus secundum electionem
 10 motus perficiuntur. Itaque phlegmonæ, id est, inflammationes, plenitudinem pariunt: ardentissimæ, & aridissimæ febres, inanitionem. Sed neruosa corpora omnia (inquit Galenus) tendi posse, siue oppleta sint, siue inanita, declarant musica instrumenta. Etenim rumpuntur chordæ, siue in humidum, vaporibusque scatens siue in aridum
 15 squalensque cubiculum, intentis etiam dum chordis, instrumenta collocaueris. Proinde huius rei haud ignari artifices, eas priusquam reponantur, laxare solent. Sed quomodo affecto aëre tenduntur chordæ, vt rumpantur, si vel nimis aridus, vel admodum humidus sit? Nempe humor madefacit ipsas, vt in tumorem præter naturam attollantur, qui mox eas extendit. Ac veluti sol tergora arefaciens ipsa contrahit, ita siccitas chordas, & trahit, & extendit. Sic lora quoque cum ad ignem exiccantur, contrahi, tendique videntur. Tertium caput seu tertiam
 25 causam addit Auicennas, quæ tametsi materiæ haudquam, saltem per initium, proportionem respondeat; noxam tamen (inquit) contristantem cerebrum inducit. Proinde nerui, hanc ceu molestum quidpiam refugientes, contrahuntur, & ad suam recurrunt originem, adnuntanturque interturbantem causam ipsam expellere. Qui barbaram sectantur medicinam, spasmum non proportionatum ad materiam nominant: quia scilicet non accidat ob materiam, quæ implere, aut inanire partes neruosas possit, sed praua potius aliqua qualitate. Tribus igitur modis fit conuulsio, inanitione, repletionem seu plenitudine, &
 35 compatiendi societate, hoc est, cerebro lege commercij patiente, & alteratis per continuationem partibus, vt contingit in conuulsione, quæ fit ab ictu feræ cuiusdam venenatæ. Primus modus, qui scilicet fit propter euacuationem seu inanitionem, accidit in superfluis purgationibus, & in copiosis, atque immoderatis sanguinis profusionibus: quæ

*Libro 5. de
symp. caus.
& 3. de loci
affect.*

*Due in vniuersum
conuulsionis
cause, Galen.
& Hippo.*

*Tertio de
loc. affect.*

*Tertia causa
conuulsionis,
addita
ab Auic.*

*Conuulsio tri-
bus modis
accidit.*

Apho. 3.
Lib. 5.

conuulsionis modum (si quidem accepto vulnere acciderit) malum ac periculosum esse testatur Hippocrates, hoc Aphorismo: Vbi sanguis plurimus fluxerit, singultus, aut conuulsio superueniens, malum. Crebrò enim mortem adferunt. In magnis quoque, ac vehementissimis ardoribus, & adurentibus (vt dictum est) febribus, ac colliquante putrilagine, hic conuulsionis modus euenire consuevit, malum sanè maximum, & penè insanabile, vt Galenus annotauit in commentario illius aphorismi Hippocratis, Febrem conuulsioni superuenire, melius est, quam febri conuulsionem. Secundus conuulsionis modus fit propter inflammationem, & alios tumores præter naturam (quos omnes *ἀδύνατα* vocat Hippocrates) in vulneribus derepentè disparentes seu euanescentes, vt in fine quinti Aphorismorum hac sententia testatus est idem Hippocrates: Quibus tumores in vulneribus apparent, non conuelluntur maximè, (id est, non admodum, seu non valde spasmo corripuntur) neque insaniunt. Verùm his deletis, atque euanescentibus, derepentè quibusdam à tergo, siue retrò, conuulsiones & distensiones fiunt: quoties scilicet (vt in commentario ait Galenus) vulnera ponè, id est, à tergo infestant. Immoderata quoque frigiditas nervosis partibus adueniens, hoc conuulsionis genus inuehit, nervos enim in vnum cogit, stipat, colibet, atque implet. Quod & hoc aphorismo expressit Hippocrates. Frigidù, conuulsiones, distensiones, liuores, rigores febriles [inducit, supple, vel adfert.] Sicuti enim nequaquam conuenit, nervos ipsos, seu ipsorum neruorum substantiam, ab immodico calore dissolui, sic neque plus iusto, & ultra modum conuenientem, refrigerari, substringi, & in vnum cogi, ac stipari. Tertius conuulsionis modus dolore excitatur, cuius còmunis causa est, autore Platone in Timæo, pathos præter naturam, violentè, & affatim incidens.

2
Secundus cō-
uulsiōis mo-
dus ex re-
pletionē.

Frigus con-
uulsiōis cau-
sa.

Apho. 17.
Lib. 5.

3
Tertius cō-
uulsiōis mo-
dus ex com-
patiendi so-
cietate.
Doloris
causa.

Ab his enim (inquit Hippocrates Platone vetustior) quæ naturam mutant, ac corrumpunt, dolores excitantur. Hac quidem vocula (corrumpunt) & celeritatem, & vehementiam transmutationis indicans. Porrò vehementes eueniunt in tactu, (qui inter reliquos sensus dolore maximè afficitur) à naturali habitu transmutationes, ob violentum calidi, frigidique occursum, atque ob eas res, quæ

- quæ contundere, secare, pungere, extendere, aut erodere possunt. Quippe res huiusmodi dolorum causæ reputantur. Nervosarum igitur partium punctura, acres quoque, & mordaces humores, aut venenosa aliqua qualitate prædicti, in vulneribus modum hunc tertium conuulsionis, substantiam diuellendo excitant. Quod de punctura diximus, testatur Galenus libro artis medicinalis cap. nonagesimosecundo, sic inquit : Nerui verò & chordæ punctura, propter sensus vehementiam, & quoniam hæc pars
- 10 principio, hoc est, cerebro continuatur, prompta est ad nervorum conuulsionem excitandam. Ac tum præsertim, cum nihil extrorsum expirat, obcæcato cutis vulnere. Hætenus Galenus. Acres autem, æruginosos, & venenosos succos per consensum, & velut quadam partium conspi-
- 15 ratione cōuulsionem inducere, ostendit Galenus in commentario huius aphorismi Hipocratis, Conuulsio ex elleboro lethalis est. Verum conuulsionem istam, quæ accidit iis, qui ab elleboro albo (hunc enim simpliciter elleborum nominare consuevit Hippocrates) purgati sunt,
- 20 non absurdè ad secundum genus conuulsionis (quod fit ex inanitione) quispiam adduxerit. Quandoquidem humores ipsi acres, & mordaces, vim habent exiccandi, atque inaniendi. Contingit autem & propter ipsam euacuationem, citra mordentes succos, iis, qui supra modum per-
- 25 purgantur, conuulsionem aduenire. Fit enim ob pharmaci, seu purgantis medicamenti functionem, vim, atque efficaciam, vt ex nervis humiditates attrahantur, & ita refficcata violentius ipsorum nervorum substantia, conuulsio enascatur. Sed & per vomitiones, quas veratrum epo-
- 30 tum concitat, accidit, morsus ratione, conuulsiones fieri, ex consensu videlicet, communicatūque, & velut quadam partium conspiratione : nempe perpessis, ac dissentis nervis, qui ventriculi hostiolo, seu orificio consentiunt. Sic quoque in vulneribus consortij lege contingit subindè
- 35 conuulsionem fieri, excitato in nervosis corporibus (à quibus motus secundum electionem perficitur) dolore.

Causa conuulsionis ex consensu cerebri facta.

Conuulsio ex elleboro apho. I. li. 5.

Purgas medicamentum interdū cōuulsionē inducit.

Sunt autem nervosæ partes, motui voluntariò, ac secundum electionem & desiderium factò, seruientes, nervi, ligamenta, muscoli, & tendones. Hæ igitur, & pontissimum nervi, ubi ingenti aliquo dolore afficiuntur, cere-

Partes motui voluntario famulantes.

brum

*Conuulsio
duplex.
Vniuersa-
lis.*

brum ipsum (quod est neruorum omnium communis origo, vt in arbore caudex, ramorum) huius noxæ confors statim efficitur, sitque (vt dixi) propter compatiendi societatem conuulsio, quam non debemus existimare fuisse ab Hippocrate prætermisam. Etenim conuulsionem quæ infestet primaria ratione explicuit, dum fieri conuulsionem vacuatione seu inanitione, repletionéque sanxit. Cæterum ex præfatis conuulsionibus, quædam sunt vniuersales, quædam verò particulares. Vniuersalis conuulsio dicitur, quando noxa cerebro communicatur, & ad ipsum peruenit. Vbi autem noxam illam senserit, tanquam molestum aliquid, vehementi conatu eam nititur expellere.

Particularis.

Vniuersales conuulsiones.

Morbus comitialis.

In quo quidem conatu neruos ipsos, & alia neruosa corpora contrahit, & conuellit. Particularis verò conuulsio fit, quando noxa non peruenit ad cerebrum, sed in particula affecta remanet, ipsam contrahens, atque incuruans. Ideò autem conuulsiones vniuersales dicuntur, quia maiorem partem membrorum occupant. Quod quidem dictum est ad differentiam epilepsiæ, quam comitalem morbum vocamus. Hæc enim partes omnes apprehendit, atque ideò conuulsio totius corporis, seu omnium corporis partium meritò dicitur, non iugis tamen ac perpetua (vt in emprosthotono, & opisthotono, atque tetano, id est, neruorum rigore videre est) sed quæ ex temporum accidit interuallis, hoc est, quæ interpollata est, atque intermissa, cum mentis ac sensuum oblatione, in quo & à iam dictis conuulsionum generibus discriminatur. Accidit nanque, vt is qui comitali morbo conciderit, neque videat, neque audiat, neque vllò sensu quicquam percipiat, ac ne consequi quidem possit, quid factum sit. Siquidem cum memoriæ viribus ratio quoque læditur, vt libro tertio de locis affectis Galenus annotauit. Hæc autem in spasmo de quo nunc agitur, minimè solent accidere. Cæterum accuratiùs atque exquisitiùs conuulsionis differentias, causas, & generationis ipsius rationem ac modum perquirere, alterius est speculationis. Proindè ad præsens ea consultè omitemus. Satis enim chirurgo nunc fuerit, si quæ de conuulsione diximus, probè intellexerit, si & tum communia, tum particularia differentiarum ipsius signa cognouerit, ac periculoso huic symptomati (ne ac-

*Quo differat
spasmo
ab epilepsia.*

cepto

cepto vulnere aliquando eueniat) prospicere atque occurrere possit, & iam præsens remediis topicis, accommodis, & ex arte institutis profligare.

De signis Spasmi.

5

Comunes conuulsionis notæ sunt, ægra seu difficilis membrorum dimotio, colli tensio, labiorum contractio, ac si vellet ridere, maxillarum, dentium, & gutturis adstrictio siue strictura, oculorum, & totius faciei (vt

*Communes
notæ cōuul-
sionis.*

10

dicunt) tortura seu peruersio. Si conuulsio ex inanitione apprehenderit, non repente, sed paulatim, ac post morbos corpus extenuantes, omnemque eius humiditatem absumentes, accidere solet. Vt exempli gratiâ, post largos sudores, aut vomitiones immoderatas, aut alui deiectiones

*S I G N A
cōuulsionis
ex inani-
tione.*

15

copiosas aut immodicas sanguinis profusiones. Item post famem, vigilias, sollicitudines, motus tum multos, tum vehementes, aridas æstuantésque febres. Cum enim hæc & alia (si quæ sunt) id genus conuulsio subsequitur, causam eius esse ariditatem ex inanitione rectè putaueris, vt Ga-

*NOTÆ
cōuulsionis
ex repletio-
ne.*

20

lenus annotauit libro tertio de locorum affectorum notitia. Si verò ex sanis alicui repentina superuenit conuulsio, ob repletionem eam fieri necesse est: & maximè quidem, si id vitij euenire sic repente conspexeris, temulento cuipiâ, ac omnino pleno homini, qui videlicet in otio degit. Item

25

si post tumores aliquos præter naturam subito deletos, atque (vt paulò antè dictum est) euanescentes, vel post frigiditates condensantes, atque in vnum nervos cogentes, sanum aliquem sic repente cōuelli contigerit, equidem nervi replentur à frigidis, & glutinosis humoribus, ex quibus

30

etiam nutriuntur, vnde conuulsionem patiuntur. Itaque his præcognitis, ac diligenter perpenſis, haud difficile inuentu fuerit, vtrum ab ariditate, quæ est humidæ essentiae defectus, & vacuatione, seu inanitione, an ab humoris plenitudine, quæ egestati, seu inopiæ, & inanitioni aduersatur, & ab Hippocrate repletio nominata est, affectus ipse

35

prodierit. Spasnum autem, qui propter cōpatiendi societatem, hoc est cerebro consortij lege, seu (vt dicitur) per consensum affecto, enascitur in vulneribus, iis notis deprehendens. A causis externis excitatur, cū dolore, morſu, & molestia affligit, ac crudeliter laborantem excruciat.

*Spasmi ex
consensu ce-
rebrī notæ.*

Spasmi

Spasmi iudicia, seu presagia.

- Presagia.** ¹ **S**I conuulsionis noxa, membris spiritalibus, ac respirationi subseruientibus comunicetur, tum scire licet ægri salutem esse deploratam, ac subitam mortem futuram.
- Conuulsio ex consummata siccitate.** ² Spasmus absolutus, seu (vt dicunt) confirmatus, præsertim si ex inanitione est, & neruorū siccitate, prorsus incurabilis est. Absoluta enim siccitas, & prorsus consummata, insanabilis est Galeno libro methodi medendi septimo.
- ³ Quod si ex siccitate non prorsus adhuc consummata, conuulsio enascatur, interdum (sed vix, ac non facile) curationem admittit. Longum enim tempus (vt in commentario sequentis aphorismi Galenus ait) exigitur ad siccitatē remouendā. Atqui morbi acuties ac vehemētia tēpus nō expectat, quin citò vires dissoluit, & subito exitium adfert.
- Conuulsio ex siccitate nō prorsus absoluta.** Quæ verò ex repletionē fit conuulsio, sanabilis est, per euacuationem. Repletioni enim contraria est euacuatio.
- Conuulsio ex repletione.** ⁴ Quod & sequenti aphorismo innuebat Hippocrates, Febrem conuulsioni superuenire melius est, quàm febri conuulsionem. Febris enim conuulsioni ex repletionē superueniens, humores frigidos, & glutinosos, ex quibus orta est ipsa conuulsio, solita est magna ex parte excalfacere, attenuare, atque dissoluere.
- Conuulsio ex febribus adurentibus.** ⁵ Si verò ex febribus adurentibus totum corpus exicetur, & neruis deindē ex siccitate conuulsio accadat, hoc maximum (inquit Galenus) est malum, & penē insanabile.

Curanda conuulsionis methodus.

- Observanda in omni conuulsione curanda.** **P**ostquàm de differentiis, causis, signis, & iudiciis conuulsionis, abundē satis tractatum est, par est, deinceps eius curationem exequamur. Est igitur illud primum ac commune præceptum in omni conuulsione obseruandum. Partes quæ contrahuntur, conuellunturve, valenter continendę sunt, & inordinatis resistendum motibus. Oleo in hūc vsum eas perfricare oportet ex liliis cōfecto, vel si eius copia nō sit, oleo cōmuni, tū aquā mulsam assumere. Eos verò qui ex inanitionē citra febrē cōuelluntur, hoc pacto curabis. Oleo, aut certē hydrelæo calido, partes cōuulsas primū foueto. Deindē, si nihil prohibet, etiam ad laucrum deducito, temperatōque solio vtor, cum oleo, & frictione lenissima. lūuat quoque in calidum oleum totum descendere, vel in aquam calidam dulcem, in qua hume
- Curatio conuulsionis ex inanitione.**
- Potus.**
- Balnea ex oleo, & hydrelæo.**

humectantia quædam, & lenientia decocta sint. Vt sunt *Humectantia & lenientia.*
capita, & extremitates agnorum, hædorum, vitulorum, & arietum pinguium: item maluarum, ac violarum folia, altheæ radices, semen cydoniorum, & id genus alia adiecta.

5 olei parte tertia. Sunt qui ad eundem usum iubent laborantes sæpius in labrum lacte caprillo, aut bubulo plenum descendere: atque vbi caldarium seu lauacrū egressi fuerint, oleis humectantibus, vt oleo violaceo, & amygdalarū dulcium, si ea non adsint, oleo communi optimo, si ne id quidem est, adipe non vetustissima, gallinæ præsertim, hædi
10 aut vituli, ceruicem, & scapulas, & spinam iuncturas quoque, & musculorum capita, perfricāt. Quidam autem infra scripto linimento totam spinam, iuncturasque omnes magnā vtilitate illinire cōsueuerunt. Recipe olei violarum

Linimentū.

15 vncias quatuor, olei amygd. dulcium, pinguedinis gallinæ, medullæ crurium vituli, ana drach. sex, pinguedinis vituli, & hædi ana drachmas decē. Bulliant omnia simul in decoctione maluarum, radicū altheæ & seminis cydoniorum, vsque ad consumptionem ipsius decoctionis deinde

20 colentur, & fiat linimentum. Porro frictio cū omnibus in homine vertebis utilis sit, tum iis præcipuè quæ in collo sunt, cū manus, & brachia, conuulsio maximè inuadit. Quod si febris adsit, non humectantia modò, sed refri-

Si febr. adsit spasmo.

25 & oleo, decoquenda erunt. Cuiusmodi sunt folia salicis, hordeum contractum, violæ, nymphæa (quod nenuphar appellant) aut eius farinæ quopiam aliquo. Ergo die nocteq; (est enim grauis, admodum importunus, acutusque morbus conuulsio) interpositis tamen quibusdam breuibus interuallis, iis remediis, hoc est, fotibus, balneis, & vntionibus, vtendum est. Dum ea intermittuntur, imponendum malagma, aut cataplasma aliquod est, ex eiusmodi humectantibus, & lenientibus, itidem (si res exoptuler) & refrigerantibus, contra quàm in conuulsione, quæ ex plenitudine ortum habet. Hæc enim, vacuantia, ac digerentia, calefaciētia quoque, & (cum ex humore procreata sit)

35 siccantia desiderat, vt mox dicemus. Cæterum qui ex siccitate (quæ inanitionis est comes) conuelluntur, nutriendi sunt sorbitionibus ex chondro, & alica: si hæc non adsint, ex lacte, aut hordeato, aut à pullis mollibus, vel agni-

Alimenta in cōuulsione ex siccitate facta idonea.

*Somnus cō
siliandus.*

*Ex 7. me-
thodi med.*

culis, vel hædis tenerioribus, iure aliquo assumptis: itemq;
ouis sorbilibus. Vinum quoque tenue, & aquosum, quod
facile per omnia corporis membra distribuitur, illis exhi-
beamus, aut saltem cum suis iusculis, ut ea promptius per-
meent, remiscebimus, nisi tamen febris accesserit. Tunc
enim prisanæ cremor magis offerendus est, somnusque ac-
cersendus. Hic enim præterquam quod vires omnes repa-
rat, plurimè etiam humectat. Vigiliæ verò cū ex his sint,
quæ maximè euacuant, & exiccant, convulsionem ex sicc-
tate accersunt, & augment. Indendi etiam sunt clysteres
ex lacte, & ex eodem conficienda gargarismata. Itaque (ut
semel finiam) in hoc convulsionis genere, curandi metho-
dus, vnicum habet scopum, nempe humectationem. Quem
certè (ob superius adductam rationem) non facile est asse-
qui. Aegrius nāq; curantur, quæ in humido siccæq; habent
alterationes, quam quæ ex calido & frigido cōsistunt.
Hæ enim maximè actiuis qualitatibus corriguntur. Illarū
verò curatio imbecillis, & (ut sic dicam) magis materiali-
bus, & passivis qualitatibus, perficitur, potissimumq; cum
humectandum esse requiritur, ut libro septimo suæ metho-
di Galenus nos edocuit. Si tamē vlla spes curationis est,
in suprā memoratis remediis consistit. Itaque tametsi ma-
lum hoc ferè sit immedicabile, cū tamen sæpe etiam præ-
ter expectationem quædam eveniant, curatio venit aggre-
dienda.

Curatio convulsionis ex plenitudine.

*Vacuatio à
toto corpo-
re.*

*Sanguis in
quibus mit-
ti debeat.*

*Quæ imit-
tendo san-
guine obser-
vanda.*

Am verò spasmus ex humiditate, & plenitudine cura-
bis per euacuantia. Vacuare autem oportet, & à toto cor-
pore, & ab ea parte quæ convellitur. Porro à toto corpo-
re plenitudinem vacuumus, duobus potissimum auxiliis,
nempe sanguinis missione, & purgatione. Sanguinē mit-
temus maximè, in quibus vel multus sanguis abundat, vel
phlegmone cōvulsionem excitavit, etiā si laborans prorsus
redundantiæ sanguinis sit expertus, modò nihil obstate-
rit eorum, quæ sanguinem mittendum dehortantur. Venæ
autem secundæ electio, ex laborante phlegmone, ac con-
vulsione, particula tibi indicabitur. Modū verò seu quan-
tatem vacationis inuenies, tum ex redundantiæ modo,
tum ex reliquis, quæ in sectione venæ spectanda & æsti-
manda sunt: Nempe ex ætate, natura, tempore anni, con-
suetud

suetudine, regione, cœli statu, & ante hæc, ipsa laborantis virtute. Cæterum sic, vt oportet, facta per sanguinis detractionem, totius corporis vacuatione, & humorum influentium auersione, mox phlegmones curationem aggredieris. Cuius (vt & omnium aliorum tumorum, qui præter naturam consistunt) si iam facta est, caput seu scopus præcipuus est, infestatis humoris vacuatio. Cum enim phlegmone duplici ratione (vt Gale. ait) à natura recedat, & quod pars ipsa multò sanguine sit referta, & quod eadem sit calidior, utique vacuationis indicatio, refrigerationis indicationem vincit. Quod si adhuc in generatione est, in hac prior vacuatione est, confluentis ad affectum locum sanguinis inhibitiō. Sed de hac alibi abundè dictum est. Vbi verò corpus vel flaua bile, vel atra, vel pituita, vel serosis humoribus, refertum fuerit (quem habitum Græci cacochymiam nominant) tum purgatione, quæ cuique superanti succo sit accommodata, vacuationem moliemur. Verum enimverò, quoniam conuulsio ex humiditate seu plenitudine, qua sani etiam repenti capiuntur, magna ex parte, à pituitosis humoribus crassis, glutinosisque in ipsa nervosarum partium substantia infarctis, procreari solet, eius potissimum, quæ ab hac causa ortum habet, curationem subiiciemus. Ergo quæ crudos crassos, & viscosos humores potenter euacuant medicamēta (inter quæ primas obtinent, hiera picra, & agaricum (hac conuulsione laborantibus exhibeto. Clysteribus acribus eorum aluum subducito. Pessis, & suffitibus, in mulieribus (si occasio detur) menses euocato. Gargarismatis, apophlegmatismis, & errhinis, seu sternutatoriis, acrioribus, pituitam per os, & nares educito. Abunde repurgato corpore, ceruicem, axillas, & inguina, oleo liliorum, costino, spicato, laurino, & ex pulegio, addito castorei, & euphorbij momento iniungito: & lanam mollem, ac succidam facto litu superimponito. Rogerius ad eiusmodi spasmodum, sequens vnguentum instituit, quod & Theodoricus approbavit.

Recipe olei muscellini vnc. vnam, petrolci semunciam, olei communis, & butyri ana vncias quatuor, ceræ vnciam vnam, styracis calamithæ, styracis rubræ, singulorum drachmas duas & semis, mastiches, olibani, gummi hederæ, ana vnciam semis: ex iis omnia quæ liquefcere

*Purgatio
quādo ad-
hibenda.*

*Curatio cō-
uulsionis à
crassis, &
viscosis hu-
moribus.*

*Vnguentum
Rogerij.*

possunt, igni admoveantur, alia verò trita, & in puluerem redacta, illis remisceantur: postremò addatur styrax, & fiat vnguentum, ex quo moderatè calefacto ceruix, & collum torū, ac vniuersa spina dorsi, inungatur. Sunt qui iubent eodem aut consimili vnguento totum corpus, inter duos ignes, aut in hypocausto, nudo homine constituto, vel si æstas est, in sole iniungi. Porro huic vnguento visus est alibi Theodoricus addidisse herbas, quæ ingrediuntur compositionem vnguenti, quod aragon nominatur, & alterius, quod Agrippæ tribuitur, quorum descriptio-
 nes extant apud antidotarium Nicolai: & præter hæc, addit oleum de castoreo, & pinguedinem ex limacibus rubris assumptam. Vocabatque tunc eiusmodi vnguentum, alabastrum, quod sanè neruorum contractionibus ap-
 primè est vtile, & accommodum. Conducunt etiam ma-
 gnoperè ad spasmum eiusmodi, oleum vulpinum, lauri-
 num, rutaceum, sicyonium chamæælinum, de iunipe-
 ro, de terebinthina. Item oleum benedictum, & oleum philosophorum. Ex iis itaque, & consimilibus frictio om-
 nibus in homine vertebrae utilissima est. Iuuat etiam
 nonnunquam totum hominem, in labrum illis calidis oleis plenum, descendere. Sed & hypocausta siue ther-
 mæ, & stufæ (vt vocant) siccæ, quæ ex suffitu rerum de-
 ficcantium fiunt, aliaque id genus: quæ sudores euocant,
 & superuacaneas corporis humiditates resoluunt, atque
 absument cerebroque, & neruis robur adferunt, circa
 finem, & corpore iam vt oportet, repurgato, mirum in
 modum conferre creduntur. Quod si & febris huic ex
 plenitudine conuulsioni superuenerit (modo hæc fue-
 rit ephemera) salubre admodum est: frigidus enim (vt
 supra diximus) & glutinosos humores, quibus nerui
 ipsi conuulsi replentur, calfacit, extenuat, atque dissol-
 uit: quod curationis eius spasmi caput est. Itaque si sua
 sponte febris in hoc genere conuulsionis non enascatur,
 eam ex industria quadam accersunt, & exuscitant: idque
 per exhibitionem confectionis anacardinæ, ad quantita-
 tem nucis auellanae. Alij ad eundem finem offerunt ca-
 storeum, & assam foetidam, vel oppopanacem, addita mel-
 lis portione dupla. Mitridatum quoque, & theriace, in
 hoc affectu mirè proficiunt. Neruos enim roborant, &
 crudos

*Olea spaf-
 mo ex ple-
 nitudine cō-
 ferentia.*

*Febris con-
 uulsioni ex
 plenitudi-
 ne superue-
 niens bonū.*

*Mitridatū
 Theriace.*

crudos succos concoquunt, absumuntque, eo scilicet nomine, quod excalfaciant. Cauendum verò præcipue frigus est: ideoque in eo conclauì, quo cubabit æger, ignis continuus esse debebit, maximeque tempore antelucano, quo præcipue frigus intenditur. Vinum per initia præsertim, gustandum non est: siquidem huius vsus tum præcipue periculosus est, eo potissimum nomine, quod fluxionem proritat. Vini loco aqua mulsæ exhibenda erit, in qua decocta sit saluia, & radix acori, cum momento nucis muscatæ. Victus tenuis, primis saltem diebus, conuulsis à plenitudine instituitur, idemque calfaciens, & exiccans. Hactenus de curatione conuulsionis ex plenitudine.

Frigus conuulsis inimicum. Vinum quãdo, & quare conuulsis interdiciendum.

Curatio conuulsionis ex compatiendi societate.

CAeterum conuulsio, quæ fit propter consensum, & velut quadam partium conspiratione seu compatiendi societate: si ex dolore excitata est, per anodyna, & dolorem sedantia curationem recipiet, vt in sequentibus dicetur, cum de vulneratis neruis agetur. Si verò ex morfu ictiue alicuius venenosi animantis, conuulsio oborta sit, theriaca parti affectæ superimponenda erit, & cucurbitularum vice vtuntur. His enim (quæ citra calefactionem, ex alto vehementius extrahunt) totam eius quod infestat, & dolorem creat, substantiam vacuabis. Sunt autem & qui ore suo virus extrahunt, ægræ videlicet particule (vt superius dictum est) admoti, ipsamque labiis complexi. Si autem accidat conuulsio, ob morsum oris ventriculi (quod propriè stomachus appellatur) ab acri aliquo mordaci, & erodente humore excitatum, vomitus statim concitandus est, post quem ventriculus roborandus erit, tum iis, quæ extrinsecus admouentur, tum iis quæ intro assumuntur, iuxta periti alicuius medici consilium. Porro in omni conuulsione à quacunque causa ortum habeat, cerebrum imprimis roborandum est. Caput igitur abrasis crinibus oleo liliorum fouendum erit. Iuuat & eodem oleo, ceruicem, totamque dorsalem spinam, axillas quoque, & inguina inungere. Hoc enim spasmo, præsertim humido, est dicatissimum. Hora paroxysmi

Curatio conuulsionis, ex compatiendi societate. Dolor. Morfus vel ictus venenatorum.

Morfus oris ventriculi conuulsionem excitat.

Cerebrum in omni conuulsione roborandum.

*Musculus aut neruus interdū per trāsuerſum præciden-
dus. Læſio quā mors potius optanda.*

bonum eſt, laborans contineat inter dentes baculum ſali-
cis, ne os exactè claudatur, & lingua à dentibus dilacere-
tur. Vltimum eſt, ſi nihil aliud fieri poſſit, neruum, aut
muſculum ex quo conuulſio orta eſt, tranſuerſum præci-
dere, vt Galenus & Razes conſuluerunt: præſtat nanque
vnius particulæ actionem amittere: quàm totius corporis.
Meliórque eſt (vt Galenus ait) læſio quam mors. Itaque
hoc pacto conuulſionem quidem ſanaueris: aliquem ta-
men ex particulæ motibus vitiaueris. Vt autem ei quod vr-
get, & vnde primum maximèque homini imminet peri-
culum, ſuccurramus, cogimur ſic nonnunquam alium in
ſanabilem affectum relinquere.

De paralyſi ex vulnere.

Paralyſis ex quibus vulneribus excitetur.

Paralyſis, id eſt, neruorum reſolutio, latus vnum aut
alterum, vel partem quampiam, non autem corpus to-
tum infeſtans: interdum etiam vulnera, & contuſiones in-
ſequitur: ſed capitis maximè, & totius ſpine dorſi vt multis
exemplis Galenus aperuit libro de locis affectis tertio. Por-
rò an paralyſis ipſa, quæ ex vulnere accidit, partes quæ è
regione vulneris ſunt, vel potius oppoſita infeſtet, ad præ-
ſens dicere omittemus. Eſt autem paralyſis neruorum re-
laxatio, ſeu molliſcatio, cum priuatione ſenſus & motus,
non quidem totius (vt dictum eſt) ſed vel lateris vnius dun-
taxat, vel priuatæ alicuius particulæ. Quo fit, vt affectus ſit
conuulſio: i contrarius: in hac enim durities adeſt cum mo-
tu deprauato, ac permutato: durities autem molliſcationi
ac relaxationi eſt contraria. Vnde Galenus libro tertio
interiorum affectorum locorum, ſic inquit, Quum omnes
pariter nerui, tum ſentiendi, tum mouendi vim amiſerint,
apoplexia huiuſmodi affectio nominatur. Vbi verò alteri
laterum, aut dextro aut ſiniſtro id accidit, paralyſis, id eſt,
reſolutio nominatur, eius ſcilicet partis, in qua conſiſtit af-
fectus, interdum dextræ, interdum ſiniſtræ. Quòd ſi in ali-
quo membrorum idem euenerit, eiſdem membri reſolu-
tio eſſe dicetur. Nam & tota manus, & totum crus inter-
dum reſoluitur, atque ſolus in crure pes, & quæ ſub genu
ſunt. Sic etiam de tota manu, ſimiliter proportionem dicen-
dum eſt. Haſtenus Galenus: ex cuius verbis colligere li-
cet, paralyſim aliam eſſe vniuerſalem, aliam verò particu-
larem. Vniuerſalis ea eſt, quæ alterum latus totum, aut
dextrum

dextrum, aut sinistrum occupat. Particularis verò, quæ priuatim alicui duntaxat particulæ accidit. Sic & de spasmo per analogiam dici potest: nempe quòd alius sit vniuersalis, alius verò particularis.

5

De causis, & signis paralyfis.

CAusæ paralyfis, atque eiusmodi ablationis sensus, & motus, geminæ sunt: nempe internæ, & externæ, seu extrinsecus aduenientes. Externæ causæ resolutionis
 10 neruorum sunt, cæius ab alto, percussio, incisio sectio, compressio, vel restrictio, frigiditas violenta, & vehemens vicinæ partis phlegmone, vel scirrhus, & id genus alia, quæ extrinsecus euenientia, vel continuum soluunt, separant-
 15 ve, vel spirituum vias occludunt, & facultatis animalis delationem impediunt. Internæ autem causæ sunt, humores crassi, & viscosi, neruos cæ: ebri, aut spinalis vocatæ medullæ (quæ ipsius cerebri vicaria est) obstruentes. Neruorum enim corporibus ita obstructis, & crassioribus reddit-
 20 is, animalis facultatis (quæ sensum, & motum præstat) in membra delatio impeditur. Cæterùm anxie disquirere, quo pacto per neruorum resolutionem, seu paralyfin, interdum sensus duntaxat, interdum motus, nonnunquam ambo simul pereant, & alia multa ad rem propositam at-
 25 tinentia, nequaquam præsentis sunt speculationis. Satis enim fuerit chirurgus, si præter ea, quæ iam de paralyfi dicta sunt, sedem primariò affectam, & à quâ noxa orta est, simulque dispositionem eius cognouerit. Nisi enim hæc (inquit Galenus) accuratè cognouerimus, nequaquam eas partes, quibus vel sensus, vel motus vitiatu-
 30 rimus. Porro ipsam affectam sedem ex anatome facilè ipsi deprehendemus.

*Cause ex-
terna para-
lyfis.*

*Internæ
cause pa-
ralyfis.*

Nam cum ex ea cognouerimus neruos, qui per faciei partes sparsi sunt, à cerebro dimitti, si earum aliqua simul cum toto corpore, resoluta est, haudquaquam nos latere
 35 debet, resolutionis dispositionem in ipso cerebro consistere. Vbi verò partes, quæ ad faciem attinent, incolumes, ac illesæ permanferint hæ autem, quæ sub ea sitæ sunt vniuersæ resolutæ fuerint, spinæ initium tum affici, sciendum est. Ex ipsa enim anatome didicimus, quòd omnes animantis partes sub ceruice positæ (quæ à consilio, & vo-

*Nota cere-
bri prima-
riò affecti
in paralyfi
ex lib. 3. de
loc. affect.*

*Nota para-
lyfis initiu
spinæ affecti*

luntatis imperio moueri possunt) nervos habent, qui eas moueant, procedentes ex spinali vocata medulla. Quod & iis verbis Galenus testatus est libro quarto de symptomatum causis: Si spinæ principium ledatur, solæ partes capitis, quoad vixerit animans, & sentire & moueri possunt. Quod si cerebro quoque noxa acciderit, qui sic afficiuntur, ij omnium partium, & motum, & sensum ilico deperdunt. Atque eadem quoque ratione, si toti corpori conuulsio acciderit, eundem spinæ locum, nempe initium, affectum esse declarat, faciei partibus omnino seruatis illæsis. Quod si hæ quoque afficiantur, cerebro noxam iam illatam esse ostendunt. Ad hæc nouimus ex corporum dissectione, nervos qui pectus mouent, ex ea spinæ parte, quæ in ceruice est, ortum deducere. Quocirca vox perit omnibus, quibus ea spinæ pars, quæ in ceruice est, fuerit affecta. Ipsa verò ex transuerso incisa, si tota fuerit dissecta, omnes quæ sub ipsa sunt corporis partes, sensu motuque priuari necesse est, utpote suscipiente spina a cerebro, vim tum sentiendi, tum mouendi pro arbitrio. Præterea in anatomia (inquit ille) vidimus vbi per transuersas spinæ incisiones, ad medium vsque duntaxat, secundum longitudinem, spina ipsa secaretur, non omnes suppositas corporis partes, sed eas duntaxat, quæ e regione sectionis erant, resolutas. Dextras quidem, dextra spinæ parte dissecta: sinistras verò, vbi reliqua pars esset incisa. Itaque (subiungit Galenus) manifestum est, quod circa primum spinæ processum, facta aliqua dispositione, per quam cerebri facultas, quominus ad ipsam perueniat, prohibetur, omnia inferiora membra, dempta facie, sensu, motuque priuabuntur. Vbi verò media duntaxat eius processus pars fuerit affecta, non omnes inferiores partes resoluentur, sed vel sinistræ duntaxat, vel dextræ. At verò spina in inferiori loco affecta, nempe sub ea neruorum propagine, quibus thorax attollitur, idque vel ob luxatam aliquam vertebra, vel alio quouis modo [ut vulnere] si quidem ingens fuerit affectus, partes inferiores omnes, subito & sentiendi, & mouendi facultate priuantur. Si verò non ita vehemens fuerit affectus, stuporem inducet. Atque ij mortem effugiant, quandoquidem spiratio in ipsis seruatur. At quibus quinta spinæ vertebra vulnerata, aut quouis alio modo affecta

Gal. lib. 4. de sym. cau. & lib. 3. de loc. affect.

Libr. 3. de loc. affect.

Ex lib. 4. de sym. cau.

Si quinta spinæ verte

affecta est, eorum manus omnino, & sensum, & motum *bra affici-*
 amittunt. Quibus verò sexta, iis non in totum sentiendi *tur.*
 mouendique facultas [in manibus] perit: quippe primi *Si sexta ver*
 brachij partes illæ servantur. Id verò multo magis, si *tebra affe-*
 5 septima spinæ vertebra fuerit affecta. Octavæ vertebra af- *cta est, vel*
 fectus perquam exigua, hac verò inferiorum nullam *septima.*
 penitus noxam manibus inducere possunt. Maximam ve-
 rò noxam ex læsa hac vertebra sentiunt, thorax, & reliquæ
 partes inferiores. Itaque nisi hoc pacto ex anatomia, ner-
 10 uorum ad singulas partes venientium principia didiceris,
 perquam difficile earum vel sensum, vel motum deperdi-
 tum curabis, restituésve. Porro humorem peccantem, ac
 paralyim committentem, deprehendes ex propriis cuius-
 que humoris notis. Causas verò externas, seu evidentes
 15 facile cognosces ex relatu, & iudicio laborantis.

Iudicia, seu præfagia paralyfis.

20 **P**ræfagire, ac iudicare potes de paralyfi, à quacunque
 occasione ortum duxerit, deque omnibus nervorum
 affectibus, quod ægre admodum sanabiles sunt. Nerui e-
 nim ipsi pauco admodum nativo calore participant, qui
 curationis membrorum opifex est, & causa effectrix potis-
 sima. Proinde verissimum etiam est, quod vulgò dici so-
 let, nempe paralyfin in senibus perquam difficile curari: hi
 25 enim nativo calore (qui robur est facultatis nos guber-
 nantis) propemodum sunt destituti. Quod Hippocrates
 his verbis expressit: Senibus parum calidi innati inest.
 Quam sententiam veram esse testatur Galenus, siue quis
 ad qualitatem sermonem referat, siue ad substantiam. Tre-
 30 mor & febris si paralyfi superuenerint, bonum: febres nan-
 que nervorum resolutionibus (vbi & convulsionibus ex re-
 pletionem) aduenientes, partim quidem superfluum dissol-
 uunt humiditatem, partim verò concoquunt frigidita-
 tem, quæ duæ sunt medicis, in curanda paralyfi (vbi & spas-
 35 mo ex plenitudine) remediorum intentiones. Adhæc,
 paralyfis, quæ ab ictu, vel casu non vehementer nervos at-
 terente, contudenteve, excitata est, curationem inter-
 dum recipit, vt contingit illi Pausaniæ Syro sophistæ, cu-
 ius meminit Galenus in fine libri tertij, de affectuum lo-
 corum notitia. Quum enim Romam aliquando venisset,

1 *Paralyfis*
affectus est
ægre sana-
bilis.

2 *Senes vix*
unquam à
paralyfi li-
berantur.

3 *Tremor &*
febris si pa-
ralyfi super
uenerint,
bonum.

4 *Paralyfis*
ab ictu, vel
casu.
Paus. sophi
sta vehicu-

lo excidit, dum per viam duceretur, vehiculo excidit, atque in dorso
unde para initio lēsus est: unde secundum duos minores sinistrae ma-
lysim in di nus digitos, atque medij partem mediam, sensum impi-
giti cōtra- mis quidem difficilem habuit, postea malē curantibus me-
xit. dicis, sensum omnino amisit. Huic autem remedia, quae
 illi imperiti medici digitis frustra adaptauerāt, lēsaē parti,
 hoc est, initio spinæ, Galenus ipse (ubi mali occasionem in-
 tellexit) statim adhibere iussit, atque sic vir ille celeriter sa-
 nitati est restitutus. Quae verò ab insigni, atque effatu di-

Paralysis gna neruorum contusione vel diuisione, oritur particula-
ex vehemē rum resolutio, prorsus insanabilis est. Soluta enim in illis
ti neruorū continuitas nunquam (vt dictum est) perfectē curatur.
contusione, Rectē quidem, & conformiter ad Galeni sententiam, A-
vel diuissio- uenzoar adstruxisse visus est, subit e mortis periculum im-
ne. minere, si nerui anhelitus, hoc est, respirationi seruientes, 15

Paralysis aliquibus vulnerati, aut quouis alio modo insigniter affe-
neruorū re cti fuerint: in ipsis enim statim perit respiratio. Quo fit, vt
spiratori praeocati repenti moriantur. Quomodo enim ablata re-
seruiētium. spiratione (quae actio est vitæ & necessaria) diutius viuere pos-
 sent? Si membrū resolutum nō imminuatur, nec emarce-

NOTAE 7
paral. cura scat, colorque eius non immutetur, spes aliqua curationis
bilis, aut in subest. Si verò contabescat, & gracilescat insigniter, color-
curabilis. que rarius pereat, atque à seipso plurimum euariet, ma-
 lum portendit.

Paralysis ex vulnere curatio.

IN curanda neruorum resolutione (quae paralysis dici-
 tur) ex accepto vulnere, vel causa alia extrinsecus in-
 cidente oborta, praemissi totius corporis vacuatione, vel
 per purgantia medicamenta, vel per sanguinis detra-
 ctionem, vel per verumque, vti res exigit: factis item
 vt decet, humorum in partem resolutam influentium a-
 uersionibus, praescriptaque victus ratione congrua (quae
 omnia periti alicuius medici consilio fieri debent) to-
 picis remediis aduersus illam sedulo pugnare debet chi-
 rurgus. Itaque cum duabus in hoc affectu profigan-
 do Therapeutices, id est, curandi facultatis partibus,
 opus sit: nempe ea quae victu, & quae medicamentis,
 tum intro assumendis, tum foris admouendis medetur:
 eam hic solam curationem exequemur, quae medicamen-
 tis forinsecus admouendis, perficitur: ne qui chirurgiam
 profite

In curanda
paral. dia-
retica, &
pharmaceu-
tica opus
esse.

profitentur, diætetica, & pharmaceutica (quæ peritissimum, & rationalem medicum desiderant) turpiter, & in magnam laborantis perniciem (vt plerique hodie affolēt) abutantur. Cæterum cum multa variâque præsidia forissecus in curanda paralyfi ex vulnere, aut alia quauis externa causa suscitata, admoueri soleant, vt emplastra, cataplasmata, vnguenta, illitus, fatus, cucurbitulæ, & alia id genus: Guido tamen vno liquore longè optimo, & ad affectum eiusmodi, siue symptoma profligandum, efficacissimo contentus erat: quod quidem ex Ioanne illo Mesue, viro in familia Arabum doctissimo, ac in re medica Evangelista à quibusdam nuncupato, desumpsit, eo loci, vbi de cordis passionibus agit. Eo autem liquore illinere solebat medicus ille Arabs ceruicem, totâque spinam dorsi, atque etiam affectam ipsam particulam. Confert nanque hoc pacto mirificè roborandis membranis spinalem medullam obuoluentibus, substantiæ spiritali, qua viuimus, nervis quoque, & ossibus. Proinde paralyfi, omnibusque neruorum ægreditudinibus, cordis palpitationi, & tremori, atque etiam manifestæ lassitudini, mirè, ac supra humanam opinionem, proficit. Adde, quòd nullum medicamentum eo præstantius inueniri potest, vbi cor celeri, festinâve eget refectione, ac refocillatione, si saltem ipsi Mesue credimus. Cæterum est quod cum ipso Mesue vehementer admiremur, priscos illos tum medicos, tum philosophos insignes, & rerum naturæ peritissimos, nullam in suis scriptis, eiusmodi inunctionis spinæ, mentionem fecisse, cum vix aliud tam præstans auxilium inueniri, aut excogitari possit, ad vitæ substantiam conseruandam. Nouisti namque satis (opinor) ex anatome, spinam dorsi in homine esse veluti carinam nauis, & fundamentum reliquorum ossium, imò verò & principium. Nosti præterea, sub hac veluti solido quodâ propugnaculo, & muro tutissimo, dorsalem ipsam medullam còditam esse, quæ cerebri quidem germen est, & explantatio, durorumque corporis neruorum principium: per quos velat internuntios, corpus vniuersum transumit, primum quidem, & maxime motum, cum hoc autem etiam & sensum. Adde quòd in spondylis dorsi (qui spinam ipsam constituunt) mira naturæ providentia efformata sunt quædam subtilia foramina, per quæ

De localibus remedijs in paralyfi ex vulnere adhibendū.

Liquoris balsamitis Mesue dentes.

Spina dorsi veluti carina nauis.

quæ vasa, spiritum, & sanguinem deferentia (venæ inquam, & arteriæ) intrò quidem, foras verò, nervi ipsi, sensum, & motum, in corpus vniuersum comportantes, feruntur. Quo fit, vt spina ipsa sit veluti platea, seu via quædam publica, non modò neruorum, sed & venarum, & artè-
 5 riarum. Proindè & spirituum, ac virtutum. Adhæc non ignoras magnam ipsam venam concavam dictam, iudem & arteriam aortam vulgò nuncupatâ, iuxta spinam ipsam totam reptare, sed & partium spiritalium est veluti subster-
 niculum, & (vt quispiam dixerit) veluti lectus aliquis. At-
 10 que (vt Mesue inquit) medullam continet veræ * humiditatis. Multas ergo easdemque bonas, atque effatu dignas intentiones cumulabis, ex inunctione ipsius dorsalis spinæ, quam veteres ipsi tum medici, tum philosophi, vel
 prorsus ignorantes, neglexerunt, vel eam nobis inuide-
 15 runt, cum ne verbum quidem in eorum monumentis de ea scriptum inueniatur, vt Mesue testatus est. Porro liquo-
 ris illius tam eximij, atque ad tam multa utilis composi-
 tio, & conficiendi ratio apud præfatum autorem talis est:

*Liquor bal-
 samites Io.*

*Me. longè
 optimus, et
 ad multa
 vtilissimus.*

** Aliæ ex-
 plaria ha-
 bent opopa-
 naci.*

*† Alias 3.
 duas semis.*

Recip. myrrhæ electæ, aloës hepaticæ, spicæ nardi, sangui-
 20 nis draconis, thuris, mumix, * opobalsami, bdellij, carpo-
 25 balsami, ammoniaci, sarcocollæ, croci, masticæ, gummi
 30 Arabici, styracis liquidæ † ana drach. duas, ladani electi,
 35 succi castorei, ana drachmas duas semis. muschi drach.
 40 semis, terebinthinæ optimæ ad pondus omnium: pulueri-
 45 sanda pulueriscentur, & omnia misceantur cum tereben-
 50 thina, reponanturque in furnibulo, seu distillatorio, quod
 55 alambicum vocant, & illa ingeniosè ac lento igne vt de-
 60 cet, distillentur: liquorem autem per distillationem subli-
 65 matum, vase vitreo forti excipe. Hic liquor proximè ac-
 70 cedit ad verum succum balsami. Guido à Cauliaco quan-
 75 doque huic pretioso liquori addebat herbas dicatas para-
 80 lysi, & tum generosius, atque efficacius multò (vt ipse tes-
 85 tatur) experiebatur auxilium.

De syncope ex vulnere.

*Syncope
 quid.*

Syncope (definitore Galeno lib. duodecimo Therapeu-
 tices) est præceps virium lapsus, qui immoderatas eua-
 cuationes, ingentes dolores, vigilias, principiorum intem-
 90 periem,

periem, atque animi vehementes affectus, sequi consuevit. Ea autem syncope, quæ in vulneribus accidit, magna ex parte creatur, vel ex immodica sanguinis profusione, vel ex vehemēti dolore. Hanc proximū esse cognosces, tum ex
 5 arteriarum pulsu elanguescente, ac deficiente, tum ex pallido vultus colore, tum ex motu totius corporis ignauo, ac difficili, sed præsertim palpebrarum, & partium extremarum, tanquam illis erigendis, aut attollendis non possit
 10 virtus motrix sufficere: sed & frigidi, circa collum maximè, & faciem, sudores, syncopen iam pulsare fores testantur, symptoma sanè minimè negligendum. Quandoquidem celeriter interdum hominem rapit, estque quasi via
 ad mortem, imò (vt vulgò dici solet) est veluti quædam
 15 parua mors. Proindè summa cura adnitendum est, ne in hoc tam periculosum symptoma vulneratus incidat. Ergo laborantem quibus poteris modis consolator. Hominum turbam ne suo anhelitu cōclauē nimis excalfaciant, & laborantem sua præsentia deterreant, procul arceto. Sed
 20 & antequàm ea prematur qui vulneratus est, panis frustum, vino optimo, aquæ rosacæ momento, diluto, illi sugendum exhibeto: atque etiam vt ex vino ipso modicum
 „ quid bibat, ipse iubeto. Vinum nanque omnibus syncope vexatis vtile est, vt libro duodecimo Therapeutices his
 „ verbis Galenus annotauit. Vinum tamē, quod & calidum
 25 naturā sit, & deductionem in corpus promoueat, omnibus
 „ quos syncope malè habet, offerre cōueniet. Cōstat autem, ex vinis ea deligenda esse, quæ & flauo sint colore, & substantia tenui, & ætate, vetera. Talia nimirum & boni odoris continuò fuerint. Cæterum amara præ vetustate, vi-
 30 na ne sunt. Porro si iam syncope, qui vulnus accepit, vexetur, eius faciem aqua rosacea, vel frigida, vel vtriusque mixtura, adiecto etiam aceti (si placet) momento, irrorabis, ac etiam ipsa validè in illam, laborantis faciem dico, proicies: aut saltem naribus aquam rosaceam, & acetum
 35 admovebis, vt scilicet suauis eorum odore, animam illorum recrees. Pilos, nasum, & aures vellito, extrema fricato, alapis illorum genas cedito, & proprio nomine alta voce illos vocato, ac cætera facito, quæ in hoc symptomate medici fieri præcipiunt.

Syncope in vulneribus vnde.

Syncope proximè in statu nota.

Syncope parua mors.

Quibus remedijs syncope occurratur.

Vinum omnibus syncope vexatis succurrit.

Vini in syncope electio.

Si iam syncope præsens sit.

*De desipientia, seu delirio accidente
in vulneribus.*

**Delirium
quid, & unde
de nascatur
Cano. 3.**

OMne delirium (vt Galenus ait libro quinto de symptomatum causis) deprauatus est principis facultatis motus, à prauis succis, aut cerebri intemperie ortum habens. Interpreti Auicennæ alienatio dicitur. Porro tametsi eiusmodi desipientiæ, seu mentis alienationes, symptomata sint modò primogenia, id est, primario, ac proprio cerebri affectu euientia, modò secunda, hoc est, cerebro compatiendi societate, seu (vt dici solet) per consensum laborante. Hic tamen nunc, de solo eo delirio, quod consortij lege, seu per consensum accidit in vulneribus, & percussionibus articulorum, sermonem faciemus. Talia nanque vulnera (vt superius diximus) doloris, vigiliarum, conuulsionis, & delirii periculum adferunt. Cæ-

Li. 4. The.

**Causa deli-
rii in vulne-
ribus.**

terùm eiusmodi symptomatis, delirii inquam in cacoëthis vulueribus euientis) generatio persimilis est ei, quæ per suffusiones oculorum accidit, à ventriculi dispositionibus ortum trahentes, vt Galeno visum est libro tertio de locis affectis. Quemadmodum enim ventriculus cerebro suas affectiones cõpatiendi quadam societate trãsmittit, idque propter neruorum a cerebro, ad os ventriculi descendentium magnitudinem, per quos etiam sensus huic parti, quàm vlli reliquarum corporis partium acutior est. Ita quoque neruosis partibus inflâmat, cerebro noxa promptissimè communicatur, atque ex illis promptius, quàm ex aliis quibuscumque partibus deliriũ superuenire solet, idque ascendente ad caput interdum per continuas partes, solo calore: interdum verò spiritu vaporoso, vel fumoso, aut fuliginoso. Hæc autem omnia, quæ sic delirium, aut phrenitidem inducunt, siccandi pollent facultate Auicennæ: quippe, quæ multo, eodémque acri calore participet. Quo fit, vt delirantes irrequieto ferè motu agitentur. Vnde Galenus libro decimotertio Therapeutices ad hunc modum ait: Ergo cum humor qui in capite redundat, frigidus est, insensibilitas, immobilitasque hominem opprimunt. Cum calidus est, perpetuus potius motus, vnà cum rationis noxa. Accidit enim (veluti demonstratum in libris de his est) ex frigore, segnitia: ex calore, immodicus motus: ex humoris verò vitio, dementia.

**Neruosas
partes in
flâmatis de-
lirium acci-
dit.**

**Deliriũ ex
siccitate fit.**

Delirij

Delirij ex vulnere curatio.

SI delirium, seu mentis perturbatio, post vulnus acceptum, hominem apprehendat, huius rei gratiâ statim accersendus & consulendus erit peritus aliquis medicus, qui potu, frictionibus, & deligaturis partiû extremarum, & maximè pedum, ac tibiârum, clysteribus quoque huic rei accommodis, fumos, ac vapores vitiosos, à capite deorsum protinus reuellere studeat, vt rectè præcepit Auicennas, iidem & cæteri, qui hac de re scripserunt. Quod autem ad chirurgum attinet, læse particulæ dolor ex toto (si fieri potest) sedandus est. Vtile est etiam alapis genas laborantis percutere, vt ipse ad mentem, seu ratiocinandi facultatem redeat. Galenus libro decimotertio Therapeutices caput delirantium in principio perfundendum esse oxyrhodino, pulchrè nos admonuit. Vapores enim, & humores à capite tûc repellendi sunt. Cùm verò in summo incremento sunt deliria, perfusiones ex papauerum capitibus (consilio eiusdem) applicabimus. Odorem quoque ex rebus frigidis naribus obiciemus, ac nares ipsas intus, vel frontem ex similibus medicamentis illinemus. Quippe sopire (inquit) ac stupescere principem facultatem oportet, cerebrum scilicet, quod supramodum incaluit, refrigerando. Sanitati magna ex parte restituuntur Auicennæ, qui per dies aliquot, radicem bryoniæ, id est, vitis albæ, vel bibûr [ex liquore aliquo refrigerante, & humectante] vel cum cibo quopiam eius saporem obtundente comedunt. Cæterùm de pruritu, duritie, atque impotentia læse particulæ, quæ interdum vulneratis accidunt, suo loco alibi dicetur.

*Vapores à cerebro auertendi.**Dolor sedandus.**Caput delirantium oxyrhodino perfundendum.**Cerebrum refrigerandum.**Radix bryoniæ.**De vulnere in carne accepto, & eius differentijs.*

C A P. V.



Vulnus propriè Galeno libro tertio methodi medendi, vnitatis est solutio, ex vulnerando in carnosa parte relicta, eadèmq; (vt recentiores addiderunt) cruenta, & citra putrefactionem: hic autem vulnus latius accipimus, nempe pro recenti plaga non modò in carne, sed etiam in nervis, venis, arterijs, tendonibus, mēbranis, cartilagine, & ossibus facta. Itaque primùm de eo vulnere quod in carnosa substantia acceptum est, edifferemus.

*Vulnus quid Gale.**Vulnus quid apud recentiores chirurgos.*

Cæterùm

*Diuisio
vulnery.*

Ceterū eiusmodi vulnus aut simplex est, & citra substan-
tiæ deperditionem, aut cum aliqua substantiæ amissione.
Vulnus simplex, & quod sine deperditione sit substantiæ,
aliud profundū aliud summo tenus factum, seu in summo
residēs est: aliud verō vtriusque particeps, vt cum pars vna
diuisionis per lōgitudinē factę, alte descendit, altera in sum-
mo corpore hēret, quod inęquale Galeno dicitur: aliud itē
magnum, aliud parū tum dicitur, tum verō est. Quę omnes
differentiæ a quātitate: seu spacio diuisionis sumptę sunt.
Vulnus quod cum deperditione est substantiæ, aut sit cum
amissione cutis solius, aut cū ablatione cutis, & carnis sub-
iectę simul. Porro eiusmodi vulnera, vel simplicia sunt, &
sine vllō affectu, aut symptomate: vel accidentia habent,
quę rationē causę nō obtinēt (tunc enim vlcera dicerētur
difficile sanabilia, de quibus in sequentibus dicitur) sed so-
lūm rationē habent sine quo nō, vt superius annotauimus
ex Gale. lib. 4. Therap. Cuiusmodi sunt intēperies, dolor,
phlegmone, pruritus, & alia paulō ante cōmemorata. Non
magnoperē autē curo, si prędictę huiusmodi differentiæ,
dispositiones aut affectus dicātur potius, quam differentiæ,
vel cōtrā. Quanquā Gal. lib. 3. methodi medēdi anxie satis
disquisiuerit, quēnā sint proprię vlcery, seu vulnerū diffe-
rentiæ, & quę aliorū affectuū complexionēs. Hoc enim pa-
rūm nūc mihi cōferre videtur ad vulnerū curationē. Com-
moda nāque morborū curatio, nō ex nominib, sed rerū re-
cta opinione cōtingit: vt scribitur primo methodi medēdi.
Cæterum de causis, signis, & iudiciis vulnery, quatenus
vulnera sunt, abunde satis in pręcedentibus dictum est, in
capite scilicet vniuersali. Proindē iis prætēmissis, vulne-
rum in carne acceptorum curationem iam aggrediemur. 31

*Curatio vulnery simplicium, in carne
summotenus acceptorum.*

*Specialis
præcipuā-
que mētio
curādi vul-
nery in car-
ne accepti,
vna est.*

Vulnerum eiusmodi curatio, prætēr iam dictas qua-
tuor, quinque intentiones communes, vnā spe-
cialē, præcipuāque habet, nempe sanguinis pro-
fusionem cohibere. Quod sanē intelligendum est, nem-
pe si nimis immoderatē, atque affatim effundatur, vt
rectē interpretatus est Auicē. Satiūs enim est (inquit) “
ipsum fluentem ex vulnere sanguinem, non omnino, ac
statim suppressere, sed si nimis abundē prorumpat, eius “
duntaxat

- „ duntaxat impetu moderate infrenare oportet. Moderata
 nanque sanguinis ex recenter accepto vulnere vacuatio,
 non parum sæpe multis profuit. Quandoquidem & phle-
 gmonas, & obstructions, & febrem subinde fieri prohi-
 buit. Quæ quidem symptomata, atque id genus alia, vul-
 neribus (nisi diligenter prouideris) superuenire, ipsiusque
 solutæ vnionis consolidationem, & curationem magno-
 perè impedire consueuerunt. Atque illud fuit Hippocra-
 tis præceptum, quod & à Galeno refertur, & approbatur
 10 libro quarto methodi medèdi: Fit enim (inquit Hippocra- *Hippoc.*
 „ tes) effluente sanguine vulnus siccius: proinde & sanius,
 „ Nam siccum (vt idem ait) sano vicinius est, humidum ye-
 „ rò non sano. Porro si tantus fuerit ruentis sanguinis im-
 „ petus, vt cum iis, quæ sistendo sanguini in vulneribus com-
 15 muniter admoueri solèt, cohiberi non possit, iis remediis
 suppressendus erit, quæ in capite de vulneribus venarum
 postea dicentur. Ceterum tamen in genere dictū sit, quo-
 modo curandorum vulnèrum intèctiones perfici debeant,
 modus tamen specialis, quo in carne perfici debeant in se-
 20 quentibus dicetur. Huius autem inuentio habetur ex dif-
 ferentiis vulnerum suprà commemoratis, ad huc modum.
 Vulnus illud simplex dicitur, Galeno, Hippoc, & aliis me- *Quid vul,*
 dicis, quod solum cōsistit, hoc est, quod sine deperditione *simplex, &*
 est substantiæ, nec vllum alium affectum, aut symptoma *qua sit eius*
 25 adiunctum habet. Vulnus igitur simplex non erit, si quæ *curadi ra-*
 vulnerata est particula fluxione vexetur, si malo succo vi- *tio.*
 tiosa sit, si omnino extra naturalem temperiem fuerit, si *Vulnus nō*
 vlla cavitās adsit, si aliqua cutis amissio facta fuerit. Itaq; *simplex.*
 vbi simplex vulnus quoddamque solum consistit in carnosā *Vul. simp.*
 30 particula, non adeo saltem magnum incidit, dissidentium *postulat tā*
 labiorum cōmissionem, seu coniunctionem, quæ sola de- *tū aggluti-*
 centi sit ligatura, vinculo scilicet ex duobus initiis circun- *nationem,*
 „ dato expostulat Galeno libro tertio Therapeutices. Quæ *Gal.*
 „ enim (inquit de simplici vlcere loquens) dissident, atque
 35 inuicem distant, si in idem adamussim componas, citra
 „ omnem reliquam extrinsecus molitionem coalescunt.
 „ Nempe sicuti in cauis vlcèribus, vt caro producat, ita in
 simplici vlcere, vt oræ ipsæ secum coalescant, atque agglu-
 tinentur, sola certè natura causa est. Diductorum igitur
 labrorum coitionem, seu agglutinationem præcedit ne-

*Oui candi-
dam, qua-
re vulne-
rib. admo-
neatur.*

cessario, ipsorum cōiunctio, atque in idem adductio. Idem omnino de hac re sentit Razus, quod & Galenus: vsus tamen communis obtinuit, vt recentibus huiusmodi vulneribus oui candidum (quod albumen vocant) aliquandiu agitaturn, & leui stupa exceptum admoveatur. Nec absque profectò, cum & sanguinis profluium supprimat, dolorem sedet, refrigeret, & phlegmonas fieri prohibeat, non solum in oculis, sed & in omnibus locis exulceratis: vt Galenus est autor libro vndecimo de simplicium medicamentorum facultatibus. Ante omnia verò cauendum est, ne dolor ineidat. Quandoquidem dolor (vt iam sæpe dictum est) & fluxionem proritat, & phlegmonem excitat. Quomodo autem dolorem sedare oporteat, in præcedentibus satis est explicatum. Porro eiusmodi oui candidus liquor, ante tertium diem amoueri non debet. Nam vt 15

Lib. 3 The.

Galenus ait parua vulnera eiusmodi naturæ sunt, vt post orarum adductionem, & commissionem, seu coniunctionem, vnius diei, aut duorum dierum spatium adhuc requirant quo proba fiat vnio, & agglutinatio. Quòd si vulnus hoc pacto non adglutinetur, curandum erit, vt in sequentibus paulo post dicetur.

De vulnere magno, percussim diuiso, in summo residente, hoc est superficiali, & minimè profundo, in quo non sola sufficit deligatura ad oras ipsius applicandas, & coniungendas.

29

SI vulnus in superficie corporis acceptum, ad tantam magnitudinem percussim cœsimve diuisum est, vt sola deligatura oræ ipsius nec adduci, nec cōmitti possint, futura aut fibulis (quas Græci ἀγκύρας vocant) eas ipsas distinctas oras adducendas, & coniungendas esse, præcepit Gale. libro tertio methodi medendi. Atque hac sola partium dissidētium coniunctione vulnus glutinatur. Apud recentiores tamen chirurgos fere omnes inualuit consuetudo, vt his vulneribus apponatur puluis ruber, quem in-

*Medicamē-
tum cruen-
tum aptū vl-
ceribus.*

carnatiuum, & cōseruatiuum vocant. Recipit autē partes duas thuris, & sanguinis draconis partē vnā. Albucaſis addit tres partes calcis viuz. Cuius sententiæ suffragatur & Lanfrancus. Guido autem loco calcis viuz bolum Armentiam adiicit. Halyabbas verò santalos apposuit. Sunt qui puluerem hūc rubrum appellatum, labiorum vulneris

aggluti

agglutinatum, & futuræ conseruatiuū, hoc modo componunt. Recipe boli Armenij, terræ sigillatæ, singulorum drach. sex, thuris, mastiches, sarcocollæ singulorum drac. duas semis, myrrhæ, aloës, singulorum drachmam vnā semis, tragacathi pisti, sanguinis draconis, singulorū drachmam vnā farinæ hordei, farinæ fabarum, singulorum drachmam semis. Sed interim summopere cauendum est, ne vel pilus, vel oleum, vel quidpiam aliud in medio adductorum labrorum vulneris interuenerit. Nam tūc eiusmodi vulnus sola dissidentium partium cōiunctione glutinari non potest. Hæc enim quæ sic interiacēt, iam vniorem dispescunt, & earum quæ copulandæ sunt partium, coalitum impediunt. Ex prædictis autem singula, cum oui candido liquore agitari possunt, donec in corpus vnum coeant: quod glutinis instar lentescat. Postea verò stupis leuibus excipiendum erit medicamentum, & ita vulnere admouendum, supra quod & aliæ stupæ solo oui albo imbutæ, & intra pannum lineum eodem madefactū liquore, inuolutæ apponendæ sunt. Sed & supra vulnus nulla alia intercedente materia, pannus aliquis tenuis prædicto imbutus liquore, admoueri debet, ne scilicet dum remouentur stupæ, futuræ iam factæ puncta abrumpanr, aut dilacerent. Quodd si loca circum vulnus adiacentia, rosaceo inungeretur, factum bene existimauerim. Hoc pacto enim læsam particulam à dolore, & inflammatione vindicabis. Qualis autem futura, aut deligatura, quales item puluilli ex eiusmodi stupis facti, hisce vulneribus percussim cæsimve in superficie acceptis, atque in conspectu apparentibus, conueniant, & quo pacto fieri debeant, in præcedentibus abundè satis dictum est. Cæterum primus eiusmodi apparatus vsque in diem quartum mutari non debet, nisi fortè dolor aliquis vehemens superueniret, aut symptoma aliquod molestum incideret. Porro si post quartum diem transactum vulnus nō coalescerit, vino aliquo styptico caute lente abluendum erit. Deinde stupæ prædicto vino imbutæ, & expressæ supra vulnus ipsū apponendæ, & alligandæ erunt, quas & quotidie mutare oportebit. Intra enim dies paucos hoc modo vulnus agglutinabimus, & persanabimus, Galeno etiamnum attestante, libro quarto Therapeutices: vbi Thessalum arguit, qui vulnera in

Cauendum ne quid labru vulneris intercedat.

Quæ cruento vulnere primū appositæ sunt, ante diem tertium, remoueri nō debent. Quæ post quartum diem fieri debeant.

multos menses, & interdum in annum, aut etiam longius tempus protraherat, & incurrere sinebat, quæ alioqui paucissimis diebus, vt sex, aut plurimum septem, curari potuerant,

Primus apparatus. Itaque primus apparatus rectè decentèrque fit, cum uorum candido liquore, & puluere illo rubro, cuius paulò antè meminimus. Hic enim & sanguinis profluium infrenat, atq; inhibet, dolorem sedat, & phlegmonem creari vetat.

Secundus apparatus. Secundus verò apparatus, optimè fit, cum vino, vt suprà dictum est. Vinum nanque (vt Galenus ait libro tertio methodi medèdi) omnis vlceris, qua vlcus est [id est, quod citra aliam cum ea implexam dispositionem reluctantem consistit] optimum est medicamentum. Quod hac sequèti ratione conuincitur. Vulnus omne, qua vulnus est, siccati, atque adstringi desiderat, præsertim si magnum extiterit.

Gallibr. 3. meth. me. atqui vinum, quale suprà est memoratū, nempe subausterrum, hæc duo commoda præstat vulneri. Vinum igitur omnis vulneris, qua vulnus est, optimū est medicamentum. Maior est Galeni, libro nuper citato, vbi ait: quòd eo tempore, quo diuise vlceris, seu vulneris partes, ritè sunt coniunctæ, medicamento opus est, quod particulam siccet, & modice adstringat, vt & si qua sanies iam subfit, hanc consumat, & si qua in vacuum locum fluxura est, hanc prohibeat. Proindè medicamentum glutinatorium plus siccet, oportet, quàm quod carnem producit: nempe ordine secundo. Minor verò ita deducitur. Vinum, vt Galenus est autor libro octauo simplicium medicamentorū, ex secundo ordine est excalfacientium: sed quod admodum vetus est, ex tertio, sicut mustū quod vocant, ex primo: caliditati autem eius, proportionè respondet siccitas. Proindè vinum ipsum pro naturarum, seu facultatum, quibus ratione ætatis pollet, diuersitate, desiccet, & agglutinat: nō autem humectat, & refrigerat (extrinsecus saltē admotum) vt Theodoricus falsò existimabat. Atq; id ipsum est, quod Galenus refert libro quarto Therapeutices, ex senioris Hippocratis sententia inquires: Vlcera madefacere, id est, abluere, quæcunque ea fuerint, nisi vino nō oportet. Tum causam subiiciēs, ait: Nam siccum sano vicinius est, humidum verò, non sano. Hinc Arnaldus dicere solebat, quòd

Vinum pro ætatis ratione, diuersa pollet facultate. cruenta,

Hipp.

eruenta, & recentia vulnera, aqua ardēte (quam & aquam *Aqua*
 vitæ nūcupant) abluta, celerit̃ ad sanitatem perducun- *vita.*
 tur: quippe quæ insigniter deficcet. Post hāc autem ablu-
 tionem, quidam infra scriptum puluerem (qui in hoc casu
 5 magnæ est efficaciz) vulnere inspergunt. Recipe myrrhæ *Pulvis opti*
 drachmas tres, aloës hepaticæ drachmas quatuor, thuris *mus.*
 drachmas duas, misce, & fiat pulvis. Sūt qui post amotio-
 nem primi apparatus, emplastrā, & vnguenta admovent,
 quæ in promptu ad hanc rem parata habēt, ac statim stu-
 10 pas superponunt. Galenus autem in re proposita, plurimi *Emplastrū*
 facit emplastrum, quod nigrum appellauit: Auicēnas verò *nigrum.*
 vnguentum de lino, quod tamen magis dicatum est carni
 regnēdæ, quàm agglutinationi labiorum vulneris. Gui-
 do à Cauliaco in hac re vti consueuerat vnguento, quod
 15 constat prædicto puluere rubro, remixto cum terebinthi-
 na lota. Quidam verò terebinthinam ipsam, cum prædicto
 puluere commixtam, & (vt dicūt) incorporatā, statim per
 initia cruentorum vulnerum admovent, atque in diē quar-
 tum relinquunt. Hæc enim oras vulneris coire facit, & fu-
 20 turam eo nomine conseruat. Sed horum omnium, atque
 aliorum multorum ad hanc rem pertinentium formulæ,
 & compositiones in antidotario describentur.

*De vulnere profundo, & occulto, sine amissione
 substantiæ, in carne accepto.*

25 **V** Vlnus in profundum penetrans, & reconditum sub-
 inde futura, & decenti ligatura curationem recipit.
 Si autem hoc modo curari nō possit, vel scilicet quia par-
 tes, quæ disiunctæ sunt, exactē ad imum vsque (ob nimiam
 diuisionis profunditatem) sibi coniungi non possint, vel
 30 potius quia in fundo collecta sit sanies, aut pus, cui nullus
 patet effluxus, ipsum per effluxionem, Galeni consilium
 sequuti, curabimus. Ipsam verò effluxionem, tum ex eiuf- *Vulnus*
 dem, tum ex contrarij loci diuisione, & situ seu figura *quando per*
 partis accommoda amolietur. Porro situm partis vul- *effluxiones*
 35 neratæ accommodum, seu congruam positionis figuram *curandum.*
 intelligimus, quando plagæ hiatus, quem orificium vo-
 cant, semper deorsum spectat, fundum verò sursum, ita vt
 sanies ex ipso vulnere prona, & libere effluat. Itaque si
 vulneris figura non ad superiora extenditur: sed ad ima
 vergit, nec futura, nec fibulis, nec deligatura partes dis-

Sectio in iuncta, omni ex parte adamussim committi: ac sibi applicata possint, atque in profundo sistatur sanies, nisi prius ad sita quando effluxum ipsius vitiatum humoris, feceris sectionem, nihil vni- facienda. quam proficies, siue carnem generare, siue agglutinare volueris. Vbi verò convenientem positionis figuram vulnus, in parte laborante seruauerit, siue id ex natura vulneris, siue ex industria contingat, sectione noua opus non est. vt li-

Sinus in se bro secundo ad Glauconem Galenus nos edocuit. Itaque more cura- refert eo loci se sinum in coxa enatum, figura ad ima ver- gentem, sine vlla ex aduerso diuisione curasse. Cum enim sita, citra nus ipse versus genu quidem terminaretur, os verò altius vlla ex ad- circa mediam scilicet femoris regionem confisteret, insit uerso se- molle cervical popliti laborantis subici, vt inferiorem situm ctionem. haberet inguen, quam genu. Hac igitur conueniente posi- tionis figura in læsa parte seruata, facile per os, ichores, & ita purulenta colluies, elabebantur, & effluebant. Idem quoque & in brachio fieri potest. Quandoquidem si os vulne- ris ad partem superiorem vergat, ita brachium collocan- dum erit, vt ipsum orificium deorsum spectet. Atque tum sine alia facta ex aduerso sectione, vulnus poterit ad sani- tatem perducere. Non secus quidem ac si os prope cubitum esset, vulnere in superiora tendente. Quod si hac conue- nienti situs figura, particula læsa collocari non possit, nec ex vulnere ipso sanies elabi, ex aduerso sectio molèda erit. Quod & hac sententia iterum Galenus confirmauit circa finem libri tertij methodi medendi. Si vulnus (inquit) ca- uitatem altè reconditam, sub cute habet, cōsiderare oportet, vtum ea in superiore parte sit, ita vt sanies ex ea prona effluat: an in inferiore, sic vt illic sistatur. Eius igitur cui effluxus patet, eadem quæ aliorum curatio est. Cui verò non est, huic ipsi moliamur effluxum oportet. Eius autem effluxus molèdi duplex ratio est, vbi exprimere deligatu- ra nihil promouemus, aliàs tota cauitate dissecta, aliàs in fundo tantum aperta. Quando verò harum alterutra sit ineunda, docebit tum locorum ipsorum natura, tum verò vlcus magnitudo. Si nanque ea loca ipsa dubia, seu fallacem, ac periculosam, sectionem faciant, & vlcus magnum fuerit, in fundo aperire magis expedit. Sin contrà se habeant, præscindere, seu diuidere præstat. Deligatio verò eius incipiat quidem (vt dictum est) supernè, finiatur infrà, vbi

ubi scilicet patet effluxus. Haftenus Galenus. Cæterum in tali diuisione quæ ex aduerso fit, Brunus syphunculos, hoc est, tubos, siue turundas concavas (quas cannalatas vocant) ex vtraque parte imponit. Guido verò dum hanc inolebatur sectionem, solebat uti setone (ut vocant) quia melius (inquit) sordes deterget, & totum pertransit spatium, minoremque infert dolorem. Ipsum autem intro-missorio ad formam acus facto immittebat, vel hastulam ligneam in cauum vulneris imponebat, & super eam tutius sectionem faciebat. Deinde sectione facta, mundificatiuum aliquod medicamentum leui stupa, aut panno exceptum, superponebat, quod bis in die mutabat.

*De cauo vulnere, cum amissione substantiæ cutis vtriusque
& carnis subiectæ tantum, non etiam ossis*

CAPUT VI.

IN cauo vulnere non ipsa modò periit cuticula (quam Græci epidermida vocant) verum etiam reliquæ cutis suppositæ, natura vniuersa, & subiectæ carnis portio aliquando non exigua. Quo fit ut geminus in eo curandi finis sit propositus, vnitio scilicet & repletio: quoniam & affectus geminus est: nempe vlcus siue vulnus, quod est vnitatis solutio, & cavititas, quæ ex amissa aliqua animalis propria substantia est contracta. Itaque continui diuortium, vnitio, cavititas repletionem desiderat. Verum enim verò quoniam in proposito vulnere vnire non possumus, quæ dissident, nisi prius cavitatem implenerimus, ordinem curationis, à cavitatis implectione ordiri necesse est. Omnis nanque quæ præter naturam est cavititas, impleri postulat: quare & quæ in carnosâ etiam accidit parte. Ipsa verò impletio inueniendorum remedium finis, quo tenditur, est, quem vel idiota, vel priuatus quisque etiam nouit. At verò ut quæ impleant, inuenias, & multa ratione opus est, & multiplici particulatim indicatione, & methodo rationali exacta. Longè itaque à scopo aberrant, qui vnum id sibi ad cauum vlcus sanandum satisfacere putant, si sciant quòd carne est implendum. Non enim in hoc curandi ratio consistit, imò in eo inueniendo quòd carne sit impleturum.

Cæterum particulares indicationes, ex quibus inuenire

Brunus.

Guido.

*Vera Hippocratis
methodus
sanandi
cavi
ulceris.*

*Due indica-
tiones va-
nueriales
proponun-
tur, in cu-
rando caui
vulnere.*

Lib. 3. thet.

*Quatuor
indicationes
particulæ*

res in cura licet, quæ cavitatem vulneris impleant, sunt quatuor.

do cauo. (1

vulnere (2

proponuntur. (3

(1

(2

(3

Prima ex ipsius vulneris substantia sumitur.

Secunda ex ipsius ægri temperamento, non corporis modò vniuersi, sed etiam afflictæ particulæ.

Tertia ab iis, quæ coniugata, & annexa dicuntur, cuiusmodi sunt particulæ laborantis intemperies, & circumdantis nos aëris temperies.

Quarta ex contrarietate indicationum, ut cum læsa particula contrario est temperamento, cum toto, hoc est, cum corpore vniuerso. Talis siquidem ordo indicationum statuitur à Galeno libro tertio methodi medendi, in curandis vulneribus omnibus, ne dum in cauo. Porro nomine indicationis substantiæ vulneris, hoc loco inaudiuntur indicationes differentiarum maximè propriarum ipsius vulneris: de quibus abundè suprà disseruimus, & in sequenti tractatu, qui de vlceribus inscribitur, locupletius adhuc differemus.

Itaque prima sanandi caui vulneris indicatio, nobis insinuat, carnem eadem specie cum ea quæ periit, regnendam esse. Impleri enim non poterit, quod cauum est (ut prima curandi indicatio vniuersalis postulat) nisi substantia omnino similis ei quæ periit, regnatur. Atqui carnis gignendæ materia sanguis est: opifex verò, seu effectrix

Sanguis bonus, materia est gignendæ carnis.

causa, ipsa natura. Verùm non satis est sanguinem dixisse, nisi etiam & bonum (inquit Galenus) addiderimus. Erit autem sanguinis qui influit, & ex quo regnenda caro primordium habet, bonus, si nec qualitate, nec quantitate vitiosus fuerit. Sed nec satis etiam hoc loco fuerit naturam dixisse, nisi etiam quorum natura, sit adiectum, & vbi. Cōstat autem, quòd subiectorum corporum, quibus superinduci caro debet, natura ipsa gignendæ carnis opifex est.

Natura subiectarum particularum opifex est carnis regnandæ. In omni cauo vulnere non spectatur.

Porro rationem opificis habere non poterit natura subiectarum particularum, quibus deficiens caro restituenda est, nisi iustum, & minimè vitiatum calidi, frigidi, humidi, ac sicci temperamentum obtineat. Siquidem ex horum temperatura, cuiusque corporis natura consistit. In omni igitur cauo vulnere, duo illa primùm consideranda sunt: nempe quod subiectum est, iustane temperie sit, id est, an secundum naturam se habeat. Et præterea sanguis qui influit, bonusne, an modicus sit.

Fingam

- Fingamus igitur & sanam esse partem subiectam, atque afflicta, & sanguinis (qui gignendæ carnis materia est) confluxum citra vllum vel in quantitate, vel qualitate vitium. Iis sanè ita se habentibus, nihil est præterea quod obftet; quominus prima carnis generatio prosperè contingat, idque nullius externi medicamenti ope. Quippe causis ambabus vnde nascitur præsentibus, nullòque extrinsecus quod impediatur, obstante, non potest prohiberi carnis generatio. Verùm in ipsa primæ carnis generatione duplex (vt Galenus ait) provenire excrementum necesse est: alterum quidem crassius, alterum verò tenuius. Quod & in omni qualitatis alimenti mutatione contingere solet. Hoc autem (tenuius inquam) in vlceribus recentibus, quæ hic vulnera appellamus, Latinis sanies, Græcis ichor nominatur. Illud verò (quod crassum est scilicet) nobis sordes dicitur. Ac ex tenui quidem excremento vulnus humidum redditur, ex crasso sordidum. Eoque duplicibus medicamentis eget, vtique vt humidum est, siccantibus, vt sordidum, expurgantibus. Ergo cum nullo vnquam tempore natura cesset, certè nec tempus vllum erit, in quo non ambo hæc in cauo vlcere colligantur. Quare nec tempus vllum erit, in quo non vtrunque medicamenti genus desideretur: vtique & quod siccet, & quod expurget. Verùm non satis adhuc fuerit, cuiusmodi quidem genere esse medicamentum debeat, inuenisse, vt iam Hippocratica veraque methodo, inuentum est, sed & species aliqua inuenienda est, quæ eiusmodi vulneri sit accommoda, & statuto ordine graduè circumscripta vt carnem producere possit. Non omne nanque medicamentum quod siccandi, & detergendi pollet facultate, carni producendæ est aptum, sed quod modicè: nempe primo ordine tum siccare, tum detergere possit. Quippe quod super hunc fuerit, ita, vt non modò humoris qui influit, redundantiam cõsumat, sed etiam affluentem sanguinem populetur, id refici carnem (vt Galenus inquit) ceu materiem eius absumens prohibebit. Itaque præsentī negotio aptissima sunt, thuris lachryma, & hordeacea, & fabacea, & erui farina, & iris, & aristolochia, & cadmia, & panax, & pompholyx, quæ vulgò tutia dicitur. Omnia verò hæc tum maioris, minorisq; discrimine inter se diffident, tum

*Hypothe-
sis.*

*In carnis
generatio-
ne, duplex
provenire
solet excre-
mentum.
Sanies.
Sordes.*

*Medicame-
tum carni
producenda
idoneum.*

Ex 3. method.

alia eorum simplices qualitates vincētes habent, alia conpositas. Siquidem aristolochia, & panax, tum ceteris plus co-
siccant, tum natura magis calent: hordeacea fabarūmq; fa-
rina, multo his minus siccant, nec vllū calorem obinēt.
Thus modicē calet, minus tamē illis siccet: adeo vt quāsdā
corporum naturas omnino non siccet. Erui farina, & iris,
horum, atq; aristolochiæ, & panacis, mediū locum tenent.

*Secūda in-
dicatio cu-
randi caui
vulneris.
Dnas esse
primarum
indicatio-
num diffe-
rentias.*

Secunda indicatio curandi vulneris caui, quæ (vt suprà
dictum est) tum ex corporis totius, tum ex particulæ labo-
rantis temperamento sumitur, insinuat nobis medicamen-
ta, vel calidiora, vel frigidiora, vel humidiora, vel sicciora,
ipsi vulnere esse admouenda: nempe pro natura, ac tempe-
ramento, & totius, & afflictæ particulæ. Scire nanque li-
cet (vt Galenus ait) duas esse primarum indicationum dif-
ferentias, quarum vna ab eo, quod secundū naturam se
habet, altera verò ab eo, quod præter naturam est, sumitur.
Porro quod secundū naturam se habet, sui custodiam in-
dicat, & propterea quæ similia sui sint, postulat. Quod ve-
rò præter naturam est, sui ablationem desiderat: proinde
& contraria requirit. Perit enim quidque in contrarium, &
à contrario. Igitur vulnus quidem (quia præter naturam
est) quo est humidius, eo sanè medicamento, quod magis
siccet, indiget. Corporis verò natura (propterea quod se-
cundū naturam est) quanto est humidior, tanto, quod
minus siccet, medicamentum postulat. Proinde, si qua sunt
in diuersis corporibus vulnera vlceraue, quibus par adfit
humiditas, quod in sicciorē corporis temperamento con-
sistit, vtique magis siccari postulat, quod in humidiorē, hoc
sanè minus, quo natura (inquit Galenus) naturæ interest.
Siquidem productam carnem, ei quæ præfuit, similem esse
oportet. Vbi igitur pristina siccior fuit, nouellam quoque
sicciorē fieri conueniet. Quare vberius hæc siccari po-
stulat: quantoque magis sicca fuerit, tanto quod admove-
tur medicamentum, magis siccam facultatem habere de-
bebit.

*L. 3. meth.
meden.*

*Thus in
quibus, in
naturis, in
vulneribus
carnē pro-
ducit.*

At in humidiorē natura, tanto rursū iis quæ minus
siccant, medicamentis est opus, quanto caro ipsa minus est
sicca. Quò sit, vt thus (quod cum temperatis, & mediis
naturis consentit) in quibusdā, tum vlceribus, tum naru-
is, pus quidem mouet, carnem non producit: in quibus-
dā etiā carnem producit. In humidiorē nanque natura
siccare,

ficcare, & producere carnem potest, in sicciore non potest, imò humectat, ac superatur à natura, proinde & putrefacit. Præterea in modicè humidis vlcerebus, tum recentibus (quæ hic vulnera & plagas appellamus) tum diuturnis, & iam inueteratis, carnē efficere potest, quippe quòd moderatè deficcet. In iis verò, quæ præhumida sunt (quòd non satis deficcet) prorsus non potest.

Tertia indicatio nobis insinuat inueniendum esse remedium, quod proportionè, & statuto quodam ordine gradùve, ipsis affectibus, qui simul cum ipso vulnere incidunt, respondeat: illòsque ipsos affectus prius summouendos esse, quàm ipsum vulnus carne implere tentemus. Itaque si intemperies vulnere accesserit, atque exulcerata vulneratave caro, vel prius etiam ex quauis occasione, vel ipso vulnerationis tempore, iusto calidior, frigidiorve sit effecta: utique medelam exigit, quæ non modò moderatè siccet, sed etiam intantum calfaciat, refrigeretve, in quatum subiecta caro à naturali suo habitu recessit. Fieri enim non potest, (inquit Galenus) ut in vlcere, vel carnis pro ductio, vel sinus impletio, vel agglutinatio, vel cicatricis, inductio (quæ omnia naturæ sunt opera) rectè vnquam cedat, nisi subiecta caro pro naturali modo se habeat. Quocirca legitimi vlceratorum, seu vulneratarum partium temperamenti maior tibi sollicitudo erit, quoties eas, vel carne implere, vel glutinare, vel cicatrice inducere studes. Itaque congruis, atque opportunitis auxiliis, aduersus illos, qui cum vulnere incidunt affectus, pugnare oportet, priusquam vulneris ipsius curationem aggrediamur. Veluti igitur si phlegmone vnà cum vulnere esset, nemo vulnus ipsum, vel carne implere, vel glutinare, vel cicatrice inducere, attentare debet, priusquam illa discussa sit. Ad eundem arbitror modum etiam, si sine phlegmone sola subiat intemperies, nullum horum fore prius sperabimus, quàm illa sit sanata. Quòd si hæc ita, ut dictum est, se habent,

inspici etiam cōueniet circundantis nos aëris temperiem. Siquidem (ut tertio methodi Galenus ait) veluti medicamentum quoddam, is quoque corporibus nostris forinsecus incidens, vbi immodicus calore, vel frigore est, sanationem remoratur. Danda igitur opera est, ut medicamenta excessui [ipsius ambientis] occurrant. Ideoque

Hippoc

3
Tertia indi-
catio curā-
di vulneris
cani.

Li. 3. meth.

Circūdāti-
onē nos aëris tē-
perie in cu-
randu vul-
neris maxime
spectandū
esse.

Hippocrates. In calidioribus anni temporibus, iis, quibus a frigidior facultas sit, medicamentis utitur, calidioribus, per frigida. Adeo (inquit) perpetuo verum est illud theorema, Quæ secundum naturam sunt, similium sibi, indicatiua sunt: quæ præter naturam, contrariorum, si modo saltem illa seruari, hæc summoueri desiderant.

Que nomine ambientis intelliguntur.

Porrò ambientis nomine hoc loco, & præsentis status, seu anni tempora, & etiam regiones, cum Gall. intelligimus.

4. Quarta indicatio curandi vulneris cavi.

Quarta indicatio particularis in sanando cauo vulnere obseruanda, sumitur (vt superius dictum est) à contrarietate indicationum: non quidem earum, quæ in diuersis temporibus perficiuntur, sed earum, quæ in vno, eodémque tempore ipsius curationis subinde offeruntur. Vt exempli gratia, si ægri temperamentum iusto sit humidius, particula verò ipsa quæ laborat, sicciior, aut contra, quòd hæc sit humidior, & totius temperamentum sicciior. Pari modo in calore, & frigore, quòd contrario temperamento sit pars cum toto. Diuersa sanè in his est ea, quæ à patiente particula accipitur indicatio, ab ea, quæ ex ægri sumitur natura. Itaque hæc particularis indicatio, quàm quartam in ordine posuimus, insinuat nobis medicamenta, vel humidiora, vel sicciiora, vel calidiora, vel frigidiora, aut prout res postulabit, media, ac temperata, deligenda esse, quæ ipsi vulneri admoveantur. Statuimus igitur clarioris doctrinæ gratia totum corporis laborantis temperamentum humidius esse, eoque medicamenta desiderare, quæ minus siccant, ipsam verò ægram particulam ex earum numero esse, quæ sicciiores sint, qualia sunt ea, quæ minus carnosæ conspiciuntur. Cuius generis sunt, quæ circa digitos, & articulos habentur: præterea, quæ circa aures, & nasum, & oculos, & dentes sunt ac vt semel dicam, vbi crebræ cartilagine, & membranae, & ligamenta, & nerui sunt: adeps verò & caro, vel omnino nulla est, vel perquam exigua. In hac siquidem hypothese, si quanto ægri temperamentum iusto est humidius, tanto particula iusto sit sicciior, nec adiciendum, nec detrahendum pharmaco quicquam est, sed tale adhibendum, quale si vlcus, vulnusve, in medijs temperamenti particula cõsisteret. Sin sicciior debito particula fuerit, quàm corporis

Hypothesis ex lib. 3. the.

corporis temperamentum iusto est humidius, utique in tantum intendi siccitatem medicamenti conueniet, quantum particulæ temperamentum, totius temperamentum excedit. Veluti si quatuor numeris sit pars exulcerata 5 medio temperamento siccior, ægri verò natura gradibus tribus humidior, manifestum est particulam, quæ nunc vulnerata exulceratæve est, siccius vno gradu desiderare medicamentum, quàm pars quæ sit temperata cæteris paribus. Sed ut hæc omnia coniectura sola cognosci possunt, ita longam in hominum naturis, & medicamento- 10 rum facultatibus contemplandis, exercitationem postulant: nec est præterea, quòd de indicationibus, quæ à calido; & frigido sumuntur dicatur. Quandoquidem ad portionem dictorum intelligi possunt. Videsne igitur 15 clarissimè, quot huic theoremati sit opus, qui probè ac certa methodo curare vulnus cauum voluerit.

Nam postquam inuentum est, humorem omnino huic vitio inesse, utique siccans medicamentum parandum indicauit. At quoniam ipsorum siccantium quædam inagis 20 siccant, quædam minus, partim ex vulnere diuersitate, partim ex ægri natura, quod expedit, est desumptum. Itaque non modò de corporis natura meditatæ sit oportet, quisquis commodè, & ex arte sanare vulnus eiusmodi studet, verùm etiam diligenter speculationem omnem de medicamentis didicisse, tum sicci humidique corporum tem- 25 peramenti notas callere. Adhæc tum ambientis temporis (quæ utique tum ad præsentis status, seu anni tempora, tum verò regiones extenditur) tum partium naturæ, tum indicationum inter se pugnantium contrarietas, ei- 30 dem consideranda sunt. Verùm enimverò Thessalus, & plerique alij medici, qui etiam illum hodiè imitantur, ista quidem nec inquirunt, nec norunt. Sed iuxta prouerbum mali sutoris modo: vno calopodio omnes calceant, nullo naturarum, aut partium, aut id genus aliorum facto di- 35 scrimine. Cæterum apud recentiores chirurgos in curando hoc vulnere, communis hic modus observari solet. Stata iam sanguinis profusione, & parte affecta, ab inflammatione, & dolore vindicata, vino calente vulnus abluitur: mox ipso perluto, ac desiccato, puluis aliquis carnem regenerans, aut vnguentum aliquod sarcoticum ad- mouetur.

*Epilogus
preceden-
tium.*

*Praxis cõ-
muni.*

mouetur. Itaque linamenta iis sarcoticis (quorum libro sexto abunde meminimus) imbuta, aut conserpsa, in finem vulneris demittuntur. Post hæc stupæ aridæ, vel quæ vino maduerint, superponuntur. Ac demum, quæ medicamenta approbè continere possit, deligatura adhibetur; atque æstate bis, hyeme semel duntaxat, auxilia eiusmodi permutantur. Porro eiusmodi medicamina, quæ vulnorum, atque vlcerum cavitates implent, mediocriter, citràque morsum abstergentia sunt, vt libro quinto simplicium medicamentorum Galenus annotauit.

10

De vulnere impleto siue æquali.

CAP. VII.

*Methodus
inducenda
cicatricis.*



Aeterum vbi vulnus purgatum, impletumque carne fuerit, æquale tunc, siue æquabile, latum, planum, atque impletum nominatur. 15
Hoc autem cicatrice tantum induci postulat. Porro vt ad cicatricem perducatur, amissa

scilicet cuticulam, quæ epidermida Græcè vocauimus, desiderat. Hanc igitur tum regnare, tum sibi vnire oportet. Verum cum ex semine ortum habeat cutis, talis omnino, 20
qualis erat, quæ periit, prorsus regigni non potest, simile quiddam tamen cuti, & quod eius officium suppleat restitui potest: non tamen planè cutis. Quando igitur vt cutis regeneretur, fieri omnino nequit, quod superest, efficere est tentandum: nempe instaurare aliquid, quod cuti deper- 25
ditæ simile sit, & carni sit veluti naturale aliquod tegumentum. Id enim est vulnus iam repletum, planumque redditum, ad cicatricem ducere. Qui finis est, quæ nunc hic præ-
tendimus. Huius itaque efficiendi ratio hæc est. Portio quæ-
piam subiectæ carnis nuper genitæ, & restitutæ (ea scilicet, 30
quæ summo tenus euidenter apparet) sic alteranda est, vt non amplius caro permaneat sed veluti cutis euadat. At
quo pacto inquires ita alterabitur? profectò alicuius alteran-
tium qualitatibus ope. Ergo (vt Galenus ait) quoniam 35
cutis carne ipsa tum siccior est, tum etiam densior, si carnem siccabimus, & adstringemus, cuti etiam persimilem reddemus. Et hæc quidem est medicamenti: quod cicatricem inducit, summa. Verum ea non satisfacit: nam & glu-
tinatoria, tum siccabant, tum etiam adstringebant, sicuti
& epulotica, id est, cicatricem inducètia. Adiciendum ergo est,

*Cutis eadē
specie cū ea
quæ perijt,
regigni nō
potest.*

*Li. 3. meth.
med.*

go est, quo ordine gradatim siccare debeant medicamenta: quæ cicatricem inducunt, quemadmodum & de sarcoticis, & glutinatoriis fecimus. Id autem ex ipsa rerum substantia facile inuenies. Epuloticum nanque, id est, cicatricem inducens medicamentum, non modò qui influit, humorè (vt glutinatorium) sed eum quoque, qui in ipsa carne subiecta continetur, consumere debet. Quò fit, vt multo profectò siccius, quod cicatricem inducat, quam quod agglutinet medicamentum esse conueniat.

Epuloticorum facultas.

10 Itaque tres gradus desiccantium medicamentorum, in curatione vulnerum necessariò statuendi sunt. Nempe sarcoticorum, id est, carnem regredientium, quorum facultas ex primo ordine est desiccantium. Agglutinatoriorum: quæ secundo gradu, vel etià tertio resiccant. Et epuloticorum hoc est, cicatricem inducentium, quæ siccandi facultate prædicta adhuc superant. Hæc enim non accidentalem modò,

Tres gradus desiccantium medicamentorum, in curatione vulnerum statuendos esse.

& confluentem (quæ præter naturam est) humorum redundantiam desiccare, ac consumere debent, sed eum quoque humorem, qui secundum naturam est, & in ipsa (vt dictum

Sarcotica. Agglutinatoria.

est) subiecta carne continetur. Quod & sequentibus ver-

Epulotica.

bis Galenus testatus est, Glutinatio (inquit) vñ id propositum est, vt eius quod præter naturam est, redundantiam consumat. Qui cicatricem inducet, non hoc modo, verum etià vt ei, quod secundum naturam se habet, ali-

quid deradat. Priusquam igitur vulnus cicatrice possimus obducere, eo usque resiccanda caro est, donec calli similitudinem induerit, & cuti similis euaserit. Quod sanè per se primariò, ac propriè, hoc est, peculiari facultate medicamèta effecerint, quæ adstringendi modicè facultatè habent

Epulotica propriè dicta quæ facultatè habeant.

& eiusmodi quidem, vt plurimùm frigida sunt, & sicca. Cuius generis reputantur, galla immatura, malicorium, id est, mali Punici seu Granati cortex, balaustium, qui flos est sylvestris Punice, fructus spinæ Aegyptiæ, vel eius loco acacia, rhus, seu sumach, & eius generis vniuersa, quæ

modicè adstringunt, atque desiccant. Per accidens verò, & secundariò carnem alterando, & calli instar indurando cicatricem etiam inducunt calida medicamina, quæ carnem detrahere, ac colliquare sunt nata, Galeno libro quinto simplicium cathartica, id est, detractoria dicuntur vulgò autem consumptiua. Cuius generis sunt

Cicatricem per accides inducètia. Cathartica.

chalcitis,

chalcitis, & æs vstum non lotum: quod enim lotum est, verè est epuloticum: & æris squamma, & misy, & fissum alumen, & quod vulgò vitreolum appellatur. Quæ prædictis verè epuloticis: id est, primario, & ex sua facultate cicatricem inducentibus, multò sunt valentiora. Misy quidem, & chalcitis præcipuè. Mitior autem æris squamma, atque etiam hoc mitius æs vstum, quod etiam si lauabis: vtique (inquit Galenus) minus mordens medicamentum habebis. Itaque si quando iis vti ad cicatricem inducendam in aliorum penuria, cogimur, parcissimè ipsis vtemur: largius enim admota, mordicant colliquantque carmen, & vlcus cauum efficiunt. Summum igitur tantum specillum, hoc est, specilli cuspidem, in ea ad exactissimum læuorem tusa dimittemus, ac post velut tenuissimum quendam pollinem partibus, quæ cicatrice induci postulant, leuiter eas contingentes, imponemus. Quòd si illa etiam aduras, vt minus acria sic ad cicatricem inducendam, reddes magis apta, si verò etiam laues, adhuc fient mitiora. Sed de his locupletius, atque accuratius dicemus in antidonatorio, & in tractatu de vlceribus.

29

De cicatricibus reparandis in vulneribus.

DEformes, atque indecoræ cicatrices, teneræ quidem adhuc, & recètes instaurantur Razi, admoto diachylo, aut lithargyro (vt vocat) nutrito. Cicatrices nigras tollunt, oleum in quo radix bryoniæ tum candidæ, tum nigræ incocta sit, dum succum reddat impositum: calamintha ex vino cocta, argenti quoque spuma cum rosaceo albo lota. Crassiores verò, & iam inueteratæ reparentur oleo balsamite appposito, vel radice cucumeris sylvestris (quem asinipum vocant) trita, & apposita. Quòd si his, aut similibus non tollantur, id totum quod supereminet, atque excreuit cultro rasorio rescindendum est, vel cauterio amouendum. Crustam verò resolues admoto gallinæ, aut anatis adipe, vel etiā mastiche. Hæc quidem in iis agenda censent recetiores chirurgi. Verum Cornelius Celsus stultum esse existimat, si vel excreuit cicatrix, vel cōcaua est, decoris causa rursus & dolorē, & medicinā sustinere. Alioqui (ait) res vtrique succurri patitur. Siquidē vtraq; cicatrix exulcerari scâ pello potest. Si medicamentū aliquis mauult, idem efficiunt

30

35

efficiunt compositiones hæ, quæ corpus exedunt. Cute exulcerata, super eminentem carnem, exedentia medicamenta coniicienda sunt, super cōcauam, implentia, donec vtrunq; vlcus sanæ cuti æquetur, tum cicatrix inducatur.

5 *De vulnere supercrescentem carnem habente, quam Græci hyperfarcosin vocant.*

CAP. VIII.



10 **V**lnus quod hyperfarcosin, id est, supercrescētem carnem habet, morbus est ex eo genere, quod in quantitate magnitudinēve partium spectatur, quemadmodum & cavitās erat, de qua paulò antè egimus: ergo veluti vulnus cauum, non vnum est virium, sed pariter cavitās, & vulnus.

15 Ita vulnus aut vlcus, quod supercrescentem carnem habet, non vnus est morbus, sed simul caro supercrescens, & vulnus vlcusve. Prior morbus, qui instrumētarius est (nempe magnitudo, quæ præter naturam est) primā indicationem (quæ veluti meta est inueniendorum remediorum) nobis insinuat, ipsius scilicet exuberantis, & præter naturæ modum excrecentis, ablationem. Alter verò morbus

20 qui communis est (nempe soluta vnitio) coniunctionem indicat. Porro ipsa agglutinatīo, seu dissidentium coniunctio, uti & carnis generatio naturæ quidem opera (ut prius diximus) perficitur. At supercrescentis carnis detractio,

25 nullum quidem (inquit Galenus) naturæ opus est, sed solis medicamentis, seu medicamentorum ope perficitur, quæ vehementer exiccent, & natura acria sint: cuiusmodi sunt, atramentum sutorium, quod Græcis chalcantum dicitur, chalcitis seu vitreolum, sponsia, radix asphodelorū,

30 hermodactyli, stupæ minutim incisæ, linamenta è panniculo carpta muria acriori imbuta, & resiccata, vnguentum viride, & id genus alia tum simplicia, tum composita, quæ ex libro sexto sunt requirenda. Cæterum id vnum semper

35 fidelī memoria obseruandum moneo, nempe pro diuersis corporum & partium temperamentis, varianda esse remedia. Eadem enim medicamenta quibusdā naturis carnem excrecentem infumunt, aliis verò cicatricē inducunt, aliis solum glutinatorio minus præstant. Eiusmodi nāq; medicamenta quæ carnem minuunt (septica Græcis impropria quidem appellatione, dicuntur) proxima sunt, tum iis quæ

Vlcus supercrescentem carnem habens, non vnus est morbus.

Carnis detractiōne medicamentis perfici, non opera naturæ lib. 3. metho.

Septica, id est, carnem minuētia.

valenter detergent, tum iis quæ cicatricem inducunt. Sic
 vt non pauci interim (inquit Galenus lib. 3. methodi me-
 dendi) per errorem medicamētum, quod carnem minuit,
 vel pro eo quod sordem deterget, vel pro eo, quod cicatri-
 cem inducit accipiant. Exempli gratia misy, & chalcitis
 (quæ inter cicatricem inducentia annumerauimus) si na-
 turæ humidæ applicabis, potius carnem demere, quam ci-
 catricem inducere deprehendes. Adde quòd inter eiuſmo-
 di septica, quæ carnem tenellam vulneribus, atque vlceri-
 bus supercrescentem colliquant, & abſumunt, quædam va-
 lentiora sunt, quædam imbecilliora, & mediccra. Quo-
 circa nonnulla mediocres carnis supercrescentias exedūt.
 Alia verò maximas hyperſarcosis, id est, carnis immodicas
 excreſcentias minuunt, & ad vsque penitiora cruſtis obdu-
 cunt. Cuius generis est, quod recipit calcis viuæ, squammę
 æris, & mannæ thuris pares modos. Sed de iis quidem ad-
 huc locupletius libro ſexto dicitur: quare ad reliquas vul-
 nerum differentias properandum est.

*De vulnere conuulſo, ab aëre alterato, dura, calloſaſque labra
 habente, cruciante, & phlegmone, aut alio præter naturam
 tumore, implicito.*

CAP. IX.



Vlneris (vt in præcedētibus demōſtrauiſmus)
 qua vulnus est, ſanatio, mediocris ſiccatio est.
 At vlneris, quod cum alio affectu coniun-
 ctum est (cuius videlicet præcedere curatio-
 nem oportet) eius curatio, vt vulnere ſolius
 non est, ſed prior illius affectus: qui cum vulnere conſiſtit,
 ſecunda verò ipſius vlneris: nam ſiue phlegmone quępiã,
 ſiue pigritia ſiue ecchymofis, ſiue eryſipelas, ſiue tumoris
 qui œdema dicitur, vlceratam, vulneratãve carnem ob-
 ſederit, primum eius molliẽda curatio est. At verò quod
 vulnus interim non ſolum non cõmodè curatur, ſed mul-
 to etiam maius redditur, id neminem (inquit Galenus) la-
 tere puto. Itaq; ſiue conuulſa fuerint circumpoſita vulnere
 loca, ſeu phlegmone, aliũve tumor præter naturam in his
 conſiſterit, propria eius affectus ſanatio inuenienda nobis
 eſt: illud pro certo habentibus, fieri non poſſe, vt vulnus ſa-
 netur, niſi locus, in quo conſiſtit, prius ſit ſanatus. In eiuſ-
 modi igitur vulneribus, ſuppoſito cõmuni regimine phle-
 botomiæ, purgationis, & dietæ (quandoquidem hi affe-
 ctus

Etus præterquam quòd vulnera ipsa ad cacoëthiam præparant, fluxionem etiam in vnum locum dolentem excitant, auocantque, tamen etiam corpus nec sanguine, nec villo succorum vitio redundet) topica, seu localis curatio communis est, agglutinationem prohibere, & fluxionem arcere.

Quocirca rectè mihi fecisse videberis, si in contuso, cruciante, & phlegmonoso vulnere, statim per initia, loca circumiacentia illiueris, vel rosaceo, vel myrtino oleo, vel vnguento, quod constat bolo armenia, oleo, & aceto. Supra

Vulu. contusi. recta curandi ratio.

10 verò dolentem partem oleum aliquod admoueris, quod vel leniendi, vel molliendi, vel maturandi (vt res exigit) vim habeat. Ponamus igitur carnosam aliquam partem

Hypothesis.

lam telo tum cæsam, tum contusam esse: huic sane ita ex Hippocratis sententia medendum est, vt quàm celerrimè

15 suppuret. Necesse enim est, carnes sic contusas, putrescere, & in pus verti. Postquàm verò sic per quandam putrescentiam in pus versæ fuerint, liquari, & tandem nouam carnem nasci. Adde, quòd hæc curandi via, & ratione obseruata, minus (eodem Hippocrate autore) phlegmone vr-

20 gebitur caro ipsa sic cæsa, contusaque. Duæ igitur intentiones in curando vulnere contuso, nobis proponuntur: nempe suppuratio, & nouæ carnis generatio. Porro cum suppuratio cum quadam fiat putrescentia, & omnia quæ putrescunt (Galeno autore) ex calido, & humido sic afficiantur, nimirum quæ calfaciant, humectentque, hisce contusis vulneribus, atque adeò omnibus iis affectibus, quibus moueri pus expedit, admoquebimus. Cuiusmodi

Gemina intentio, in curando vulnere contuso proponitur. Ljb. 4. Therap.

sunt, maluæ costæ, radix althææ, tetrapharmacum, panis triticeus, hordei farina ex aqua, & oleo: itemque panis ex

30 aqua & oleo. Præterea fomentum multæ calidæ aquæ: hæc enim, & similia omnia quæ sic calfaciunt, & humectant, celerrimè pus mouent. Horum autem materiam copiosam habes libro præcedente de tumoribus præter naturam: & in antidotario; item libro quinto de simplicibus.

35 Verum enimverò non fuerit alienum, hîc vnum, atque alterum compositum medicamentum subiicere, quod ad sup-

» purationem in proposito vulnere beneficiat. Recipe radi-

» cis althææ, cucumeris agrestis, singulorum vnciam semis,

» origani agrestis, hyssopi ana manipulum semis, florû cham-

mæmeli, seminis lini, ana pugillum vñ, ficus pingues sex,

Ex Auic. sen. 3. quart.

uas passas pari numero, vnà bulliant, ac tandem iis pres-
 sis, ac diligenter tuis, adde galbani, myrrhæ, styracis liqui-
 dæ, æsopi, ana drachmam vnā semis, sanguinis draconis,
 adipis porci, ana vnciam semis, componatur malagma.
 Conducit plurimū ad eandem intentionem assequen-
 dam, & infra scriptum medicamentum, in formam em-
 plastrū redactum. Accipe foliorum maluarum, & violarum
 ana manipulum vnum, radicis althææ libram semis: deco-
 quantur in iure carniū absque sale, postea subigantur in
 mortario, & cribro incernantur, ex cribratura cum prædi-
 cta decoctione, & farina hordei, ac tritici, ana quantum sa-
 tis esse videbitur, fiat emplastrum solidum, siue malagma,
 addendo butyri, & olei communis singulorū vncias tres,
 vitellos duorum ouorum, & croci momentum. Hoc au-
 tem, vt & præcedens malagma super vulnus, & contusam
 carnem, dandum est. In ipso verò vulnere imponi debet
 digestiū (vt vocant) ex terebinthina resina, & ouorum,
 luteis. Cæterū perducto ad suppurationem vulnere,
 his, quæ pus mouent, relictis, ad purgantia, & detergentia
 transeundum erit, vt sunt, tincta in melle linamenta, mun-
 dificatiū ex apio, & id genus alia, quæ in antidotario
 descripta inuenies. In omnibus autem eiusmodi vulneri-
 bus, rectè inditur turunda melle rosaceo, aut vnguento
 Apostolorum nuncupato, imbuta. Suprà verò id purgans,
 detergensve medicamentum, stupæ aridæ dandæ sunt: ad-
 aptandaq; est deligatura, quæ admota medicamenta pro-
 bè retineat, donec perfectè expurgatum vulnus fuerit.
 Tum demū autem purū vlcus est (inquit Celsus) cū
 rubet, ac nimium neque siccum, neque humidum est. Ac
 quodcunque sensu caret, quod non naturaliter sentit,
 quod nimium aut aridum aut humidū est, quod aut pal-
 lidum, aut albidum, aut liuidum, aut nigrū est, id purum
 non est. Purgato, vt decet, vulnere, carne ipsum implere
 oportet, quæ secunda erat in curando hoc contuso vul-
 nere, intentio. Carnem igitur modo, quo suprà diximus,
 generare oportet, & iam impletum vlcus ad cicatricem
 perducere. Quem scopum faciliè assequeris, si turundam
 indies paulatim imminueris. Ita enim solius naturæ ope-
 ra, ac citra vllum medicamentum, vlcus carne implebitur,
 & cicatrice obducetur. Quod si caro multū esset dila-
 cerata

*Emplastrū**Digestiū
vulneri im-
ponendum.
Detergen-
tia quando
admonēda.**Stupæ ari-
dæ.**Cor. Cels.
lib. 5.**Intentio
curadi vul-
neris cōsisti**Si caro cō-
rufa multū*

- cerata, & sutura utilis videretur, consuatur laxa quadam
 sutura, labia retinente. At si labra vulneris ab ambiente
 alterata fuerint, ac dura, callosa q; appareant, scalpello illa
 (modò nulla alia obstiterit dispositio) corium amouendo,
 5 renouare oportebit: deinde consuere. Porro si cæsa contu-
 sa q; caro enumeratis modò auxiliis, ad suppurationem
 perducì non possit, videatur q; in gangrænâ, ac partis
 corruptelam degenerare (quod ex tardâ, difficiliq; matu-
 ratione, & fusco, liuido, aut nigro loci affecti colore, de-
 10 prehendes) vnguentum Aegyptiacum nominatum, capi-
 te de curatione gangrænæ descriptum, aut aliquod aliud
 simile medicamentum, quod ad eiusmodi corruptionem,
 & mortificationem sit idoneum, protinus erit ad mouen-
 dum. Quòd si alia quædam symptomata, vel affectus, huic
 15 contuso vulnere superuenerit, vt dolor, phlegmone, aut
 quouis alius tumor præter naturam, aduersus illa cõgruis
 (quæ suo loco dicta sunt) remediis erit pugnandum.

- De ecchymosi seu ecchymomate, id est, sanguinis subter-
 cutem effusione, & coitu, quod vnâ cum contu-
 20 sione, ruptione q; cute integra manente,
 hoc est, non vulnerata, incidit.

C A P. X

- 25 **E**cchymoma, id est, sanguinis subter cutē ef-
 fusio & coitus, solutæ continuitatis genus
 quoddam est, quod plurimum (vt libro quar-
 to methodi ait Galenus) vnâ cum contusio-
 ne, ruptione q; incidit. Quocirca non fuerit à
 proposito alienum, si propter affinitatē, quam habet cum
 prædicto vulnere, pauca nunc obiter de eo dicamus. Itaq;
 30 incidit interdum hoc vitium, cum sola contusione, citra
 carnis musculosæ, in profundo hærentis corpore, ruptio-
 nem, quod Græci rhegma appellant: vt ex violento ictu,
 vel graui casu. Aliquando verò cum sola ruptione, absque
 etiam contusione carnis (quod Græcis sarcothlasma &
 35 thlasma dicitur) consistit: vt cum motu quopiam va-
 lente, & confertim facto, citra graue aliquod extrinsecus
 incidens, caro disrumpitur. Nonnunquam etiam
 cum vtroque, vt cum graui, ac duro quopiam corpore,
 quod extrinsecus superinciderit, vel casu ab alto, non mo-
 dò carnosæ musculorum partes, sine cutis diuortio cõtun-

Ecchyma
sis quidēEcchyma
ma à qui
bus occasi
nibus exci-
terur.

Ecchymosis nota.

4

Anastomosis unde excutitur. Libr. 5. the. Diapedesis unde oritur.

Species ecchymomatosis.

IVDICIA de ecchymomate.

duntur, sed etiam ex distentione violenta, & confertim facta, abrupuntur. Tunc enim venis exiguis, in ea sic con-
tusa ac rupta carne, diuortium expertis, sanguis exilit, unde ipsum ecchymoma sub cute collectum nascitur. Cuius
apparentes notæ sunt, tumor mollis, & tactui cedens, liui-
dus, & magna ex parte indolens. Fit autem etiam ali-
quando ecchymosis, & ex oris vasorum apertione, quam
anastomosis vocant, & ex ea, quæ à nonnullis diapedesis
dicitur, id est, transcolatio, exilitio, vel transmissio, aut sub
sultus. Porro accidit anastomosis propter tum vasis im-
becillitatem, tum sanguinis, qui ad os eius impetu ruat,
copiam. Adhæc, ob acrem quampiam, quæ illi extrinse-
cus incidat, qualitatem. Diapedesis ex tunica quidem ipsa
rarefacta, sanguine verò tenuato oritur. Accidere præte-
reà interim potest, & ex gracilium vasorum ore adaperto.
Verum de ea tantum ecchymosis nunc agitur, quæ contu-
sionem, vel ruptionem consequitur. Hanc igitur ecchy-
mosim propter solutam vnitatem affatim factam, dolores,
& ob sanguinis in profundo concursum, abscessus non-
nunquam insequuntur, qui magna ex parte per halitum
digeruntur. Species autem ecchymomatis sunt hypopia,
quæ Romani suggillata vocant, & liuores ex ictu proue-
nientes, Græcis hyposphigmata nuncupata, quæ & inter-
preti Auicennæ vestigia percussione, Latinis verò propriè
vibices, dicuntur.

Ecchymoma quod cum magna, ac violenta contusione
incidit, periculo non vacat. Solet enim frequenter (si ne-
gligatur) non modò afflictæ particulæ, sed & corporis to-
tius corruptionem adferre. At si forsàn in contusione,
quæ cum ecchymosi consistit, cutis à carne seiuncta, ma-
neat pendula, rarò vel nunquam agglutinatur. Proinde
satius est, eam præscindere, & exiccantia medicamenta ad-
mouere, vel absque deligatura, locum sic excoxiatum relin-
quere. Aër nanque ambiens cutis ipsius instaurationem
non mediocriter adiuuat.

*Curatio ecchymomatis, quod vel contusio,
vel ruptio excitauit.*

Li. 4. met.

Cæterum, quoniam ecchymosis seu ecchymoma, plu-
rimùm (vt Galenus ait) vnà cum contusione, ruptione-
neque incidit, idcirco in ipso curando, plures erunt indi-
cationes

cationes obseruandæ. Semper enim pro affectuum numero, etiam medendi indicationes respondent.

Prima indicatio est, fluentem ad locum affectum materiam vacuare, & auertere. Quod optimè quidem fit, autore Auicenna, venæ sectione; quam omnes etiam artis periti, in hoc affectu imperant; quamuis corpus mundum, hoc est, purum ab excrementis, fuerit.

1 *Indicatio in curanda ecchymosif, obseruanda.*

Secunda intentio est, dolorem sedare, & partem læse, ne fluxionem excipiat, robur adferre, rebus frigidis, & styptioris eam perfundendo, atque illinendo. Vnde Razes, & Læfrancus partem eo vitio laborantem, iungebant rosaceo, & post unctionem, puluere myrtillorum respergebant, ac mediocri deligatura stringebant. Verùm cūimvero in communi vsu obseruatum est, vt per initia oui candidum rosaceo permixtum, loco dolens, ac sic effecto, admoveatur.

2 *Intentio.*

Tertiò, curationis consilium est dirigere debemus, vt sanguinem ipsum totum, qui subter cutem effusus est, dissipemus, ac resoluauius, idque confectum, priusquam nigruerit, & in grumos iam coierit. Quod factu quidè haud difficile erit, si & sanguis effusus tenuis, & propè summam cutem, non autem in profundo situs, fuerit. Quòd si discuti non possit, tum infra scriptis digerentibus medicamentis, tum scarificationibus educendus erit, & si nihil hæc promouerint, affectus eiusmodi more abscessuum curandus erit. Itaque sanguinis sic per contusionem,ruptionemque, subter cutem dispersi, dissipatio, & vacuatio, ecchymomatosis, quæ ecchymoma est, propria est curatio, vt libro quarto methodi medendi iis verbis Gale. testatus est.

3 *Intentio.*

Sanè (inquit) ecchymosis omnis vacuatione pro remedio curationis indicat. Quare calfacientibus huic, & modicè siccantibus medicamentis est opus [quale est ex nigris populis acopon.] Quippe quæ vehementer siccant, digerunt illa quidem in principio euidentius quàm quæ sunt imbecillia, cæterùm nonnihil ipsius vitii scirrhusum, difficileque curatu relinquunt. Curandum verò est, vt ruptis, quæ in profundo hærent corpore, hæc tum vires habeant magis intentas, tum ipsa magis acria, magisque dissipatia sint, tum (vt semel dicam) tantò efficaciora, quato magis à cute ad profunda ecchymosis recessit. In talibus sanè nec cucurbitæ vsus sit inutilis: id enim instrumentum, ad violentum

Propria ecchymomatosis vacuatio.

Omni ecchymosin vacuatione indicare.

Cucurbitule vsus.

quibus ec- attractum, à medicis est excogitatum. Verùm enim uero, quoniam tunicæ venularum, ex quibus sanguis exiliit, chymomata in viliis. cõfusæ sũnt, per initia sanè (vt Galeno, & Paulo visum est) nonnihil ex adstringentibus, iis quæ digerunt, admiscere oportet. Contusæ enim illæ venularum tunicæ, aliquam densationem requirunt, vt ad naturalè suum statum reducantur, & ne noua materia ob dolorem attracta, ad locum contusum delabatur. Quandoquidem si solam digerentem vim haberet medicamentum in principio applicatum, non modò id quod effusum est digereret, sed & per contusionem aliquid sanguinis, qui contusis venulis continetur, extraheret, vt testis est Gal. lib. 5. de compositis medicamentis secundum locos. Quando autem in naturalem statum venulæ redierint, citra adstrictionem ad sola digerentia medicamenta venire tempestiuum est. Porro in quibus fieri modicè adstringentium quiddam, nec non per halitum digerentium miscere conuenit perspicuum est, imbecilliora primùm debere assumi: validiora autem inueteratis, & iis quæ nigrescunt, admoueri. Ad inueterata igitur ecchymomata, Paulo etiam autore, radícula illitu prodest: quippe discutit ea, vbi erodere inceperit: vel ipsius radiculæ succus, cum micis panis inductus. Cæterum ex moderatè digerentibus, quæ vulgò resolutiua domestica vocant, hæc sequentia sex auxilia in communem vsum veniunt.

Ad inueterata ecchymomata.

Primum constat vino, melle, & sale.

Secundū ex farina hordei, cataminthe, & vino cõficitur.

Tertium recipit ceram, & cuminum.

Quartum fit ex floribus chamæmeli, meliloto, stœchade, & cumino, omnibus in vino decoctis.

5 Quintum ex maluis, furfure, absinthio, cumino, aut anetho, aqua, vel vino incoctis.

6 Sextum fit, ex farina hordei, & fœnigræci, croco, & momento auripigmenti, omnibus quidem aqua calaminthæ incoctis.

Potiones Solent & potiones quædam institui, quæ si assumantur, sanguinem concretum, & extra vasa effusum (vulgò mortuum vocant) dissipare, ac resoluere creduntur: cuius generis est ea, quæ constat bdellio, costo, centaurio, & syropo acetoso, atque huic aliæ quædam consimiles, quæ in casu ab alto, offensione, & violento membrorum tractu, ac distentio

stentione, offerri consueuerunt. Cum autem totum ecchy-
 moma, digestum per halitum est, siccare iam vehementius
 ruptum ipsum permittitur, ac deligatura coniungere, om-
 niâque in summa facere, quæ vt vlcus coalescant, efficiant.
 5 Ergo si euocatû celeriter totû ecchymoma sit, facilè coale-
 scet rupta ipsa caro. Sin longiore spatio, sordes multa sub-
 nascens medium inter vlceris labra spacium occupabit,
 ita, vt iam coire ruptio non possit. Atque inde adeo fit, vt
 qualibet leui de causa, nos hæc sui admoneant: nã siue quis
 10 obriguit, siue parûm concoxit, siue febri laborauit, siue se
 vehementius fatigauit, eiusmodi illicò particulis dolet.
 Non enim (vt modò dictum est) in idem coière ruptionis
 labra, sed tantûm propè sunt admota. Quò fit, vt leui mo-
 mento ea facilè separentur, & medius inter ipsa locus su-
 15 peruacuo humore repleatur. Et quid quæso aliud, quàm
 assidue nouum ecchymoma creatur: & primò illi (cûm vi-
 delicet primûm caro est rupta) persimile? nisi quòd ex te-
 nuî magis sanie nunc constat: cû in principio è sanguine
 ecchymoma esset. Ideoq; facilius etiã nunc quã prius, seu
 20 per initia, digeritur. Cæterûm quomodo curari debeant
 sugillata, liuores, aliâq; id genus accidentia. quæ contusio-
 nes, graues casus & offensiones consequuntur, aliquan-
 do forsân alibi dicetur. Hactenus de vulneribus, quæ in
 ne maximè per tela inferuntur. Sequitur, vt de his
 25 mus, quæ morfu sunt.

*De vulnere ex morfu, velictu animaliu, tû venenatorum
 tum aliorum non ita noxiõrû illarû, & præsertim de
 morfu canis rabiosi. C. LXX. XI.*

30 **D**E vulneribus, quæ ex morfu punctuue ani-
 malis inferuntur, & præsertim canis rabiosi,
 aut alicuius venenatæ feræ, aut bestię, quidã
 memoriæ pauca tradiderunt. Quippe quæ
 non adeo frequenter accidunt, & si aliquan-
 do inciderint, soleant rustici, ac plebei homines neglectis
 35 chirurgis, ac medicis, medicamentum præsens ad hæc ipsa
 cõficere, ex alliis, cœpis, & oleo, quod cataplasmatis modo
 vulnere imponût. Adde, quod exquisitè de iis tractare, ma-
 gis ad medicû (quem physicû appellant) quàm chirurgicû,
 nisi quòd ad vulnus spectat, pertinet. Itaq; qui absolutam
 eorum cognitionem habere desiderat, ex Arabicæ familiæ

Qui præfer

tim auto- scriptoribus, Auicennam, Razem, & Rabi Moïsem, & ex
res tum re- recentioribus Barbaris, Henricum legat oportet, qui de o-
centes, tum mnibus ferè venenis, fufiffimè tractauerunt. Sed mul-
reteres, de tò his doctius, atque accuratius de eiusmodi morfibz, &
venenatis ictibus venenatorum animalium scripserunt, Aëtius An- 5
vulneribus tiochenus, Paulus Aegineta Cornelius Celsus, Actua-
scripserunt. rius, Oribasius, & ante hos omnes adhuc Dioscorides.

Quos omnes, si velis, hac in re poteris consulere, aut vnum
 saltem ex illis, quem placebit, deligere. Tantùm enim loco
 vniuersalem, vulnèrum ex morfu punctiue illatorum, cu- 10
 rationem referemus, atque eam duntaxat adhuc, quam

Morsus ac maximè chirurgia molitur. Itaque morsus animalium
punctus a- punctiue, duplici constant differentia: alij enim sunt ve-
nimaliū du- nenati, alij verò minime: venenati dicuntur, qui à viru-
plices. lentis bestiis inferuntur, cuiusmodi sunt rabiosus canis, ser 15
Virulenti. pentes, peregrinæ angues, scorpio, basiliscus, draco, vipera,

coluber, mus araneus, phalangium, aspis, & id genus aliæ
Morsus nō virus ei culantes feræ. Contrà verò non venenati morsus
venenati. dicuntur, qui ab animantibus non ita virulentis impri-
 muntur, infigunturve: cuiusmodi sunt, canes domestici, si- 20
 mia, homo, equus, sues tam domesticæ, quam syluestres, fe-

lis in domibus oberrans (quem nominant elurum) & simi-
 lia. Ictu quoque hominum copora lædunt, vesperæ, apes,
 muscæ, culices, pulices, & cimices. Sed qui à vespis, & api-
 bus punctus infiguntur, plus noxæ, ac doloris inferunt, 25
 interdumque chirurgi operam desiderant. Omnis autem
 ferè morsus (si Cornelio Celfo credimus) habet quoddam

virus. Paulus non addubitat ipsius etiam hominis mor-
Morsus o- fus, cum virulentis bestiis conscribere. Siquidem (inquit)
mnis quod- maligniores multò, cæteris aliis vlcèribz apparent, præ- 30
dam virus fertim si qui morsum intulit, ieiunus fuerit. Idemque bi-
habet. lioso temperamento, atque antea legumina, pro cibo sum-
 pserit, atque imprimis lenticulam. Eapropter quæcunque

communiter in aliis virulentis morfibz vel ictibus côm-
 moratur ac profunt, eadè quoq; in his morfibz extrinsecus 35
 per initia adhibere cōueniet, exceptis nimium acerbis,
 & causticis, id est, adurètibz. Cæterum morsus ipsi, ac pū-
 ctus tam venenatorū & lethalium, quàm non virulentorū,
 in quibusdam, quod ad rationem curadi attinet, con-
 spirant, & in quibusdam euariant. Conueniunt quidè in
 eo, quod

- eo, quòd neque desiccantia, neque repellentia, neque cicatricem inducentia (quorum natura astringentia est, & desiccatoria) desiderant, quin potius attrahentia, dilatantia, relaxantia, atque emollientia statim ab initio expostulant.
- 5 Tam hi etiam, quàm illi, sedulò repurgari appetunt: ac demùm postquàm vlcera probè fuerint repurgata, cicatrice obduci. In hoc autem differunt, quòd morsui non venenato abundè satisfaciunt, domestica (vt vocant) attrahentia, & maturantia. Cuius generis sunt, cæpæ, & allia,
- 10 tam agrestia, quàm satiuia, cocta, trita, & cum fermento, oleo, & sale mixta. Si verò vulnus morsu, aut ictu virulentum aliquod animans homini intulit, quæ vehementer etiam trahunt, ne virus interna subeat, & ad cor serpat (cuius destructionem ex suaapte natura semper appetit) statim
- 15 erunt admouenda, vt cucurbitula, loco prius scalpello inciso, & emplastra quædam validè virus extrahentia, quæ statim subiungemus. Deindè candenti ferro (si patitur locus) vulnus adurendum est, aut caustico saltem aliquo medicamento, ac vehementer exedente vtendum. Eius-
- 20 modi enim vulnera omnia lethalia sunt, & præsentem sæpe perniciem (si protinus non succurritur) adferunt. Proinde & extrema illis (iuxta Hippocratis consilium) adhibenda sunt remedia. Adeoque vt membrum, quod sic à lethali, ac virulenta fera, vel morsum, vel ictum est, in-
- 25 terdum præcidere, seu amputare conueniat. Quemadmodum Galenus memoriæ prodidit, vinitorem quendam à vipera morsum, vbi feram agnosceret, confestim læsum digitum falce abscidisse, atque in totum sic periculo liberatum. Porro venenatos morsus, aut ictus punctusve iis sequentibus notis deprehendes. Vulnus infixum validè do-
- 30 let punctiōis, & mordicationis sensus vehemens in afflicta parte perſentitur, vulneris, atque affecti loci color perit, ac mutatur aut enim rubet, atque inflammatur, aut liuet vel nigricat. Laborans grauibz angitur molestiis, ac totus ardet: corpus totum eius ipsius, qui vel demorsus, vel
- 35 ictus est, ita nonnunquam obstupescit, ac talem (vt sic dicam) obdormitionem sentit, vt tangentem non sentiat. Verùm nihil ferè in iis perpetuum est. Neque enim dolor semper adest vehemens, aut atrociter molestans in omnibus eiusmodi ferarum, ac bestiarum venenosarum ictibus,
- aut

*In quibus
conspirèt et
inuicem dis
sident vi-
rulentis mor-
sus, & non
venenati.*

*Venenum
semper cor
petit.*

*Vinitor
morsus à vi-
pera sibi di-
gitum am-
putauit.
Morsum,
ac punctum
venatorum
nota.*

aut moribus: sed in quibusdā satis remissus est: ut in mor-
Morsus ca su canis rabiosi. Nec enim protinus infestum quicquam,
ni rabiosi ubi momorderit, (ut inquit Dioscorides) infligit, nisi ut
per initia vulnus dolorem, hoc est, statim quidem ubi morfu excan-
nihil mole- descendens rabie canis, in partem aliquam vulnus intulit, ni-
stia adfert, hilo plus doloris, aut molestiæ ab initio adferre videtur,
præter quā quā non rabiosus. Sed & qui à scorpionis ictu dolor ac-
ex vulnere cidit, modò decrescit, modò intenditur, ac nunc feruor,
dolorem. nunc frigus: tum percussum locum, tum corpus totum vi-
Scorpionis cissim inuadit, ut Paulus annotauit: & ut breuiter dicam, 10
ictus, quæ sua cuiusque animantis moribus, & ictibus propria, ac pec-
symptoma- culiaria signa sunt: ut videre est apud Dioscoridem, Pau-
sa inuehat. lum, Aëtium, Cornelium Celsum, & alios, qui de venena-
 tis hisce bestiis fusius, atque accuratius scripserunt. Cæte-
 rum aliis venenatis bestiis (quòd apud nos rarissimè sint) 15
 prætermisissis, operæpretium non abs re duximus, si vnus
 rabiosi canis particulatim meminerimus. Siquidem hoc
 animal & fœcundum prouentu, id est, frequens, & contu-
 bernalè homini, ac domesticum esse cōsuevit. Adde quòd
 & rabie sæpius corripitur ac perit, ab eoque difficile caueri 20
 possit. Inde periculum ineuitabile hominem manet, nisi
 multis & conuenientibus vsus fuerit præsidiiis. Plerunque
 autem flagrantissimis æstibus canis in rabiem efferatur.
 Interdum etiam per frigora maxima, ut Lycus memoriæ
 mandauit. Iam verò rabiosus potum, & escam auersatur, 25
 siti premitur, neque tamen bibit: anhelat prætereà non pa-
 rum, idque exerta lingua, aures inclinat, largam, spuman-
 tēque pituitam naribus, & ore proicit: mutus in totum
 est, & veluti insanus, ut ne domesticos quidē agnoscat, tor-
 uē & solito tristius intuetur, in omnes passim sine larratu 30
 irruit, & nullo discrimine beluas, & homines nostros iuxta
 ignorōsque morfu adoritur. Vbi autem momorderit, sta-
 tim quidem nihil molestiæ (ut prius diximus) adfert, præ-
 terquam ex vulnere dolorem. Exinde autem (nempe tem-
 poris progressu) morbus ille, qui ab aquæ metu hydropho- 35
 bia Graia est voce appellatus, exoritur. Miserrimum sanè
 (inquit Celsus) genus morbi, in quo simul æger & siti, &
 aquæ metu cruciatur, quo oppressis in angusto spes est.
Hydropho- Porro magna ex parte circa quadagesimū ferè à mor-
bia. bus diem, solet hic morbus hydrophobicus ingruere, qui-
Horrorem busdā
aut metum

- busdam & post sex menses, aliis proditum etiam est, post septem obuénisse. Sunt & qui post annum vnum, vel etiam duos interdum, à morfu impresso, morbum hunc contrahi testentur. Narrant & aliquos post septénium hoc aquæ metu fuisse tentatos. Quo fit, vt qui à cane rabido morfi sunt, non valde tuti mihi esse videantur. Non enim statò, definitòque tempore post morsum, aquæ pauor exoritur. Itaque quoniam non confestim à morfu, huiusmodi aquæ metus, homines inuadit, quidam decepti, canem qui momorderat, non fuisse rabie percitum arbitrati sunt & proinde vulnere cicatricem inducere properarunt. Atque hoc pacto ipsimet huius mali autores, sibi perniciem attulerunt, dum scilicet huic affectioni causam dederunt. Hac autem vsus probatione atque experientia, facilè deprehendes rabiosus sit canis, nec ne qui momordit: Iuglandibus, nucibus concisis: & accuratè tritis vulnus diligenter obstruitur & postea circumligatur, sequenti die ablata, gallinæ, aut gallinæ in cibo apponentur: ac primùm sanè non attingent: fame autem vrgente, si eas vorauerint, rem attentius considerato. Nam canis qui momordit, si nò fuerit rabiosus, sospites, ac superstites aues quæ nuces illas comederint permanebunt: sin contrà rabie correptus fuerit, postera die peribunt: atque tunc ad vulnere dilatationem properandum erit. Iterùmque post paucos dies eadem experientia vtendum. Et si non perierint gallinacæ, tunc vulnus ad cicatricem perduces, nullum iam veritus periculum. Huiusmodi indicationis, seu experimenti autor quondam fuisse putatur Oribasius, vt refert Paulus. Exterùm hydrophobiam, id est, aquæ metum. Græcorum aliqui, ex immodica fieri siccitate dixerunt: quasi in contrarium habitum, mutata penitus humida eorum substantia: veruntamen Ruffus antiquæ medicinæ grauis autor, insanix ex atra bile speciem eam esse testatus est: magna scilicet veneni eius cum humore illo similitudine. Itaque nò secus quàm reliquos melancholicos, & atra bile insanientes scimus alios alia timere: idque etiam sentire videntur qui dicunt, canis ipsius qui momorderit imaginem in aquis opinari eos se videre, eoque metu terribos aquam fugere & auersari. At ex iis qui hoc vitio sunt occupati, nullum (inquit Paulus) præterquam vnum, aut alterum seruatum

aquæ, nullum præscriptum cõstitutumque tempus habere.

Rabiosi canis morfus probatio, ex Oribasio.

Hydrophobia vnde.

Pauci ex iis qui aquam metus laborant, seruantur.

tum fuisse ex historia didicimus. Eosque non à rabioso cane morfos, sed ab homine quodam morfo rabienteque, & aquam iam timente, vitium adeptos. Siquidem Eudemos (vt refert Dioscorides) superasse, ac superuixisse quendam affirmat. Et Themisonem (inquit) aliqui demorsum in idem vitium incidisse, & euasisse fatentur. Molestissimum itaque & dum iam occupauit insanabile est hoc morbi genus. Ante tamen huius occupationem, multi etiam quos canis momordit seruari sunt. Euenit autem hic morbus hydrophobicus, cum neruorum distentione, vel conuulsione, totiusque corporis robore, præsertim faciei, cum sudore, & languore quodam, sui que fastidio, & domesticorum ignorantia. Aliqui auræ splendorem, & aquam fugiunt: & dum vident, & dum admoventur. Nonnulli etiam omnem humorem auersantur, & horrent: alij sine vlla doloris intercapedine vexantur. Sunt etiam, qui canum more latratus edant, & obuium quemque dentibus impetunt, morsuque suo alios simili vitio labefactant. Miserrimum sane (vt iam diximus) & molestissimum morbi genus. Cæterum vnicum eo oppressis remedium esse scribit Cornelius Celsus libro quinto suæ medicinæ: nempe non opinantem in piscinam non antè ei prouisam proicere. Et si natandi scientiam non habet, modòmersum bibere pati, modò attollere. Si lubet interdum deprimere: vt inuitus quodque aqua sarietur. Sic enim (inquit) simul & sitis, & aquæmetus tollitur. Sed aliud periculum excipit, ne infirmum corpus in aqua frigida vexatum, neruorum distentio absumat. Id ne incidat à piscina protinus in oleum calidum dimittendus est. Sed iam tempestiuum est, communem virulentorum omnium vulnerum (vt sumus polliciti) curationem aggrediamur.

Communis, aduersus omnes morsus, & ictus virulentos, curatio.

Virulentorum omnium animantium morsus, aut ictus non nimium distantem curatione desiderat, quamuis in ea multum antiqui variarunt: vt in singula genera bestiarum, siue animantium, singula medendi genera præciperent, atque aliis alia. Sed in omnibus eadem valde multa, maxime proficiunt. Itaque quæ ad hanc communem

nem medendi rationem attinēt, primū exponemus: deinde cursum perstringemus, quæ ad peculiarem, priuatamque eorum curationem pertinent, quos rabiosi canes (quod frequentiores apud nos sint, quam aliæ virulentæ & bestia) momorderint.

„ Igitur in omni morfu: vel ictu animalis, quod venenum
 „ vibrat, gemma est Galeno libro decimotertio methodi me-
 „ dendi curandi indicatio: nempe virulenti ipsius liquoris
 „ vacuatio, & eius quod dolorem creat alteratio. Sanè (in-
 „ quit) virus ei aculatum vacuant, tum excafactoria medi-
 „ camenta omnia, tum quæ citra calefactionem vehementer
 „ trahunt, veluti & cucurbitulæ, & cornua quædam quibus
 „ nonnulli cucurbitularum vice vtuntur. Sunt autem & qui
 „ ore suo virus extrahunt, ægræ videlicet particulæ ad moti,
 „ & ipsū quæ vulnus labiis complexi. Huc sanè pertinet & cau-
 „ terium, & medicamenta quæ cauteriis similiter escharam
 „ efficiunt. Atque hæc omnia totam eius quod infestat, sub-
 „ stantiam exinaniant. Alterum auxiliorum genus est eo-
 „ rum, quæ qualitatem per contrariam qualitatem alterant.
 „ Scilicet exhibentibus nobis, si vehementē calorem eger vel
 „ in ipso demorso loco, vel in toto corpore sentiat, auxilia re-
 „ frigerantia. Sin frigus sentiat, calfaciētia. Hactenus Gale-
 „ nus. Eius autem cōpendiosam dictionem, & vniuersalem
 „ methodum sic interpretamur. Inter ea, quæ virus ē profun-
 „ do euocant, primò medicamēta enumerat, quæ calfaciēdi
 „ facultate prædita sunt: deinde cucurbitulas, & cornua,
 „ postea verò oris suctionē, & postremo vstionē quæ vel fer-
 „ ro, vel medicamētis fiat. Itaque de his singulatim nobis di-
 „ cendum est, quò res peruiā magis cuique euadat, ac modus
 „ vsus eorū neminē lateat. Id vñ autem imprimis omnes
 „ scire volo, ea, quæ modò ex Gal. retulimus auxilia, & id ge-
 „ nus alia, quæ mox subiungemus, si primis diebus præter-
 „ missa fuerint, frustra postmodum adhiberi. Non enim vi-
 „ rulentam illam materiam, quæ iam ad intima, neglecta cu-
 „ ratione, pertransiit, satis euocare possent. Quare nulla vti-
 „ que adiectionis eorum foret vtilitas, sed incalsūm corpora
 „ doloribus ster nerentur. Inter ergo principia morfus, aut
 „ ictus illati, hæc, & similia adferēda erūt. Sed & priusquàm
 „ hæc, quæ sit venenum extrahunt, atque eliciunt, admo-
 „ ueantur, supra vulnus membrum id, quod vel demorsum,
 „ vel

*Geminam
esse curandi
rationē, in
omni mor-
fu aut ictu
venenato.*

*I
Virus ē cor-
pus morfu,
vel ictu eia-
culatū, qui
bus auxi-
liū vacue-
tur.*

*2
Alteratio
eius, quod
dolorem
creat.*

Aduerte.

*Membru de-
morsum sit
pru vulnus*

vel

deligadum. vel ictum est, deligandum erit, non tamen nimium vehementer, ne torpeat. Hac enim deligatura impediens, ne tam subito virus interna subeat.

Oris suctio. Itaque si leuior morsus, aut ictus est, oris suctio apprimè conuenit. Homo igitur aliquis statim adhibendus est, qui vulnus exugat. Surgentem verò oportet ieiunum nò esse, sed & cibum sumpsisse, & vino os colluisse, postea exiguum olei in ore continens, ictum exugat, & expuat venenum. Cauere etiam oportet, ne qui vulnus sic exucturus est, in-

Venena nò gustu, sed in vulnere nocent. ternam aliquam oris partem exulceratam habeat. Siquidem venena (vt suprà ex Celsò retulimus) non gustu, sed in vulnere nocent. Sed & locus ipse priusquam exugatur, spongiâ in poscam calidâ immersâ, fouendus, ac proluendus erit. Alij vulnus abluendum aquâ cenicent, in qua do-

coctum sit chamamelum, & syluestris lapathi radix. Sunt, qui gallinarum, aut aliarum quarundam auium podicem vulnere admouent, ad virus exugendū. Quod si quæ applicatæ fuerint volucres, moriatur, venienti extractū esse suspicatur: post hæc verò cinis acetò subactus, pro cataplasmate imponatur. Maximè autè ad hanc rem conducit, cinis fermentaceus, id est, ex lignis vitis: vel ficulneus, aut laurinus. Qui si non adsit, eo, qui haberi potest, vtendū est, diligètia (inquit Aëtius) ad hoc potissimū adhibita, vt inflammatio in loco excitetur, & materiæ ad morsum prouocentur.

Sal morsui canis rabidi optimū medicamentum. Sal quoque his vulneribus, præcipueque ei (si Celsò credimus) quod canis fecit, medicamentum est, si manus vulnere imponitur, superque id duobus digitis verberatur. Exsaniat enim, ac salamentum quoque rectè super id vulnus deligatur. Porro in omni morsu tam venenato, quàm

Vnguentū Dini. non venenato, Dinus hoc vnguento utebatur. Recipe cereæ, picis nigræ, axungie veruecinæ, olei antiqui ana quart. vnum, galbani vnciam vnam: fiat vnguentum.

Auxilia aduersus magnos, & vehementes morsus, & ictus venenatos. Morsibus verò, aut ictibus venenatis magnis ac vehementioribus, commodè illinuntur, cæpæ cum sale, & ruta, sinapi quoque, & stercora. Item iuglandes nuces cū allio, sale, & melle. Emplastra quoque, & cataplasmata ex Diatanno, & aliis medicamentis calfactoriis, quæ vehementem trahendi vim habent, apparata. Plurima enim ex iis nò modò virus ipsum potèter eliciunt, sed & vulneris oras (præsertim in rabidi canis morsu) latas, ac hiantes seruant.

Neque

Neque enim permittendum, ut hæc citò coëant, aut com-
 mittantur. Præter opinionem autem facit Aëtio, ex vi-
 peris theriace Andromachi, emplastri modo imposita, &
 compositum hoc sequens medicamentum: quod recipit
 spumæ argenti, cerusæ, resinæ pinus, singulorum libram
 vnam, olei veteris libras tres, ceræ vncias septem, ammo-
 niaci thymiamatis trientem, id est, vncias quatuor, galba-
 ni etiam trientem: cerusam, argenti spumam, & oleum co-
 quito, donec non inquinent manus, deinde liquefacta ad-
 iicito, vnito, & vtitur reposito ad omnem morsum, & ad
 abscessus, & tubercula mammillarum, panos, sinus, fistu-
 las, parotidas: ad miraculum enim (inquit) discutit ipsas.
 Vtitor & ad carbunculos. Arcet vehementer inflamma-
 tionem, & rarò citra magnam commoditatem, & effica-
 ciam adhibetur. Porro in magnis quoque, ac vehementio-
 ribus, tum ictibus, tum morfibus potèst est hoc subsequens
 emplastrum, quod acrioris est potentiae. Recipe galbani,
 sagapeni, opopanacis, assæ foetidae, myrrhæ, piperis, sul-
 phuris, singulorum semunciam, stercoris columbini, &
 anatis ana vncias duas, calaminthæ, mentastri ana vnciam
 vnam: dissoluantur gummi ex vino, & in vnum miscean-
 tur omnia cum melle, & oleo antiquo, & fiat emplastrum.
 Pleraque alia tum ex veteribus tum ex recentioribus ad-
 duci possent, quæ vel commorsam, vel ictam partem ve-
 hementer calfacere, & vellicare possunt: proinde & vene-
 num euocare. Verùm quoniam iterum de hac re dicemus
 libro sexto, hæc abundè ad præsens sufficere putamus. In-
 terim tamen monemus cum Erasistrato, ut incognita,
 peregrina, & inusitata vitentur. Cuiusmodi sunt fel ele-
 phanti, oua crocodili, & consimilia, quæ difficilè, nisi regia
 facultate peruestigari possunt. Adde, quòd neq; frequenti
 obseruatione (ut Dioscorides ait) hæc sufficiens experimen-
 tum præstiterunt, quo nostra fides iis obstringatur. Iam
 verò tempestiuum est, ut de cucurbitulis, & cauteriis dica-
 mus: utriusque enim etiam virus è profundo euocamus.

Ergo si vehemèntior morsus est, cucurbitulam cum lar-
 giori flamma ad vulnus adfigito. Sed antè circumstantia
 loca altioribus vlcusculis (si id membrum patitur) scarifi-
 cato, quòd plus vitiati iam sanguinis extrahatur, & ut san-
 guinis illius corrupti vacuatio obstitat, ne venenum mem-

*Aëtio.**Guid. em.
acrioris
tentie.**Cucurbi-
tula.*

bratim insinuetur. Attrahetur enim pluribus quasi canalibus, & foras euocabitur, vnà cum sanguine, & spiritu, ipsius virulentæ bestię venenum. Si cucurbitula non est, quod tamen vix incidere potest, tum quodlibet simile vas, quod idem possit, vt caliculus, vel pultarius (vt inquit Celsus) oris compressioris. Optimè autem auxiliantur, si statim in principio post amotas cucurbitulas, super vulnus

*Animalia parua dis-
cerpta, &
virulento
morsus ad-
moti.*

*Gallinarũ
pulli.*

imponantur, & conuoluantur animalia parua discerpta, hoc est, per medium diuisa, intus adhuc calentia, veluti sunt gallinaceus pullus, sed mas præsertim, hædus, agnus, & porcellus. Sic verò calida eorum caro statim percusso loco imponenda est, vt pars interior corpori iungatur: venenum enim exugunt, & dolores leniunt. Ferè autem inter cætera animantia magis placent, gallinarum pulli, quippe qui calidiore natura præditi sint, argumēto, quod deuoratum insigne virus eliquent, & aridissima quæque semina consumant. Item nonnunquam harenas, lapilósque, quos faucibus insinuarint, dissoluūt. Itaque animantis calore, spiritus istę partis impetum capeffens, venenum

*Absceden-
tes carnes
amputandæ.*

exigit. Porro à maioribus canis rabiosi morfibz, abscedentes carnes, hinc auferre, & labia acie scalpelli circumscribere, ac prehensam hamo carnem amputare oportet: si modò tamen locus neque neruosus, neque musculosus est. Hæc itaque carnis circinatio, seu circumscriptio, & sectio, scarificatione longè potentius opitulantur. Quod si locus carnis circumscriptionem, & sectionem non admittat, cucurbitulæ (vti diximus) cum largiori flamma adfigendæ

Maiora sunt. Nec verò maiora hæc vulnere in demorsis à rabioso canis, ita vereri oportet, vti minora, & vlcusculis in cutis similia: maiori namque vulnere copiosus sanguis emanans, potest nonnihil virulenti liquoris exhaurire: quod minus in minoribus non accidit.

*Verenda,
quàm mi-
nora.*

At verò & vstio, cōtra ipsos virulētos morsus, aut istus, cum locus neruosus non est, & tutò inuri potest, expeditissimum censetur auxilium, vt potè cum ignis cætera viribus præstet simul quòd virus domet, ipsiusque vires hebetet, & penitus ferri, hoc est, ad intima illabi, non patitur: simul quòd pars ignem experta, deinceps non vilem, nec indecoram loci instauratōne efficiat, manēte diutius exulceratione. Si verò vri nō potest, Cornelio Celso auto-

*Sanguinis
missio.*

re, san-

- re, sanguinem homini mitti, non alienum est. Tum vſto quidem vulnere ſuperimponendi, quæ cæteris vſtis ſunt: ei verò, quod expertum ignem non eſt, ea medicamenta, quæ vehementer exedunt, & ſi laborans patitur, quæ adurunt, & cruſtas vlceribus inducunt. Cæterùm animaduertendum, ex eo tempore, cùm cruſtæ (ſeu igne, ſeu adurentibus medicamentis inductæ fuerint) decident, ne vlceris oræ coaleſcant, & cicatrice obducantur. Sed ſi fieri poteſt, ad longum præſinitum tempus vlcerationes, & ſordidas
 10 adhuc, & inflammationem minantes, prorogari cōuenit, ſic virulētq in longū tēpus proro-
 quo viroſa materies ſemper effluat: non autem intus con-
 tineatur, & ad intima ſe inſinuet. Id autem optimè præ-
 ſtabit, indurum iis (vlcerationibus inquam) ſalfamentum, gādas eſſe.
 & ſylueſtre allium detritum: item cæpæ, & id genus alia.
 15 Si verò (quod perſæpe accidit) ante dies præſinitos, cica-
 trices coirent, committerenturque, manum poſtulabunt,
 Nanque eas diducere, carnemque ſcalpello circinare, aut
 iterum inurere expediet. Vbi verò propoſitum tempus
 præteriiit, vlcus ad cicatricem perducendum erit. Quan-
 20 doque etiam (vt ſuprà diximus) haud importunum fue-
 rit, partem iſtam, ſi commodè ſectionem non reſpuat, vt
 ſunt extrema, amputare: præſertim ſi fera quæ momordit,
 aut iſtu vulnus impreſſit, lethalis ſit, & inuitabile pericu-
 lum adferat, cuiuſmodi ſunt ſerpentes omnes, vt aſpis, cæ-
 25 ræſtes, vipera, & cōſimiles.

De vulnere, cum proſuſione ſanguinis, ex venis, &
 arterijs.

C A P. XII.

- 30 **P**oſtea quàm de vulneribus, quæ carnoſis par-
 tibus incidūt, abundè ſatis determinatū eſt,
 nunc tempeſtiuū videtur Galeni doctrinam,
 atque inſtitutū ſequentes, de iis vulneribus
 dicamus, quæ in arterijs, & venis ſiunt. Ergo
 35 ſi cui arteria venæve magna vulnerata eſt, & copioſum ſan-
 guinis profluuiū continuò ſuperuenit, & glutinari id vul-
 nus, difficile quidem etiam in vena eſt, in arteria verò non
 40 ſolū difficile, ſed etiam, quod fieri (ſicut nonnullis medi-
 corū eſt viſum) omninò fortasſe non poſſit. Dicendū ergo
 de vtriſque eſt, vulnere inquā, in arteria, aut vena accepto,
 & hæmorrhagia, ac prius quidem de ſanguinis profluuiio,
 quippe quod magis vrgeat: ſecundo verò loco de ipſius

Galen. lib.
 5. methodi
 medendi.

Profusio vulneris agglutinatione, ac curatione. Sanè profluit ex
ex vena, vena, vel arteria, sanguis, aut tunica earum diuisa, aut re-
vel arteria serato earum ore (Græci *ἀναστήμωσι* vocât) aut (vt sic quis
causa. dicat) transcolatus, siue trāsmisus, vt in diapedesi. Verùm

Differen-
tia.

quoniam in duabus posterioribus causis solent magis me-
 dici, quos phycos appellant, accerfiri: hic duntaxat age-
 mus de sanguinis effusione, quæ ex prima causa ortū ha-
 bet, & vulnera consequitur, hæc nanque ad chirurgum
 magis videtur pertinere. Cæterum sanguis profunditur
 interdum ex arteria, interdum ex vena, atque ex earum 10

Diabrosi.

quidem aliquando vna duntaxat, nonnunquam verò ex
 pluribus, iisdemque, vel maioribus, vel minoribus. Sed &
 sanguinis eruptio, accidit ex eo interdum vulnere, quod
 cum amissione sit substantiæ: aliquando verò ex eo, in quo
 nihil substantiæ deperditum est. Interdum etiam cum ero- 15

CAUSAE.

sione: interdum verò citra erosionem, quæ Græcis *διάβρω-*
σις dicitur. Item quâdoque iam profluit sanguis, & quan-
 doque postea fluxurus est. Interdum quoque causa huius
 profluuij sanguinis apparens est, quæ in vena, aut arteria
 diuortiū facit, cuiusmodi est sagitta, telumve aliquod, aut 20
 erosio præsens, & non ex vulnere excitata. Hæ itaque sunt
 differentiæ præcipuæ, profusionis sanguinis in vulneribus,
 à quibus curandi indicationes desumuntur.

Erosio ab alio, & graue quippiam, durumque incidēs. Erosio au-
causa inter tem venis, & arteriis intrinsecus salit accidit, ex succo ali-
na. quo, cui mordens natura insit, vt est bilis flaua, vel atra su- 35

perassata. Ex iis itaque manifestum euadit, quòd venæ, vel
 arteriæ vulnerari non possunt, quin cutis, & caro vulne-
 rentur. Proindè suppresio iam sanguine, glutinandi, seu
 (vt dicunt) incarnâdi indicationes, ab ipsis (carne inquam
 & cute) sumendæ sunt, vt in sequentibus dicitur.

Signum

Signum venæ; atque arteriæ incisæ, est sanguinis profusio. Quod si sanguis cum impetu, ac saliendo profluat, & tenuis, ac flauus feruensq; appareat, arteriam diuisam esse significatur. Si verò crassior, & nigrior conspiciatur, ac quietè, sine pulsu, & citra saltum effundatur, iudicium est ipsum à vena effluere. Hæmorrhagia, id est, sanguinis profluuium, omnium calculo, ac iudicio periculosa est. Nisi enim constiterit ac supprimatur, mortem adfert inuitabilem. Quippe quod sanguis (vt dici solet) naturæ sit thesaurus. Ad hoc syncope, conuulsio, delirium, singultus, in hæmorrhagiis malum portendunt, vt Auicennas post Hippocratem annotauit. Porro subit admirari, quod Arnaldus scriptis prodidit. Nèpe quod arteria per transuersum dissecta, promptius coalescit, & agglutinatur, quàm si secundum longitudinem esset diuisa.

Curatio profusionis sanguinis ex vulnere.

Capita methodi, qua sanguinis profluua, quæ ad manum sunt, curantur, duo traduntur à Galeno, quibus Auicennas tertium addidit. Vt igitur omnium fiat mentio, hæmorrhagia trifariam sistitur.

Primò iis, quæ fluxionem auertunt, tum deriuando, tum reuellendo: secundò infrenantibus, atque intercipientibus fluxionem, & tertio topicis, id est, localibus auxiliis.

Porro ex iis, quæ sanguinis profluuium auertunt, tam à venis, quàm arteriis sanguinem fundentibus (huic enim hæmorrhagiæ propriæ debentur auertentia eiusmodi auxilia) quædam id efficiunt citra vllam extra corpus vacationem: alia verò cum euacuatione. Citra vacationem, fluentem è vasis sanguinem auertunt, & alio trahunt, curbitulæ siccæ, seu leues, & cum flamma admotæ, frictiones, & ligaturæ, primum in propinquioribus partibus factæ: deinde in remotioribus. Auertitur autem sanguis cum euacuatione, atque ad alia membra conuertitur, tum ad proxima deriuatus, tum ad contraria reuulsus, vena in ea parte incisæ, quæ profusioni è directo respondet, quæque ipsis membris sanguinem fundentibus coniuncta est. Itaque hæc (inquit Galenus) Hippocratis inuenta sunt. Omnis scilicet immodicæ vacationis, communia remedia. Deriuatio ad latus, & ad vicina fit, reuulsio ad contraria, non tamen semper ad remotissima,

Discretio, quando sanguis ab arteria, & quando vena reij-

citur. Prognostica.

Apho. 3. li 5.

Modi tres sistende hæmorrhagia.

Auertentia.

Li. 5. meth. med.

Paroche- vt falsò quidam putauerunt. Illam parocheteusin, hanc
reussis. antispasmi Græci vocant. Antispasis igitur, id est, reuul-
Antispas- sio, in iis quæ suprâ sunt, omnibus deorsum semper agitur:
sis. sursum, in iis, quæ sunt infra. Præterea à dextris ad sinistra,
 sicut ab iis rursus ad illa: similiter ab iis, quæ intus habentur,
 ad ea, quæ foris sunt: contrâque ab his, ad illa. Itaque si
 resolutus adhuc æger non sit, vena (vti diximus) in eo loco
 secanda erit, quæ profusioni sanguinis è directo respondet,
 & vulneratæ parti coniuncta est, siue deriuare, siue reuelle-
 re studueris. Vbi autem paululum detraxeris, mox vnam 10
 horam intermittens, rursus modicum quid detrahes: post
 iterum, atque iterum, pro laborantis viribus, vt Gale. con-
 sultuit lib. 5. Therapeutices methodi. Sed de hac sanguinis
 in vulneribus detractiōe, latius alibi superius diximus.

2 Causæ sanguinem infrenantes, atque eius fluxum in- 15
Quæ san- tercipientes, quædam sunt incrassantes, ac inspissantes, vt
guinem si- lentes, oriza, iuiuba, cotonea mala, quæ Græci *νυθία* vo-
stât incras- cant, & in vniuersum fructus omnes styptici, hoc est, austeri,
sando. in hunc vsum offerri solent in omnibus sanguinis pro-
Quæ sup- fusionibus. Aliæ verò sunt stupefacientes, veluti aqua 20
primâ san- frigida, tum epota, tum circa locum, ex quo profuit san-
guinem stu- guis projecta. Non autem supra vulnus ipsum: vlceri-
pesaciendo. bus enim frigidum mordax. Item res omnes, quæ insi-
Quæ refri- gniter refrigerant, sicuti & syncope, seu animi deliquium,
gerâdo san- in quo propter sanguinis ad interiora reuocationem, to- 25
guinē flue- tus corporis habitus refrigeratur, & sanguis sistitur,
reinhibeât. vt loco nuper citato Galenus annotauit, ad hunc mo-
 dum scribens:

Porro confluere prohibetur [sanguis] & propter animi
 deliquium, & cum ad contraria reuellitur, & cum ad vici- 30
 na deriuatur, & per refrigerationem, tum corporis totius,
 tum verò præcipuè ipsius partis afflictæ. Hac enim ra-
 tione, etiam frigida pota, sæpe hæmorrhagias suppressit:
 idem facit & frigida foris infusa. Sed & quinto Aphoris-
 morum in iis frigido vtendum esse præcipit Hippocrates, 35
 vnde fluit sanguis, aut fluxurus est, non ad ipsa (inquit) sed
 circa ipsa, vnde influit.

3 Topica, hoc est, localia, remedia, quibus sanguis cohibe-
Topica au- tur, tametsi numero octo ponantur ab Auicenna, ea ta-
milis. men nunc ad quinque reduximus.

Primum

Primum genus auxilij fit per futuram: secundum per li- *Quinqu*
 namenta, quos *auxiliorū* Græcè vocant, vel per penicillum siue *genera lo-*
 turundam, quod aiunt: tertium remedium est, torius vasis *calia qui-*
 sanguinem fundentis præcisio: quartum deligatura, & vin- *bis hæmo-*
 5 culum: quintum est adustio per candentia ferramenta, vel *rhagia su-*
 per caustica medicamenta.

- Primus modus coercendi sanguinem, qui per futuram *1) primū-*
 fit, his maximè vulneribus competit, in quibus nulla fa- *sur in vul-*
 cta est substantiæ deperditio. Tunc autem commodè *neribus.*
 10 fit futura, cùm vulnus ipsum à sanguine concreto, qui *Sutura san-*
 thrombos Græcè dicitur, integrè est repurgatum. Ita- *guinè coër-*
 que hoc peracto ipsius vulneris labra in idem adducen- *cens.*
 da sunt, nostrarum manuum operâ, vbi sic ad manum
 vulnus se exhibet, postea consuuntur, futura quidem com-
 15 muni, vel ea quam pelliones facere solent, præsertim si
 magno impetu sanguis prorumpat. Dum autem ita
 fuit vulnus, satis alte acus in carnem demittenda est.
 Post hæc, pulvis astrictorius superponendus erit. Deinde
 stupæ oui candido liquore, & puluere illo astringente, cu-
 20 ius in sequentibus fiet mentio, imbutæ, superimponendæ
 erunt. His ritè peractis, membrum affectum deligandum
 erit, & situ appposito collocandum. Appositus enim vul-
 neratæ partis situs, inter hæmorrhagias remedia Galen. *Sitū part*
 censetur. Quodd autem modus is suppressendi sanguinem, *ad hæmor-*
 25 utilis fit, ex eo manifestum euadit, quod labra vulneris *rhagiā pl*
 prius hiantia, & adinuicem distantia, in vnum adducun- *rimum cō*
 tur, & inter se committuntur, locus affectus refrigerat- *ducere.*
 ur, & adstringitur. Quæ omnia in hoc affectu Galen. de-
 siderat, lib. 5. suæ methodi medendi. Sed & multoties ad-
 30 serit Auicennas in quarto, necessarium esse, vt carnis vul-
 nera consuuntur. In quo etiam Theodoricus, & Henricus
 consentiunt. Dicunt tamen plurimi Galen. non præcipere
 venarum, arteriarum, & intestinorum vulnera suenda esse,
 quippe quod dura nimis, & exanguia sint, atque idè ag-
 35 glutinari, & in pristinam vnionem coïre non possint. Ve- *An vena-*
 rum pace illorum (inquit Guido) dixerim, non inhibuit *rum & a*
 Gale. suenda esse venarum, & arteriarum vulnera: quod si *teriarū v-*
 id tacuit, certè adfirmasse videtur. Quinimo & litera ipsius *nera suen-*
 Galeni quod dicimus planè innuere videtur, quæ sic ha- *da. libr.*
 bet. Neq; enim suere fas est, arteriæ venæue vulnus, veluti *meth. me-*

dixerint, qui nullam à vulneratæ partis substantia, naturæque sumi indicationem aiunt. Sed tu (subaudi) per regulam oppositorum, nos qui sumimus indicationem à substantia, & natura partis vulneratæ, suemus eas. Quòd si non seorsum, ac separatim, coniunctim saltem cum carne, & ad modum peritonæi, id est, ut peritonæum suere consueuimus. Atq; ita si non iuxta primam intentionem coëant, atque adglutinentur, saltem iuxta secundam (vti superius in sermone communi diximus) coibunt.

Secundus modus supprimendi sanguinem. ² Secundus modus supprimendi sanguinem, qui fit per linamenta, & vulneribus, in quibus aliqua est substantiæ deperditio, potissimum accommodatur, ita perficitur. Imprimis vulnus ipsum puluere aliquo, qui adstringendi facultatem habeat, respergito: deinde linamentis, vel stupis hiantem plagam oppleto, siccis quidem primùm, deinde si hæc parùm proficiunt, aceto, vel iis medicamentis, quæ sanguinis supprimendi facultatem habent, madefactis, supràque spongiam ex aqua frigida expressam imposito, ac manu superposita, eam comprimito, vel alligato: & post hæc membrum appositè (vt superius dictum est) collocato. Qui sanè modus sistendi sanguinè apprimè utilis est, ut loco paulò antè citato testatur Galenus, sic in-

Quomodo obstruatur os vasis.

quiens: Obstruetur vasis [sanguinem fundentis] osculum, & sanguine ipso concreto, qui thrombos Græcè dicitur, & iis, quæ foris illi imponuntur: cuiusmodi sunt linamenta, quos *μότης* Græcè vocant, & medicamenta, ea quæ idcirco, quòd ex lenta, crassâque substantia consistant, meatus obstruunt, Græci emplastica vocant. Horum autem optima sunt eidem, quæ ex frixa resina, & farinæ triticæ tenuissimo polline, & gypso, aliisque id genus, sunt confecta, oui candido macerata, & cum leporibus pilis imposita.

Tertius modus sistendi sanguinè. ³ Tertius modus sistendi sanguinem, qui fit, totum vas sanguinem fundens, per transuersum præcidendo, competit maximè venis, & arteriis, quæ in profundo sitæ sunt, ut idem Galenus est autor. Cogimur (inquit) non modò arterias, sed etiam interdum venas totas præcidere, utique transuersas. Incidet autem huius necessitas in iis, quæ ex profundo loco rectè assurgunt, præsertimque per angustas vel principes particulas. Quippe ita retrahitur ex vtraque

parte,

„ parte, pars vtraque, celaturque, ac integitur, superiacen-
 „ tibus corporibus vulnus. Post hæc, pulvis aliquis san-
 „ guinem cohibens, super vulnus imponendus, & stupæ, vel
 „ spongia medicamentis facultatem suppressendi sangui-
 „ nem habentibus, imbuta, superalliganda erit, & figura
 „ particulæ vulneratæ accommodata, adhibenda.

Quartus modus suppressendæ profusionis sanguinis, ⁴ *Quartus*
 qui fit funiculo vasi sanguinem fundenti circumposito, *modus sup-*
 competit præsertim arteriis, quæ in penitioribus delite- *primendæ*
 10 scunt. Itaque si alia auxilia profluuium vincuntur, arteriæ *hamorrha-*
 nudandæ sunt, vt Auicenna præcepit, & hamo appre- *giæ.*
 hensæ, mox vinculo aliquo gracili, vt filo serico, exci-
 piendæ, ac fortiter stringendæ sunt. Post hæc medica-
 15 mentum adglutinans, siue incarnatiuum, vulneri appo-
 nendum erit, & membrum fasciis vt oportet, deligandum,
 sitûque appposito collocandum. Porro vinculum ipsum
 radici vasis erit iniiciendum, vt libro quinto methodi Ga-
 lenus nos admonuit. Tutius autem est iuxta eiusdem Ga-
 20 leni sententiam, vtrunque facere, funem quidem radici va-
 sis circumdare, & quod deinceps habetur, id est, inde pro-
 cedit, præcidere. Radicem vasis vocat hîc Galenus, prio-
 rem eius partem, quæ vel iocinori propior est, vel etiam
 25 cordi. Hæc (inquit) in collo, ab inferiore est parte: in bra-
 chiis, & cruribus, à superiore. In singulisque reliquarum
 partium, prout ex dissectione intelligere licet. His sic per-
 actis, implendum carne vulnus quamprimum est, prius-
 quam funiculus à vase decidat. Nisi enim producta caro
 prius locum, qui circa præcisam arteriam est, impleuerit, si
 locus aliquis vacuus superfuerit, vtique quod Græci aneu-
 30 rysma dicunt, sequitur.

*Radix va-
 sis, quæ.*

Quintus modus, excretionis sanguinis sistendæ, qui ⁵ *Quintus*
 per adustionem fit, qua crusta (quàm Græci escharam vo- *modus sistē*
 cant) inducitur, maximè competit venis, suæ vnionis di- *di sangui-*
 uortium ab erosionem perpeffis. Gal. ipso autore sic ad ven- *nem.*
 35 bum inquit: Maximam autem necessitatem, vel cru- *Lib. 5. libe.*
 „ stificis, id est, crustam inducentibus medicamentis, vel
 „ ignitis ferramentis vtendi animaduerti, vbi ex erosionem
 „ putrescentis alicuius, profluuium sanguinis concitatur.

Hic itaque modus sistendi sanguinem perficitur, tum
 candentibus ferramentis, tum medicaminibus crustam

inducentibus, quibus cum calore adstringendi facultas sit
 coniuncta. Cuius generis sunt chalcantos, id est, atramen-
 tum sutorium, misy, & chalcitis, seu quod vitreolum vulgò
 appellatur. iisque tam vstis, quàm non vstis. Quæ autem
 ex calce viua, id est, non extincta conficiuntur, valentiora
 quidem his sunt: cæterum quia adstringendi vim non ha-
 bent, crustæ, quæ ab ipsis fiunt, citius excidunt. Hærent
 autem diutius, quæ ab adstringentibus: quod vtiq; lon-
 gè est vtilius. Quippe ita prius in basi, seu in imo earum,
 caro supernascitur, efficiturque vasis profluentibus veluti
 operculum, donec venæ agglutinatio facta sit. Vnde nec
 nosmet (inquit Galenus) præcipites esse, veluti nonnulli
 sunt, ad crustas detrahendas oportet, vbi hæmorrhagias
 periculum imminet. Si enim properes illas resolvere, ac
 delicere, tantum inde accidit interdum sanguinis proflu-
 uium, vt vix cohiberi possit. Quocirca præcipiebat Aui-
 cennas, adustionem faciendam esse, ferramenti vehemen-
 ter ignitis, & valenter in profundum adactis, quo crassæ,
 ac profundæ escharæ fiant, quæ nec faciliè separentur, at-
 que excidant. Hinc Theodoricus crustificis, seu causti-
 cis omnibus medicamentis præferebat arsenicum, quod
 vocant sublimatum: nec sanè immeritò. Nam & protin-
 us omnem sanguinis profusionem sistit, & altam, ac diu-
 tius hærentem crustam inducit. Horum autem medica-
 mentorum crustam inducentium, materia suo loco (nem-
 pe lib. sexto) explicabitur. Porro ipsa ferramenta igne fla-
 grantia, ex aceto, aut vino (vt rectè quidam consulunt) re-
 stinguere oportet. Cæterum alius quidam ab iis modus
 est peculiaris reprimendi sanguinem, qui tamen si nondum
 adhuc profluat, mox tamen fluxurus est: vt cùm sagitta, 30
 telumve aliquod corpori infixum, extrahendum est. Ita-
 que cum hæc occasio nobis occurrit, puluilli tres, aut qua-
 tuor apparandi sunt: rotundi quidem, & circa medium (vt
 sic dicatur) fenestrati perforative, medicamine aliquo san-
 guinem coërcente delibuti. His ergo ritè sic apparatis, ip-
 sius teli infixi stipitem seu hastile, per foramen immit-
 tito, ipsosque puluillos circa hastile stringendo mini-
 ster aliquis, suprà vulnus comprimat. Medicus verò
 ipse vulnerarius sagittam, vel aliud quoduis telum infi-
 xum extrahat. Exempto telo, puluilli sunt adæquandi,

*Arsenicū
 sublimatū
 optimū ad
 hæmorrha-
 gias præsi-
 dium.*

*Modus a-
 lius suppri-
 mendi san-
 guinē, qui
 statim flu-
 xurus est.*

ita vt nullum amplius foramen in illis pateat, & supra vulnus comprimendi: dein alij non pertusi supra illos sunt apponendi.

Hi igitur sunt modi, quibus sanguis à venis, & arteriis vulneratis profluës cohibetur: qui vt arte, & ratione fiant, *Præcepta quedã, de suppressione sanguinis obseruanda.*

Primum est Galeni libro quinto Therapeutices methodi, qui in omni fluore sanguinis ex vulnere, iubet vt is, qui vulnerato astiterit, ilico digitum super os vulneris vasis imponat, blandè innitens, ac sine dolore comprimès. Quippe simul (inquit) tum sanguinem sistet, tum eū crescere in vulnere faciet. Thrombos enim, id est, sanguis concretus ex iis est auxiliis quæ hæmorrhagiam sistunt, sicuti & linamenta, quos *μωτὰ* Græci appellant, & medicamenta ea quæ iisdem emplastica dicuntur. Ideo autem thrombus sanguinem suppressit, quia vasis sanguinæ fundentis osculum obstruit: vt paulò antè diximus.

Secundum documentū est, quòd in omni sanguinis ex vulnere profusione, post admotionem pulueris adstrictorij tres aut plures, vt videbitur, panni linei, aut ex stupis puluilli, oxycrato primū madefacti, & postea expressi medicamento sanguinem suppressente imbuantur, vulneri agglutinentur, & supra ipsum alligentur.

Tertius canon est eiusdem Galeni, qui per deligaturam docet suppressere sanguinem, sic inquit: Alligandum autem id forissecus fascia est, ex tenui linteo cuius fasciæ primi quatuor quinquève amplexus ipsi profluenti vasi iniiciuntur. Ab hinc vasis radicem versus ducentur, in quibus videlicet partibus radicem versus ducere licet. Licet autem ferè in omnibus, præterquam cerebri membranis. Hac quidem deligatura (vt inquit Auicennas) quod confluit reprimatur, & vena sanguinem fundens, constringitur.

Quartus canon in suppressendo sanguine obseruandus est, vt membrum à quo sanguis profluit, situ appposito collocetur. Vnde Galenus libro quinto methodi medendi ad hunc modum ait, Præter omnia iam dicta, inter hæmorrhagias, id est, profusionis sanguinis remedia censeatur, & appositus vulneratæ partis situs. Porro appositus fuerit eidem Galeno vulneratæ particulæ situs si ad geminum hunc



hunc finem sit directus. Nempe vt & dolore pars careat, & sursum spectet, custodito tamen in hac situs figura modo, ne dolor incidat. Si verò vel prona spectet, vel doleat, non solum profluuium non sistetur, sed etiam si non sit pro-uocabitur, & inflammatio augebitur, præsertim si pars dolore infestetur, cum nihil quidem æquè sanguinis profluuium excitet, inflammationesque augeat, ac dolor.

Deligatura ante diē tertium minime soluēda. 5 Quintum documentum ab eodem Galeno præscriptū est, quo cauetur, ne ante diem tertium deligatura solua-tur: vbi autem illam tertio solueris die, si tutò adhuc me-
dicamentum emplasticum, & sistens sanguinem vlceri ad-hæreat, aliud rursus super ipsum accommodabis, ac veluti linamentum id, quod ex pilis factum inhæsit madefaciēs, deligabis, ita vt initio deligasti. Sin prius sua sponte reie-cerit linamentū radicem vasis digito blandè comprimēs, 15 ne videlicet quippiam confluat, hoc quidem suspensa ma-nu, ac sensim adimes, atque alterum impones. Quod etiā eodem, quo & primum (si necessitas exigat) imbues me-dicamento, vel oui candido liquore cum rosæcco subactō, vel vino crassiore, & styptico. Ad hunc modum, quoad 20 carne obducetur, ac munietur vas, curare debebis, vtique à principio ad finem vsq; (vt supra dictum est) particulam supinam seruans.

6 Sextum præceptum in larga sanguinis profusione ob-seruandum est, vt laborans oculos clausos contineat, aut 25 loco obscuriore reponatur, ne vel proprium sanguinem, vel rubrum quidpiam videre possit. Atque illi asseueratio-ne affirmetur, quod sanguinis profluuium constituit, & si adhuc sanguis fluat, magno ipsius commodo id fieri, at-que ita contraria imaginatione, virtus naturalis ipsius ro-30 boratur.

Auicenn. Hinc dicebat Auicennas, quòd grauissimum acciden-
tium animalium, mouentium imaginationem, est motus
sanguinis, & consecutio eius, qui paratus est ad eum, cum
multum intentus fuerit, ad considerandum res rubras. 35

Medicmēta sangui-nem suppri-mentia. Cæterum tempestiuū est vt subiiciamus medicamenta, 40
quæ sistendi sanguinem vim habent: statutum enim erat
nobis postremo loco de iis dicere. Itaque primum, atque
omnium optimum est, quod à Galeno describitur libro
quinto methodi medendi. Quo etiā ad cerebri membra-
narum

narum hæmorrhagias vti securissimum est. Item ad colli vulnera, ipsarumque venarum iugularium, quas sphagittidas vocans, etenim & harum sanguinem citra vinculum prohibet. Verba autem Galeni hæc sunt:

- 5 Thuris pars vna, aloës partis vnus semissi miscetur. 1
 „ Mox cum vtendi tempus instat, tantum huius pulueris cū *Gal. medi-*
 „ oui candido subigitur, quantum mellis reddat crassitudi- *camentum*
 „ nem. Hoc dehinc leporis mollissimo pilo excipitur, dein- *sanguinem*
 „ de tum vasi ipsi, tum vlceri toti liberaliter imponitur. Al- *supprimēs.*
 10 ligandum autem id forinsecus fascia, ex tenui linteo, mo-
 „ do quo in tertio canone suprâ dictum est. Hoc autem me-
 „ dicamēto (inquit paulò post Galenus) multifariam vtor,
 „ aliàs (vt dictum est) duplum thuris aloë admiscens, aliàs
 „ pari modo ambobus vtens, aliàs paulò superante oloën
 15 thure, aut etiam plusculo, sed nondum duplo, etiam man-
 „ nam pro thure aliquando iniiciens. Porro constat in duris
 „ corporibus, plus aloës esse immiscendum, in mollibus plus
 thuris.

- Secundum medicamentum sumitur ex dictis Auicen- 2
 20 næ, quod & ab omnibus chirurgis approbatur, habet au-
 tem ad hunc modum, recipe boli Armeniæ, sanguinis dra- *Auicennæ*
 conis, thuris, aloës succotrini, pares portiones, terantur in *puluis.*
 puluerem, qui apponatur, vt dictum est.

- Tertium medicamenti genus est Bruni, qui ipsum de- 3
 25 sumpsit ex lib. diuisionum Razis, & ex Albucafe. Recipit *Bruni me-*
 autem calcis viuæ (quæ sola, vt suprâ diximus, sanguinem *dicamētū.*
 cohibet, & sistit) sanguinis draconis, gypsi, aloës, thuris,
 vitreoli, singulorum æquas portiones; rediguntur in pul-
 uerem, & cum oui candido liquore, & tela araneorū mi-
 30 scentur, donec in corpus vnum coëant, & superponuntur.
 Est qui plurimum commendat gallam combustam, ma-
 ceratam in vino, & aceto, tritamque, & super arteriâ ad-
 motam. Alij in huiusmodi pulueribus symphyton ad-
 dunt, quod posteriores consolidam vocant. *Galla com-*
busta.
Symphysō.

35 *Curatio vulneris in vena.*

- „ Vppresso sanguine, qui ex vulnere profluebat, ad pro-
 „ priam ipsius vulneris curationem mox accedendum est,
 „ vt superius est annotatū. Porro tametsi (vt Galenus ait) *Li. 5. meth.*
 „ sanatu difficilior sit arteria, quàm vena, nō tamen est me-
 dicamētorum admodum diuersus in vtraq; vñus, imò spe-
 cie

*Curatio vl
ceru in ve-
na.*

cie planè idem, maioris minorisq; ratione euariàs. Quip-
pe tanto ficcioribus medicamētis eget arteria, quàm vena,
quanto ipsa est suapte natura ficcioris tēperamenti, quàm
vena. Ergo quod venæ insedit vulnus, vbi ad manum est,
& citra substantiæ deperditionē, eandem desiderat cura-
tionem iis, quæ in carne accidūt. Nam siue ex recenti ictu
factum est, id agendum est, vt medicamentis iis, quæ en-
hæma vocant, coëat: siue ex erosione, quæcunque dicta de
rebellium vlcerum curatione sunt, ea prius ratione discer-
nenda, mox vt opere perficiantur, tentanda. Quinetiam
vbi vinculo vas sis complexus, aut medicamentis sangui-
nem supprimentibus, aut ferramentis ignitis vsus, ita, vt
facta fuerit substantiæ deperditio, illudque tibi curationis
propositū restet, vt quæ circa vulneris, vlcerisve labra sunt
carne impleas, iisdem omnino medicamentis vtendum
erit quæ in methodo sinuosorum ac cauorum vlcerum
sunt descripta.

*De vulneribus neruorum, tendonum, & syndesmorum, id est li-
gamentorum.*

C A P. X I I I.

*Differētia
vulnerum,
partiū ner-
uosarum.*



Vulnera neruosarum partium Auicennæ li-
bro quarto suæ medicinæ, & Galeno libro
sexto methodi medendi, quandoque pun-
ctim, quandoque cæsim fiunt. Eadem inter-
dum sine contusione, interdū verò cum con-
tusione accepta sunt. Ex puncturis autem, quædam hiant,
atque apertæ sunt, quædam cæcæ, atque occlusæ manent,
adeo vt earū ora sic conuiueant, ac inter se coëant, vt con-
spectum effugiant. Porro ex dissectionibus, hoc est, iis quæ
in neruosis partibus cæsim fiunt vulneribus, aliæ per trās-
uersum, aliæ per longitudinem inflicte sunt. Atque ex ha-
rum vtrisque, quædam fiunt sine amissione substantiæ car-
nosæ, quædam verò cum deperditione ipsius substantiæ
carneæ, cute etiam, quæ interueniebat, diuisa, adeo vt ner-
uus nudus appareat. Ad hæc nerui transuersim vulnerati,
quandoque non ex toto, sed duntaxat ex parte dissecti,
quandoque verò toti præcisi sunt. Atque in omnibus iis
vulnerationibus, quandoque dolor ingens, & inflamma-
tio, & conuulsio accidunt, quandoque verò non. Itaq; ab
iis nuper commemoratis vulnerum differentiis, curatio-
nis indicationes sumuntur.

Omnium

Omnium eiusmodi vulnerationum causæ sunt ea, quæ CAUSÆ.
 incidunt, pungunt ac penetrant, & contundunt: vt in superioribus (vbi scilicet de causis vulnery in vniuersum differuimus) ostensum est.

5 Cæterum ex præcedentibus conspicuum euadit, quod SIGNA
 neruus vulnerari nõ potest, quin cutis, & caro solutionem et indicia.
 „ continui, & vulnerationem etiã patiantur. Neruum con-
 „ uulneratum esse testantur, dolor ingens, læsio sensus, &
 „ motus, & si in loco neruoso vulnus acceptum est. Sed ab
 20 hoc postremo coniecturalis solùm nota desumitur.

Neruis vulneratis, aut punctis, ex sentiendi, quod obtinent, acumine, inflammatio, & dolor immodicus accidit.

Quare & febres, & conuulsiones his oboriuntur, quibusdam & delirium, ob neruorum cum cerebro commercii.

15 Interim verò, in aliis quoque particulæ affectæ locis, inflammationes, & abscessus super ipsum neruum conuulneratum, quod cohæreat, solent accidere. Ita quidem iudicatur Galeno libro tertio artis medicinalis, vt in superioribus annotauimus.

20 Si in vulneribus neruorum tumor apparuerit, & postea disparuerit, conuulsionis, ac delirij periculum imminet. Hinc de tumoribus, qui vulneribus superueniunt, loquens Hippocrates libro quinto Aphorismorum, in vniuersum omnes illos tumores damnat, qui derepente detumescunt.

25 Sed & ingens malum portendi ibidem adferit, cum vulneribus prauis (qualia sunt, quæ in capitibus, aut finibus musculorum, & maximè neruosorum fiunt) tumores omninò non adueniunt. Si in vulneribus (inquit) fortibus, & prauis tumor non appareat, ingens malum. Sequenti quo-

30 que aphorismo, qui pars est antecedentis, docet Hippocrates, tumores omnes prauis maximè vulneribus, cuiusmodi sunt ea, quæ neruosis partibus illata sunt, superuenientes, quicunque molles sunt, optimos esse, contrarios verò prauos. Molles (inquit) boni, crudi verò mali. Vbi crudum

35 tumorem vocat, durum, atque renitentem, qui opponitur „ molli. Ad hæc, neruo per transuersum vulnerato, sed non omninò dissecto, maior conuulsionis metus impendit, quàm si totus præcisus esset: phlegmone scilicet à de-

sectis fibris, ad non sectas communicata: cæterum conuulsione, ab ipsis non sectis excitata. At si totus quidem

Que symptomata.

quique affectus, ex neruorum vulnere oboriuntur.

Tumor in neruorum vulnere.

Crudus tumor, qui discutitur Hip. Gal. lib. 6, Therap.

dem neruus præcisus sit, metus prætereà nullus instat, nec periculum vllum inde sequetur: debilis tamen particula manebit, vt priùs dictum est, cùm de spasmo ageremus.

Meminisse prætereà oportet, quòd frigidum, partium neruofarum vulneribus, magis est mordax, quàm iis, quæ carnes occupant.

*Ligamēta
vulnerata,
valentiſſi-
ma tolerāt
remedia.*

Neruea ligamēta, siue copulæ, quos syndesmos vocant, cùm simillimā habeāt tendonibus speciē, valentiſſimorum remediōrū Gal. sexto Therapeu. vim tolerāt: quippe quòd nec ad cerebrū pertingāt, & sensu careant. Nam nerui om-
nes, alij quidē ex ipso planē cerebro ortū habent, alij spi-
nali interueniente medulla. Tendones quoque, quoniam
compositam ex neruo ligamētōque substantiā habēt qua-
reñs nerui participes sunt, eatenus ex cerebro oriuntur.
Ceterū minùs saltē, quā ipsi nerui cōuulsionē accersunt.

Syndesmus verò vulneratus, si is est, qui ab osse ad os permeat, ac duorum ossium coniunctio est, & maxime sine periculo est, & ipsum quibuslibet siccans medicamentis, nihil hominem offendes. Sin is qui in musculum se inserit, quando est neruo & tendone minus periculo opportunus, 20
tanto vtique, nisi ritē, hoc est cautē, & diligenter curetur, reliquis syndesmis, magis terrere debet.

Curatio vulnery, partium neruofarum.

Curatio vulnery eiusmodi partium neruofarū, com-
munis est, cum ea, quæ & vulneribus partiū carnosarum accomodatur: hoc vno tamen excepto, quòd sympto-
ma ilis superueniens, nempe dolor, primò medici solici-
tudinem (cùm nimis cōtristat) ad se conuertit. Ita tamen,
vt vniuersales, ac communes illæ intēctiones suprā memo-
ratae, haud prorsus interim negligantur. Hæ autem nume-
ro erant quatuor. Prima quidem, extranea, quæ vulneris
labris intercidunt, remouere. Secūda, vulneris labra dissi-
dentia cōmittere. Tertia commissa, atque in vnū coniun-
cta, seruare. Quarta, particulæ lęsæ substantiā conseruare. 30
Ceterū quomodò has intēctiones assequamur, ex differe-
ntiis iā suprā enumeratis planē cognoscemus. Ergo à simpli-
ciori exordjū sumētes, de nerui pūctura primū dicemus.

*In gēti do-
lori primò
succurren-
dum.*

*Puncti ner-
ui curatio.*

In nerui puncti curatione, neque vnitionem moliri
statim oportet, neque coacta, seu in vnum coniuncta
conseruare

conseruare: Quin potius cutis quidem vulnus apertum, inglutinatumq; custodire. Itaque infixæ duntaxat (si quæ neruis inhæserint) extrahenda, & particulæ oblææ substantia seruanda. Porro, qua ratione defixa euellenda sint, abundè in præcedentibus ostendimus. Reliquum est igitur, vt quomodo lesæ particulæ substantia seruanda sit, & ab ingruentibus iniuriis vindicanda, aperiāmus. Ceterum partis ipsius laborantis, hoc est, puncti nerui substantiam optimè seruabis, si, & dolori (qui ob exactum, atque excellentem partis affectu sensum vehementissimus excitari solet) sedulo, ac maturè occurreris: & phlegmonem fieri prohibueris. Quæ duo ex necessitate (nisi obstiteteris) nerui puncturam consequuntur, & conuulsionē subinde accersunt, vt in præcedentibus iam annotauimus. Vt autem geminum hunc scopum assequaris, hoc est, dolorem, ac inflammationem prohibere possis, quatuor intentiones rursus tibi erunt diligenter obseruandæ. Prima erit recta vitæ institutio. Secunda, materiæ antecedentis substractio: ne scilicet ratione doloris, confertim ad locum affectum confluat. Tertia, corpus à conuulsionis noxa vindicare. Quarta, dolorem sedare, & æruginosam saniem, educere. Et hæc quidem puncturæ nerui propria est, & maxime peculiaris. Aliæ verò tres, omnibus neruorum vulneribus sunt communes.

Quod ad primam intentionem attinet, præcipit Auicennas, vt cui neruus punctus est, victum in extremo tenuissimum seruet, iuxta eam formam, quam superius expressimus, dum in vniuersum de vuulneribus tractaremus. Locus in quo cubabit æger, tepidus esse debet, vt Celsus nos admonuit. Lectulus verò mollis, vt Galeno, & Auicennæ placuit. Sed & collocari quoque membrum, quod ictum est, ratione certa debet. Opimum etiam medicamentum laboranti quies est: moueri enim, & ambulare, nisi sanis alienum est. In quiete igitur, ac lectulo molli hominem continere oportet.

Vt autem secundam intentionem assequi possis, sequendum omninò tibi est Galeni cōsiliū, qui libro sexto methodi medendi, iubet in nerui punctura, corpus totum sanguinis missione inaniendum esse, vtique si virtus robusta fuerit, & nihil aliud obstitit: etsi nulla etiam adsit in cor-

In nerui punctura vulnus diu aperiū seruandū est.

Symptoma ta nerui pūcturam comitantia.

Quatuor intentiones in curanda nerui punctura, obseruande.

Vitæ ratio.

2 Materia antecedētis substractio sanguinis missio.

pore laborante sanguinis redundantia. Morbi enim magnitudo, ac doloris vehementia, corpore etiam plethorico non existente, hoc genus auxilij (vt antea diximus) plerumque desiderat. Cæterum in hac per sanguinis missionem, vacuatione, seruanda semper erit locorum affinitas, vt frequenter admonuimus. Si verò vitiosis succis repletum corpus sit, protinus congruo medicamento illud purgabis.

Purgatio. Leuis quoque frictio rectè adhibetur, sed his partibus, quæ longius absunt à vulnere.

Frictio.

3 De tertia indicatione abunde satis dictum est in præcedentibus, vbi de conuulsione vulneribus superueniente tractauimus. Itaq; si puncto neruo, vel quouis modo vulnerato, aut etiam contuso, spasmus acciderit, aut eius metus ingruat, protinus caput, collum, atque vniuersam dorsi spinam, oleo liliorum, vel cõmuni, calente fovebis. Porro si in partibus superioribus, vt manu, vel brachio, id genus vulneris neruus acceperit, præter iam commemoratas partes, axillas quoque vbertim oleo calenti delinies. Si verò punctus, aut quouis modo vulneratus neruus ex his sit, qui in crure habentur, bubones, siue inguina, pubes, & loca vicina, largo oleo statim erunt imbuenda. Tum per totam spinam, ad collum, & caput vsque ascendendũ. Sed & tendones, & ligamenta, ac loca ipsa vulnere vbiuis illato propinqua eodem modo fouenda sunt, vt sexto libro methodi medendi Galenus facere nos edocuit.

Cæterum, neruorum vulneribus, sed maximè punctim inflitctis, perperam à principio curatis maxima omnino inflammatio, & putredo superuenit. Ergo cum nerui vulnerati sic iam inflammatione tentantur, & putrescunt, farinam hordeaceam, aut fabaceam aut potius eruina, in aqua lixiua aut oxymelite, vel syropo acetoso, decoctã, loco phlegmone occupato, & putrescenti statim illinire oportet. Non autem triticeam farinam, aut eius generis cataplasmata, quæ particulam putrem efficiunt: imò verò neque aquam calidam adhibebis. Hæc enim tametsi reliquis inflammationibus, quas phlegmonas appellamus, sit accommodatissima (vt quæ eas valde mitiget) vulneratis tamen neruis est infestissima. Ab humectantibus namque, & calefacientibus medicinis, putredo huiusmodi affectibus comparatur. Quòd si vehemēs inflammatio cum

Aqua calens vulnere nervi infestissima. maximè

maximo dolore infestauerit, eruinam farinam, aut fabaceam, cum optima sapa, addito paucissimo aceto, decoctā, illinito: prius tamen parte affecta, oleo calido affatim perfusa. Tanta verò interdum ex eiusmodi puncturis, & nervorum vulneribus oboritur putrefactio, vt ferro candenti, vel caustico aliquo medicamento (cuiusmodi est Aegyptiacum) eam adurere cogamur.

Haliab. & Auicenna ad eiusmodi phlegmonas, & gangrænas, seu putredines, emplastro ex metallicis, & aceto præparato utebantur, cuius cōpositio libro tertio de compositione medicamentorum κατὰ γένη, à Galeno sub hac verborum serie descripta est. Cere pondo vnc. sex, olei vnc. nouem, mysios pondo vnc. sex, chalcitidis denarij pondo vnus, squammæ æris pondo vnc. duas, & semis, thuris pondo vnc. semis, galbani pondo vncia. Quæ liquari possunt, hoc est, cera, & galbanum, liquefacta, metallicis in aceto acri prius accuratè tritis, superfunduntur. Hoc pharmacum ignorauit Galenus, quis composuerit, neque apud vllum hoc modo citatum vnquam (vt ipse testatur) comperit. Eadem tamen præstare, quæ & alia quædam odorata simul, & sumptuosa, quæ paulò antè recenset, adfirmat. Recentiores autem eo medicamento vti non consueverunt, sed illo potius, quod constat farina hordei, fabarum, & orobi, in lixiuio stillaticio, (vt prius diximus) decoctis.

25 Quippe quod à Galeno, & Auicenna maximè sit celebratum, & frequenti experientia, optimum ad hanc rem à multis comprobatum. Addit autem in decoctione Auicennas, mel, & acetum.

Quod verò ad quartam intentionem consequendam attinet, quæ nervorum quidem puncturæ magis propria est, Galenus libro sexto methodi medendi, valde multa pharmaca recenset, ab ipso excogitata, & deorum quadam prouidentia (vt alibi testatur) inuenta. Quæ vulnere imposita, ad vtrunque mirè sunt comparata, tum vt dolorem mitigent, tum vt exitum saniei patefaciant.

35 Tutiùs verò fuerit in nervis acu, aut paxillo, aut quopiam tali compunctis, præsertim si in altum recessum vulnus, hoc est, punctura descenderit, & conspectum effugiat, cutim etiā in vulneris orificio aperire, ac latius incidere, quò melius sanies effluat, & commodius ad profunditatem loci me-

*Emplastr.
ex metalli-
cis ad gan-
grænas, &
putredines.*

*4
Doloris se-
datio, & sa-
niei edu-
ctio.*

*Punctura
dilatatio.*

dicamentorum vires perueniant. Porro aliis cultro ra-
 sorio, aliis verò cauterio cutem ipsam aperiendam esse ma-
 gis placet. Galenus in id genus puncturis, orificium dua-
 bus in cutem sectionibus rectis diuidere iubet libro tertio
 de compositione medicamentorum secundum genera. 5
 Itaque nisi oræ angustiorum eiusmodi punctuum aperian-
 tur, conuulsionis periculū magis imminet. Quippe quod
 obcæcato ita cutis vulnere, nihil à profundo extrorsum
 expiret. Facta autem cutis apertione, exiccandum mox
 vulnus est, substantia aliqua tenui, quæ vsq; ad ima nervi 10
 offensi possit penetrare, vt lib. artis medicinalis Gale. nos
 admonuit. Cuius generis est oleum Sabinum, præsertim
 vetus, quod tanquam vtilissimum ad præsentem curatio-
 nem, libro sexto methodi medendi, & tertio de compo-
 med. *extra yvuv*. idem autor deligit. Vitandum autem (con- 15
 silio eiusdem) omninò est, oleum crudum, quod *duorgis*
 vel *imqduuv*: duplici nomine Græcè dicitur: & quod deni-
 que vim habet adstringendi, cuiusmodi est oleum myrti-
 num, tribus saltem primis diebus. Hoc enim per halitum
 non digerit, sed obstruit, & perspiratum prohibet. Præstat 20
 igitur nervos punctim ictos oleo tenui, adstrictione pro-
 fusus carente, perfundere, quale dulcissimum est, quod lon-
 gè melius erit, si duo aut tres annos transegerit. Sed ne-
 que Sabinum etiam ipsum oleum, quamvis sit tenuissi-
 mum, aut aliud quoduis simile, vt est Iasminum (quod vo- 25
 cant) frigidum admouendum est, sed calens: frigidum
 namque præterquam quod nervis aduersatur (vt quinto
 Apho. expressit Hippoc.) tenues quoque meatus obstruit,
 & ipsos angustiores efficit: calidum verò digerit, ac dila-
 tat, doloresque magis demulcet. Si vehemens dolor labo- 30
 rantem discruciat, oleum ex vitellis ouorum commodè
 administratur. Ad eandem quoque intentionem in nervis
 punctim vulneratis, Galenus sæpe vsus est terebinthina
 resina, medicamento sanè apprime idoneo: per se quidem
 in pueris, & mulieribus, & generaliter iis, qui molli essent 35
 carne, cum euphorbio verò emollita, in duris corporibus.
 Nò secus autè & propoli, nò per se modò, verum etià cum
 euphorbio molliens, vsus est: & si nonnunquam duriora
 contigerint cum oleo quodam tenuiore. Quin (subiun- 40
 git) & sagapenò in duris corporibus sum vsus, utique cum
 oleo

*Oleum Sa-
binum.*

*Olea ad-
stringentia
vitanda.*

*Frigidum
punctis ner-
uis aduersa-
tur.*

*Si dolor
vehemens
idest.*

*Medicame-
ta quibus
vsus est Ga-
len. in ner-
uis punctim
vulneratis.
Lib. 6. me-
tho. med.*

„ oleo, & terebinthina id miscens. Sed & opopanace ad
 „ eundem modum, quo & sagapeno. Mihi verò & lachry-
 „ ma Cyrenaica non inutilis fore videtur, si quis empla-
 „ strum ex ea faciat: cuiusmodi est, quod nos ex euphorbio
 „ composuimus. Verùm (inquit) nondum id experientia,
 „ quemadmodum reliqua omnia comprobauimus.

„ Quippe præcedere oportet eam, quæ à vera methodo
 „ proficiscitur, remediorum inuentionem: huic verò expe-
 10 rientiam ad certiore etiam fidem subscribere. Si quidem
 „ ex tali methodo etiam sulphur, quod neque ignem exper-
 „ tum, neque lapidosum sit, sed omnino tenuium partium,
 „ ei cui neruus vulneratus esset, conducturum sperauimus.
 „ tantùm eius [sulphuris inquam] tenui oleo miscentes:
 15 dum quod ex vtrisque mixtum erat, sordiũ haberet cras-
 „ situdinem. In valentioribus verò durioribusque corpori-
 „ bus etiam si ad mellis crassitudinem redigas, sic quoque
 iuueris. Nam id quoque comprobatum experientia est.
 Hactenus Galenus. Cuius sententiam approbat Auen-
 20 zoar, huiusque rei periculum se aliquando fecisse testa-
 „ tur. Quæ autem de lota calce subdit Galenus, neruis de-
 nudatis magis conuenire videntur. Quare in sequentia,
 ea referuamus.

*Remediorũ
per mesho-
dum inuen-
tionẽ præ-
cedere de-
bere deinde
hanc expe-
rientia con-
firmare.*

Auẽzoar.

Cæterum paucis quibusdã interiectis refert Galenus, se
 25 composuisse emplastrum ex cera, resina terebenthina, pic-
 „ ce, & euphorbio, ad hanc intentionem longè optimum,
 „ quo & plurimi sua ætate, felici successu vterentur. Reci-
 „ piebat autem ex cera partem vnã, ex terebinthina, & pic-
 „ ce, vtriusque partis vnus dimidium (sic vt quod ex vtrisque
 30 constaretur, cæræ par esset) ex euphorbio verò, cæræ partẽ
 duodecimam, etiam plus aliquando, vbi scilicet valentius
 efficere est in animo. Licet quoque interim & plus sit,
 „ quod ex terebintina, & pice confit, quàm cera. Licet rur-
 „ sus & alterum eorum tantùm cæræ admiscere. Quin
 35 etiam in penuria terebenthinæ resinæ (quæ vix apud nos
 „ reperitur) abietinam Galenus etiam autore, commodè ad-
 „ miscebis. Emplastro verò aliquo ex prius memoratis ap-
 „ posito, lanam mollem oleo calente madefactam supra de-
 „ center alligabis. Igitur vt summarim, atq; vniuersim dica-
 „ mus, quæ in puncti nerui curatione obseruanda sunt, Ga-
 lenum ita sexto lib. Therapeutices scribentem audiamus.

*Emplastrũ
Galenĩ.*

Gal. lib. 6. Vulnerati nerui curatio, medicamenta postulat, quæ & tepidum calorem excitent, & valèter [sine molestia tamen] deficcant. Tum quæ ex substantiæ suæ natura, & trahendi vim habeant, & tenuium sint partium. Et rursus ibidem. In pharmacis autem huc omne consilium direxi: vt esset eorum facultas, tum tenuis, tum modicè excalfaciens, & quæ admodum siccare citra dolorem posset. Cùm sola hæc trahere ex profundo saniem, neque contracta, neque demorsa particula possit. Porro cùm permagna humanorum corporum (vt alibi Galenus ait) sit differentia, tum in o temperamenti, tum ætatum mutationibus, insuper vitæ studiis nulla ratione quòdque medicamentum omnibus conuenire potest. Quamobrem duo in promptu habeto, alterum valentius ex similibus genere confectum, alterum mitius, quæ inuicem mista dum vsus postulat permulta inter hæc iuxta misturæ quantitatem constitues.

De neruis cæsim vulneratis.

SI autem neruus non punctim, sed planè cæsim vulneratus fuerit, diligenter considerandû est, quo pacto facta vulneratio sit: vtrumne per transuersum neruû, an secundum longitudinem eius. Tum verò quâ tum interuenientis seu prææcensis cutis diuisum sit. Ad hæc spectandum etiam est, num totus neruus dissectus sit, an non ex toto præcisus. Eiusmodi nanque vulnere differentia, curandi rationem non parum euariant, vt ex sequentibus euadet manifestum. Itaque si cutis, quæ interueniebat sectio, non satis pateat, ampliori diuisione aperienda est, vt iam in præcedentibus admonuimus. Proponatur igitur primum satis esse cutis adaperitum, non ita tamen hiare vulnus, vt neruus ipse incisus sensui nudus adhuc appareat. Sanè huiusmodi nerui scissura, siue per directum, siue per transuersum facta diuisio sit: vltra communes tres iam intentiones distas in punctura obseruandas, tres adhuc alios scopos, siue intentiones habet. Prima est, vt in loco vulneris magis declinui, turunda aliqua mollis, & suavis blandè imponatur. Secunda, vt aliquod medicamentum anodynum, seu mitigatorium, & vt vocant incarnatiuum, neruis dicatum, vulnere superponatur. Tertia, vt lana mollis succida, vel oleo calente delibuta, desuper blandè alligetur. Ergo non ita exactè vulneris oræ committendæ sunt, & glutinandæ, quin

Hypothesis.

3. Intentiones particul.



- quin emissarium aliquod relinquatur, quo collecta sanies
 effluere possit. Hæc enim si in profundo retineatur, nervis
 putrefactionem ac corruptionem inducet, atque ita con-
 uulsionem etiam inuehet. Eam ob rem profuerit (primis *Turunda.*
 5 saltem diebus) turundam aliquam mollem, digestiuo ex
 terebinthina, oui luteo, & croci momento illitam, loco vul-
 neris, vt dictum est, decliuiori molliter immittere, donec
 nullum amplius phlegmones, aut conuulsionis periculum
 timeatur. Medicamentum autem his neruorum, ac etiam
 10 tendinum vulneribus, cæsim non punctim acceptis, expe-
 ditissimum, appriméque idoneum esse creditur, quod vn-
 guentum ex vermibus vulgò noncupatur. Recipit autem *Vnguentum*
 centaureæ minoris, linguæ canis, lanceolatæ, quæ plátago *ex vermi-*
 est minor, pilosellæ, consolidæ maioris & minoris, ana M. *bua.*
 15 vnum, vermium terrestium, quos lumbricos appellamus,
 lib. semis, olei communis, libr. vnam, vini libr. vnam, & se-
 mis: subigantur simul, & ita septem diebus nutriantur, seu
 (vt loquuntur) fermententur. Deinde illis addantur sepi-
 arietis à pelliculis emundati, lib. vna, picis nigræ, resinæ,
 20 ana quart. vnum gummi ammoniaci, galbani, opopanax
 in aceto dissolutorum ana drac. quinque: simul omnia mo-
 derato igne decoquantur vsque ad vini & aceti consum-
 ptionem, & colentur. Vbi verò hæc penè refrixerint, adde
 terebinthinæ quar. semis. thuris, mastiches, sarcocollæ ana
 25 drac. tres croci drach. duas: spathulâ agentur in morta-
 rio, & fiat vnguentum. Porro longè alia multa medica-
 menta, paratu etiam facilia, hisce neruorum diuisioni-
 bus, valde accommodata referuntur à Galen. libro tertio de
 compositione medicamentorum secundum genera, & sex
 30 to methodi medendi. Cuiusmodi est, quod ex oximelite, *Cataplas-*
 & fabarum farina: vel eruorum: vel lilij, vel ciceris: vel lu- *ma.*
 pinorum amarorum, vel hordeacea farina cataplasma con-
 ficitur. Item pix liquida fermento temperata, atque vulne- *Pix liqui-*
 ri imposita. Eruorum quoque, aut alia ex prædictis farina, *da.*
 35 fermento permixta. Imo & interim fermentum ipsum so- *Oxелеum.*
 lum. Quinetiam oxelæum solum quod caleat, modò ace- *Propolis.*
 tum abundè acre, & verustum sit. Propolis quoque recens
 liquida, & pinguis vulnere imposita, sepe præsidio fuit: in-
 terim quidem per se, interim fermento commixta. His ita-
 que præidiis ad neruorum vulnera, tam in agris, quam in

*Qualia in
vniuersum
medicamē-
ta esse debe-
ant, neruo
rū vulneri-
bus accom-
moda.*

*Lana mol-
lis succida.*

*Li. 3. lxxa
yivv.*

vrribus felici admodum successu, Galenus sæpe vsus est, non solum in his, quos iam phlegmone prehēderat, sed etiam: vt refert protinus ab initio. In summa oportet medicamenta omnia, quæ neruorum vulneribus tam cæsim, quàm punctim inflictis, ex vsu futura sunt ea pollere facultate, quæ & modicè calfacere (id est, tepidum calorem, & veluti ex sole suauem excitare) & valenter, citra dolorem tamen siccare possit. Tum ea quoque esse substantiæ natura, quæ ex alto saniem, atque humores educere, ac digerere valeant. Atque ex iis minus molesta esse consue-
runt, quæ liquida sunt: vt Galenus etiam annotauit, libr. 3. de compo. medic. secundum genera. Super eiusmodi verò medicamenta lana mollis succida vel oleo calente respersa apponenda est, & leniter obstringenda. Cæterum quoniā frigus cum omnibus, tum verò maximè neruorum vulne-
ribus infestissimum est, plurimum conferet lanam ipsam superpositam permanere calidam, siue oleo tantum, siue oxelæo quoq; imbuta fuerit: fiet hoc si aliæ lanæ siccæ vel-
lera, aut panni calidi subinde mutati, extrinsecus circūponantur, & æger intra tectum, si modò hyems fuerit, ad
quintum vsque vel septimum morbi diem sese contineat. Nam si eo vsque phlegmone non tentetur, vacetque prorsus dolore: & nullam sentiat tentationem, in posterum (inquit Galenus) tutus erit. Atque hæc de neruo cæsim vulnerato in vniuersum, ac generaliter dicta sunt siue per trās
uersum siue per directum, seu longitudinem neruus diuisus sit. Quæ verò sequuntur, peculiariter de neruo per transuersum vulnerato dicuntur.

De neruo per transuersum cæso.

AT si neruus per transuersum vulneratus sit, non tamē ex toto præcisus, maior conuulsionis metus im-
pender, inflammatione scilicet (vt supra diximus) à dissectis fibris ad integras, & non sectas succedente, cæterum conuulsione ab ipsis non sectis excitata: Huic itaque memoratis prius auxiliis, quàm citissimè occurrendum est. Ergo
in quiete omnino, & strato mollissimo continendus æger est, plurimòque oleo affatim, & assidue inguina, spina, axilla, collum, & caput perfundendum. Cæterum in hoc vulnere largius sanguis mittendus est, & victus tenuior adhibendus, quàm in neruo per directum inciso. Quod
si conu

si conuulsio iam superuenerit, & nulla conuenientium
 medicamentorum vi remittatur, reliquæ fibræ quæ inte-
 „ græ remanserant, præcidi debent. Si enim totus neruus
 „ præcisus sit, nullum quidem prætereà (vt Galenus inquit) 6. metho.
 „ conuulsionis periculum sequetur: debilis tamen particula
 „ manebit. Verùm læsio, quàm mors potius optanda. Hoc pa- Ther. 12.
 „ cto quibusdam in priore infernâque femoris parte, per
 transuersum percussis reliquum tendinis amputauit Gale.
 „ vt tuta illi esset curatio. Porro si transuersa hæc diuisio, Li. 3. *λὰ τὰ*
 10 „ tam insigniter alta in musculo facta sit, vt deligatura nihil *γὰρ.*
 prodesse possit, non dubitabis musculi distantes inuicem
 partes (præsertim si vulnus recens fuerit) futuris altioribus
 contrahere, curâ tamen semper adhibita, ne ab acu ner-
 uus, vel tendo compungatur. Carnosa nanque ipsa mus-
 15 „ culorum pars, dum acu suitur, periculo vacat. Nerui verò,
 aut tendines, non mediocri periculo consuuntur. Horum
 quidem omnium Galenus nobis autor fuit libr. tertio de
 compo. medi. secundum genera, ad hunc modum scribens:
 „ Contemplatus (inquit) gladiatorem quendam ex his quos
 20 „ equites nominant, transuersam diuisionem in priore, ac
 inferiore femoris parte habentem eâmq; satis altam:
 „ tum vulneris labrum intuitus sursum alterum reuulsum,
 „ infrâ alterum quasi ad patellam detractum, non dubitau
 „ distantes inuicem musculorum partes futuris contrahere,
 25 „ curatione illa quæ Græcè à latitudine *λὰ τὰ πλάτος* dicitur,
 „ neglecta. Itaque veritus tendines ipsis consuere denudatis
 „ prius illis, sic altioribus futuris vsus sum, haud ignarus car-
 „ nosam ipsam musculorum partem periculo vacare, tendi-
 „ nes verò non item, quanquam hoc nullum ex præceptoribus
 30 „ facientem viderim. Has autem futuras in eiusmodi *Cur futura*
 vulnere, ideò non superficie tenus, sed altius moliri con- *alta esse de-*
 uenit, ne quæ in imo sunt, inconglutinata dehiscant. Reli- *bent.*
 qua verò, quæ ad vulneris curationem attinent, hæc quo-
 que sunt eadem, etiam si totus neruus præcisus sit. In solo
 35 „ itaque per transuersum accepto vulnere, eodémque in-
 gniter alto cum deligatura nihil prodesse potest, ex sola
 futura curatio absoluitur. Etenim in vulneribus, iuxta
 membri longitudinem factis, deligatura vulnerati musculi *Lubrici in*
 partibus inuicem contrahendis sufficit Galeno. Cæterum *rosaceo de-*
 futura decenter facta, biduo confutum vulnus fouendum *cocti.*

erit rosaceo, in quo lumbrici terrestres prius decocti fuerint, ac suprâ pulvis aliquis qui suturam contineat, aspergendus erit, cui parem ipsorum lumbricorum desiccatorum, & contritorum portionem, si lubet, adicies. Quidam enim memoriæ prodiderunt, eiusmodi terræ intestina contrita, neruisque diuisis imposita, protinus mirum in modum prodesse: vt libro simplicium vndecimo Galenus refert. Sunt qui & centaurium arefactum, & contritum etiam inspergunt. Medicamen enim est admodum desiccatorium, mordacitatis expers, quodque, si glutinatoriis, & disiccatoriis miscetur, vlcera maligna, & cacoëthe sanare creditur. Quin & ipsis herbæ recentis illitu magna vlcera glutinantur, vetusta quoque, & quæ ad cicatricem ægrè perducuntur, eodem modo vtentibus cicatrice obducuntur Galeno libro septimo de simplicium medicamentorum facultatibus. Refert Dioscorides, & quodam in loco Auicennas, quod carnes minutim incisæ coalescunt, si cum centaurio maiori decoquantur. Eidem quoque centaurij minoris radix recens, aut arida antè madefacta, vulnera conglutinat, & coniungit. Sed iam tempestiuum est vt de nudato neruo dicamus.

Nerui casim vulnerati, & nudati curatio.

Nudato neruo omnis curationis consilium huc tibi dirigendum est, vt minima cum rosione sicces. Proinde si neruus non punctim, sed planè casim vulneratus fuerit, cute etiam quæ interueniebat diuisa, adeò vt nudus appareat, nullum iam suprâ commemoratorum medicamentorum, quæ ex euphorbio, ac similiter acribus, emplastri specie fiût, applicabis. Nudatus nanque vehementem ipsorum vim ferre nequit, ita vt cùm interposita cutis erat, tulit. Optimè igitur eo casu feceris, si & calcem, & pompholygem, ac metallica omnia resinas quoque olea, mel, & ceram quæ eiusmodi medicamentis, nudato neruo, ac diuiso apprimè idoneis, miscenda sunt, elueris, quo scilicet citra rosionem vllam sint siccatura. Quippe medicamentis omnibus (vt Galenus inquit) quæ laueris, acris, mordensque humor eluendo detrahatur. Tûc igitur præstantissimum erit, calcem æstatis tempore in diebus canicularibus sub sole, aqua salubri, & dulcissima sæpius elotam, & exicca

Cētauriū.

Radix centaurij minoris.

Nudatus neruus vehementem medicamentorum vim ferre nō potest.

Li. 6. met. & 9. simp. Calx elota cū rosaceo.



exiccata, plurimo optimoque rosaceo admixtam apponere. Congruit & hoc casu medicamentum, quod è pompholyge (vt dictum est) elota sit, largiore itidem, ac probatissimo rosaceo salis omnino experte, solutum liquatumve.

Medicamentum ex pompholyge. Emplastrum ex melle.

5 Salubre quoque medicamentum est, & quod ex melle optimo sub emplastri specie componitur. Solui verò & id rosaceo oportet, quod tum reliquis conditionibus sit optimum, tum salis omnino expers, vt scilicet minima cum rosione sicces. Nihil enim acre (vt diximus) nudato neruo
10 (quæ pars est suapte natura sensu vegetissima) vnquam admouendum est. Si verò robustus sit, qui vulnus accepit, & cui corpus sit à superuacuis humoribus mûdum, in hoc fas est, etiam valentioribus remediis nonnullis vti: vt pastillis, seu trochiscis ex Polyida autore, sapa calida solutis, &
15 in linamentum illitis.

Neruo denudato nihil acre admouendum.

20 Id autem vel imprimis (inquit Galenus) semper habendum curæ est, ne quid ex iis, quæ vulnus contingent frigidum sit. Quandoquidem ipsa laborans particula, & sensibilis maximè est, & principum corporis partium primati [népe
25 cerebro] continua, & temperamento suo frigida. Quorum omnium occasione, & ex facili à frigido offenditur, & suâ offensam cerebro impertit. Ad iam dicti verò pastilli vsum propè etiam accedit & medicamenti vsus: quod *διὰ χαλκίτης* Galeno nominatur, vulgò autem diapalma. Hoc
30 ergo medicamine, si trochiscos Polyidæ ad manum nô habemus, vti tutò poterimus. Pastilli autè Polyidæ ex quinto libro de compositorum pharmacorum miscella sunt requirendi, quorum si copia non est, Andronis vel Passionis, vel etiam Galeni pastillus erit sumendus, quorum compositiones libro superiore cap. de carbûculo descripsimus.

Lib. 6. met. Nihil frigidum nudato neruo admouendum.

Diapalma

Pastilli.

35 Cæterum vulnus eiusmodi oleo perfundendum non est, præsertim cum nûc memoratis pastillis curatio suscipitur.

Oleum nudato neruo, et vulnerato, non esse admouendum.

Nam oleum illorum viribus aduersatur, & sordidum vlcus reddit. Neque enim parum interest (inquit Galenus)
40 nudone neruo oleum, an per interpositam cutem admoueas. Abluenda igitur à vulnere sanies est, molli lana specillo circumuoluta, in sapa repida intincta, & mox expressa. Quod si omnia bene atque ex animi sententia succedant, etiam vino dulci, non acri & mordaci, vulnus commodè poteris madefacere. Eo autem iam penè ad cicatricem ducto,

Sanies quibus abluenda.

*Aqua nu-
dato neruo
adversa-
tur.*

*Deterforiū
medicamen-
tum.*

*Candēs fer-
rum.*

cto etiam, vtile fuerit album, tenue, & quod Græci oligo-
phoron vocant. Aquæ verò vsus, ob causam superius ad-
ductam, sicuti & relaxans cataplasma semper in neruo nu-
dato deuitabis. Blande etiam, ac suauiter vulnus (si neces-
sitas vrget) detergebis, vnguento ex vermibus factò, vel
aliquo alio deterforio medicamēto, quod recipiat mel pro-
batissimum, terebinthinam, & farinam hordei, aut faba-
rum: vel alio ex iis, quæ in antidotario habentur. Nonnul-
li pro comperto habent, quòd si dissecti nerui capita, seu
extremities candenti ferro, carne vitata, leuiter attingan-
tur, optimè postea conglutinari. Postquam autem neruum
denudatum contexeris, linamenta extrinsecus circundu-
cere oportet, ex medicamento (inquit Paulus) quod an-
gustis vulneribus faciat: nempe eo, quod ex euphorbio præ-
paratur, aut fimo columbarum, sed ita, vt etiam sanas par-
tes ampliter comprehendat.

De neruorum contusione.

*Neruorū
cōfusio pro
miscuā ha-
bet, cū ec-
chymosi, cū
generatio-
nis, tum cu
rationis ra-
tionem.*

*Si cū neruo
cutis contu-
sa sit.*

Neruorum cōtusionem, promiscuam cum ecchymo-
si, seu carniū contusione habere generationem, fa-
cilè nobis insinuat similis vtriusque affectus curatio. Ita-
que illic & digerentibus, & adstringentibus medicamen-
tis vtebamur, hīc verò etiam siccantibus, & adstringētibus
nobis vtendum est, præsertim dum cutis vnà cum neruo
contusa exulceratæque est. Si verò absque cutis simili affe-
ctu neruus quidem contusus est, huic auxilia, quibus euo-
candi, ac digerendi facultas insit, adferenda sunt. Contu-
so igitur neruo, si cutis simul contundatur, & vlceretur, fa-
barum lomentum oxymelite dilutum, aut si magis siccare
voles eruina farinam cum sapa, & modico aceto illines.
Quòd si amplius adhuc siccare desideras, irim quoque il-
lyricam, vel eam quam vulgò florentinam vocant, immit-
tes. Recentiores in hoc affectu per initia rosaceum cū oui
candido liquore admovent, & mitigato dolore laborante
particulam fouent vino tepefacto, quod crasse sit substan-
tiæ, & astrictionis particeps. At si vnà cum contusione
dolor infestet, picem liquidam cataplasmati e farina faba-
rum adicies, & vbi simul bene decoxeris, calens medica-
mentum applicabis. Vniuersi autem corporis curatio,
eadem est cum ea, quam paulò ante docuimus. Verùm
si neruus quidem contusus sit, cutis verò nihil quod sensui
appareat,

*Si dolor
vnà cū con-
tusione in-
festet.*

appareat, à natura recesserit, oleo calente discussorio, quale anethinum est, & rutaceum, irinum quoque & amaracinum, cōtinuè locum irrigabis, perfundēsve, & lana oleo madefacta fovebis, ac totius corporis curā prædictis simili adhibebis.

Porro si neruus totus sit præcisus, metus prætereà nullus (vt paulò ante diximus) instat, nullum enim inde periculum sequi potest. Membrum tamen ea parte debile efficietur, præsertim si disiectus neruus insignis magnitudinis fuerit. Curatio verò eius communis est, cum ea quæ aliorum est vlcerum.

*Si neruus
totus sit
præcisus.*

Du vulnerebus ossium. C A P. XIII.

Radita vulnerum carnosæ substantiæ, venarum, arteriarum, & neruofarum partium curandi ratione, nunc de vulneribus ossium nobis agendum superest. Ceterum tametsi omnis continuitatis seu vnitionis solutio in osse Galeno sexto methodi medendi & passim alibi, Græcè proprio nomine catagma, (quod Latinis est fractura) dicatur, recentiores tamè tum medici tum chirurgi, fracturam vocare cōsueuerunt, solam eam ossis diuisionem, quæ sine incisione, à violentia quadam, vt ruptura extrinsecus accidente, fit, de qua in sequentibus latius dicitur. Vulnerus verò ossis appellare solent, præcisionem ense, aut quopiam alio simili incidente, vel in profundum penetrante factam, de qua in præsentiarum dicere statuimus. Huiusmodi autem præcisio quandoque (vt nunc loquuntur) est totalis, quandoque partialis. Cæterum cum os ipsum vulnerari non possit, quin caro & venæ, & aliæ superiacentes particule etiam vulnerentur, sæpe numero ex ossium vulnere, pessima quædam symptomata excitantur. Nempe profusio sanguinis, dolor vehemens, conuulsio, & syncope: à quibus & agendorum etiam indicationes sumendæ sunt. Porro cum notæ vulnerum ossium, sensu sint satis conspicuæ, his prætermisissis iudicia seu præfagia subiciemus, quæ tam ab ipsis veteribus quàm recentioribus, scriptis madata sunt. Itaque iudicat Galenus libro artis medicinalis, & rursus tertio & sexto methodi medendi, quod

*Fractura
quid.*

Vulnus ossis.

*Ex ossium
vulnere
præua oboritur
symptomata.*

*IUDICIA.
I*

ossis

*Puerorum
ossa diuisa,
per se coale-
scunt.*

osis soluta semel partium continuitas nunquam postea adamussim & per se instaurari potest: præsertim verò in iuuenibus, & adolefcētibus, & viris, multòque minus adhuc in senibus. Potest namque os illud tantam vnitionem per se & sine alterius ope recipere, atque in idem adamussim coalescere, quod abundè molle est, cuiusmodi cōspicitur in puerulis. Alterius tamen ope, vt substantiæ cuiusdam interuentu, ceu glutino quodam, ossa ipsa quantumvis etià dura siccaque sint, cōcrescunt glutinanturve. Vocant autem glutinum hoc, seu substantiam illam interuenientem, cuius beneficio separata ossis patriculæ secum agglutinatur colliganturque, Græco vocabulo poron sarcoidem, id est, callum carnosum. Huius prognostici ratio superius adducta est, vbi de iudiciis vulnery in vniuersum agebatur.

*Erysipelas
in ossis nu-
datione ma-
lum.*

Hippocratis oraculū est libro septimo Aphorismorum, casum prauum esse, ossis nudato, carnem circumstantem videri ab Erysipelate apprehensam. In ossis (inquit) exultione, hoc est, nudatione, erysipelas, malum. Sed hic casus (vt Galenus ait in commentario) ossibus ita patientibus raro superuenit.

*Nudata os
sa, à frigido
magna opere
offenduntur*

Adhæc, frigidum nudatis ossibus, eiusdem Hippocratis testimonio, est infestissimum: partes enim sunt exangues, ac natura sua frigidiores. Quæcunque autem tales in animalibus partes sunt, citius, ac magis à frigido offenduntur, vt libro quinto Aphorismorum Galenus annotauit, commentario decimo octauo.

*Magnorū
ossium præ-
cisio, cū exi-
tu medul-
le, periculo-
sa admodū
est.*

Si magna ossa, veluti est os, quod propriè brachium, & humerus dicitur, vulgò autem os adiutorij, & vtrunque focile, siue os tibiæ, maius inquam, & minus (illud cne, hoc perone Græcis dicitur) tota præcisa sint, adeò vt medulla egrediatur, vulnus tale periculosum admodum est, & magna ex parte membrum, quod ita præcisum est, emoritur. In tam insigni namque incisione, nerui, venæ, & arteriæ maiores, quæ vitam, sensum, atque alimentum particulæ iam sic affectæ prius ministrabāt, omnino præcinduntur. Quancquā non defuerint aliqui, qui Auicennā perperam intelligentes, ausi sint oppositum planè asserere. Inquit autem ad hunc modum Auicennas, Et quod dicitur de incisione medullæ, quòd interficit, est intentio, in qua nullā est vtilitas. Habet enim medulla lenitatē, & viscosi-

Lib. 4.

tatem,

tatem, & non inciditur. Quod dictum sic accipiendum est, quòd nullus vnquam interiit ob præcisione medullæ ossiû, quanquam mēbrum sic percussum tandem cōtabescat, & emoriatur: ob eā scilicet, quam nuper adduximus causam.

- 5 Cū verò dicit, medullam nō incidi, hoc intelligendum, cū os frangitur, non autem cū totum excinditur. Quis enim addubitat, cū os totum præcinditur, & medullam quoque simul excindi posse?

- Cæterum summoperè cauendū est, ne aliquid ossis vul-
 10 nerati subitò, ac magna vi extrahatur. Nam si ita fit, vix à fistula, conuulsione, delirio, & febre, laborans tutus erit, vt Auicēnas nos cōmonuit libro quarto suæ medicinæ. Proinde satius est, extrahenda ad tēpus relinquere, & medicamento aliquo attractoriam facultatē habente, naturā ad-
 15 iuuare, quā sic ea subitò, & magna violentia eximere, vt suprā etiam monuimus, cū de telis è corpore extrahendis ageremus.

Curatio vulnerum ossium.

- 20 **I**N curandis ossium vulneribus, sicuti & in fracturis, atque aliarum partium soluta continuitate, finis, seu scopus saltē primus, ac generalis, vnus est: nēpe vnitio. Quòd si is per affectarum partium siccitatem (vt paulò antè diximus) perfici non possit, restat alter, vt alterius scilicet cuiusdam interuentu dissidentes ossis vulnerati partes glutin-
 25 entur. Vt autem finem hunc secundum possis assequi, quatuor alij scopi tibi proponuntur obseruandi, suo ordine exequendi.

*Quatuor
scopi in cu-
ratione vul-
neris ossiū
obseruandi.*

- Primus est, vt iis, quæ infixæ sunt, & ossium frustulis (si quæ sint) exemptis, partes inuicem distantes, in vnum ad-
 30 ducantur, & vt commissæ iam seu coniunctæ maneāt, vulnus in carne acceptum, suturis altioribus, ac validioribus contrahendum est.

Secundus est, vt præidia, quibus huic affectui ritè mēderi possis, prudenter deligas.

- 35 Tercius, vt deligaturæ modus decēs adhibeatur. Nēpe talis, vt cōmodè vulnus tractari, ac curari possit, citra omni modā eius ipsius deligaturæ remissionē, & ademptionem.

Quartus, vt postquam à phlegmone iam tuta esse videbitur laborans particula, victus poro gigendo aptissimus, instituat.

Cæter

*Primus
scopus.*

Cæterum, quomodo primus scopus attingi possit, iam in sermone vniuersali de vulneribus superius dictum est. Quodd autem eiusmodi futuræ in carnelis partibus factæ, in proposito affectu sint ex usu, hinc manifestum euadit, quoniam disiectas vulneris partes, in vnum adducunt, adductas verò, coniunctasque haud amplius disidere patiuntur, ac præter hæc, partis substantiam tuentur. Vices enim deligaturæ, & ferularum tenent, prohibentque ne circumflus aër plagam temere subintret, & os ipsum alteret, ipsique noxam inferat, quod magnoperè vitandum est. Atque hæc omnia in proposito casu sunt vtilissima. Permittendum igitur, vt vulnus mox carne impleatur, atque caro ipsa medicamenti exiccatoria facultate præditis, ita obdurata est vt tandè calosa fiat, & poros gignatur. Itaq; si aliquid ex ipsius ossis substantia deperierit, eiusmodi caritas ad vnguem impleri nō potest, sed insanabilis remanebit, vt lib. tertio metho. med. Gale. nobis est autor.

*Secundus
scopus.*

Secundum autem scopum hoc modo assequeris. Sutura decenter facta, turundam in locum vulneris decliuorem imposito, vt per hoc emissariū ossis frustula (si adsint) vel sanies, aut purulenta colluies, educi & expurgari possint. Sed & puluerem futurarū (vt vocant) conseruatiū, superponito, quem primis diebus cum oui candido liquore remiscebis. Postea verò agglutinatoriū cōmune ex puluere illo, quo omnes passim vtiuntur, terebinthinæ permixtum ita vt in vnum corpus coëant, superaccommodato, vel aliquod aliud simile, ex iis quæ incarnatiua vocant, prout res exoptulabit. Ergo turundulam melle rosaceo, quod puluerem glutinatorium ex myrrha exceperit, illitam, indito.

Myrrha.

Myrrha enim Auicennæ, carne nudata ossa vestit, & operit. Itaque si os exutum nudatumue appareat, prædicto puluere, & linamentis ex optimis pannorū laciniis cōfectis, ipsum operito munitoue. Deinde emplastrū, vel stupas, aut pānos lineos vino calēte dilibutos, superapplicato.

*Tertius
scopus.*

Cæterum, tertius scopus in curando ossium vulnere propositus, ita absoluetur. Cum os totum præscisum est, facta imprimis (vt dictum est) sutura, totum membrum, vt Razès præcepit, excepto vulnere, duplici panno, obuoluito. Pannos autem eiusmodi, primis quidem diebus oui albore, sequentibus verò, vino calido, tum austero, tum nigro,

nigro, imbuito, Et fascia longa ac lata iuxta membri magnitudinem & figuram deligato. Ea enim longitudine & latitudine fascia ipsa esse debet, quam vulneratæ partis conformatio desiderat. Vt autem conueniens sit eiusmodi deligatura, eius principium iuxta finem laboratæ particulæ incipiat. Ab hinc facta ad superiorem partem circumuolutione, vbi prope vulnus ventum erit, fasciam ex aduerso plagæ circunducito, atque eam versus corpus non comprehenso vulnere, quousque satis erit, dispensato. Mox fasciam vertendo, eam supernè deorsum ducito. Atque vbi iam ad locum vulneris eam deduxeris, in partem vulneri oppositam, supra priorem aliam circumuolutionem, circunductus iniucito, eosque ita dispensato, vt ibi vnde initium accepit deligatura terminetur, & vulnus minimè coopertum remaneat. Porro, fasciæ sic reuolutæ extrema acu ibidem erūt assuenda. Deindè ferulæ duæ vel tres (si vulnus in artubus acceptum est) leues ac politæ, membri læsi figuræ, ac magnitudini accommodè iniiciuntur, quæ læsam partem ita fulciēt, vt vulnus minimè contegāt. Has autem fascias deligabis, nec prius solues, quàm vulnus percuratum fuerit: nisi tamen dolor, vel eo loci excitatus pruritus, aut inflammatio nos ad id cōpellat. Quibus quidem symptomatis, modo quo in sermone vniuersali diximus, succurrendum erit. Vulnus verò extrinsecus stupis contegendum est, & fascia deligandum, quæ singulis curationibus solui debebūt, quā alix supradictæ fasciæ mancant: deinde vulnus detergeri, exiccari, & more aliorum vlcera curari debebit. Quod autē (inquit Galenus) neotericis inuentum est glossocomion, quo maximè tempore gignendi calli vtimur, laudandum id quidem, quantum aliud quiduis eiusmodi machinarum, ducimus.

Porro quod ad quartam intentionem attinet, quo tempore callus gignitur, nutriendum corpus esse bis boni succi, & qui multum nutriant, ex quibus provenire succus soleat, non solum bonus, sed etiā tenax, ex quali fieri callum maximè expedit: de quo plura in sermone de fracturis. De duritie autem, quæ diuortii continui sequitur in fractura, quam Græci catagma vocant, fufius etiam alibi dicitur.

*Deligatura
modus
in vulnera
to esse.*

*Quartum
scopus.*

Lib. 6.



GENERALIS DI-

VISIO VLCERVM, IN
librum tertium Chirurgicarum
institutionum Io. Tagau-
tij Medici.

VLCUS.

1 Simplex, { Id est, cui nec vllus affectus alius, nec sym-
ptoma vllum coniungitur.

2 Compositum, { Seu cum alio affectu, aut sympto-
mate complexum.

1 Vlcus simplicis, ac solum consistentis differentia.

Veræ, ac propriæ,
Extrinsècus acce-
dentes,

{ Hoc est, à natura vlcus ac-
ceptæ.

{ Et non à substantia rei desum-
ptæ.

Vlcus differentia vera, ac maximè propria, atque à substantia
rei acceptæ, sumuntur.

A figura ipsius vlcus.

Ab ipsis dimensionibus, { Hoc est à diuisioni magni-
tudine, spatio, seu quantita-
te, &c.

Vlcus differentia à figura.

Vlcus rectum.

Vlcus obliquum.

Vlcus Pampini modo retortum.

Vlcus hami ritu vncum.

Vlcus differentia à magnitudine & spatio ipsius diuisioni.

Vlcus magnum, { Longitudo, & latitudo.

Vlcus paruum. {

Vlcus in summo residens. { Altitudo.

Vlcus profundum. {

Vlcus æquale. { Differentia sunt etiam in alto.

Vlcus inæquale. {

Vlcus magnum, & profundum. { Longitudo, & al-
titudo.

Sub ma

*Sub magno comprehenditur longum, & latum: sub paruo,
breue, & angustum. Quæ differentia funt à
dimensionibus fumpta.*

*Vlceris fimplicis differentia extrinfeus accedentes, & non à sub-
ftantia rei, hoc eft, à natura ipfius vlcern, acceptæ, fununtur*

A tempore.

A parte affecta.

A fitu, feu loco in parte affecta.

Vlceris differentia à tempore.

Vlcus recens.

Vlcus inueteratum.

Vlceris differentia à parte affecta.

Similari,

Organica.

Vlceris differentia à parte fimilari affecta.

Vlcus in cute.

Vlcus in carne.

Vlcus in arteria.

Vlcus in vena, &c.

Vlceris differentia à parte organica affecta.

Vlcus auris.

Vlcus narium.

Vlcus oculorum.

Vlcus oris.

Vlcus faucium.

Vlcus pulmonum, &c.

Vlceris differentia à fitu in parte affecta.

Vlcus in confpectu.

Vlcus fub cute conditum, & non apparens.

Vlcus in principio, in fine, vel medio mufculi.

Vlcus in fupernis partibus.

Vlcus in infernis partibus.

Vlcus fecundum longitudinem,

Vlcus fecundum latitudinem.

Vlcus fecundum tranfuerfum.

2 *Vlceris compofiti differentia fununtur à complexu ipfius.*

Cum fymptomate.

Cum morbo.

Cum fua caufa.

Cum fua caufa & morbo.

*Quæ à ge-
nerationis
modo, &
ratione fu-
muntur di-
ferètia mi-
gri ad vul-
um perti-
nèt, quan-
ad vlcus,*

*Non funt
proprie di-
ferètia, fce-
verius com-
plicati af-
fectus.*

Cum fua caufa, morbo, & parte affecta.

Vlceris differentia à complexu cum symptomate.

Vlcus crucians.

Vlcus dolore vacans.

Vlcus purum.

Vlcus fordidum.

Vlcus faniofum.

Vlcus cruentum.

Vlceris differentia à complexu cum morbo.

Vlcus dyscratum, id est, cum intemperie.

Vlcus phlegmonofum.

Vlcus eryfipelatofum.

Vlcus gangrænofum.

Vlcus cancerofum.

Vlcus putridum.

Vlcus cauum.

Vlcus supercrefcens.

Vlcus phagedænicum.

Vlceris complexus cum fua caufa.

Vlcus fponaneum.

Vlcus ab animali venenofum.

Vlcus à fimia morfu.

Vlcus ab hominis morfu, &c.

Vlceris complexus cum fua caufa, & morbo.

Vlcus cacochymum, id est, vitiofo fucco obfeffum.

Vlcus cacoëthes, id est, malignum.

Vlcus rheumaticum, id est, fluxione vexatum.

Vlcus arrofum.

Vlcus finuofum.

Vlcus ab atra bile.

*Vlceris differentia à complexu cum fua caufa,
morbo, & parte affecta.*

Erofio.

Caries.

Efthiomenus.

Sphacelus.

Dysenteria.



INSTITVTIO- NVM CHIRVRGI-

CARVM IOANNIS

TAGAVTII

MEDICI

LIBER TERTIVS.

De vlceribus, in vniuersum.

Quid sit *ulcus* vulgò apud chirurgos, & eius
definitionis interpretatio.

CAPVT I.



Ixi-
mus libro superiore, de cruentis
vulneribus, seu de ea cõtinui solu-
tione, quę in carnosa parte ex vul-
nerando recens facta est, ac relicta.
Nunc transeundum ad id vnionis
etiamnũ in carnosa ac molli sub-
stantia factum diuortiũ, quod nec
recens est, nec cruentũ, sed iam in-
ueteratum, & in quo vna, vel plu-

res consistunt dispositiones, quę vnionẽ, vel consolidatio-
nem remorantur, atque impediunt: ex quibus saniosa, &
purulenta quædã colluuiẽs, putredõque excitatur. Vocant
autem vulgares medici, & chirurgi tale vnionis diuortiũ
seu cõtinui solutionem, communiter *vlcus*. Quanquam
vulnus, & *vlcus* ferẽ passim apud probatos autores pro re
eadem sumantur: nẽpe pro dissolutione vnionis in parte
carnosa. Quę siue recens sit, siue antiqua (quatenus saltem
olutio tãtũ vnitatis est) eandem sanationẽ (vt Galenus
ait) semper desiderat. Cuius vtique propositus finis vnus

*Ulcus quid
vocetur chi-
rurgu vul-
garibus.*

*Vulneris,
seu vlcus
finis.*

est, nempe vnicio, vel agglutinatio, vel coëctio, vel continua-
 tio, quæ eadem sunt. Itaque discrimen quod à tempore su-
 mitur, nihil planè proprium indicat Galeno. Nam recens
 (inquit) vetusve vlcus nihil indicat. Quanquam indicare
 videtur nonnullis, sed hi seipsos fallunt. Non abs re ta-
 men factum putauimus, si recentium ac vulgarium medi-
 cæ, ac chirurgicæ familiæ scriptorum morem iam ab om-
 nibus receptum sequuti, discrimen inter vulnus (quam &
 plagam vocant) & vlcus posuerimus. Vlcus quidem cum
 ipsis appellantes continui solutionem in substantia car-
 10 nosa & molli, in qua vna vel plures consistunt dispositio-
 nes, vnitionem seu agglutinationem fieri impredientes, ex
 quibus sanies, & purulenta quædam colluuiæ, ac putrila-
 go excitatur. Apud interpretem autem Auicennæ vlcus
 ita breuiter definitur: Solutio cōtinuitatis in carne, quan-
 15 do iam continet saniem & pus, nominatur vlcus. Ceterum
 in hac vlceris definitione, solutio continuitatis, locum ge-
 neris obtinet, cuius species libro superiore de vulneribus
 abunde recensuimus. Reliquæ verò definitionis particulæ
 pro differentia appositæ sunt. In substantia quidem car-
 20 nosa, siue in carnosis, & mollibus particulis, ad discrimen
 corruptionis ossium, quæ propriè vlcus non est: sed caries,
 & corruptela, quæ terendon Græcè dicitur. Quæ autem
 subnectuntur, ad differentiam vulnerum addita sunt. Vul-
 nus enim recens & cruentum, quatenus saltem vulnus est, 25
 & quantum nominis ratio indicat, solutio est continui
 simplex, ac per se consistens, hoc est nulli alteri affectui aut
 præcedenti, aut sequenti coniuncta, qui eius curationem,
 nempe agglutinationem (quam solum desiderat) remo-
 30 retur, & impediat. Vlceris verò nomine, communiter in
 chirurgia eam vnionis, seu continui dissolutionem statim
 inaudimus, quæ non simplex sit, vt vulnus, sed quæ aliis di-
 spositionibus, eius curationem impredientibus seorsum-
 que, ac per se nonnunquam consistere valentibus, comple-
 xa semper atque annexa reperiatur, vt in differentiarum 35
 enumeratione clarius innotescet. Quò fit, vt vulnus ge-
 neraliter, si ad vlcus conferatur, simplicis ac minimè com-
 positi affectus rationem obtineat: vlcus verò (quo de hic
 agimus) compositus semper affectus intelligatur. Non
 imus tamen incicias, quin & vulnera propriis quibusdam
 disposit

*Vlceris de-
 finitio.*

*Vlcus quid
 Auicennæ.
 Definitio-
 nu vlceris
 examina-
 tio.*

*Vlceris no-
 mine quid
 intelliga-
 tur in chi-
 urgia.*

*Vlcus quo
 à quo vul-
 nere diffe-
 rat.*

dispositionibus, quæ necessario illis accidunt, complicari possint, vt verbi gratia magnitudini & paruitati, rectitudini & obliquitati, æqualitati & inæqualitati, profunditati & resistentiæ in summo, & ita de aliis, quæ vulnerum discrimina siue differentias constituunt: generalem tamen vulnerum quatenus vulnera sunt, curationem parum aut nihil euariant, vt supra in tractatu de vulneribus diximus. Itaque vulnus magnum & paruum, rectum & obliquum, æquale & inæquale, in summo residens & in profundo penetrans, longum item & breue, recens & inueteratum, veræ ac propriæ sunt simplicis soliûsque vulneris, & cui nullus alius adiunctus sit affectus, differentiæ: sicuti etiam & vlcis, quod solum consistit: vt in sequenti capite dicemus. Porro in definitione vlcis ex Auicenna superius adducta, per saniem & putredinem, sordities, squammæ, & crustæ (quas Græci escharas vocant) etiam inaudiuntur: quæ in ipsis vlcibus contingere possunt. Itaque Auicennas, & qui eum sequuti sunt, vulnus & plagam vocant, vbi nondum est pus: vlcus verò vbi iam pus adest. In qua sententia fuisse quoque videtur Cor. Celsus, Latinus ferè Hippocrates, libro quinto suæ medicinæ: vbi recentem, & cruentam adhuc plagam, vulnus appellat: vlcus verò, cum iam vetustas occupauit, siue extrinsecus quidem per vulnera inciderit, siue intrinsecus corrupta aliqua corporum parte nascatur. Quid autem sit sanies, quid pus, quid fordes, postea dicetur.

De differentijs vlcis, & à quibus sumantur.

C A P V T I I.

Vlcis differentia sumuntur quibusdam à tribus potissimum: nempe à causis excitantibus, membris, & accidentibus, seu dispositionibus cum eis complicatis. Alij verò breuitati studentes, eas à duobus duntaxat desumunt, vtpote à causis, & symptomatis, atque etiam affectibus ipsis, quibus complicantur: ea quidem quæ à membris siue laborantibus particulis sumuntur discrimina omnino prætereuntes: quippe quæ ad particularem, non autem ad vniuersalem de vlcibus tractationem pertineant. Adde quod & in tractatu de fistula, id est, sinu qui occalluit, de iis obiter

*Vulneris
atque vlcis
propria
differentia.*

*Vlcis differentia
sumuntur.*

Vlcerū differētia à causis.

Differētia vlcerum ab affectibus quibus complicantur.

Affectus cum vlcere complicati.

Vlceris complexus cum symptomate.

Vlceris complexus cum sua causa, & morbo.

agetur. Dicemus tamen hīc & de iis non nihil. Differentiæ, quæ à causis sumuntur saltem communiore, & magis propriæ, hæc communiter solent à chirurgis assignari: vlcus virulentum, & corrosiuum, siue comedens, vlcus sordidum, rhyparon Græci vocant, & putridum, siue putrefactum, quod Græci serpedonā appellant, vlcus cauernosum, & profundum, vlcus fistulosum, vlcus cæcerosum. Differentiæ autem, quæ ab accidentibus, siue symptomatis, & affectibus, quibus ipsa vlcera complicantur, ferè communes, atque æquiuocæ sunt, & ipsis vulneribus. Primo tamen, & magis propriè (vt recentibus placet chirurgis) de vlcerebus, quàm de vulneribus dicuntur. Hæ autem sunt: vlcus cum intemperie, quod Græcè discratum vocant, vlcus crucians siue dolorosum, vlcus cum tumore aliquo præter naturam, quod apostematofum nominant, vlcus contusum, vlcus supercrefcens, cum carne molli, & superflua, *ὀρυζαγὰν* Græci appellant, Auicennæ interpres carnem additam super vulnera: vlcus durum simul & tenebrosum, vlcus cancerosum, & gangrænosum, vlcus cauum, vlcus cariosum, id est, cum osse corrupto, vlcus cum varicibus, vlcus cacoëthes est, malignum, & ægrè sanabile, atq; id genus alia. Cæterum multæ ex suprâ commemoratis differentiis, verè vlcerum differentiæ non censentur Galeno, sed aliorum affectuum cum vlcere complexionibus, cuiusmodi sunt vlcus cancerosum, gangrænosum, supercrefcens, putrefactum, cauum, & cum tumore aliquo, vt vlcus phlegmonodes, erysipelatodes. Putredo nanque, gangræna, phlegmone, erysipelas, cancer, & reliqua id genus, ex morborum sunt genere: nempe affectus præter naturam, actionem vitiantes, qui seorsum ac per se consistere possunt. Quod enim consistere seorsum, & per se potest, id nullius vnquam (inquit Galenus) alterius fuerit differentia. Esto igitur hoc tibi veluti præceptio, ac regula, qua discernere liceat, differentiæ alicuius affectus aliquid sit, an alterius affectus complexum. Sed & alio rursus modo vlcus crucians siue dolorosum, & vlcus sordidum, ceu quædam vlcere differentia dicuntur, cum tamen veræ aut propriæ differentia non sint, sed complexus potius symptomatis cum vlcere. Dolor nanque & sordes ex symptomatum sunt genere. Pari modo & cum dicitur cacoehymon vlcus, id est, vi-

tiosio

- tioſo ſucco obſeſſum, aut fluxione vexatum, quod rheumaticum Græcè Galeno dicitur, aut arroſum, id eſt, quod exeditur, cauſa cum affectu copulatur. Talia igitur multa pro differentiis vlcerum chirurgis & medicis vulgaribus
 5 uſurpantur, quæ reuera differentię non ſunt, ſaltem apud Galenum, ſed alterius diſpoſitionis complicationes ſeu affectus compoſiti. Simplicis igitur ſoliuſque vlceris differentię veræ ac propriæ, ab ipſa vlceris natura ſumuntur. Vlcus autem ſimplex hic cum Galeno appellamus, quod
 10 ſolum conſiſtit, id eſt, cui nec ullus affectus alius, nec ſymptoma ullum coniungitur. Simplex igitur non erit, ſi quæ exulcerata eſt particula, vel fluxione vexetur, vel malo ſucco vitioſa ſit, vel omnino extra naturalem temperiem fuerit, vel vlla cavititas adſit, vel ſi aliqua cutis amiſſio contigerit. Itaque differentię, quæ ab ipſa vlceris natura ſumuntur, vel maximè propriæ ſunt, & à ſubſtantia rei acceptæ, vel extrinſecus accedentes. A ſubſtantia rei capiuntur, Vlcerū diſ-
 quæ à figura, & à diuiſionis magnitudine ſeu quantitate, ferētia ma-
 ac diſenſione, ſiue ſpatio ducuntur. A figura, vt vlcus re- ximè pro-
 20 ctum, vlcus obliquum, vlcus circulare ſiue rotundum, vlcus retortum, vlcus vncum. A diuiſionis magnitudine, Figura.
 ſiue quantitate, vt vlcus magnum, vlcus paruum. Ex di- Quātitas.
 menſionibus ſiue ſpatiis, vt vlcus longum, vlcus breue, vlcus latum, vlcus anguſtum, vlcus ſublime, ſiue ſuperficiale, Dimenſio.
 25 id eſt, in ſummo reſidens, vlcus profundum, vlcus æquale, vlcus inæquale. Extrinſecus verò accedentes vlcerum Vlcerū diſ-
 differentię ſumuntur à tempore, & à generationis ratio- ferētia ex-
 ne: item ex eo quod totum vlcus, parsue vlceris conſpe- trinſec⁹ ac-
 ctum fugit, vel conſpiciendum ſe præbet, hoc eſt, à ſitu in cedentes.
 30 parte affecta. A tempore quidem, vt vlcus recens, vlcus Tempus.
 inueteratum. Ex generationis ratione, vt vlcus inciſum, vlcus Modus &
 diruptum, vlcus partim inciſum, partim diruptum. ratio gene-
 A ſitu in parte affecta, vt vlcus in conſpectu ſiue euiden- rationis.
 ter apparens, vlcus intus conditum, ſiue non apparens, Situs.
 35 idque in toto, vel in parte, item vlcus in principio muſculi, vlcus in fine muſculi, vlcus in medio muſculi.

Cæterum quæ ex loco affecto ſumuntur vlcerum differentię (ſi tamen differentię cenſendæ ſunt) non utique, vt Galenus inquit, à propria ipſorum natura, vt præcedentes, deſumuntur. Loci autem in quibus conſiſtunt vlcera, Locus affe-
 ctus.

sunt partes similes, & organicae. Igitur si à locis in quibus est vlcus, differentias censeas, hoc modo fiet diuisio vlceris à loco affecto: vlcus in parte simili, vlcus in parte organica, siue instrumentaria. Rursus vlceris differentias à parte simili affecta, hoc pacto diuides: vlcus in vena, vlcus in arteria, vlcus in cute, vlcus in musculo. Censetur enim musculus & pars similis, saltem ad sensum. Differentiae verò à parte organica affecta eiusmodi sunt, vlcus auris, vlcus in faucibus, vlcus in aspera arteria, vlcus pulmonis, vlcus pectoris, vlcus in pene, vlcus in sede, & sic discurrendo per singulas corporis partes, quas instrumentarias vocamus. Atque hæc completa, & absoluta est simplicis soliusq; vlceris, & cui nullus alius adiunctus sit affectus, in suas differentias diuisio, quæ à propria ipsius natura sumitur. Quod si affectus aliquis, seu dispositio, quæ seorsum (vt diximus) & per se consistere possit, vt phlegmone, gangræna, putredo, vlceri adiungatur, ab eo (vt suprà diximus) sumi non possunt vlceris differentiae, saltem verè & propriè dictæ. Verumenimverò quoniam ab ipso etiam Galeno locis sexcentis dictum est, non oportere de nominibus contendere, si quis putrescens vlcus, & quod exeditur, & quod gangræna, & quod erysipelate affligitur, & cancerosum, & sinuosum, & cariosum, & cacoëthes, & dolens, & indolens, atque id genus alia, vlcerum differentias nominauerit, non erit cum eo contendendum, modò etiam illis curationem adhibeat. Vocabunturque vlcerum differentiae, sumptæ ab eo cum quo complicantur. Nempe differentiae à complexu cum morbo, differentiae à complexu, cum symptomate, differentiae à complexu cum sua causa, & si quæ sint aliæ.

*Non esse de
nominibus
contenden-
dum.*

De causis vlcerum.

C A P. III.



Llcerum causas in vniuersum geminas tantum chirurgorum posteritas statuit, nempe antecedentes seu præcedentes, quæ Græcis *πρὸνύμναι* dicuntur: & continentes siue coniunctas, quæ *συνύμναι* Græcè appellantur. Procatarticas nanque, hoc est prægressas & euidentes seu primiti-
nas illis minimè tribuunt. Quippe quæ dum carnem incidunt, disrumpunt, aut laniant, aut quouis alio modo cōtinui solutionē in ea efficiūt, nequaquam primo statim occursum
sanem

saniam aut pus, aut sorditiem (quæ necessariò vlcera comitari arbitrantur) creare, aut excitare possunt. Quamquam conseqüo quodam id præstare valeant, nempe corporeas, atque antecedentes causas commouendo. Itaque
 5 vlcera antecedentes causæ sunt, cacochymia, id est, succorum vitium, cum scilicet sola qualitate peccant humores, non etiam quantitate, atque eorundem prauorù succorum, siue humorum in corpore existentium nimis exuperans copia, qui corporis ipsius particulas arrodere, &
 10 tandem corrumpere possint. Porro eiusmodi succorum prauitas, aut ex deprauata victus ratione generatur, aut totius corporis, vel alicuius notæ membri, vt hepatis, aut lienis, vitio contingit, vti plerisque locis Galenus nobis testatum reliquit. Causæ verò continentes, siue coniun-
 15 ctæ vlcera dicuntur intemperies illæ, quas malitias complexionum vocant, in vulneratas particulas ex causis *υπονομιμας*, siue antecedentibus modò dictis, vel etiam ex ipsis vulneribus, aut abscessibus, aliisve præter naturâ tumoribus (sed malignis præsertim) ruptis & apertis, excita-
 20 tæ. Quemadmodum enim ex herpete, tum miliari, qui Græcis cenchrias dicitur, tum etiam esthiomeno, id est, exedente, qui ex bile fit crassiore, & acriore, vlcus corrosiuum, siue erodens, generatur, ita ex anthrace, seu carbunculo præsertim venenoso (quod vlcus est escharosum) rhyparum,
 25 id est, sordidum, & ex abscessibus profundum, & concavum, siue cauernosum procreatur. Itaque tres hi ægrè sanabilem, rebelliumque vlcera modi videntur.

Vlcera causas antecedentes.

CAUSAE vlcera continentes.


Tres modi ægrè sanabilem vlcera.

Primus, qui ex intemperie subiectæ carnis prouenit. 1
 Secundus, qui ex vitio confluentis fit sanguinis. Et 2
 30 tertius, qui ex mensura, seu copia, vel quantitate confluentis nascitur, vt libro quarto methodi medendi Gal. annotauit. Qui & aliter ibidem diuisionem posse fieri tradit: nempe ægrè sanabilem, rebelliumque vlcera, alia propter vlcera carnis intemperiem, alia ob confluentem humorem, talia fieri. Tum intemperiem rursus ipsam bifariam diduci, cum aliàs in qualitate sola naturæ modum egressa, subiecta caro sit, aliàs etiam cum accessorio quodam tumore. Iam ipsum confluentem bipartitò etiam scindimus, nempe in confluentis succi, tum qualitatem, tum quantitatem. Quatuor igitur erunt in vniuersum contumacium, & ægrè

& ægrè sanabiliū vlcerū modi: nempe sola subiectæ carnis intemperies, quā & dyscrasiam vocant, intemperies cū accessorio tumore, humor influens, aut vitiosus, aut multus. Humor nanq; qui copiosior in partē vlcere laborantē influit (tametsi vitiosus non sit) sanationem vlceris (quod in eo excrementa creet) moratur, atque in longum tempus protrahit. Cæterū quintum modum adieciſſe videtur Gale. in commentario huius aphorismi Hippocratis: Vlcera quæcunque annua sunt, &c. nempe passionem ossis corrupti in loco vlcerato. Vbi enim caro, quæ ossi superiacet patienti, adhibitis (vt oportebat) idoneis medicamentis exiccata, cōtra xerit cicatricem, statim quidem integra sanitas restituta videtur. Rursus verò paulatim aliqua influente sanie ex osse corrupto, in parte penitiorē iterū aduenit inflammatio, & puris generatio consequitur, à quo cicatrix eroditur, caro verò exulceratur. Subdit autem Galenus loco nuper ex quarto libro Therapeutices methodi citato, interim dictorum affectuum siue dispositionum, aut aliquos, aut etiam pariter omnes misceri, atque ita multas, ac diuersas vlcerum differentias iam supra commemoratas enasci. Porro tradenda est medendi methodus, nō omnium simul, sed cuiusque seorsum, quod in sequentibus faciemus, à simplicioribus quidem exordiū fumentes, vt eorum curatione tradita, compositorum sanationis methodus facilius, ac melius intelligatur. Cæterū quoniam passim cū de vlceribus tractamus, voces hæc, sanies, pus, virus, sordes, & id genus alia, nobis occurrunt, non abs re factum putabimus, si hoc loco quid apud

Sanies qd. chirurgos & medicos significant, quoque inter se conueniant, & diffideant, paucis aperiamus. Sanies propriè Latine is tenuis humor est, qui Græcis *ἰχὼρ* dicitur, qualis exit ex vulnere nec recenti, nec iam sanescente, sed inter utrumque tempus. Quibusdam ichor, sanguinis sanies interpretatur. Sanies duæ sunt species apud Celsum Græcè distinctæ nominibus, quarum vna *ἰχὼρ*, altera *μυδιμυρία* nominatur. Ichor tenuis, subalbidus ex malo vlcere exit, maximèque vbi neruo læso inflammatio secuta est. Meliceria crassior, & glutinosior, subalbida, mellisq; albo subfertilis fertur. Hæc quoq; ex malis vlceribus, vbi nerui circa articulos

articulos læsi sunt, & inter hæc loca maximè ex genibus
 profluit. Apud recentiores autem, & plebeios istos medi-
 cos, ac chirurgos (quibus nusquam ferè vilius vocis pro-
 prietas, & quæ rei naturæ conueniens sit, seruatur) sanies *Sanies vul-*
 5 communiter pro eo quod Latini appositè pus vocât, vsur- *gò, pro pu-*
 patur. Genus tamen interdum saniem etiâ faciunt, ad for- *re malè v-*
 dem, virus, seu virulentiam, & purulentâ colluuiem, quam *surpatur.*
 Græci πύον, Romani pus vocant. Nomine enim saniei, la-
 tius sumpto vocabulo, omnem humiditatē præter naturā
 10 alteratam intelligunt. Itaq; si tenuis sit humor, qui exit
 ab vlcere, virus, seu virulētia, si crassior, sordes, si verò me- *Virus.*
 diocris, generis appellatione, illis sanies nuncupatur. Et *Sordes.*
 hæc quidem in vlceribus (vt aiunt) copiosa, in cauis vulne- *Sanies.*
 ribus pauca, reperitur. Est igitur sanies propriè vulgari-
 15 bus medicis, & chirurgis, idem quod pus Latinis, & πύον
 Græcis: Celso verò genus est, duas sub se (vt modò dixi-
 mus) species continens, Græcis distinctas nominibus, qua-
 rum vna ἰχώρ, altera μελιμύχια dicitur. At Latinis Galeni
 interpretibus, vbi passim Græcè ἰχώρ scribitur, sanies ver- *ἰχώρ.*
 20 titur. Cæterum, quod πύον Græcis, & Latinis pus propriè *Puris gene-*
 nominatur, ex sanguine, vel carne contusa ortum habet. *ratio.*
 In eius autē generatione, semimala quædam, vt quisquam
 dixerit, fit transmutatio, siue alteratio. Etenim cū tres in
 animalium corpore fiant alterationes, vt libro quinto sim-
 25 plicium Galenus docuit, vna planè secundū naturam est,
 cū videlicet cibus in ventre coquitur, aut in visceribus,
 & vas, qui inibi generatur succus, vnde rursū pars vna
 quæque nutriatur. Altera contra planè præter naturam,
 nempe in putrescentibus omnibus. Atq; hæc quodāmodo
 30 inuicē sibi contrariæ sunt. Tertia ex vtraq; mista & media
 est, partim secundū naturā existens, partim præter naturā.
 Itaque transmutatio, seu alteratio, quæ pus generat,
 medium inter optimam (quæ nutritio est partium anima-
 lis) & simpliciter malam (quæ cum putrefactione fit ori-
 35 da) locum obtinet. Neque enim à solo calore præter na-
 turam, neque à solo calore ingenito, & secundum naturā,
 planè vincēte, fit suppuratio, seu puris generatio: sed mix-
 tus quodāmodo ex vtriusque est calor inflammationis,
 quæ dum ad suppurationem connectitur, dolores, exten-
 sa simul, ac calefacta præter naturam inflammata parti-
 cula,



cula, & febres principio, id est, corde concalescente, excitantur. Atque hæc duo quidem contingunt ex quadam veluti ebullitione, atque exustione sanguinis, qui ubi ex toto exustus fuerit, residuum eius fit pus, quemadmodum ex lignorum exustione cinis, ut Gale. testatum reliquit in commentario huius aphorismi Hippocr. Dum pus conficitur, &c. Ex iis igitur manifestum euadit, quid sit pus, quomodo generetur, quæ sit eius causa efficiens, & materia. Nunc quid sit virus, seu virulentia, & sordes, apud chirurgos, paucis aperiamus. Virus ergo illis, seu virulentia, est superfluitas subtilis, ex abundantia humorum aquosorum generata. Quæ (inquit Guido) duplex est, calida, & frigida, serosa, & rubicunda. Sordes autem eidem, est superfluitas quædam crassior, ex humoribus crassiorem substantiam habentibus procreata, quæ quidem est triplex: quædam enim (inquit) est spissa, inæqualis, coagulata, & alba: quædam verò nigra, & alia velut fex, cinericea.

*Virus.**Sordes.**Sanies siue virus quid.**Lib. 3 met.**Pus mediū est inter sanie & sordem.**Boni, ac mali puris nota.**Pus in latine dicitur.*

Porro quod illi virus appellant, Gale. Græcè *ἰχμὴς*, Latine sanies dicitur. Est autem sanies, siue virus (ut verbo vno dicatur) tenuius illud excrementum in vlceribus, quod ea humida reddit: sicuti sordes crassum, quod vlcus rhyparon, id est, sordidum efficit. Quemadmodum enim (ut Gale. inquit) omnem qualitatis alimēti mutationem, alterum crassius, alterum tenuius excrementum sequitur, ita & in vlceribus, præsertim cauis, duplex excrementum provenire solet: nempe tenuius, quod Latine sanies, Græcè *ἰχμὴς* appellatur, & crassius, quod sordes dicitur. Ac ex tenui quidem excremento vlcus humidum redditur, ex crasso sordidum. Quò fit, ut vlcus ipsum duplicibus egeat medicamentis, utique ut humidum est, siccantibus: ut sordidum, iis quæ expurgant. Sed hæc alterius sunt contemplationis. Cæterum mediam quodammodo substantiā sortitur pus, inter tenuem, & crassam, si saltem laudabile atque optimum est. Optimum autem est (ut scribit Hippoc.) si album, leue, æquale, ac quàm minimè sordidum sit. At illud malum est Celso, quod multum tenue, dilutumque apparet, magisque si ab initio tale est: itémque si colore sero simile, si pallidum, si liuidum, si feculentum est. Præter hæc, si male olet. Porro genus quoddam puris est apud eundem Cornelij Celsum, Græca dictione *ἰχμὴς* appellatum.

appellatum, quod in magnis (inquit) vlcerebus sanescentibus apparet, tenue subalbidum, quasi vinctum, colore, atq; pinguitudine oleo albo non dissimile. Sanies autem mala *Male sanies nota.* est, multa, nimis tenuis, luida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quæ & ipsum vlcus, & iunctam ei cutem erodit. Melior non multa, modicè crassa, subrubicunda, aut subalbida. Itaque spes sanationis in his vlcerebus maior est, ex quibus melioris generis quæq; prædictorum proueniunt. Sicuti & eius vulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis bonus fluxit. Eam ob rem, bonitatis atque malitiæ notæ, in horum singulis diligenter à chirurgus perpendendæ sunt, vt & deprehendere, & pronuntiare possit, quæ vlcera insanabilia sint, quæ uero facilem, aut difficilem curationem habeant. Quæ res non parui sanè est momenti, vt chirurgus ipse, & se aliis admirabilem præstet, & calumniam deuitet. Atque hæc de pure, & sanie, ac sorde dicta sufficiant. Nunc autem dicendorum ordo postulat, vt vlcerebus signa, ac etiam iudicia subiiciamus.

20 *Nota siue signa, quibus vlcerebus differentia dignoscuntur, ex eorum definitionibus petita.* CAP. IIII.



Vlcerebus cuiusque suæ sunt propriæ notæ, quibus vnum ab altero distinguitur. Hæ autem ex singulorum definitionibus petendæ sunt. Quocirca præcipuarum supra memoratarum differentiarum breuissimas definitiones hic obiter recensere operæ pretium esse duximus. Quod dum facimus, non tam verba, quàm rem ipsam lectorem spectare volumus. Maluimus enim communibus, & ab omnibus chirurgiæ professoribus iam dudum receptis vti definitionibus, licet aliquando rudibus, plebeiis, & nõ ita elegatibus, quàm rei per se satis obscuræ, verborum lenociniis, & tersiore stilo tenebras offundere: crassam tamen illam, & supinam barbariem, quantùm nobis licuit, vbiq; deuitauimus. Ergo vt semel dicamus, vlcus virulentum est, in quo virus, hoc est, *Vlcus virulentum.* tenue quoddam, ac liquidum excrementum, quod saniem propriè Latinis appellari diximus, citra erosionem abundat. Alio nomine saniosum dicitur. Vlcus, quod sua malignitate siue malitia, parti quã iam occupauit, erodendo, atq; interdum *Vlcus corrosiuum, siue arrodens.* escharam (quã acris mordaxque succus ad ipsum cõfluens excitat)

- excitat) gignendo, maius atque amplius indies efficitur, corrosiuum, siue arrodens nominatur. Quod si eius malitia adeò crescat, ut non modò ulceratas atque corruptas carnes, sed etiam sanas absumat, depopuleturque, vlcus iam depascens appellabitur. Græci omnes medici *νομήν* hunc affectum, Galeno etiam teste, nominant, propterea quòd pergere pascendo id vitium ab ægris particulis ad eas, quæ integræ sint, soleat, atque harum semper aliquid ægris adicere. Cuius species est phagedæna, ambulatoriuum vlcus appellant, quod huc, atque illuc serpèdo, incutim, ac subiectam carnem, sed extimam tantum ac superficiale, depascitur, ac rodit. Nunquàm enim eiusmodi vlcus in penitiora penetrat: quò sit, ut vlcus in summo residens, minimè autem profundum, dici meritò debeat. Vlcus sordidum est Galeno quod crassiore illo, ac viscoso scatet recremento, quod sordem appellauimus, Græci rhyparon vocant. Recètiore verò aliter definiunt, nempe quod crustas aliquas habet crassas, seu (ut loquuntur) grossas aut carnem aliquam mollem, crassam, & superfluam. Vlcus putre siue putridum dicitur, ex quo vapor aliquis graueolens, seu (ut aiunt) fumus quidam foetidus, & cadauerosus expirat, atque attollitur, persimilis illi qui à putrescentibus ac corruptis iam carnibus effertur: habetque semper annexam sibi sorditiem, atque extraneam caliditatem cum humiditate superflua, & plerunque febrè. Hoc à sordido differre volunt sola malitiæ, ac fraudulentiæ intentione. Cauernosum vlcus appellant, cuius orificium strictum est, atque angustum: profunditas verò latior, & sensum effugiens, siue occulta, multosque anfractus habet, & cuniculos, siue vias hinc inde discurrentes, citra tamen callositatem & duritiem. Sunt qui & apposito nomine cuniculosum ipsum appellant. Fistulosum vlcus à nuper descripto cuniculoso seu cauernoso vlcere non differt, nisi quòd meatus illos anfractuosos & sinuosos, callosos habet, & dueros. Vlcus cancerosum, est visu horrendum, foetidum, labra habet dura, crassa, tumida, atque inuersa: colore inter rubrum, & nigrum medio, utpotè fusco, aut liuido; adhuc circa locum ulceratum venæ quædam liuidæ apparent, exaltatæ, & turgidæ, crasso, & nigriore sanguine plene. Vlcus dyscraton, siue ut vulgò dicunt,

- dicunt, dyscrasiatum, est in quo quædam *Avanquasia*, id est, intemperies, seu mala quædam qualitas præter naturam dominatur, vt caliditas immoderata, vel frigiditas, aut humiditas, vel siccitas, aut plures ex illis simul. Nominatur
- 5 autem propriè nobis vlcus cum intemperie. Vlcus crucians siue dolorosum appellatur, quod laborantem atrociter molestat, seu (vt ait Guido à Gauliaco) in quo sensibilitas rei contrariæ reperitur, Græcè *ἐλκὸς ὀδυνηρόν* dici potest. Vlcus rheumaticum Galeno dicitur, quod aliunde
- 10 fluentes humores vetant sanescere. Verminosum vlcus appellatur, quod vermibus scatet, scolecôdes à Græcis dicitur: horum autem vermium opifex est putredo. Vlcera cacoëthe Galeno, & Græcis omnibus medicis dicuntur, quæ omnibus ritè decenterq; factis, sanari tamen non possunt, quod scilicet in particula laborante siue vlcerata, ma-
- 15 lignitas quædã adsit cæca, & nobis occulta, ea sanari prohibens. Nos eiusmodi vlcera, maligna, contumacia, rebellæ, atq; ægrè sanabilia dicimus. Varicosum vlcus nominatur, quando in partibus eo superioribus venæ quædam eminentes, ac turgidæ, crasso sanguine, aut vitioso aliquo succo oppletæ apparent (varices vocant) quæ ipsi vlceri fluxionem suppeditant, atq; ita sanescere ipsum vetant. Apostematofum vlcus nuncupant, in quo tumor aliquis præter naturam est, ab humore quopiam procreatus, vt
- 20 phlegmone, aut erysipelas. Cætera satis ex præcedentibus innotescunt.

Vlcus crucians.

ἐλκὸς ὀδυνηρόν.

Vlcus rheumaticum.

Vlcus verminosum.

Vlcus cacoëthes.

Varicosum vlcus.

Vlcus apostematofum.

Vlcerum prognostica siue indicia. CAP. V.

- 30 **V**lcera (inquit Hippocrates) quæcunq; annua sunt, aut etiam diuturniora, os abscedere est necessarium, & cicatrices cauas fieri. Quæcunq; vlcera (vt Galenus ait in commentario huius aphorismi) longo tempore manent, vel cicatrice nullo modo adueniente, vel si facta sit, rursus resoluta (nihil videlicet medicis in curatione delinquentibus) cacoëthiam, hoc est, malignitatem quandam ostendunt, difficulterq; ad sanitatem perducuntur. Id autem accedit, vel propter influxum vitiosorum humorum, vel propter dispositionem in membro ex humoribus in id confluentibus, processu temporis contractam, vel ob aliquem vitiatum ac corruptum inibi ossis affectum. Vlcus omne (vt scri-
- 35

Apho. 45. lib. 6.

Vlcera annua & diuturna.

Fen. 4. c. 1.

Vlcus se non sanans.

Vlcera du- bit Auicennas) quod, posteaquam carne impletum est, &
ra, viridia, cicatrix illi induci debet, subito renouatur, periculum est,
aut nigra. ne in fistulam degeneret. Eidem mala vlcera iudicantur du-
Vlcera fri- ra, & quæ ad virorem aut nigritem vergunt. Eiusmodi
gida. enim color natiui particule vlcerae caloris extinctionem
Calida vl- insinuat. Vlcera (vt idem Arabs ait) frigida, albedine &
cera. mollitie dignoscuntur, & præsertim si calidis iuuentur.
Li. 4. The. Calida verò ad ruborem declinât, & frigidis gaudent,
 sed & tactu etiam discernuntur. Itaque horû vtraq; agno-
 sces, partim colore, partim tactu, partim (vt Galen. inquit) 10
 laborantis sensu. Quippe alias vltionem sentire se faten-
 tur, alias manifestum frigus, in particula, gaudentque vel
 frigidis medicamentis, vel calidis, & aliis quidê rubor le-
 uis insidet, aliis color magis albicat. Siccis quoque atq; hu-
 midis vlcerebus suæ sunt propriæ notæ, quæ tactu maxime 15
 deprehenduntur. Hic namq; sensus sicca atque humida, &
 quæ eas qualitates consequuntur, duritiem scilicet & mol-
Vlcera tu- litiem, asperitatem & lenitatem, experitur. Adhæc si mali-
tiæ corpo- gna vlcera totius corporis colorem repræsentent, vt verbi
ri colorem causa, candidum, purpureum, aut fuscum, vel citrinum, vi- 20
repræsen- tium aliquod effatu dignum hepati, atque insignem san-
tia, guini, ab ipso iocinore procreato, corruptelam inesse si-
 gnificatur.

Aliud. Vlcera, quæ aliis morbis succedunt, ægrè sana-
 bilia sunt.

Aphor. 4.
lib. 6.

Vlcera cir-
cū glabra.

Aliud. Vlcera circunglabra praua sunt, hoc est, cum vi- 25
 deris pilos à circumiacentibus vlcere locis defluere, vel cu-
 tem squammulas è summa parte dimittere, scito, ac iudica-
 to tale vlcus prauum esse. Prauos namque humores, seu ma-
 lignos succos ad partem vlcera tam tunc confluere simile 30
 veri est, qui vehementer vlcus erodunt. Itaq; eiusmodi ma-
 ligni succi, neque radículas pilorû omnes abolere queunt,
 neque exulceratum locum ad cicatricem perducere, ac soli-
 descere patiuntur. Cum autem pili qui prius deciderant,
 in iis quæ circiter vlcus sunt sedibus renascuntur, bono in- 35
 dicio esse solent.

Vlcus ante
morbū, vel
in ipso mor-
bo enascēs.

Aliud. Vlcus (vt primo libro prædictionum scribit Hip-
 pocrat.) siue ante extitit, siue in ipso morbo natum est, dili-
 genter obseruari debet. Nam si moriturus æger est, ari-
 dum & liuens, aut pallidum ante mortem apparet.

Aliud

Aliud. Vlcera, in quibus post longam saniei, seu virulentiae emissionem pus laudabile apparere incipit, bonum nobis portendunt. Siquidem & naturae robur, & materiae obedientia notatur. Quae autem sint puris optimi ac laudabilis notae, in praecedentibus dictum est.

Aliud. Vlcera, quae in extremitatibus musculorum dorsu, vel tiliarum, aut brachiorum sunt, periculo non vacant Auicennae. Valde etiam periculosa eidem censentur: quae interna membra occupant, aut ad ea usque perueniunt.

Aliud. Quibus vlceribus ante absolutam deterfionem, sarcotica, id est, carnem producentia medicamenta administrantur, mala, ac superflua caro in illis generatur. Quaecunque verò probe & opportunè expurgata semper ad cicicius promouentur, his caro (inquit Hippocrates) magna ex parte non supercrescit, nisi si contusa sunt.

Aliud. Vlcera in orbem circumducta, hoc est, rotunda pessima (vt de vulneribus dictum est) esse solent, ac tardè magnoq; negotio ad cicatricem perducuntur. Proinde pueros subinde in perniciem trahunt. Itaque in eis consilium chirurgorum est, vt cauterio figura illa orbicularis aboleatur, & lineae modo (quantum saltem fieri poterit) in relictum diducantur.

Aliud. Artuum siue extremarum partium vlcera, vt pedum, aut manuum saepe numero phlegmonas, aut alios eiusmodi praeter naturam tumores in adenosibus partibus, seu glandulis (quas Graeci adenas vocant) accersunt, atque excitant, praesertim verò vbi corpus plethora laborat. Haec enim partes, quoniam imbecillae sunt rari & facile tentantur fluxionibus. Sic igitur fit, vt & propter vlcus, quod in manus, aut pedis digito sit, eiusmodi glandulae in inguinibus, & alis, tum intumescant tum phlegmone occupentur, cum defluentem ad ultimos artus sanguinem, aut alios quosvis humores, priores acceperint, & exceptos, ob eam quam habent laxitatem, & raritatem retinuerint. Quinetiam in collo, & secus aures saepe numero glandulae his quibus in collo, capite, vel aliqua vicina parte vlcus est natum intumescunt. Nominant autem (inquit Galenus) ipsos adenas, cum sic intumuerint bubones.

Aliud. Cum medicamenta vlceribus adhibita conferunt, aut saltem nihil nocent, argumentum est ea rite ac

Vlcera in quibus partibus periculosa.

Vide Hip. apud Gal. li. 4. Ther.

Vlcera rotunda.

Artuum vlcera.

Colli & capitis vlcera

Bubones.

Si auxilia decenter administrata esse. Cum verò noxæ aliquid adfe-
profuerint, runt, & vlcus humidius reddunt aut siccus, calidius aut
ut nocue- frigidius, indicium est, ea non esse præsentis morbo ido-
rint. nea. Eruntque magis desiccantia, aut humectantia, cali-
 diora aut frigidiora, prout res postulabit, deinceps admo-
 uenda. Quod si ex admotis vlcus etiam mollius red-
 ditur, adstrictoria statim erunt adiicienda. Cæterum si

Si vlcus at- vlcus eroditur, & profundius efficitur, sedulo aduertenda
rodatur. est, num id ex acrimie succorum vitio, & vlceris ma-
 lignitate accidat, an ex facultate medicamentorum, quæ
 admoventur, plusquam oportet detergerium. Hæc enim

Not a.

admoventur, plusquam oportet detergerium. Hæc enim
 vlcera tam particulam arrodendo, multam saniem pro-
 creant, & vlcus humidius reddunt. Quo fit, vt imperitos
 chirurgos atque improuidos sæpenumero falli contingat,
 qui dum putant vlceris cacoëthia, id est, malignitate eius-
 modi saniosam colluuiem, seu (vt ipsi loquuntur) virulen-
 tiam, atque superfluum humiditatem prouenire, quæ ad-
 huc efficacius detergunt, properant admoouere, atque ita
 profundius, & magis cauum vlcus, imò verò & calidius,
 ac etiam interdum phlegmonodes efficiunt. Hinc erosio-
 nis, ac mordicationis sensum laborantes perferunt. Sed hæc non minus ad curandi rationem pertinere viden-
 tur, quàm ad signa prognostica, de quibus nunc agimus.

Vetus me-
ridionalis
officit vlce-
ritus.

Porro inter cætera quæ magis officiunt vlceribus, ventus
 est (vt Guido à Cauliaco annotauit) meridionalis, atque
 aëris ambientis humiditas caliditati adiuncta. Hæc enim
 vlceribus putredinem inuehunt: siquidem quæ putrescunt
 omnia, ex calido & humido sic afficiuntur. Hinc fit (in-
 quit) vt tibiærû vlcera Auinione ægrius ac difficiliter mul-
 to curentur, quàm Parisiis. Contra verò accidit in capitis
 vulneribus. Cæterum quemadmodum plurima vulnèrum
 iudicia vlceribus etiam communia sunt, ita & vlcerum de
 quibus modò differimus, iudicia permulta vulneribus ad-
 aptari possunt. Quocirca quæ in iudiciis vulnerum dicta
 sunt, vlceribus conuenientia, huc reuocanda erunt.

De curatione vlcerum in vniuersum.

CAP. VI.

Duo spe-
ctanda in cu-
ratione vl-
cerum.



IN curatione vlcerum duo nobis spectanda pro-
 ponuntur, nempe ipsius vlceris, quæ vlcus est
 cōtemplatio, & vlceris cum sua causa, aut sym-
 ptomate aliquo, aut alia quauis dispositione
 comp

complicati, aut etiam hanc vel illam particulam occupantis consideratio. Omne enim vlcus (vt supra diximus) aut solum est, ipsumq; per se (hoc est, nullo alio affectu, vel cum eo simul inuadente, vel ipsum præcedente, aut sequente) aut cum alio quopiam vno, multisve consistit. Quorum alij non modò statim ab initio vlcus excitarunt, sed etiam nunc maius efficiunt, alij eius sine quo non, vt ad curandi opus, rationem obtinent. Cæterum vlcus omne, qua vlcus est, vnam communem habet curandi indicationem. Siquidem (vt Galenus ait) vlcus, qua vlcus est, sanatio mediocris siccatio est. Hæc autem indicatio communis etiam est vulneribus curandis, qua saltem vulnera sunt, id est, plagæ vulnerando acceptæ. Sed hoc discrimen habent, quòd hæc minori, illa (quòd humidiora sint) maiori desiccatione indigent. Verum enim uerò vlcus, quod cum alio affectu coniunctum est, cuius videlicet præcedere curationem oportet, eius curatio, vt vlcus solius non est, sed prior illius affectus, secunda vlcus. Nam siue phlegmone quæpiam, siue erysipelas, siue tumoris, qui œdema dicitur, siue nigritia siue ecchymosis vlceratam carnem obsederit, primum molienda eius curatio est. Quòd si valentior aliqua intemperies (quæ imbecillitatis affectus partis causa esse solet) exulceratæ carni adsit, huic nimirum primo medendum erit. Vbi autem intemperiei affectum iam sanaueris, exulcerationis postea affectum sanabis. Ita quoque & varices, qui sæpe supra exulceratum locum sunt, prius sanabimus; vt deinde mox vlcus sanemus. Cæterum nulla harum curationum (inquit Galenus) ipsius est vlcus: sed alterius cuiusquam affectus, qui vlcus vel gignit, vel certè fouet. Porro duplex in eiusmodi cum vlcere complicatis dispositionibus consilium est ipsi Galeno libro quarto methodi medendi: nempe vt vel eiusmodi affectus e corpore prorsus eximas, vel incommodum quod inferunt, vincas. Verum hoc (inquit) vbi exiguus planè affectus est, fieri licet: vbi magnus est, duci ad cicatricem vlcus prius non poterit, quam illi affectui remedium attuleris. Talium igitur vlcusum quæ sic cum aliis affectibus complexa sunt, quatuor sunt particulares curandi intentiones.

Vlcus sanatio: mediocris siccatio est.

*In tollendis dispositionibus cum vlcere complicatis, duplex consilium esse. Particulari cura diuulsi-
ribus scopi.*

- 1 Prima vitæ rationem, sanandis eiusmodi vlceribus accommodam, præscribit.
- 2 Secunda materiam antecedentem, auertit & intercipit.
- 3 Tertia symptomata, & dispositiones, quæ cum vlceribus complicantur corrigit, & summuouet.
- 4 Quarta correctis, & profligatis iis dispositionibus, quibus vlcera complicantur, ea more vulnecum concauorum sanare præcipit.

*De primo
& secundo
scopo.*

Cæterum primam, & secundam intentionem assequimur, humoris copia, aut praua qualitate noxios, quibus laborantis corpus scaret, quisque in partem vlceratam influunt, tum corrigendo, tum vacuando, & auertendo, fluxionemque ipsam intercipiendo. Porro auxilia quibus commodè succorum abundantiam, & vitium tollimus, corrigimus, atque auertimus, sunt, venæ sectio, purgatio, proba victus ratio, cauteriū, vomitio, & id genus alia. Fluxiones verò intercipimus ligaturis, perfusionibus, & epithematis: item vnguentis ex bolo Armenia, atque aliis refrigeratibus, & astringentibus de quibus in sermone de tumoribus præter naturā, abunde dictū est. De iis autē sic Galen. libro quarto methodi medēdi, vbi maligni succi, & exulceratis curationē pertractat, ad verbum scribit: Aequè verò & mali succi, qui ad exulceratam partem confluit, vlcercans quidem est, sanatio eius hic dicitur. Vt malignus succus est aut copia redundans, in propriis ipsorum locis tractabitur. Cum ergo qui exulceratis partibus influit succus, nec multo plus iusto, nec multo deterior sit, auerti hunc regerique conueniet, adstrictis scilicet, refrigeratisque iis particulis, quæ ante exulcerata sunt. Inchoanda quoque deligatio est, à laborante ipsa particula, deducendaque versus sanam, veluti in fracturis ossium præcepit Hippocrates. Talis enim deligatura meatus adstringit, per quos materia ad particulas vlceratas influit. Sed & quæ vlceribus ipsis admoventur pharmaca, siccant valentius oportet, quàm ea, quæ simplici admoventur vlceri. Quòd si consisti compescique medicamentis influxus nequeat, causa eius intelligenda est, atque hæc prius adimenda. Ac si quidem ob partis, quæ fluxum recipit, imbecillitatem id fiat, huic nimirum medendum est: fuerit autem vlcerata, quoque partis propria quædam curatio. Sin propter sanguinis

*Si succus
qui influit,
nec copiosus
sit, nec ma-
lignus.*

*Si fluxus fi-
at, ob partis
imbecillita-
tem.*

guinis copiā, viciosūve succum, vel corporis totius, vel alicuius suprapositarū partium, illa scilicet prius sunt corrigenda. At imbecillitas quidem partis propter quam plus iusto succorum illi influit, omnino ab intemperie prouenit, non tamen ab omni. Eoque fit, vt exulcerata caro nō nunquam intemperata tantū sit, non autem imbecilla; nonnunquam vtrunque, & intemperata, & imbecilla. Quippe imbecillitatis affectū partis, valentior intemperies causa est. Quomodo autem curari debeat illa
 10 dyscrasia, siue intemperies, mox in sequentibus dicemus. Cæterū qua ratione, quibūve modis fluxiones quæ vel à toto corpore, vel à membro quopiam in particulam vlcere laborantem irruunt, intercipere, atque auertere oporteat, suprā in tractatū de tumoribus præter naturam abundè dictum est. Quare ne eadem identidem vbique repetamus, ex eo loco, quæ ad rem præsentem attinent requirenda erunt.

*Valentior
intēperies
causa est im-
becillitatis
partis.*


Tertia intentio, quæ symptomata, & dispositiones quæ cum vlcere complicantur corrigit, ac summouet, perficitur prout cuiusque symptomatis, & affectus cum vlcere cōplicati natura requirit ac desiderat. Porro (si Galenum sequimur) tradenda est medendi methodus non omnium simul, sed cuiusque seorsum. Itaque Galenum ipsum imitantes, exordium sumamus ab intemperie, quæ cum vlcere
 20 complicatur, corrigenda: de qua ad hunc modum scribit libro de morbis methodo curandis quarto.

*Tertius
scopus.*

*Lib. 4. mes.
med.*

Vlceris dyscrati, id est, cum intemperie iuncti curatio.

CAP. VII.

„  „ Arnis intemperies, si squalens siccaque videtur, aqua temperata fouens humectansque corriges. Quoties autem eo remedio vteris, esto tibi perfusionis humectationisque meta, vt cum primum rubescit, attolliturque parti-
 30 culæ moles, tum desinas. Quippe si ultra profundas, quod attraxisti, id euocabis. Itaque nihil profeceris. Quinetiam medicamentorum humectandi facultas plenior esto, quam
 „ vt in sana carne præceptum est. Si vero humidior, quam pro naturali habitu caro fuerit, contraria ratio ineunda
 „ est, ac medicamentorum facultas ad siccius transferenda:
 „ aqua verò nullatenus admonenda. Imò si lauandum vl-

*Squalentis
ac sicca in-
tēperiei cu-
ratio.*

*Humidioris intempe-
riei cura-
tio.*

*Caloris &
frigoris no-
ta.*

*Curatio fit
per contra-
ria.*

*Caro rectè
se habet, si
propriū ser-
uet tempera-
mentum.*

cus videtur, vinum, aut posca, aut decoctum austera cuius-
dam herbae præparandum. Eodem modo & calidiorem
quàm par est carnis habitum refrigerabis, & frigidiorē
calefacies. Agnosces verò (inquit) horum vtrunque, par-
tim colore, partim tactu, partim laborantis sensu. Quippe
aliàs vitionem sentire se fatentur, aliàs manifestum frigus
in particula, gaudentque vel frigidis medicamentis,
vel calidis. Et aliis quidem rubor levis inhiat, aliis color
magis albicat. Breuiter quæcunque partes vlcerae per in-
temperantiam aliquam à naturali habitu recesserunt, eo-
rum sanationem per ea, quæ contraria viribus sunt, fieri om-
ninò est necesse, calidam vtique intemperiem (vt di-
ctum est) refrigerando, siccam humectando, frigidam cal-
faciendo, humidam siccando. Quòd si frigidior humi-
diórque locus sit, calfaciendo pariter ac siccando, & in aliis
ad eundem modum, vincentem videlicet qualitatem, con-
traria semper oppugnans. Atque vbi intemperiei affectum
iam sanaueris, deinde etiam exulcerationis affectum sana-
bis. Non aliter planè nunc curata intemperie, quàm si
citra vlcus incidisset. Quo manifestum fit, non esse vlcus,
sed intemperiei propriam omnem eiusmodi curationem,
quæ tamen vlcus ipsius sanationem omninò præcedere
debet. Siquidem fieri non potest, vt in vlcere vel carnis
productio, vel sinus impletio, vel agglutinatio, vel cicatri-
cis inductio, rectè vnquam cedat, nisi subiecta caro pro na-
turali modo se habeat. Hæc autem rectè se habuerit, si
(quod reliquis etiam omnibus est commune) proprium
temperamentum tueatur. Ergo si exulcerata caro iusto
calidior, frigidiorve effecta fuerit, vtique medelam exigit,
quæ in tantum calfaciat, refrigeretve, in quantum ipsa à
naturali suo habitu recessit. Subiectæ nanque carnis af-
fectus, causæ rationem obtinet ad id quod efficitur. Quippe
ex hac (vt Galenus inquit) & per hanc, tum quæ dissi-
dent, glutinantur, tum quæ caua sunt, carne implentur.
Itaque temperatam esse subiectam carnem, ad vlcera tum
glutinanda, tum carne implenda prorsus oportet. Dolor
quoque vnum est, ex symptomatis, quæ vlcusum curatio-
nem remorantur, & impediunt. Quocirca si vehemens
aliquis dolor vlcerae parti incidat, protinus hic aut tol-
lendus erit, aut saltem quoad licebit, demulcendus. Do-
lor

lor enim præfertim vehemens, vires prostermit, & fluxio- *Vlcus cras-*
 nem proritat: proinde & vlcis ipsius curationem prohi- *cians.*
 bet. Itaque tametsi quæ vlcis particulis ad doloris se-
 dationem admoventur, vlcis aduersentur, quoniam ta-
 5 men ex doloris vehementia plerumque imminet laboranti
 periculum, & propriam vlcis curationem moratur, ne-
 glecto ad tempus vlcere, dolori tanquam vrgentiori pri-
 mum, maximèque intendendum est. In complicatis nan- *In compli-*
 que affectibus, id ex quo primum maximèque homini im- *catis affe-*
 10 minet periculum, quòdque magis accelerat, & vrget, pri- *ctibus vr-*
 mum curari, atque auferri debet. Ceterum quibus auxiliis *gētiori sem-*
 dolor mitigari, aut sedari possit, in duobus libri superiori- *per primis*
 bus copiosè satis dictum est, diceturque iterum in antido- *succurren-*
 tario. *dum est.*

15 *De vlcere cum tumore particule. CAP. VIII.*



20 *C*eterum ad eundem quoque modum, & partium, quæ cum aliquo præter naturam tumore exulceratæ sunt, earum prius sanandus tumor est: fieri enim non potest, vt vlcus tumore manente, ad sanitatem perducatur.

Quocirca omni studio laborandum est, ne phlegmone, aut quouis alius tumor in loco vlcis excitetur: quòd si id prohiberi non possit, remediis dicatis curari debeat,

25 Vlcere tamen interim non neglecto. Quæ autem omnis præter naturam tumoris curandi ratio sit, in præcedentibus fusissimè dictum est. Nunc quantum eius rei coniunctum cum vlcis curatione est, obiter, ac compendiosè tractabitur.

Compendiaria igitur obsessarum phlegmone

30 partium vlcis curatio, per id genus præsidia obitur Galeno, quæ sanè vel affectum prorsus summovent: vel si quid exiguum, quod suppuret reliquerint, alterum medicamentum acre, quòd educere pus queat, requiritur: vel tenuis circumposita cutis sit, velisque celerius explica-

35 tum ægrum, sectio petenda est. Quod si cataplasmate ex hordei farina, aqua & oleo quòd calfaciat humectetque, illinantur partes vlcis, quæ phlegmone infestantur, lenientis (vt Galenus ait) tractatio est, non medentis, & contra malum pugnantis. Id enim non ex prima ratione fit, hoc est, vt remedium affectus, sed vt symptomatis mitigatio.

Libr. 2.

Phlegmonosi vlcis curatio.

Lib. 4 met.

*Si inflāma
tio vlcera
exerceat.*

*Vinum.
Posca.*

*Malum pu
nicū dulce.*

Siquidem ipsius phlegmones remedia (vt autor est Hippocrates) sicciorum sunt virium. Itaque si inflammatio vlcera aut etiam vulnera adhuc recentia obsideat, vsus est medicamentorum quæ desiccant, atque inflammationem arcent. Ex liquidis igitur (inquit Paulus) laudatissimum est vinum, deinde posca. Si vero sordes quoque cum inflammatione occupent, nullā diluta conuenit. Ex iis autem medicamentis, quæ siccandi potestate prædita sunt, cōmuniter quidem conferent, inflammationibus dicata, quæ in tractatu de tumoribus præter naturam descripta sunt, si oleosa, acriæque excipias: priuatim autem hoc proficit. Malum punicum dulce, vino incoctum tritūque illinitur. Mirabile nimirum, & (vt Paulus ait) multiplici vsu commendatum est remedium: facit enim tum ad capitis, tum naturalium vlcera, tum etiam ea, quæ toto corpore exercuciant, oculorūque inflammationes. At si erysipelas, aut eiusmodi quippiam vlceri accesserit, iis vtendum erit præsiidiis, quæ aduersus illa superius scripta sunt.

Vlceris contusi curatio. CAP. IX.

*Vlcerā cū
contusione
facta, ad
suppuratio
nē ducēda.*



*Cataplas-
mata suppu-
ratoria.
Aqua ca-
lida.
Tetraphar-
macum.
Hippo.*

Aleni ex Hippocratis testimonio sententia fuit, vlcera omnia præter ea quæ contusa sunt, siccati oportere. In iis verò quæ cum contusione facta sunt, quā celerrimè pus mouendum esse. Siquidem necesse est carnes sic contusas putrescere, vt noua tādē caro gignatur. Pus autem ipsum siue carnis contusæ suppuratio, cum aliqua putrescentia fit. Porro quæ putrescunt omnia, ex calido, & humido sic afficiuntur. Proinde fit, vt ea quæ calefaciunt & humectāt, omnibus his affectibus, quibus moueri pus expedit, semper admoveamus. Cataplasmata igitur ex hordei farina, aqua, & oleo: item quæ ex pane, aqua, & oleo, componuntur, conueniunt. Præterea fomentum multæ calidæ aquæ, & tetrapharmacum (ceu quæ calfaciant, humectentque, & pus quā celerrimè moueant) vlceribus contusis rectè adhibentur. Sed præstat ipsius Hippocratis verba subiicere: Quodcunque vlcus (inquit) cæsim percussimve acuto telo est diuisum, medicamentū en- hæmū & siccans aliquod, quod suppurare vetet, admittit. Sin caro aliquo telo tū cōtusa, tum cesa sit, huic ita medēdum est, vt quā celerrimè suppuret. Nam & minus phlegmone

gnone vrgebitur, & necesse est carnes, quæ contusæ cæ-
 sèque sint, putrefactas, & in pus, verfas liquari, postea no-
 uam carnem nasci. His itaque verbis aperte nos docet Hip-
 5 pocrates, vlcera quæ sine contusione accepta sunt, quàm
 maximè ficcari. His verò quæ cum contusione facta sunt,
 quàm primùm pus mouere. Porro eorum quæ puri mo-
 uendo aptissima sunt, materiam in sermone de tumoribus
 præter naturam, & in antidotario copiosam reperiēs. Sed
 & de iis etiam suprà tractauimus, vbi de vulneribus con-
 10 tuis meminimus.

*De carne in vlceribus supercrescente, quam Græci hyper
 sarcosin nominant, tollenda. C. A. P. X.*



15 **C**aro in vlceribus suprà quàm par est excre-
 scens, medicamentis exiccantibus tollitur. E-
 quorum sanè numero sunt diphryges (cuius
 tria sunt genera apud Dioscoridem) insper-
 sum, aut cataplasmatīs instar inductū, squā-
 ma æris, omniāque testacea cōbusta. Item echini, hoc est,
 20 erinacei vtrique tam terrestres quàm marini, cum toto cor-
 pore concremati. Verùm hæc non admodum eximie, sed
 modicè ac mediocriter duntaxat purgant, & supercrescen-
 tia compescunt. Asiæ verò petræ flos longè validius id nu-
 25 meyis obit, atque hoc magis adhuc sori, chrysocolla, chal-
 citis, misy. Quæ si combusta fuerint, nūnus vellicant, ac ro-
 dunt. Item æris flos, qui chalcanthos Græcis vocatur. Cæ-
 terùm ærugo his adhuc omnibus valētior est. Sales autem
 30 concremati carnes cum humore flaccidas consumunt, ac
 liquefaciunt. Sic etiam linamenta è panniculo discerpta,
 muria acriori imbuta, & denuò resiccata atque imposita,
 mediocres carniū supercrescētiās, liquefaciunt, atque
 35 exedunt. At maximas carniū excrecētiās adusque pe-
 nitiora crustis obducunt, Faustiani pastilli, triti atque in-
 spersi. Item medicamentum quod recipit calcis viuæ, id est,
 aqua non extinctæ, squammæ æris, & mannæ (quæ mica
 40 est thuris, concussu seu attritu elisa) pares modos, hoc est,
 partes æquales. Porro Faustini pastilli, id est, trochisci,
 Paulo Aeginetæ libro septimo ad hunc modum descri-
 buntur. Auripigmenti drachmæ duodecim, sandarachæ
 (quæ rubrum est auripigmentum, & à natura magis exco-
 45 ctum) drachmæ sex, calcis viuæ drach. octo, chartæ com-
 bustæ

*Diphry-
 ges.*

Squammæ æris.

Echini.

*Asiæ lap-
 dis flos.*

*Sales cōc-
 mati.*

*Medican-
 tum ad m-
 aximas hi-
 sarcosēsi.*

*Faustini
 pastilli.*

*Vnguentum
Aegyptia-
cum.*

bustæ drachma: myrti baccarum succo vel decocto excepta in pastillos redigito. Sed de eiusmodi supercrescentem carnem compescens, & absumentibus iterum in antidotario dicemus. Ad hanc autem intentionem in communi usu est vnguentum Aegyptiacum nominatum. Cæterum dum hæc caustica atque erodentia medicamenta admoventur, partes quæ in circuitu sunt, refrigerantia desiderant, ne scilicet in partem ulceratam ex rosione, calore, & dolore, humorum fluxio aduocetur. Deinde crustæ ulceribus inductæ resoluendæ erunt, & vlcus ad sanitatem reducendum.

Vlceris cum duritie, & decoloratione labrorum curatio.

C A P. X I.

*Excisio
Galen.
Scarifica-
tio. Auic.*



Um labra tantum vlceris decolorata duræ plusculum fuerint, excidenda ea sunt (Galenus auctore) ad sanam usque carnem. Auicenna autem decolorata eiusmodi, duræque vlceris labra scarificanda esse præcipit, & ab eis sanguinem, ad motis etiam cucurbitulis, extrahendum. Sanguine autem, quod satis esse videbitur, educto, spongiam siccam, hoc est, nullo liquore madentem, ac postea etiam medicamenta quædam resiccantia superimponere iubet.

Sed & de iis ante Auicennam ad eundem ferè modum scripserat Hippoc. qui certè nihil omnino eorum, quibus ad vlcerum curationem est opus, omisisse videtur. Hic enim non solum vlcerum (ipso etiam Galeno teste) quæ citra alium affectum consistunt, sanatorum rationem inuenit (vt quæ in siccando, vt supra dictum est, consistat) sed etiam priuatim per species affectuum cuiusque. Siquidem vel liuidum, vel nigrum, vel rubrum cõspicitur, scarificando, ac sanguinem emittendo. Mox spongiam statim sicciorē magis, quàm humidiorē, hoc est, siccā potius quàm humefactā superimponendo. Posthæc verò etiam resiccantia remedia applicando. Ab his, si res postulet, rursus sanguinem auferendo. Ac mox iterum talia peragendo, donec parta omnino sanitas sit. Quod si labra vlceris dura callosaque appareant, etiam ea excidendo. Cum verò amplius progressus huiusmodi affectus est, deliberatio incidit, excidendumne omne id sit, quod præter naturā visitur, an spatium potius curandum: proculque dubio est, ægri animum

Lib. 4. the.

num hoc casu consulendum esse. Aliqui enim longiori tempore curari citra sectionē malunt: aliqui quidvis subire, dummodo citius sanentur, sunt parati. Ceterum excidere (vt postea Galenus ait) res est promptissima: maius
 5 verò quippiam atque artis egens medicamentis, sanare.

Varicum cum vlcere complicatarum curatio.

C A P. X I I.



10 **V**aricum superiacentium, hoc est, suprà exulceratum locum existentium occasione, contumax ad sanandum sepe vlcus redditur: quippe quòd ex his humiditas aliqua ad exulceratas partes defluat. Eas igitur (vt suprà dictum est) prius sanare oportet, vt deindè mox vlcus sanemus. Igitur varices, qui cruribus & alibi quàm in te-
 15 sticulis prouenire solent, hoc modo ex Hippo. atque Aëtij Antiocheni, & Pauli Aeginetæ sententia curabis. Primò in cute, vasi elato seu venæ in fastigium tumefactæ hoc est, varici, adiacente, simplicem sectionem scalpello per longitudinem facito. Ita leuiter tamen, vt venam sic in verti-
 20 cem elatam non diuidas, & scalpello penetres, sed sola cutis incidatur. Ducta sic leuiter in cute sectione, oras vulneris hamulis diducito, & membranulas, cultro ad ramicem aquosum accommodo, sensim ac blandè excoriat. Mox vena detecta nudatæ, & à circuniacentibus corporibus
 25 vndiquaque explicata, eam volsella aut obtuso hamo attrahito, ac suspensam teneto. Deinde acum duplex linum, seu lineum funiculum duplicem, trahentem subiicito, subterve transmittito, linique habenulam amputato, sic vt duo funiculi efficiantur. Tum venam dilatatam, nò aliter quàm
 30 in phlebotomia fieri solet, scalpello per mediū diuidito, ac sanguinis quātum satis esse videbitur, detrahito. Deinde altero funiculo superiorem vasis partem constringito, crurèque eleuato, sanguinem qui in ipso apparebit, manuum expressi euacuato. Quod vbi factum fuerit, venam ab altera parte lino altero rursus deuincito. Partem verò illam
 35 venæ, quæ inter duo vincula est, vel statim excindito, vel manere sinito, vsque dum putrefacta sua sponte cum funibus excidat. Peracto opere, sicca linamenta in plagam inferenda sunt, spleniūque ~~conclao~~ id est, vino cui oleum adiectum sit, madens superimponendum, ac deligandum est.

Tum

*Varicum
curatio.*

*Si varix
cum occupa-
uerit.*

*Emulſio va-
ricis.
Vitis.*

Li. 6. ca. 5.

*Ad ulcerū
vermes.*

Tum linamentis, medicamento aliquo ad pus faciendum apto, imbutis, curatio prosequenda erit, cetera quæ reliquis vlceribus communia sunt, peragendo. Sed interim quies ægro imperanda, seruato acclui membri decubitu: ne si declue iaceat, humores ad ipsum confluant. Pranso autem magis quàm ieiuno & parum pleno, potoque, item concaléfacto, & (vt Paulus voluit) loto, dieque calido potius quàm frigido, venam eiusmodi (si dictis Hippocratis auscultes) secabis, atque ex ea sanguinem mittes. Itaque si varix crus (vt magna ex parte solet) occupauerit, loto prius (vt præcepit Paulus) homine, funiculum superiori femoris regioni circumdato, ac vt inambulet iubeto. Inde venam ita repletam, attramento scriptorio, aut collyrio notato, iuxta eius situm trium digitorum spatium aut paulo ampliori interposito. Deinde reclinato seu decumbente ægro, crusque ipsum extendente, alterum vinculi paululum supra genui iniicito, ac mox quā attramenti nota est, sectionē facito, & reliquā curationem (vt supra modo annotauimus) prosequitor. Quidam ex veteribus, funibus siue vinculis minime utebantur, sed venam vel statim vbi à carne absoluta erat, & vndiquaque nudata, excindebant, vel ab imo etiā adhærentem violenter extrahendo abrumpebāt. Alij verò vitionem eligentes, digitalibus interuallis innixa cauteria vasis admouēt. Atque vbi crusta exciderit, vlcusque incarnatum, & cicatrix indurata fuerit locum roborant. Verum omnium tutissimus chirurgiæ modus est, quem supra diximus. Porro varices in imo ventris suborientes, cōsimiliter tractandi sunt. Illi item, qui in temporibus existunt, ea ratione, quàm in angiologia, siue exemptione venarum docuit Aegineta, tolluntur. Atque hæc satis de varicum curatione, quantum saltem præsens locus postulat.

De verminoso vlcere.

CAP. XIII.



T vermes qui vlceribus procreantur, arceas primum quidē est, vt humiditatē putredinēque, eorum opificem tollas. Itaque vermes in vlceribus exortos interficiunt, & putredinē simul auferunt succus & decoctū absynthis, & agrimonix, vel centaurij, vel marrubij, calamēthi quoque officinarum (quod primum genus est calamunthæ Diosco.) succus iugiter instillatus, atque id genus multa, quæ etiam aurum vermes enecant

enecant. Priuatim autem ad vermes qui vlcera infestant commendatur Archigeni, & Theodoro medicamentum, quod recipit cerussæ & polij parẽm mensuram, cum pice liquida illitum. Conducit etiam magnopere linamentum
 5 salina ieiuni hominis illutum, & applicatum. Hoc vermes etiam in auribus perimit, & concolores cicatrices reddit; vt testatur Aëtius.

Vlceris disrupti, & cum ossis corruptione complicati, curatio.

CAP. XIII.

- 10 **V**lcerum nõnulla cicatrice obducta, postea tempore haud ita multo interiecto denuò inflammatione tentantur, rursúmque sua sponte & per se rumpuntur, & à continuitate sua discedunt. Ossẽ enim quopiam substracto malè affecto, hoc est,
 15 vitiato & corrupto circumdata ac superiacens caro ex facili quidem interdum ad cicatricem ducitur, & sana ex toto, ad vnguẽmque restituta esse videtur: verũ cursu humoris valido, paulatim ex ossẽ in alto contabescente, ac putrescente, tum inflammatio, tum pus oboritur, quod cicatricem lacerat, ac disruptit. Caterũ vitiati ac corrupti ossis signa hæc sunt. Primò ferè pingue fit: deindẽ vel
 20 nigrum, vel cariosum. Quæ supernatis (vt Celsus ait) grauibz vlceribus, aut fistulis, hisque vel longa vetustate, vel etiam cancro occupatis, eueniunt. Quæ nam igitur
 25 horum vlcerum curatio erit? certè eatenus exiccare, quatenus squamima affecti ossis exciderit. Ossium autem squammæ facilè excident, si agrestis papaueris, & fici arboris foliis cũ polenta læuigatis, atque ex vino illitis ipsius ossis sinus concauos repleueris, aut alterci (quem Græci
 30 hyoscyamum dicunt) semen, & attramentum sutorium, pari pondere contrita imposueris. Sed & pecedani radix contrita, subito squammas ossium remouet, ac separat. Squammas etiam ossium breui detrahie, & novam probamque carnẽ desuper renasci facit, sequens
 35 medicamentum quod admirabile vocat Auicennas. Recipit autem aristolochiæ, ireos, myrrhæ, aloës, corticis plantæ panacis [ex quâ fit succus opopanax dictus] cam-
 bil (quod apud Arabes genus est cuiusdam terræ rubræ minutæ vt arena, & Galeno ac Græcis eretrias,
 vt puto, dicitur) adusti, scorix aris, corticis pini, singulorum

*Ossis vitia
 u nota.*

*Quæ ossium
 squammas
 excidere faci-
 unt.*

*Emplast.
 Auic.
 Cambil.
 Terra ere-
 trias.*

lorum portiones æquas, melle omnia excipiantur, & fiat emplastrum. Oportet autem ante omnia vitiatum ac corruptum os nudare, vlcere exciso, & si latius eius corrupti ossis vitium est, quàm vlcus fuit, carnem subsecare, donec integrum os vndique pateat. Osse autem sic nudato, totum id quod pingue & corruptum est, candente ferramento semel iterumue (vt res exigit) admoto adurendum est, vt ex eo statu secedat. Aut certè eradendum, donec iam aliquid cruoris ostendatur, quæ integrioris & minimè corrupti ossis nota est. Neque alia facienda sunt, vbi caries nigritiæ sue in summo osse est. Siquidem id vel paulò diutius eodem ferramento adurendum, vel radendum est. Porro qui radit hæc (inquit Celsus) audacter imprimere ferramentum debet, vt & agat aliquid, & maturius desinat. Finis est, cum vel ad album os, vel ad solidum ventum est. Albo nanque finiri ex nigritie vitium, soliditate quadam, ex carie manifestum est. Accedere etiam cruoris aliquid integro supra dictum est. Cæterum si caries altè descendit, per terebram vrgenda crebris foraminibus est, quæ altitudine vitiū sequent. Tū in ea foramina demittenda candentia ferramenta sunt, donec inde siccū os ex toto fiat. Simul enim post hæc & resoluetur ab inferiori osse quod cunque vitiatū est, & is sinus carne replebitur, & humor aut nullus postea feretur, aut mediocris. Sin autem nigrities est, aut si caries ad alteram quoque partem ossis transit, oportet excidi. Sed quod totum vitiatum est, totum eximendum est. Si inferior pars integra est, catenus, hoc est, vsque ad subiectam partem ossis integram, quod corruptum est excidi debet. Sunt qui post abrasionem cauterium admouendum esse suadent: nec immerito sanè. Nam si corruptela ossis ex humiditate excrementosa & superuacanea, ipsius ossis substantiam labefactante ortum habet (vt certè magna ex parte habet) nullum præsentius aut tutius remedium excogitari potest, ipsa vstione, seu cauterio (vt vocant) actuali. Hoc enim decenter admotum, & citò, & tutò in summo quoque & in alto (non secus quàm ignis ipse actualis) desiccat. Post vstionem verò ferro candente factam, rosaceum calidum infundunt. Guido autem à Cauliaco post vstionē cauterio (vt dicūt) actuali (quod in hoc affectu magnopere probat) decenter

Libr. 8.

Si caries alte descendit.

Vstio.

Que post vstionē facienda.

decenter factam, rosaceum oui candido liquore permixtū,
tribus primis diebus admouet: triduo verò alio sequente,
loco albuminis, luteum oui (quod vitellum appellāt) rho-
dino, id est, rosaceo commiscet: postea butyrum cum melle
5 rosato infundit. Sed præstat eius verba hoc loco subiicere.
Ego (inquit) post cauterium pono oleum rosarū cum al-
bumine oui per tres dies, & per alios tres dies cum vitello
oui, & postea butyrum cum melle rosato. Et desuper con-
tinuo vnum de mundificatiuis vsque ad offis exfoliationē,
10 & post cum puluere emplastri dicti, hoc est, ex Auicenna
superius commemorati, incarno, & consolido.

*De vlcēibus dysepulorū inueteratis, & ijs, quæ cacoēthe,
& chironia dicunt.* C A P. XV.



15 **V**lcera, quæ ad cicatricem ægrè ducūtur, Ga-
lenus Græcè dysepulota nominat. Quæ verò ta
ægrè sanabilia dolosa, malefica siue maligna
contumacia rebelliæ dicimus, eidem, &
Græcis aliis, qui de re medica scripserūt, au-
toribus cacoēthe nominantur. Hæc quoque, præsertim in-
20 ueterata, & quæ vix cicatricem recipiunt, alij chironia ap-
pellarunt, ceu Chirone medicinæ peritissimo indigentia: *Chironia.*
alij telephia, quòd in tali vlcere Telephus cōsenuerit. *Telephia.*
Galenus libro quarto de compositione medicamentorum se-
cundum genera, vlcera cacoēthe diuidit penes vehemētiæ
25 differentiam in maligniora, seu præter modum malefica,
& mediocria seu moderatiora: atque hæc quidem imbe-
cillioribus, illa verò valētioribus remediis curari præcipit.
Illa autem non mediocriter: sed maximè maligna contu-
maciāq; vlcera, Asclepiades atque alij veteres (vel ipso Ga-
30 leno teste) chironia propriè nominabant. Cæterum Cor-
nelio Celso autore, chironium vlcus appellatur, quod &
magnum est, & habet oras duas callosas, tumētes: exit sa-
pientis nō multa: sed tenuis. Odor malus, neque in vlcere, ne-
que in eius tumore est. Nulla inflāmatio, dolor modicus
35 est, nihil serpit: idēque nullum periculum adfert: sed non
facile sanescit. Interdum tenuis cicatrix inducitur: deinde
iterum rumpitur, vlcusque renouatur, & maximè in pedi-
bus & cruribus. His similia sunt, quæ Auicennas ægrè sa-
nabilia, & occultam quādam nobis proprietatem habent. *Auicennas.*
tia nominat. Hæc enim (inquit ille) neque putrida sunt,

neque corrosiua, neq; ambulatoria: sed sunt vnus dispositionis, plana, claudencia sese, & reciduiantia sæpe, hoc est, cicatricem frequenter ducentia, & rursus sæpè se aperien-

Varia causa tia & renouantia. Porro multæ ac varix sunt causæ, quæ
se propter eiusmodi malignorum contumaciam, atque ægrè sanabi-
quas nō sa lium vlcerum coitionem & sanationem remoratur, & im-
nescat vl- pediunt. Nempe fieri aliquādo potest, vt labra exulceratæ
cus Labra partis callosa, & dura causa sint, quominus sanescat vlcus.
callosa.

Intemperies. Potest etiā causa esse intemperies, vel quæ citra tumorem

Varix. præter naturā in vlceratis partibus consistat, vel quæ cum

Lienis, aut tumore quidem aliquo coniuncta sit. Potest & varix su-
iocinoris vi- periacens, vel lienis auctio & male affectus, vel in iocinore
tium. vitium aliquod præterque hæc omnia imbecillitas ægræ

Imbecilli- partis, quæ (vt Galenus ait) ipsa quoque intensa quædam
tas partu. est intemperies, vlceris curationem in multos menses pro-
Cacochy- trahere. Quinetiam vitiosus in toto corpore succus (caco-
mia. chymiam vocant) maxima causarum est, quæ incommo-
 dare vlceribus possunt, & ea diuturna contumaciāque ef-
 ficere. Vexat sanè non minus vlcera, atque ea curatu diffi-
 cilia reddit, succorum æquabiliter se habētium exuperan-
 tia, quam plethoram appellant. Quæ omnes causæ, & si
 quæ sint aliæ, in duas (vt supra docuimus) reuocari pos-
 sunt: nempe in carnis subiectæ intemperiem, & humorem
 confluentem. Itaque si eiusmodi vlceribus dyssepulotis, id
 est, ægrè cicatricem admittentibus, maleficis, contumaci-
 bus, atque inueteratis, aliquando mederi velis, necesse est
 causas, quæ illa creant, primū summoveas atque abscin-
 das: deinde maligni ipsius vlceris curationem aggrediaris.
 In morbis nanque omnibus nedum vlceribus, in quibus
 effectrix causa adhuc manet, ab hac inchoāda curatio est.
 Magna igitur attentione inspiciendum venit, num cor-
 pus totum cacochymum vel plethoricum existat, vel lien,
 aut iecur malè afficiatur, vel labra vlceris dura, & callosa
 sint. Item num aliqua insignis subfit partis vlceratæ in-
 temperies, aut etiam varix aliquis superiacens fuerit, cu-
 ius occasione contumax ad sanandum vlcus redditur. Er-
 go si totū corpus cacochymia aut plethora laboret, prius
 expurgare, vacuaréque expedit, quàm medicamentum vl-
 ceri admoueas. Si verò lien, aut iecur male afficiatur, his
 prius prouidere, deinde ad vlcus curandum venire oportet. Ad

tet. Adeundem modum & varices, qui sæpè supra exulceratum locum sunt, prius (vt supra docuimus) tollèdi sunt, deinde mox vlcus sanandum. Intemperies quoque atque imbecillitas, quam sæpè insignis quædam parit intemperies, antequam ad vlcis curationem accedamus corrigenda erit. Breuiter ei, quod fluxionis in partem vlceratam decumbentis est causa, atque ægrè sanabile vlcus reddit, prouidendum, ac si fieri potest, medendum prius erit. Deinde maligni ipsius vlcis & contumacis curationem

10 aggredi oportebit.

Itaque malignorum & difficulter cicatricem recipientium vlcis curationis summus scopus est, valida citra demorsum exiccatio. Hæc enim ab aliis vlcisbus hoc vno dissident, quòd medicamenta citra demorsum, atque erosionem vehementer exiccantia desiderant. Quæ enim mordendo vlcus, & manifestam in eo exasperationem excitando, dolorem inferunt, fluores, hoc est, humores vlcis partibus influentes irritant, & phlegmonas concitant. Talis igitur pharmacorum materia, quoad eius fieri potest, ad dysepulota, id est, ægrè cicatricem admittentia, & cacoëthe, id est, maligna vlcera inuenienda est, unde vlcus citra mordicationem & dolorem siccescat. Hæc autem non ita inuentu facilis statim videbitur, si attentius rem ipsam fueris contemplatus. Vt enim generalem hunc scopum, nempe validam vlcis desiccationem, assequaris, duo tibi alij scopi proponuntur, vnus vt id quod influit, regeras, repellasve, si saltem qui vlcis partibus influit succus, nec multò plus iusto, nec multò deterior sit: alter, vt quod affectæ parti in hæret, infixumque est discutias. Atque hæc contrariæ vires præstant. Siquidem influxum reprimunt, quæ sunt adstringentia pharmaca: digerunt impacta iam exceptaque, trahendi potestate prædita. Porro quæ adstringunt, vt plurimum exasperant, atque hac occasione molesta sunt. Trahentia verò, ac digerentia ex alto humiditates, non citra acrimoniam id efficiunt. At acrimoniam dolor aliquis necessario sequitur vlcis partem erodens. Atque sic propter dolorem, quem exasperantia erodentiæque concitant humores) vt paulò antè dicebamus) vlcis partibus influentes irritari, & vlcus phlegmone obfideri

Malignorum vlcis curationis summus scopus est, valida citra demorsum exiccatio.

Duo alij scopi ad summum, & generalem scopum assequendum necessarii.

1. Repellendum quod influit.

2. Digerendum quod iam parti inhaesit.

exedique contingit. Ex quibus sanè dictis colligitur, vlc-
ribus dysepulotis, id est, cicatricè difficulter recipientibus,
præsidia inueniri non posse: & multò minus adhuc mali-
gnis, quæ Græca dictione cacoëthe suprà iā sæpius vocauim-
us. Quid ergo nobis agendum erit, vt talia vlcera cacoë-
the, & dysepulota dicta ad integram sanitatē perducantur?

*Medicame-
ta dysepulo-
ris & ma-
lignis vlc-
ribus sanā-
dis accom-
moda.* Deligenda sanè erunt pharmaca, quæ vtraque vi & fa-
cultate (nempe adstrictoria & digerente) polleant, atque
ita quod influit, repellant, quod verò iam affectæ parti
inhæsit discutiant. His itaque mista facultate præditis me-
dicamentis, vlcera de quibus nobis in præsentia sermo est,
citra erosionem demorsumve vt res expostulat desiccabis.
Cæterum tametsi medicamentum ex ambobus compo-
situm erodente puta, & adstringente necessario validum
existat, sordes tamen & humiditatis copia id genus vlc-
ribus incumbens, veluti propugnacula quædam vlceratis
particulis facta, rosionem valentibus pharmacis adimūt,
solvuntque. Porro artificio hac in re potius (vt videtur)
vti debet medicus quàm experimento inniti: nempe
quod sciat rationalis medicus vlcus non alia medicamen-
torum virtute curari, quàm dum affecta pars eam siccita-
tem consequatur, quam in naturali statu sita possidebat.

*Lib. 4. cōp.
secundum
genera.*

Quod factum intelligimus, vbi neque tenuis amplius
sanies influat, neque pus producat. Hanc autem di-
spositionem vlcera nanciscuntur, quo dicebamus modo
siccescantia, hoc est, adstricta, discussaque. Dein vbi sicca
quidem fuerint, verum sordida adhuc appareant, deter-
soriis pharmacis repurgantur. Cæterum cùm manifesto
constet omnibus in artis operibus exercitatis, rationem
sine operum exploratione probabilem non esse, medi-
cus diligenter attendere debet, quem effectum medica-
mentum vlceri adhibitum, quotiescunque ipsum solue-
rit, in particula vlcerata præstiterit, quantum scilicet hu-
miditatis in vlcere desiccauerit, vel si etiam sordes adsit,

*Diligenter
inspiciedū,
vnde sordes
in vlcere e-
nata sit.*

quantum indè absterferit. Sed & animum intendere
oportet, vtrum vlcus carne, quæ subest exesa, ac colli-
quescente, sordidum euaserit, an quia medicamen sordi-
bus auferendis aptum requirat, impositum verò tale non
sit. Quod nimirum medicis etiam bonis (Galeno atre-
stante) existimatis, nonnunquam imposuit, ac nostris
quoque

- quoque chirurgis quotidie adhuc imponit. Vbi enim vlcus post vnam aut alteram medicamenti appositionem sordidius conspexerint, statim non cogitantes, an id ex rosione pharmaci acciderit, ad absterforium valentius accriusque se conferunt, vnde iterum vlcus erosum, ex æquo sordidum, vel etiam magis adhuc altera solutione visitur. Carne enim id fœdatur, à medicamento colliquata. Nam ita in prauam saniem degenerat. Quicquid autem in his ipsis tenuioris substantiæ est à pharmaco diffiatur, 10 reliquum ibidem vlcerebus infixum, sordes ipsis redditur. Cæterum cum ampla sit latitudo vtriusque in eo, quod alterum vlcus altero magis minúsve dyssepulotum, malignumque sit, corporaque omnia, quibus mederi cogimur, non eadem omnino temperaturam ac dispositionem habent, sed alia vitioso succo, alia plethora laborêt, quædam 15 dura & robusta sint, quædam verò tenera & mollia, atque ad sentiendum insigniter habilia, fieri non potest, vt vno eodemque medicamēto omnibus indifferēter dyssepulotis & malignis vlcerebus, quæuis corpora occupantibus, medeamur: sed tantum medicatium pharmacorum (vt Galenus ait) esse numerum oportet, quantus ipforum quoque 20 vlcerebus extiterit. Ergo in curandis eiusmodi vlcerebus ægrè sanabilibus, supposita eorum natura, & maiori cuiusque minorive à naturali habitu recessu, laborantis cuiusque corporis habitus ac dispositio diligēti animaduersione erit consideranda. Deinde cuiusque medicamenti tam simplicis, quàm compositi, vis & facultas adamussim ediscenda. Quæ scilicet deficcāt, non tamē vlcerebus sordes abstergunt. Item quæ abstergunt quidem, non tamen probe 25 deficcant, ac quæ vtriusque etiam possunt efficere. Sed & accuratè prospiciendū est, ex quo quodque medicamentum ordine existat, hoc est, an imbecillum, an moderatū, an validū. Atque in vno quoque ordine maioris minorisve ratio attendenda erit. Quod maximum Galeno censetur, inter ea, quæ ad horum vlcerebus curationē pertinent, neglectum tamen (inquit) plerisque medicinalis materiæ scriptoribus. Nam hi solas vniuersales ipsius vires dicere 35 studuerunt: inter quos fuit & Dioscorides, quem nulli eorum, qui in eadem quasi arena defudarunt, hoc est, de medicinali materia scripserunt, secundum esse, vel Galeni

Nō vnum idemq; medicamentū omnib; corporib; mederi potest.

Lib. 4. natura yvuy. Quæ in curandis malignis vlcerebus præcipuè consideranda.

Dioscorid.

Qui de me ipsius testimonio quisquam dixerit. Sed & qui ~~composita~~ *dicamentis* medicamenta tradiderunt, de his indeterminatè, & citra *indeterminatè* distinctionem scripserunt. Neque enim virtutem ipsius *medicamenti*, an scilicet validissimum, an moderatum, vel *tra distinctione* imbecillum esset, explicuerunt: neque difficultatis, aut magnitudinis *lignitatis* latitudinem ipsorum ulcerum, aut naturam, habitumve corporum ulcere laborantium expresserunt: quæ *psent, erroris occasione alijs* nimirum distinctione omissa, per multos medicos & chirurgos, interdum benè, interdum malè, ipsis pharmacis, quæ posteris scripto reliquerunt, ut contingit: idèoque nonnunquam scopum mirificè adsequi, interim ab illo errare, alio delabentes. Itaque non iniuria tam veteres, ut Andromachus, Crito, Asclepiades, quam recentiores scriptores accusandi veniunt, qui sine ulla distinctione remedia scripserunt ad dysepulota, id est, cicatricem difficulter recipientia: item ad cacoëthe, id est, maligna, siue maligna, & contumacia ulcera: plurima enim ex his sunt virtute inuicem longè diuersa. Siquidem nonnulla horum vehementiora sunt, alia moderatiora: quædam verò imbecilliora. Adde, quod & alia ulcera (ut diximus) magis, & alia minus dysepulota, & difficilia, malignaque sunt. Sed nec corpora omnia eius generis ulceribus scatentia, eiusdem prorsus (ut paulò antè dicebamus) naturæ ac dispositionis reperiuntur. Quare neque eadem omnino medicamenta desiderant. Itaque ad maligniora ulcera, & corpora duriora ac robustiora, valentioribus utendum erit remediis: ad mediocria verò, & molliores ac delicatiora corporum habitus, imbecillioribus. Merito igitur (ut initio quarti libri de compositione medic. *natà yvri* scribit Galenus) omnes, qui vnum duntaxat medicamentum ulceribus malignis cicatricem inducere promittentes habent, successu crebro frustrantur. Nam duo (minimum) quæ idem pollicentur, eandemque facultatem ostendunt, diuersa alioquin inter se non simpliciter maioris minorisque, verum (ut inquit ille) maximi ac minimi ratione, in promptum adesse illi conuenit, qui omnia id genus vitia curare proposuerit. Nos itaque deinceps pharmaca, primum quidem simplicia, deinde composita recensēbimus, ac etiam seriatim enumerauimus, quæ ulcera (de quibus nobis hîc sermo est) citra demorsum, & manifestam exas-

Ordo dicendorum.

sperat

- sperationem exiccare possunt. Cæterum cum variè (vt iam sæpius dictum est) inter se differant, in eo quòd magis minusve siccent, expressam eorum mentionem faciemus, quæ valide ac vehementer, quæ moderate, & quæ obscurius seu imbecillius exiccent: à metallicis, Galenum secuti, incipientes: quibus etiam terræ species adnumerantur. Siccant igitur modicè lemnia sphragis, siue lemnium sigillum, ita quidem cognominatum ob impressam illi sphragida, hoc est, sigillum Dianæ sacrum: nos & terram sigillatam eam vocamus. Et cadmia, quam climiam & cathiniam nuncupant. Hæc autem pluribus deinceps diebus sub canis feruore ex aceto trita, aut vino planè giluo, & substantia pellucido, facultatem acquirit magis siccantem. Quòd si ex acri aceto teratur, siccataque reponatur, vlceribus valdè etiam magnis, Galeno & Aëtio commode inspergitur. Valentius cadmia & lemnio sigillo, hoc est, terra sigillata, pharmacum est chalcidis (quæ species est vitreoli, apud Arabes colcotar, chalcadis, & zegi nuncupata) combusta, in cadmiæque morem trita, atque in puluerem redacta, & postea exiccata. Nam cruda, hoc est, ignem non experta, tanta pollet efficacia, vt iam crustas inducat. Lota quàm vsta minus desiccet, minusque mordax reperitur. Persimile quoque medicamentum est ærugo cremata, quæ & æris ærugo etiam dicitur, & vulgò hodie ab omnibus viride æris. Non combusta autem nimis efficax medicamen est, sicuti & chalcitis, quæ ignem non experta est. Verùm hæc (chalcitis inquam) non nihil etià adstringit, & ea multò magis adhuc chalcantum, id est, atramentum sutorium, quod inter metalla maximè siccatur.
- Misy autem & fori chalcitidi genere cognata sunt, ex vna, vt ita cum Galeno dicam, radice producta. Itaque tria hæc (quæ sub vitreoli genere comprehenduntur) maioris tantum, & minoris ratione differunt. Stibi siue stibium, quod Græcis *στίβιον*, vulgò autem in officinis antimonium dicitur, magis quàm fori desiccet, & adstringit. Porro diphryges appellatum pharmacum, vlceribus ægrè humiditatis vitio ad cicatricem venientibus aptissimum est. Validè enim desiccet, tametsi modicè mordax sit. Adhæc præter acrem tum qualitatem, tum potentiam, vim habet adstrictoriam: quas tamen vtrasque fortiores,

*Moderatè
siccantia sim-
plicia.*

*Lemmium
sigillum.
Cadmia.*

Chalcitis.

Ærugo.

Chalcantū.

Mysi.

Sori.

Stibi vel stibium, vulgò antimonium.

Diphryges.

Alumen. & chalcitis cruda, & chalcantum, id est atramentum sutorium, repræsentat. Omne quoque aluminis genus vlcera exquisitè desiccant, & generosè adstringit. Vnde nemo (inquit Galenus) solis his ad vlcera vitur, sicut nec cruda chalcitide, & ærugine: vsta verò & hæc, & mysi utilia sunt; vt elota morsum quidem remittunt, verùm minùs siccant.

Erosio metallicis per combustio- nem edo- matur. Illud enim metallicis omnibus commune est, quod combustis clotisque erosio, quæ prius adfuit, edomatur, ac interit. Quamobrem his sic crematis & lotis vti quidem licebit in pueris, eunuchis, mulieribusque, præsertim 10 candidis, imò etiam & viris, qui cute alba visuntur, & molli carne natura sunt præditi. Item in eis, qui ad sentiendum habiles admodum sunt, & plethora, vitiosoque succo laborant. Talium enim corpora faciliè ex morsu, seu rosione phlegmonem accersunt. Itaque cum permulta cor 15 pora, quibus mederi cogimur, vnâ quandam dispositionem habeant, qua vehementem commorsum ferendo non

Tutius est lotis metallicis, quàm non lotis vti. sunt, tutius est lotis, quàm non lotis vti. Cæterùm alia, præter hæc metallica superius commemorata, plurima adhuc simplicia sunt pharmaca, quæ malignis vlceribus curandis sunt idonea. Sarcocolla nanque, & ichthyocolla, id est, glutem piscium, & his magis adhuc chrysocolla, quam auri glutinum appellant, tali facultate prædita sunt. 20

Sarcocolla. Huc etiam optimè faciunt, plumbum combustum, plumbique recrementum, quod *σκιάν μολύβδου* Græci vocant, 25

Ichthyocol- la. & vulgus cacaturam: siccant & ferri squamma, præsertim stomomatis, id est, partis ipsius squammæ subtilioris, hæc enim probè siccant. Porro æris squamma, ex malleorum percussione decussa, quæ Græcè *ἀπὲς χαλκῶς*, vulgò au-

Chrysocol- la. tem batitura æris dicitur, præter quòd siccant, etiam abster-

Plumbum combustum. git, purgâtque Galeno & Aëtio, vnde pura quoque vlcera efficit, quod reliquæ squammæ præstare non possunt. Ita-

Scoria plumbi. que si hæc omnia medicamenta arida vlceribus malignis ac contumacibus insperferis, mirificè (inquit Galenus) vi-

Squamma ferri. debis citra erosionem ea desiccari, sicut vbi buccinorum, 35

Squamma æris. purpurarumque, ostreorum [sepiarum] aliorumque id genus ostracordermorum piscium testas concrematas, &

Ostracoder- morum testa cōcremate. (vt addidit Aëtius) lotas adhibueris. Vitrum combustum leuiter ac sine morsu exiccat, hinc dysepuloris, id est, cic-

*Vitrum combustum.*atricem difficulter admittentibus, non item malignis, ac rebellibus

- rebellibus conducit: quippe minus exiccat, quàm illa re- *Galla om-*
 quirunt. Cæterùm galla omphacitis, hoc est, immatura: & *phacitis.*
 malicoria, id est, mali Punici corticis seu putamina, crema- *Malico-*
 ta, & arida apposita, ad malefica & quæ malè coalescunt *rium.*
 5 vlcera, efficacissimum medicamentum deprehenditur.
 Hæc enim non solùm siccandi, sed etiam adstringendi po- *Cortex cap-*
 testatem habent. Cortex etiam capparis tritus, & aridus *paris.*
 malefico & putrido vlceri vtilissimè imponitur Aëtio. *Affatim*
 Malum terræ, quod Græci aristolochiam appellant, iris, *exiccatis.*
 10 acorum, arthemisia, panacis radix, argemone, chamæleontis
 nigri radix, cyperum, dracunculus, & gladiolus affatim
 exiccant Galeno. His euidentius adhuc centaurium, & *Terra ere-*
 polium: quibus paulò imbecillior est terra nomine ere- *triam.*
 15 cambil nominatur. Talis sanè medicamentorum simpli- *Cambil.*
 cium, ad dysepulota vlcera, maligna ac contumacia, ma-
 teries existit, quibus & humorum fluxionem intercipere,
 & locum vlceratam valenter, citra demorsum tamen at-
 que erosionem, exiccare possis. Quomodo autem simplici-
 20 buseiusmodi medicamentis siccis modò commemoratis,
 in vlceribus ad cicatricem ægrè venientibus, & malignis
 vtendum sit, ex Galeno & Aëtio requirendum est. Por-
 rò ex his suprâ memoratis simplicibus pharmacis. Gale-
 nus libro quarto de compositione medicamentorum se-
 25 cundum genera, varia remediorum formulas, nempe ce-
 rata, vnguenta emplastra, & pulueres conficit, quæ ad eiu-
 modi maligna, & ægrè ad cicatricem venientia vlcera, mi-
 re proficiunt. Ex cuius quidem scriptis Auicenna formu-
 lam vnâ medicamenti desumpsit, quàm magnopere *Vnguentū*
 30 Guido à Cauliaco, & illius ætatis chirurgi celebrarunt. *Auicē. lōgē*
 Recipit autem cadmiæ, aluminis, chrysocollæ, id est, glu- *optimum.*
 tini auri, singulorum partes octo, floris æris, qui sponre ex
 ære profilit, & corticis æris, hoc est, æruginis, quæ in offi- *Serugo,*
 cinis yride æris nominatur, & Græcis *ἰνὺς ῥύον*, vstorum *vel æris æ-*
 35 ana partem vnâ, gummi cupressi, partes quatuor, ceræ, *rugo, est vi-*
 olei rosacei, aut myrtini ana quantum satis esse videbitur, *ride æris.*
 fiat vnguentum. Cæterùm, cùm vnum omnibus medica-
 mentum (vt frequenter dictum est) commodè adaptari
 non possit, tutiorque sit leniorum pharmacorum vsus,
 mordaciorum verò periculosior, composita medicamenta

Lib. 4. de
imp. med.
α/α γιν.

distinētē hoc loco describam, quæ ad dysepulota, id est, cicatricem difficulter recipientia, inueterata, contumacia, maligna, & chironia vlcera, ex Galeni sententia bene faciunt, primūque mitiora ac moderatiora referam: deinde validiora, ac potentiora subiiciam.

Andromachi emplastrum ad vlcera dysepulota, id est, ægrè ad cicatricem venientia, sed nondum maligna, quod probatur Galeno.

Diphrygis denarium pondo quatuordecim, argenti spumæ, denarium pondo quadraginta, ceræ denarium pondo quinquaginta trium, olei myrtei pondo vncias decem.

Aliud eiusdem generis mitissimum & lenissimum.

Eloti pumbi denariū pondo duū, spodij denariū pondo quatuor, cadmiæ tātundem, diphrygis denarij pondo vnius. Ea omnia excipiat terebinthinæ denarij sex.

Aliud cicatricem obducens, imbecillius autem, quam vt cacothe persanet.

Compositio hæc capit, molybdenæ, id est, plumbaginis, drachmas quinque & viginti, diphrygis drachmas quatuor, sorios [aut vitreoli] drachmas duas & semissem, misyos tosti drachmas duas, terebinthinæ drachmas nouem, ceræ & myrtei vtriusque drachmas decem. Porro in omnibus eius notæ pharmacis, illa quæ liquari possunt, liquefacta & refrigerata, deinde rasa siccis diligenter in puluerem reductis admisceto. Nam si liquida ipsis affundas, sæpe fient grumi ceræ modo maximè cum frigus fuerit. In sole feruenti si mistura fiat, licet ea superfundere: mouendo vehementer rudicula primū, deinde cochleari. Præstat autem in hisce omnibus (inquit Galenus) rudiculam palmæ esse ramiusculum.

Aliud medicamen epuloticum, id est, cicatricem ducens, optimum quod διὰ λανθάνει, id est, ex ladano inscribitur, ad Critonem relatum, callosis, veteribus, & curatu difficilibus vlceribus apprime idoneum.

Picis aridæ denarium pondo viginti quinque, æuginis rasæ denarium pondo octo, æris combusti denarium pondo quinque, squammæ rubræ denarium pondo octo, ladani vncias tres, vini optimi sextarium semis, quod capit vncias duodecim Oribasio. Conuenit etiam

hoc

hoc medicamentum prætumidis vlceribus & cauis. Deligatum verò membrum in diem quartum continendum est. Argenti spumam & oleum coquito, donec aliquam spissitudinem accipiant: deinde squammâ æris, æruginem dum confluerint, vt colorem bonum acquirant, mox picem adiicito. Posteaquam refrigeratum fuerit, ladanum ex vino tritum: obseruans, ne ex hoc adiecto, efferuescat. Postremo supra moderatum ignem vnita cōfundito subigitóque.

10 *Mediocre medicamentum ad moderatè maligna vlcera idoneum.*

ACcipe æris combusti, & æruginis, vtriusque vnciam vnâ, aluminis scissi, vel scissilis (quod vulgò in officinis alumen de pluma appellatur) semunciam, ceræ vncias duas semis: hoc pharmacum temperatum est, & medium facultate. Porro minus mordebit medicamentum, leneq; prorsus efficietur, si loco aluminis scissilis diphrygem acceperis, & æruginem cōbustam apposueris. Quòd si expurgare sordes statueris, æris squammæ semuncia addetur. Hæc autem pingui cera & recenti excipienda sunt. Quòd si sicciior paulò fuerit, quàm vt commemorata excipiat, temperandum est oleum myrteum, quo mollescat, vel melinum, quod oleum de cydoniis appellant, vel ricininum, quòd vulgò in officinis oleum de cherua nominatur, vel omotribes vetus. Aut si omninò nihil oleosum medicamento adhibere placet, laricem resinam admisce-
to: cuius si copia non est, terebinthinam assumito.

Aliud validum medicamentum ad chironia vlcera, id est, non mediocriter, sed maximè maligna contumaciaque, ex Asclepiade.

30 **A**Eris squammæ, & æruginis rasæ vtriusque pondo vnciam, ceræ sēlibram, hoc est, vncias sex, resinæ laricis, vel si eius copia non est terebinthinæ, pondo vnc. & semissem. Ea quæ liquari possunt aridis affunduntur. Quibus acceptis, ac curiosè mollitis vitior. Item platysma (hoc
35 est, linteum latum, cui emplastrum illitum sit) exiguū soli affectæ parti, vt vlcus tantum comprehendat iniicito. Cæterum ambientes particulas, pharmaco quod phlegmoné arceat, circumdare oportet, atque inter curandum tertio quoque die soluere expedit, deinde fomentis mitigare, ipsūque

Platysma.

ipsūque emplastrum, quod à latitudine platysma vocatur, ablucendo emollire, ac rursus (vt iam suprà diximus) imponere, donec cicatricem inducere incipiat. Porro mediam, ac (vt Gale. ait) symmetram habebit temperiem, vt etiam modicè maligna curet, si non tripla, vt in præcedenti descriptione sed quadrupla ceræ portio metallicis, squammæ scilicet & ærugini, commixta fuerit. Sed moderatius adhuc extiterit, si quincupla adiciatur, vt nondum cacoëthe, sed ægrè cicatricem ducentia perfanet. Itaq; cum auxilium ad aliquid spectet, ac mollius pharmacum ad moderatiora cacoëthe, id est, malefica, magis quàm vehementius conducatur, satius fuerit in vlceribus non ita malignis & cōtumacibus ceram quadruplam, vel quincuplum amborum simul metallicorū esse, vt rectè Galenus admonuit.

Aliud Pharmacum vehemens & mitigatorium ad cacoëthe, Andromachi. 15

CERÆ tyrrenicæ (vel eius loco pinguis & recentis, optimæ) drach. octo, seu i taurini, terebinthinæ, plumbi vsti, singulorum drachmas quatuor, linamentis excepto vititor. 20

Ad desperata vlcera, quorum scilicet curationem plerique aggressi, non absoluerunt, sed tanquam ab insanabilibus destitute, emplastrum admirandum, cui (autore Galeno) cum propter alia, tum quoniam longo experimēto probatum est, multum confidere oporteat. 25

*In codice
Grac. Ga.
& Aëtij
hæc pēdera
reperiūtur.*

*Hemina,
Gracis co-
style dicta,
cōtinet olei
unc. 9. vini
10. mellis
13. Oleum, &
adeps anno
rum 40.*

SORIOS [cuius loco vitriolum sumi potest] drach. viginti quatuor, aluminis scissilis [quod vulgo alumē de pluma nominant] calcis viuæ, malicorij [id est, corticis mali granati] singulorum drachmas sexdecim, thuris, gallarū immaturarum, vtriusque drachmas vigintiduas, ceræ drachmas centum viginti, seu i vitulini, vel si eius copia nō sit, veteris suilli, quam axungiam vocant, drachmas centum sexaginta, olei veteris heminam, hoc est, uncias nouem. (Aëtius assumit olei antiqui libram vnam.) Arida trita, & tenuissimo cribro excussa, denuo simul terito. Quæ dein- 35
de, his quæ liquari oportet, liquatis, & ab igne remotis, permisceto. Cūque omnia probè vnita fuerint, alumen, thus, fori, calcem, singula prius è vino adstringenti trita adicito, & vititor. Dum Galenus medicamentum hoc cōficeret, oleum & adipem quadraginta annorum adiciebat, 2

bat, atque ita semper diuturna vlcera, præter modum maligna ac deplorata, opinione melius sanauit. Eius autem generis sunt ea, à quibus pars affecta in tam vitiosum, ac deprauatum habitum ducitur: vt sanguinem probè etiam
 5 coctum, qui ad eam nutriendi causa defertur, mutet corrumpatque, vel id quod influit, adeò cacochymum existit; vt etiam si pars nihil passa fuerit, ab illo certe ipso solo erodatur. Hoc itaque medicamento quod noxiū est transmuratur: atque discutitur. Satius autem fuerit cacochymiam prius conuenienti medicamento expurgare, deinde
 10 (vt suprà monuimus) vlceris curationem aggredi.

Aliud Galeni, ad chironia vlcera in mollibus corporibus.

15 **C**ERÆ libram vnam, cerussæ vncias octo, rosacei libram vnam salis ammoniaci vncias quatuor, squammæ æris vncias duas, thuris, aluminis, æruginis, malicorij, calcis viuæ, singulorum vnciam vnam: quæ liquari debent, liquata, & frigefacta, aridis è vino tritis admisceto, atque placidiori igne decoquito. Ceterum innumeræ propemodum
 20 aliæ formulæ compositorum medicamentorum ex veterum scriptis à Galeno libro quarto de compositione medicamentorum secundum genera referuntur, quæ ad dyssepulota, cacoëthe, inueterata & chironia vlcera persananda apprimè idonea sunt. Ex illo igitur libro, veluti è
 25 sylua quadam remediorum rationalis quisque medicus, & qui methodum ab eo illic traditam artificiosè didicerit, idoneam vlceri, quod curandum suscepit, remedij formulam sibi deligere poterit, atque hac solus vti sciet. Porro nonnullas, easdèmq; ex ipsis præcipuas, exempli gratia
 30 hoc loco adscripsimus, quo magis lectori ad manum essent, & in particularibus, non vniuersalibus folijs contentus, exerceretur. Sed iam tempus est, quartam curandorum vlcerum in vniuersum intentionem persequamur.

Quarta igitur intètio curandorū vlcerum cum aliis dispositionibus complicatorum, quæ ablata, & (vt loquuntur) rectificata dispositione agglutinationi seu consolidationi repugnante, loci vlcerati curationem nos aggredi debere suadet, iisdem omnino intètionibus & modis perficitur, qui suprà dicti sunt in curatione vulnerum concauorum, in quibus substantiæ aliqua deperditio facta est.

Proinde

Quarta intentione curandorum vlcerum.

Proinde methodus ac curandi ratio: quæ illic à nobis tradita est, in memoriam reuocanda erit. Itaq; cum tanta sit curationis vlcera, cum vulnere atque etià apostematum curatione communitas ac conuenientia, nil mirum, si Galenus multis locis eorum tractationem ac doctrinam commiscuerit. Ceterum his ita ad vmbilicū deductis tempestiuum est, de propriis ac (vt dicūt) famosis vlcera differentiis pertractemus, inter quas primum se offert vlcus, quod virulentum & corrosiuum appellant.

De proprijs ac (vt loquuntur) magni famosis vlcera differtentijs, & primò de vlcere virulento, & corrosiuo, quod Græci momodes, id est, exedens appellatur.

C A P.

X V.



Vid sit vlcus virulentum seu saniosum & vlcus corrosiuum, siue arrodens, quid item ambulatiuum, & depascens siue māducans, quod Græci *μωμης* appellant, & quomodo hæc iniuriam dissideant, in definitionibus differentiarum vlcera abundè est explicatum. Excitantur autem eiusmodi vlcera à prauis humoribus, sed præsertim biliosis acris, & mordacibus, qui propter adustionem, cacoethiam quandam hoc est, malignitatem acquirunt. Atque hæc magna ex parte oriūtur post herpetas, & prurientes pustulas, quas acris, & biliosus humor excitauit, atque etiam post vulnera, quæ mordacibus medicamen-

Causa.

Curatio vltis, exedens

tis, exacerbata atque irritata fuere. Cæterum vt ad perfectam sanationem perducantur eiusmodi vlcera, tripliciter egent auxiliorum genere, sicuti & plæraque alia, nempe victus ratione proba, & conuenienti purgatione, quæ succo prauo, acris, & erosionem in affecta particula exci-

Hypothesis, ex li. 4. the.

tanti sit accommoda, & localibus remedijs. Age igitur, esto aliquis, qui sanus quidem sit, hoc est, omnia naturæ munia inculpate exerceat: sed ex scabèda derepentè quapiam particula, veluti brachio, pustulam statim excitauit, mox eadem ipsa particula iterum atque iterum pruritu vexetur, pustulæque dirupta vlcus decolor, & inæqualiter erosum gignatur, atque hæc in tribus quatuorve diebus à principio inciderint. Hac itaq; hypothesi posita, dicat mihi hoc loco quispiā: quonam pacto sanare huiusmodi vlcus conueniat? Certè vt eius curationem feliciter assequaris,

- ris, imprimis qualis sit totius corporis tali vlcere laborantis affectus, statim tibi erit cōsiderandum. Inuenies nāque tum ex vlceris ipsius symptomatis, id est, accidētibus, tum ex notis quas totū corpus præ se feret, cuius maximè generis sit is qui redūdat succus. Atq; hunc (si Gale. consiliū sectionis) idoneo purgante medicamento protinus educes, nec protrahes, dum totus hominis cubitus affectū quendā contumacē rebellēmq; curationi cōtrahat, quemadmodū facere solebant Thessali sectatores, ipsius videlicet præcepta mordicus obseruantes. Præcipitur nanque ab omnibus ferè (inquit Galenus) antiquis medicis, quicunque ratione quadam ac methodo de vlcere curatione scripserunt, causas quæ illa creant abscindendas esse, æquè profecto vt cæterorum omnium morborum. Itaque hoc tibi tanquam commune præceptum esto, omnino in omnibus morbis nedum vlcere, in quibus effectrix causa adhuc manet, ab hac inchoandam curationem esse. Hinc rectè mōnebat Galenus libro decimotertio methodi medendi, digerentia, hoc est, resolutia, seu discutientia medicinali, nequaquam particulis quibusdam applicanda esse, vbi redundantia in toto corpore aut superiacente particula subest. Quippe quòd hæc sic admota implerent potius quàm educerent. Itaque tunc à totius corporis, aut superabundantiæ mittentis particulæ superiacentis vacuatione incipienda curatio est. Deinde euaporante auxilio vtēdum. Facta igitur totius corporis, vt decet vacuatione (vt factum quondā fuit in Romana quadam illustri muliere, quæ herpetem esthiomenum, id est, exedentem, in malleolo primum habebat, qui tandem ad bubones vsq; ascenderat) ad curationem particularis affectus, hoc est, ipsius vlceris arrodentis deueniendum erit. Ergo si particulam exulceratam atque arrosam, supra modum calefactam videris, ipsam statim frigidis, stypticis, desiccantibus refrigerabis. Commodè autem feceris, si vlcus ipsum, & particulam totam vlceratā aqua aluminosa ablueris: hæc enim ablutio magno vsui talibus vlcere esse solet. Quippe quæ influentes humores potenter repellat, & siccandi facultatem obtineat, vt autor est Auicennas. Poteris etiam affectum locum irrigare, vel aqua plantaginis & rosarum, vel aqua in qua ferrum candens extinctum

A purgatione incipienda curatio.

Li. 4. ther.

Cōmune de digerentib. præceptū.

Particularis curatio vlcere arrodentis.

Aqua aluminosa vi.

Repellentia, et siccantia.

*Bolus ar-
menia.*

*Pulvis ex-
siccatorius.*

*Horū vn-
guentorum
formule &
compositio-
nes li. de-
scribuntur.*

*Nota de
plumbea
lamina.*

*Deligatu-
ra duplex.*

tinctum fuerit, aut etiam decocto cyperi, myrobalano-
rum, cupressi, plantaginis, malicorij, balaustij, quod flos
est mali Punici sylvestris, & consimilium. Vt autem ab in-
gruentibus defluxionibus, vlcerata particula vindicerur,
optimum fuerit, circumiacentes partes vnguento ex bolo
Armenia illinere. In medio verò vlceris, pulvis aliquis, qui
vim desiccandi habeat apponendus erit, vt ex lithargyro,
plumbo vsto, pompholyge, quæ vulgò tutia dicitur,
antimonio, quod stimmi & stibium Græcè dicitur, ære
combusto, corallio, lapide hæmatite, spodio lotis. At-
que etiam psidiis, id est, corticibus mali granati, myroba-
lanis, & id genus aliis. Item pannorum lacinia in lina-
menta formata, splenia Græci vocant, vnguento albo
Rhasis illita, aut vnguento quod sextam partem lithar-
gyri recipiat, in quo omnes consentiunt, vel vnguento,
quod diapompholygos nuncupatur, supra vlcus ipsum
dandæ sunt. Cæterum supra eiusmodi pulueres, ac lina-
mēta vlceri imposita, puluillus, seu puluinus aliquis, quæ
plumaceolum vocant posca aquosa imbutus adhibendus
erit: deinde conueniens deligatura, quam exprimentem
nominant, cuius supra in tractatu de vulneribus memini-
mus. Guido à Cauliaco in talibus vlceribus solebat post
lotionem nullo alio adhibito auxilio apponere laminam
plumbi tenuem perforatam, in qua virtus argenti viui,
cum aqua plantaginis erat infixæ, & ligare ligatura expri-
mente, quod non est (inquit) fas loqui propter idiotas. Ita-
que tria hæc molybdos, id est, plumbum, aqua aluminosa,
& deligatura decenter facta, miram ac fortè incredibilem
vim habent, in sanandis eiusmodi vlceribus. Porro deliga-
turam talem esse conueniet, quæ ad vsum magis, quàm ad
elegantem formam conducat: hæc autem duobus modis
fit, nempe vel vnico vinculo seu fascia vna, vel duabus. Ita-
que si vna tantum fascia fuerit, principio eius versus su-
periores vlceris partem statuto necessaria erit siue sura,
siue genu, siue malleolus siue cubitus, siue manus summa,
aut alia quæuis pars laborauerit. At si duabus fasciis uti
malueris, quemadmodum in fracturis fieri solet, altera à
parte affecta, hoc est, ab ipso vlcere, ad superiorem regio-
nem feretur, altera deorsum prius ducetur, mox in supe-
riore parte designet, eo videlicet loco quo prior incepit.
Cæterum

Cæterum præter reliqua commoda, quæ ex hac deligatione proueniunt, illud etiam accedet, quòd vlcera quæ ob rotunditatem coalescere nequeunt, oblonga reddentur. Solutio autem non singulis diebus, sed alternis facienda est. Neque in solutione vlcus aqua inspergendum, sed molli linteolo, puro, & sicco sanies detergenda. Quòd si partes vlceri adiacentes inflammari videantur, & iam phlegmonòdes quippiam repræsentent, platysmati exterius plurimo spatio liquidum medicamentum illinere oportet, quale est Galeni phœnicinum, hoc est, è palmulis confectum, vel aliquod simile, non quidem quocunque contigerit dilutum, sed vino adstringente, quantum imbibi poterit. Sitq; oleum quod adicitur refrigerans, & adstringens, cuiusmodi sunt myrteum, & melinum. Quòd si hæc nõ adsint, omphacinum, & omotribes nominatum adhibebis. At si durities circa partes vlceri adiacentes apparuerit, ipsum phœnicinum, seu emplastrum è palmulis, oleo veteri, aut ricinino (quod officinæ oleum de cherua nominant) diluendum est. Tutiusq; fuerit superpositæ regioni, quodpiam ex medicamentis repellentibus liquidis adhibere, quo si quid vel prauum, vel plusquam par est, influat, regeratur. Atque id maxime, cum in crure vlcus obortum superpositam venam varicosam habeat. Quæ dum magna est, ac sanguinem nec colore rubrum, nec probum, sed atrio-rem & melancholicum continere videtur, excidenda, vt prius diximus, auferendaq; est. Cæterum si vlcera eiusmodi admota medicamenta contemnant, indiesque magis atque magis erosio serpat, & augeatur, corpus subinde à vitiosis succis repurgandum erit, continensq; ipsa seu (vt vocant) coniuncta materia depascens atq; arrodens, inuisione, seu cauterio (vt loquuntur) actuali absumenda & desiccanda veniet, nõdò laborans id genus auxilij tutum, atque vtile, cæterisq; aliis longè præstantius, non reformidet, ac renuat. Quòd si ferrum candens ob timiditatem, aut delicatam, nimis naturam pati, atque admittere nõluerit, medicamenta acriora, & quæ ignis vires habeant admouebis, cuiusmodi sunt pastilli Andronis, Musæ, aut Pasionis, in tractatu de tumoribus præter naturam descripti, vel trochisci aphodelorum, aut qui calidicon nominantur quorum formulæ ac descriptiones libro sexto re-

*Deligatur
ra alternis
diebus sol-
uenda.*

*Si partes
adiacentes
inflammen-
tur.*

*Olea refri-
gerantia, &
adstringen-
tia.*

*Si durities
adsit.*

*Si erosio nõ
cedat medi-
camentis.*

Vitio.

*Pastilli
caustici.*

Arsenicū,

feruntur. His etiam atramētum scriptorium, quod & incaustum vocant, magna utilitate admoventur. Quod si hæc parum profecerint, arsenicum, quod sublimatum nominant, modica tamen (vt alibi dictum est) quantitate, tutò adhiberi potest. Locus autem ambiens, hoc est, circūpositæ vlceri partes, interim refrigerantibus perpetuò munien-
 dus erit, ne tam vehementibus admotis præsidiiis, fluxio irriteretur. Porro si ne his quidem tam potentibus auxiliis malum aliquando victum fuerit, nec erosio ipsa depascens quouis modo listi possit, membrū amputare necessarium
 10 est, vt voluit Auicennas.

De sordidi & putris vlceris curatione. CAP. XVI.



Vid sit vlcus sordidum, quod Græci rhypharon vocant, quid item putre, seu putrefactum vlcus dicatur, supra definiuimus. Porro sordi-
 15 dum, & putrefactum vlcus Guidoni dicitur, quod sui malitia (vt eius verbis vtat) putrefa-

*Vlcus sordi-
 dum & pu-
 tre.*

cit membrum, dimittendo viscositatem aut carnem mollem, siue (inquit) crustosam fœtidam, à qua fumus eleua-
 tur fœtidus, & cadauerosus. Ac tale quidem vlcus fraudu-
 20 lentum etiam appellant. Cæterum si eius malitia vlterius progrediatur, & serpat, in sphacelum (quem vulgus esthio-
 menum vocat) degenerat, & homini vitam adimit. Horum autem vlcerum causæ sunt, succi prauis, crassi, sanguinis naturam quodammodo respicientes, hoc est, sanguinei, 25
 qui feruore quodam velut ebulliētes, venenositatem, atq; malignitatem quandam indispiscuntur. Et hæc quidem magna ex parte carbunculos maleficos, siue anthracas, ab-

*Vlcus frau-
 dulentum.*

*Causæ vlc-
 erum putriū
 & sordido-
 rum.*

*Curatio ra-
 tio.*

scessus, & vulnera male curata, consequuntur. Porro tali-
 30 um vlcerum curatio consistit in proba victus obseruatio-
 ne, & euacuationibus accommodis, quibus corpus vniuer-
 sum ab excrementis, atque à natura alienis humoribus ex-
 purgetur. Vbi autem iam purum ab excrementitiis, atque à natura alienis humoribus corpus vniuersum tibi appa-
 35 ruerit, tum particula ipsa laborans, hoc est, vlcerata, cucur-
 bitulis, scarificationibus, hirudinibus, atque epithematis siue fotibus, à corruptis ac deprauatis succis ipsam occu-
 pantibus, vindicanda erit, vt rectè præcepit Auicennas. Post hæc verò propriam ipsius vlceris curationem aggredi-
 40 eris. Sordes igitur primò tibi abluenda erit, aut hydro-
 melire

*Sordes ablu-
 tio.*

melite quidem, aut marina aqua, vel si eius copia non est, *Vlceris mū*
 falsa. Deinde mundificandum vlcus, vnguento vulgò Apo *dificatio.*
 stolorum dicto, aut eo quod Aegyptiacum nominatur.
 Post hæc, quidam desuper adhuc dandum esse monent
 mundificatiuum aliud, ex absinthij succo, melle rosaceo,
 myrrha, & farina hordei compositum, & circumiacentes
 vlceri partes, vnguento ex bolo Armenia illinunt, ac supra
 cætera prædicta puluillos, ex stupis canabinis studiosè pe-
 xis, aut ex lineis pannis læuibus, pusca aquosa (quod oxy-
 0 cratum vocant) imbutos apponunt, atque alligant. Si ve- *Si sordes in*
 rò sordes in putredinem, aut corruptionem degeneret, lo- *putredinē*
 cus abluendus erit oxycrato, aut (vt voluit Guido) aqua *degeneret,*
 cineris, vel saponis. Deinde emplastrum ex carnibus pi-
 5 scium salforum, farina orobi, & aristolochia longa, non
 autem rotunda, & scilla, omnibus ex vino coctis, & cum
 melle mixtis, superaccommodandum est. Ad eandem in-
 tentionem Auicennas subsequens medicamentum descri-
 bit, multa (vt adfirmat) experientia comprobatum. Con-
 cipit tragacanthi rubri vnc. vnam, calcis viue, aluminis,
 10 corticis granatorum, ana drach. sex, thuris, gallarum, ana
 drach. quatuor, ceræ, & olei, ana quod fuerit satis. Aliud.
 Vitrioli partes duodecim, chalcitis (quod & colcotar Ara-
 bes appellant) partes decem, tragacanthi partes nouem,
 coquantur in aceto, & ex eis fiat linimentum. Ac semper
 25 quidem vnguentum ex bolo in ambitu vlceris, vt supra
 monuimus, apponito; desuper verò stupeos puluillos oxy-
 crato madefactos. Porro si vlcera eiusmodi depascentia pu-
 tridaq; eosque feritatis, & malitiæ deuenierint, vt partes
 adiacentes magis atque magis semper erodant, ac sine mo-
 30 do in illis corruptelam excitent, vehementissimis medica-
 mentis (qualia supra in curatione malignorum vlcerum
 recensuimus) indigebunt. Imò verò frequenter inustio-
 nes, atque etiam excisiones illis erunt necessariae, ita vt
 quicquid vitiatum, ac corruptum est, prorsus extirpetur,
 35 & viua, ac sana duntaxat caro relinquatur: quam ex na-
 tiuo ipsius colore, & sanguinis bonitate, facile deprehen-
 des. Inter cætera autem medicamenta acria, quæ viuum à
 corrupto separant, & in hoc affectu celebrari solent, om-
 nium præstantissimum atque efficacissimum quotidiano
 experimentoprehenditur arsenicum, quod sublimatum *Arsenicū*
sublimatū.

vocant, vt aliquoties alibi annotauimus. Hoc enim confestim malum sistit, & id quidem sine dolore. Quod si medicamentis eiusmodi malum non cesserit, membrum ipsum tali depascente ac putrido vlcere affectum, cogimur abscindere, vt cætera pars tuta sit. Id autem miserum atque vltimum auxilium, nunquam tentandum est, nisi dum cætera præsidia nihil proficiunt, & malo prorsus victa sunt, vt alibi adinuimus.

De profundo & cuniculoso vlcere, quod & sinus Latini dicitur.

CAP. XVII.

10

Vlcus cuniculoso.



Lcera cuniculosa, seu cauernosa supra appellauimus, quorum orificia stricta sunt, profunditas vero in latum se diffundit, & sensui occulta est, multos interdum anfractus habes, modò rectos, modò obliquos, citra duritiem

Fistula quid.

tamen & callum. Atque hoc vno à fistula dissidet, quamuis promiscua turba, eiusmodi vlcera omnia cuniculosa, fistulas nominent, cum tamen fistula propriè vlcus sit altum, angustum, & callosum, Galeno, Cel. Aët. & Paulo.

Sinus quid, & eius differentie multiplices.

Itaque quod profundum & cauernosum vlcus recentiores chirurgi appellant, id Latini appositè sinum, Græci κέλυκος nominant. Fit autem cum adiacens vlceribus cutis, diutius subiectis corporibus non coalescit, glutinaturque, cuius multæ ac variæ sunt differentie, nimirum ex cauernarum magnitudine, situ, figura, ac numero desumptæ.

Aut enim breues sunt, aut altè penetrantes, iuxta carnem desinentes, aut ad ossa, vel cartilaginem subeuntes, sursum, deorsum, vel ad latus tendentes, recti aut flexuosi, simplices ac duplices, triplicésve. Galenus autem eorum duntaxat, qui a positionis figura sumuntur, meminit: vt qui præcipuè curandi rationem immutent. Siue enim magnus, siue paruus aut breuis, vel altus, aut iuxta superficiem consistens, simplex vel duplex, tripléxve fuerit, eadem

Que sinu differentie curandi rationem euariant, & que non.

semper est eorum curandi ratio. At si vel sursum, vel deorsum, vel ad latus, vel intro ad ossa tendit, curationem variat. Cum enim sursum tendit, facile per eius os saniosa colluuius atque ipsum pus effluit. Cum verò deorsum vergit, intrus, retentum pus, aut sanies, contiguas partes erodit. Quare nisi factò ex aduerso (vt statim dicetur) emissio

rio

rio, nihil omnino profeceris, siue carnem generare, siue
 glutinare velis. Cum verò ad latus declinat, aut sursum
 vergit, aut intrò fertur, sed ita locari pars afflicta potest,
 vt liberè sanies, aut pus è sinu effluere possit, incisione ex
 5 aduerso facta opus non est, sed de his adhuc in sequenti- *Cause*
 bus. Cæterum causæ eiusmodi sinuum, seu cuniculoso- *num.*
 rum vlcerum, sunt abscessus, siue suppurantes affectus tar-
 dius disseci, & vulnera perperam curata. Pus namq; lon-
 go nimis spatio in suppurato abscessu, aut in profundo
 10 vulnere, quod non ritè expurgatur, retentum ac delite-
 scens malignitatem, & veluti acrem atq; erodentem quan-
 dam naturam acquirit, & cuniculos tandem molitur, qui
 difficilè admodum carne impleri, & glutinari quèunt. Ad
 affectam namq; particulam, quæ iam imbecillitate in con-
 15 traxit, vndiq; ex circûiacentibus ac vicinis partibus, imò
 verò & ab vniuerso corpore, superuacanei humores con-
 fluunt, atq; ita ægrè sanabile redditur vlcus. Differen- *Sinuum d*
 tiæ cuniculorum, seu cauernularum eiusmodi vlcerum, *ferètia*
 deprehenduntur turundis, (quas tentas vocant) & specil- *bus depi*
 20 lis, siue contis (quæ probæ vulgò dicuntur) argenteis, vel *hendat*
 plumbeis, aut alia consimili materia factis, in ipsos cuni-
 culos læuiter, ac blandè immisis. Item minutis quibusdā,
 atque exhibus radicibus, & cereis candelis, necnon & colo- *Iudicia*
 25 ratis quibusdā iniectionibus. Color verò materiæ, quæ
 ab ipsis cauernulis & sinubus egreditur, qualitātē eius ma-
 nifestè insinuat: si enim tenuis fuerit, & loturæ carnis perfi-
 milis appareat, calidā esse haud temerè, eā iudicabis. At si
 candida visitur & serosa, indubiè frigida erit. Sed & saniei
 purisve bonitas, & paucitas, doloris quoq; & tumoris, qui
 30 prius aderāt, priuatio, sinū carne impleri, & glutinari demō-
 strāt. Si verò cōtraria his adfuerint, glutinationē nequa-
 quā adhuc fieri nobis indicant: vt Galenus iis verbis nobis
 testatū reliquit libro secundo de ratione curandi, ad Glau-
 35 conem. An verò (inquit) altæ sinus partes coaluerint, ex
 manante sanie deprehendes, si ea multa vel pauca, cocta
 vel cruda sit. Præterea si neque in ipso sinu dolor sentia-
 tur, nec tumor appareat, sed totus locus æquabilis sit, sic-
 40 eus ac doloris expers. Quòd si puris probè cocti portio exi-
 gua in ore cōspicitur, multò magis de glutinādo sinu spe-
 45 randū est. Hactenus de sinuum differētiis, causis, & iudiciis

dicta sufficiant. Itaque tempestiuū est, eorū curationē aggre-
diamur, & qua poterimus breuitate, nūc prosequamur.

*Ratio curandi sinus, seu vlcis profundæ & cauerno-
si, non tamen adhuc callosi.*

*In curan-
do sinus, ge-
minum esse
scipum.*

CVM sinus, quo de hīc agimus, vlcus sit cauum, & pro-
fundum, geminus in eo curando scopus ac finis me-
denti proponitur, vnitio scilicet & repletio. Vlcus enim
quā vlcus est, vnitionem, cauitas verò impletionem deside-
rat. At quæ desident, vniri non possunt, nisi prius cauita-
tem (si cum vlcere, vt in sinu coniuncta sit) impleueri-
mus. Ordo igitur curationis postulat, vt à cauitatis imple-
tione ordiamur. Sed cauitas rursus carne impleri non po-
test, nisi laborans particula & iusto temperamento præ-
dita sit, & sinus ipse omninò purus, & ab omni sorde im-
munis extiterit. Itaque si vel phlegmone, vel erysipelas, 15
vel gangræna, vel intemperies aliqua simplex aut com-
posita, partem affectam obsederit, manifestum est, quòd
nisi quis illos affectus prius sanauerit, implere cauum vl-
cus non poterit. Fieri enim non potest (vt libro tertio me-
thodi medendi Galen. inquit) vt in vlcere vel carnis pro- 20
ductio, vel sinus impletio, vel agglutinatio, vel cicatri-
cis inductio, rectè vnquam cedat, nisi subiecta caro pro
naturali modo se habeat. Adhæc cum in ipsa nouæ car-
nis generatione, duplex prouenire excrementum necesse
sit, alterum quidem crassius, quod sordes propriè appel- 25
latur, alterum tenuius, quod Græcis *ixos*, nobis verò
sanies dicitur, ac ex tenui quidem hoc excremento, vl-
cus humidum reddatur, sicuti ex crasso sordidum, dupli-
cibus sanè medicamentis sinuosum vlcus egebit, ante-
quàm carne repleatur: nempe vt humidum est siccanti- 30
bus, vt sordidum expurgantibus seu detergentibus. Or-
do igitur sanationis à sorde expurganda in curando sinu
incipiet, quòd videlicet nec glutinari quicquàm, nec car-
ne impleri possit priusquàm purum, hoc est, detersum, &
à sordibus ritè expurgatum fuerit. Vbi verò iam ab omni 3
alio affectu immunis, & purus ab excrementis sinus fue-
rit, tum primùm agglutinantibus medicamentis uten-
dum erit. Hæc autem nec detergent, nec expurgant, vt
sarcotica, id est, carnem generantia, sed contra prorsus
(inquit Galenus) substantiam omnem in diem cogunt.

Cuiusmo

*In noua
carnis gene-
ratione du-
plex proue-
nire excre-
mentum.*

*Vlcus si-
nuosum du-
plicibus e-
get medica-
mentis.*

*Agglutinā-
tium facul-
tas.*

Cuiusmodi facultatem habent medicamenta ea, quæ austera & adstringentia vocantur. Hæc enim siccant tantisper, dum humoris redundantiam qui secundum naturam est, absumant. Sed de iis alibi fusius à nobis dictum est.

- 5 Pone ergo in eadem particula sinu occupata, intemperiem aliquam, vel phlegmonem, aut consimilem affectum, & cauitatem, & vlcus, & sordem simul consistere, ordo curationis expostulat, vt primùm phlegmonem aut intemperiem, secundo loco sordem, tertio cauitatem, & quarto vlcus perfrangas. Si quidem iusta subiectæ carnis temperies, causæ rationem habet, vt quæ concrefcere secum quod vlcerat est, faciat; & cauitatem impleat. Puritas vlcus, rationem eius sine quo non. Atque hanc sordes interpellans, curationem moratur. Habet verò & ipsa cauitas, ad vlcus, rationem eius sine quo non, vt libro tertio Therapeutices Galen. annotauit. Quando inquit) nisi cauitas prius impleta sit, induci cicatrice vlcus non possit. Atque hæc in vniuersum dicta sint de ratione curandi sinus, quod & vlcus profundum, & cauernosum nostri chirurgi appellant. Cui magna ex parte complicari solent, quæ supra commemorauimus. Hac igitur vniuersali methodo præmissa, particularium ipsorum sinuum differentiarum (quas curandi rationem variare diximus) sanationem subiungamus. Constituatur igitur imprimis sinus ad superiorem partem porrectus, ita vt eius orificium deorsum spectet, talis certè non adeò multum negotij in sanando fa-
- 25 cesset. Quandoquidem per os eius facilè sanies effluet, atque ideo prompte conglutinabitur, adhibitis saltem iis, quæ statim dicentur auxiliis. Sed neque cum ad latus declinat, aut intrò fertur, aut etiam deorsum vergit, incisione ex aduerso facta opus erit, si pars ipsa afflictæ ita locari possit vt libere sanies è sinu emanare queat. Itaque ponatur sinus, artus aliquos, nempe cubitum, aut femur occupare, poterit utique decliuus figuratus, citra diuisionem ex
- 35 aduerso factam coalescere. Etenim in cubito cum oræ gibbero vicinæ sunt, summam manum elatius protendens, sinum ad effluxionem incitabis. Sic & in femore, si sinus deorsum vergat, & ad genu terminetur, os autem ipsius sublime supra femoris medium sit, popliti mollem puluinum subiicies, quod demissius inguen quàm genu

Hypothesis.

Si sinus orificium deorsum spectet.

Inciso ex aduerso, quando in sinu fieri debeat, & quando nō.
Ex Paul.
Ex Gal.
2. ad Gl.

positum sit. Cæterum si sinus deorsum vergat, aut ad la-
tus declinet, vel intro feratur, & situm affectæ parti com-
modum dare non possis, quò liberè sanies effluat, nihil
vnquam promouebis, siue carnem generare, siue glutina-
re velis, nisi prius collectioni purulentæ effluxum molitus
fueris. Intus enim retenta sanies contiguas partes ero-
det. Porro saniosæ illi colluuiæ effluxum bifariam mo-

*Bifariam
effluxu mo-
liri posse sa-
niet, aut pu-
ri, in sinu.*

liri poteris. Nempe vel factò, tantum in imo sinus, vulne-
re, vel tota cavitare dissecta. In imo, seu radice sinus fit se-
ctio, si vlcus magnum fuerit, & locus totus sine periculo
secari non possit. Præstiterit autem semper, si nihil obli-
terit, totam ipsius sinus cavitatem dissecare, quàm ex ad-
uerso plagam facere. Ita enim facilius, ac citius multò, ad
sanitatem vlcus perducetur. Tota igitur cavitare dissecta,
ellyphniis, & pannorum laciniis in linamenta formatis,
congruique medicamentis sic expurgandus, atque relin-
candus erit sinus, vt tandem caro regignatur, cavitatis im-
pleatur, & ad perfectam sanationem, modo quo suprà de

*Quod mul-
ta puris co-
pia sinèda
est colligi in
fundo sinus
priusquam
ex aduerso
diuidatur.*

altis, & cauis vulneribus docuimus, perducatur. Cæte-
rum priusquam ex aduersa parte diuisio fiat, purulenta col-
luuiæ sinenda est, magna satis copia in fundo ipsius sinus
colligi, quo sinus parietes magis attenuentur, atque ita me-
lius specillum (suprà quod sectio fieri debet) in cavitatem
demittatur, sinu scilicet ex puris copia distento, & amplio-
re factò. Specillum autem ipsum quod sic in sinum immit-
titur, læue, hoc est, minime asperum esse debet, ac vnctuo-
so aliquo (vt citra dolorem immitti possit) illitum. Adhæc
parte posteriore perforatum esse decet in modum acus, vt
in eo imponi possit cæto aliquis (vt vocant) ex stupis ca-
nabinis, aut aliqua gracili fascia, aut certe funiculo quo-
piam molli, vt canabino factus. Incisione autem facta,
dolor qui per eam excitatus est, sedandus erit, & impe-
rus profluentis sanguinis, oui candido, atque aliis id ge-
nus suppressendæ sanguinis profusioni dicatis auxiliis,
compefcendus. Post hæc autem cæto alius, quando opus

*Specillum
quod in si-
num immitt-
itur, qua-
le esse de-
beat.*

erit, detergente aliquo medicamento imbutus, inden-
dus erit, atque vt id commodius fiat, alteri, qui sinum
adhuc occupat, aut assuetur, aut alligabitur. Poterunt
& ellyphnia, seu linamenta inmundificatio aliquo tincta,
in sinum ipsum imponi, superque, atque in ambitu dan-
da

*Sineq; aper-
tio in imo,
neque can-*

- da sunt, quæ mox infrà dicemus. Porro si neque in imo *tas tota dis-*
 ipsius sinuosi vlceris, plaga commode fieri possit, neque *secari pos-*
 cavitata tota diffecari, sinus totus eluendus erit collutio- *si.*
 nibus, primum quidem deterforiis, si inhærentem sa- *Sinus qui-*
 5 niem subesse suspicaris: deinde sarcoticis, id est, carnem *bis liquori-*
 generantibus: postea verò ad glutinans medicamentum *bis ablue-*
 transeundum erit. Proinde Galenus libro secundo de ra- *das.*
 tione curandi ad Glauconem, sinum ipsum nunc meli-
 crato solo, id est, mulsa, nunc quidem puro vino, nunc
 10 verò mulso eluendum esse monet. Itaque ad detergen-
 dam, expurgandamque sinui inhærentem saniem, meli-
 cratum præferendum est. Sed præsertim in sinu cuius os *Melicratū.*
 deorsum spectat, per quod sanies libere effluat. Huius nan-
 que sinus profunditatem totam, ad glutinationem aptam
 15 (vt Galenus inquit) sola reddere potest iniecta mulsa. Ad
 purgandum verò simul & roborandum, vbi scilicet adhuc
 aliqua levis cuiusdam sordis derelictæ suspitio est, vel ipso
 etiam Aëtio autore mulsum eligimus. At vbi carnem iam *Mulsum.*
 in sinu mediocriter regenitam, omnino puram esse conie-
 20 cerimus, & glutinationem quærimus, vino puro subad-
 stringente sinum ipsum eluimus. Vinum enim eiusmodi,
 quod medium est inter dulce & adstringens, leuiter gluti-
 nat. Si autem cruētus foetidusque sit humor, qui è sinu ex-
 cernitur, oxymeli (Aëtio autore) cæteris præstat. Aui-
 25 cennas & quidam alij sinum præsertim maligniorem, &
 vehementer sordidum detergent, & eluunt, aut lixiuio, aut
 marina aqua, aut etiam aluminosa, quæ in hoc affectu præ-
 stantissima est. Hæc enim præterquam quod potenter for-
 des abluit, à parte quoque affecta fluxionem arcet, & re-
 30 pellit. Albucasis chirurgus insignis vnguētum Aegyptia-
 cum, cum aqua & melle liquatum, in sinum eiusmodi,
 deterfionis & corrigendæ malignitatis gratia immitti iu-
 bet. Galenus quoque, vbi sinus ipse, aut situs, aut alterius
 cuiusvis occasione, sordidior aut humidior est, medica-
 35 menta, quæ valentius quàm mulsa desiccant, & detergent,
 admouenda esse suadet. Cuiusmodi est medicamentum *Medicame-*
 ex combusta charta compositum, quod ad hunc modum *tū ex char-*
 temperatur: Squammæ, gallæ, myrrhæ, singulorum pon- *ta cōbusta.*
 40 do denariūm octo, sandarachæ, arsenici, elaterij, id est, suc-
 ci cucumeris agrestis, singulorum pondo denariūm. qua-

tuor, thuris pondo denarium trium, atramenti sutorij 66
(quod Græci chalcanthum vocant) tantundem, chartæ 66
quantum satis est ad inducendum colorem. Debet autem 66
exigua eiusmodi medicamenti portio largo rosacco misce-
ri, quod & eius vehementia remittatur, & per angustum 5
foramen, in sinus profundum, per fistulam, aut æneam,
aut corneam, recto ducto foratam possit iniici. Iniecto au-
tem medicamento, vlceris os linamento concepto clau-
dendum est, ne id refluat. Nisi enim diutius maneat, exic-
care non poterit. Cæterum si vlceris calidum fuerit, hoc est, 10
calidam intemperiem sibi adiunctam habuerit, & virus ab
ipso sinuoso vlcere manans, rubrum & loturæ carnis recen-
ter maceratae per simile appareat, non alienum fuerit ipsum
abluere melicrato, hoc est, aqua mulla recentis, in quo lenti-
cula, hordeum, rosæ, & balaustium incocta fuerint. Si verò 15
vlceris frigidum sit, & sanies tenuis & aquosa conspicitur,
mulla in qua incocta sint, marrubium, absinthium, pimpi-
nella, & myrrha eluendum est. Porro vbi sic ab omni for-
de puros sinus effecerimus, carne replentibus medicamen-
tis (sarcotica Græci vocant) si caui saltem fuerint, dein 20
de glutinantibus, & tandem cicatricem inducentibus, si-
militer reliquis vlceribus vtendum erit. Carne autem re-
plent, quæ humiditatem siccant, & sordem detergent. Ita-
que, idem medicamentum primario atque ex sese sordis
deterforium Galeno appellatur, altero verò significato sar- 25
coticum & glutinans. Quippe quod tali imposito medica-
mento, vlceris carne replentur, ac coeunt. Opus enim ipso-
rum proprium est (vt alicubi scripsit Galenus) affectam
partem recrementis vacuare, ne videlicet sanies carnis ge-
nerationem glutinationemque impediat. Sarcotica igitur 30
detergendi etiam vim habent, sed omnis rosionis seu mor-
sus expertem. Finis autem glutinantium est, nullam inter
coitura subnascentem humiditatem permittere. Glutina-
turo nanque (vt tercio methodi Galenus ait) vnum id pro-
positum est, vt eius quod secundum naturam est, redundan- 35
tiam consumat. Epuloticorum verò, id est, cicatricem indu-
centium medicamentorum finis est, non hanc totam subna-
scentem, ac redundantem humiditatem impedire, sed
etiam nunc consistentem, in iis quæ mox cicatricem ducent,
consumere, adhuc callo obducere, & abstringendo indu-
rare.

*Si vlceris si-
nuosum ca-
lidum fuerit.*

*Si vlceris si-
nuosum fri-
gidum fuerit.*

*Idem medica-
mentum deter-
forium, sarco-
ticum & glu-
tinans.*

*Sarcotico-
rum facultas.
Glutinan-
tium finis.*

*Epulotico-
rum finis.*

rare. Sed de iis in antidotario fufius dicemus. Ergo (vt ad propositum reuertamur) si cauus finus carnem requiratur, primùm medicamenti, quod charta constat, aridi paululùm, cum multo rosaceo inferi conuenit. Deinde carpto
 5 linamento os obturari. Inde emplastrum Isis aut Machæ-
 rionis, aut simile quoddam, vnà cum rosaceo cerato liqui-
 diore solutum iniicitur. Vbi verò mediocriter carne reple-
 tus est finus, aliquid ex glutinantibus medicamentis, non
 vehementer siccantibus adhibendum est, quod crescetem
 10 tenellam carnem blandè, & sine morfu cogat, non aliter ac
 si recens ac cruentum vulnus curaretur. Curatur autem
 hoc mollibus, blandis, minimèque dolorem excitantibus
 medicamentis, qualia sunt enhæma, quorum opus seu fa-
 cultas est coniungere, & diuisas partes cōglutinare, vt in
 15 pristinam vnitatem particula reducatur. Multa (inquit
 Galenus) eiusmodi medicamenta inueniuntur, alia qui-
 dem ex bitumine confecta, vocanturque nescio qua ratio-
 ne, vt idem ait, emplastra Barbara: alia verò, quia fului &
 fusci sunt coloris, cirrha, & phæa nominantur, ex argenti
 20 spuma & æruginè liberalius decocta. Horum autem me-
 dicamentorum misturas. Galenus, Paulus, & Celsus do-
 cent. Sed præstat de hac re interpretis vulgaris Auicennæ
 verba subicere. Ad incarnandum (inquit) oportet quòd
 25 medicinæ fiant currentes lauatiux, cum viscositate adhæ-
 rente, & iniiciantur in eis cum clysteriis, & immittantur
 cum ellychniis & tentis. Et nos quidem iam experti sumus
 30 emplastrum Apostolicum, id est, Apostolorū, & centau-
 ream, quando cum ea implètur, & est mirabilis valde. Suc-
 cedit huic symphyton, deinde iridis Illyricæ radix, postre-
 35 mò erui farina, & id genus alia, quæ glutinandi faculta-
 tem habent. Porro sequens medicamentum, quod in fre-
 quenti est vsu apud chirurgos, miram vim habet in glutin-
 andi seu incarnandis eiusmodi vlceribus. Recip. aquæ deco-
 ctionis hordei librā vnam, mellis rosati vncias tres, sarco-
 40 collæ drahmas duas, myrrhæ, thuris, singulorū drachmā
 vnam, vini odoriferi vnc. sex. Coquantur omnia simul vs-
 que ad tertias, id est, vsque ad consumptionem tertie par-
 tis. Quibus & addi potest aliquando aliquid aloës. Cate-
 rum post glutinantis medicamenti impositionem, sola
 spongia noua ex mullō iuxta Galeni consiliū circumpo-
 nenda.

*Si cauum fi-
nus carnē
requirat.*

Enhæma.

*Cirrha, &
phæa medi-
camenta.*

Auicen.

*Medicamē-
tum incar-
nans et glu-
tinans.*

*Modus deli-
gandi sinus
post glutina-
torij me-
dicamenti
impositio-
nem.*

nenda est, quàm fieri potest mollissima. Eius autem deli-
gatura à sinus fundo incipiat, & eius ore finiat: fasciarum
verò spiræ siue circumflexus, sinus profundum sine dolore
arctent: ac paulatim vsque ad os eius elaxentur, eidemque
(ori inquam sinus) indatur medicamentum molle, circum-
ducto forinsecus emplastro ad os ipsius sinus forficibus di-
scisso: vt sanies effluere possit. Effluet autem è sinu sanies,
supposito aliquo alio paruo emplastro ad solutionē vsque,
quam tertio quoque die faciēs, hoc ipsum tanquam oper-
culum circumpositum auferes, relicto eo quod totum am- 10

*Tertio quo-
que die spō-
gia, ac par-
uum empla-
strum de-
menda.*

*Li. 2. de ar-
te curat. ad
Glanc.*

bit sinum, medicamento. Ideo autem tertio quoque die,
aut certè citius aut tardius, prout res efflagitabit demenda
spongia est, ac paruum emplastrum quod superpositum
erat: vt si qua humoris colluies in ore sinus collecta sit, va-
cuetur exploremusque, an altæ sinus partes coaluerint, an 15
minimè, quod ex manāte sanie (vt docet Galenus) depre-
hendetur. Si scilicet ea multa vel pauca, cocta vel cruda sit.

Itaque altas ipsius partes coaluisse demonstrat, pus co-
ctum ac paucum, præsertim si neque in ipso sinu dolor sen-
tiatur, nec tumor appareat, sed locus totus æquabilis sit, 20
siccus ac doloris expers. Cùmque spongiam rursus impo-
sueris, rursusque (vt diximus) adalligaueris, postero vel
tertio die soluto, vt dictum est, semper linteolum sinus ori
admotum permutans, quod eodem emplastro illitum, to-
tum os ambitu cingat. Neque verò omnino appressum (vt 25
Galenus admonet) esse debet: sed ita, vt per id tota sanies
vacuari possit. Itaque cùm secundo vel tertio quoque die
(vt iam semel atque iterum dictum est) spongia, vel par-
uum emplastrum eximitur, considerandum multane an
pauca, cruda an cocta materia ad os vlcere affluerit. De- 30
inde expers ne sit, an particeps doloris locus affectus, & an

*Nota coi-
tionis alta-
rum sinus
partium.*

tumor remanserit, aut diminutus sit. Altas enim sinus par-
tes coisse restatur pus coctum ac paucum, præcipuè que si
dolor & tumor non adsint. Contra multum & crudum,
& cum fœtore, & loci humiditate, dolore & tumore, non- 35
dum coaluisse significant. Neque verò (vt scribit Gale-
nius) si primo vel secundo die tenuis quædam sanies ex si-
nu manet, de glutinatione omnino desperandum est. Sæ-
pe enim vis medicamenti affectæ particulæ admoti, ex ipsa
cute & subiecta carne tenuem humiditatem vehementer
exprimit

exprimit, quoties eius qui curatur corpus ita affectum est, siue ex natua temperie, siue mala victus ratione. Hac humiditate expressa, loca mediocriter resiccata glutinantur. Quod si tertio, aut quarto ab initio die, sanies cruda
 5 in ore apparuerit, scito (inquit idem) sinum non esse glutinatum. Quare affecto loco medicamentum, quod vehementer quidem exiccet, sed nec mordeat, nec cutem contrahat, circumponendum est. Cuiusmodi Galeni medicamentum est, quod à fuluo colore cirrhū dicitur, ex
 10 concoctis metallicis, oleo ricinino, quod oleum de cherua appellant, & aceto sine cera confectum. Hoc enim medicamentum (vt idem Galenus testatur) sine morfu vehementer exiccat. Cuius compositio & vsus ex libro secundo de compositione medicamentorum *narā*
 15 *γυν* requiri debent. Guido à Cauliaco iubet post glutinantis medicamēti impositionē, desuper apponenda esse emplastra, & pannos, aliquo quod habeat (vt eius verbis vtat) rectificare illa illitos. Cuiusmodi sunt, emplastrum
 20 *διὰ χαλκίτεως* nominatū, quod à palma Græcè *φοινίκιον*, & vulgò diapalma appellatur. Item emplastrum (inquit) nigrum vel flauum cum gallis: & mel coctum cum puluere thuris, myrrhæ, & aloës: vel quædam horum, vel omnia simul, & vinum stypticum crassum, quod grossum vocat. Postea ligare præcipit: vt docet Galenus libro se-
 25 cundo ad Glauconem. Paucis autem interiectis subdit, de tenta (vt loquitur) hæsitasse multos, vt Henricum, & præceptorem suum Bononiensem, quòd solida non ponatur, qua saniem (inquit) in loco retinet, sed cannulata, aut duplicata, vt sanies continuè valeat exire: & spongia super
 30 orificium ponatur, vt sanies trahatur exterius sugendo. Spongia nanque ideo circundatur atque alligatur, vt exiccet, manantēque è sinu saniem excipiat, aliqui partem erosuram, aut pruritum excitaturam. Imbuta autem (vt suprā diximus) mulso spongia sit, vt deter-
 35 geat, mollis, ne asperitate lædat, noua verò, vt aqua marina adhuc imbuta partem affectam desiccet. Hactenus de ratione curandi vlcis alii, angusti, & cauernosi, non tamen callosi. Nunc ordo postulat, vt de calloso vlcere, seu callo obducto sinu, quam fistulam nominant, dicamus.

*Cirrhū me-
dicamētū.*

*Guido à
Cauliaco.*

*Spongia qua
lis esse de-
beat.*

Sinus.*Sinus dege-
nerat in fi-
stulam.**Fistula
quid.**Fistularū
differentia
multiplices*

Vum pus in abscessibus sic excoriat particu-
lam, vt continentia à subiectis separet ac di-
ducat, dein eo quomodocunque euacuato, 5
distantia inter se pristinum statum recupera-
re nequeant, affectio eiusmodi sinus appella-
tur Galeno, libro de tumoribus præter naturam. Quem
si quis (ait ille) nō statim curet, callo obducitur, durūque
temporis progressu fiet, nec conglutinare ipsum cum sub- 10
iectis sibi possibile est, vocaturque tunc hic affectus pro-
priè fistula, de qua nunc dicere instituimus. Est igitur fi-
stula (quam Græci syringa nominant) arctus oblon-
gūque, & callosus sinus, aliquatenus indolens, qui ma-
gna parte ex abscessibus parum dextrè curatis, oritur: 15
sed & ex aliis nonnunquam vicerum generibus ac sinibus
perperam curatis nascitur. Hæc autem nomen accepit
ab harundinearum fistularum tralatione, vt Paulus an-
notauit. Quandoquidem in eis cauitas quædam depre-
henditur, harundinum cauitatibus similis. Fit autem fi- 20
stula in omni ferè parte corporis, habetque quædam (vt
Celsus ait) in singulis locis propria, sed de communibus
hic dicemus. Differentiæ igitur fistularum plures sunt, fi-
cuti & sinuum, quæ ex situ, figura, numero, magnitudine,
& aliis id genus sumuntur. Siquidem aliæ sub cute exten- 25
se sunt, aliæ altius penetrant, aliæ rectæ, aliæ flexæ & tor-
tuosæ sunt, aliæ intra carnem desinunt, aliæ ad ossa, aut car-
tilaginem penetrant, aut vbi neutrum horum subest, ad
interiora perueniunt. Aliæ neruos attingunt, aliæ venas,
aut arterias occupant. Aliæ præterea simplices sunt, aliæ 30
duplices triplicēve, ab vno ore intus, orse, quæ tres sunt,
aut etiam in plures sinus diuiduntur. Aliæ deinde facilè,
aliæ cum difficultate curantur. Atque etiam (inquit Cel-
sus) quædam insanabiles reperiuntur.

De signis & iudicijs fistularum.

35

*Fistularū
notæ à qui-
bus petan-
tur.*

Fistularum dignotiones sumendæ sunt, ab his quæ se-
cundum essentiæ rationem ipsis insunt, atque etiam
iis, quæ consequuntur accidentibus, & effectibus. A sub-
stantialiter quidē inhaerentibus, vt ab illo (inquit Guido)
corio

- corio calloso, & à forma fistulæ instrumentalis, & factitiæ. Callositas nanque cum forma fistulari, essentialis est differentia ipsius fistulæ. Ab accidentibus verò & effectibus, vt à virulentia illa horribili, quæ aliquando ab ipsa
- 5 fistula effluit, emanátve. Item à dolore, qui in ea modicus esse solet, nisi dum partes quæ iuxta neruum sunt, occupat. Cæterùm simplicisne fistulæ sint, an in plures partes diducantur, cognosci potest ex modo puris. Cuius si plus fertur, quàm quod simplici spatio conuenit, plures sinus callosos esse manifestum est. Corporis quoque
- 10 inquinatio docet, num in plures partes fistulæ penetrarint. Quia sæpe cum quis aliter decubuit, aliterque membrum collocauit, pus ferri, quod iam desierat, incipit: testaturque non solum alium sinum esse ex quo descēdat, sed etiam in
- 15 aliam corporis partem eum tendere. Cùmque ferè iuxta sint caro & neruus, & aliqua neruosa, quales ferè tunicæ, mēbranæque sunt, genus quoque puris docebit, num plures sinus intus diuersa corporis genera perferant. Siquidem ex carne (inquit Celsus) pus læue, album, copiosius
- 20 fertur. At ex neruoso loco coloris quidem eiusdem, sed tenuius, & minus. Ex neruo pingue, & oleo non dissimile. Cuius sententiæ refragari videtur Aëtius, sic de nerui fistula inquit: Humor inde delatus tenuior est, ei similis,
- 25 qui ab ossibus defluit, non quidam oleaginus, aut pinguis, sed saniosus & glutinosus. Sed & ex aliis notis, quàm ex pure, deprehenditur nerui fistula, nempe dolore, stuporis enim punctiōisque sensum incutit. Deinde motus, qui ab eo neruo perfici solet, deterior apparebit. Sed in specillo attactu (inquit Aëtius) molestus
- 30 acutiusque sensus redditus, rem manifestissimè iudicabit. At fistula locum erodente, si vena suberit, plurimus crassusque sanguis effunditur. Sin arteria aperiatur, tenuis & flauus cum multo spiritu stridoréque exhibet. Ante omnia autem (vt rectè consuluit Celsus) demitti specillum in fistulam conuenit, vt quò tendat, & quàm altè perueniat, scire possimus, simul etiam protinus humida, an siccior sit, quod extracto specillo patet. Si verò os in vicino est (id quod disci potest sic, iam necne eo fistula penetrauit) quatenus nocuerit. Nam si molle est, quod vltimo specillo contingitur, intra carnem adhuc vi-
- tium

Quibus notis deprehendatur simplicisne sit fistula, an multiplex.

Lib. 5.

Aëtius.

Nerui in fistula crosi nota.

Vena atque arteria crosse signa. Fistula specillo maxime exploranda.

*Os si cario
si nota.*

*Obliqua si
fistula quo-
modo explo-
randa.*

tium est. Si verò magis id renititur, ad os ventum est. Ibi deinde si labitur specillum, nondum caries est: si non labitur, sed æquali innititur, caries quidem: verum adhuc leuis est. Si inæquale quoque & asperum subest, vehementius os excusum est. At cartilago vbi subhæsit, ipsa sedes docet, peruentumque esse ad eam ex renixu patet. Cæterum si obliquæ fuerint fistule flexumque aliquem: vel plures habuerint, vt specilli apex progredi nequeat, virgulam plumbeam, stanneamve conflabimus, aut ceream potius candelam assumemus, qua iter pertentemus. Cum enim flexilis admodum sit, ad fistulæ figuram facile accommodabitur. Hactenus de signis fistularum: nunc de iudiciis,

Fistularum iudicia, seu prognostica.

Lib. 7. **F**istulæ si altius penetrant, vt ad vltimas dimitti collarium non possit, si tortuose atque anfractuose sunt, si multiplices, maius (inquit Celsus) in manu, quam in medicamentis præsidium est: minusque operæ est, si sub cute transuersæ feruntur, quam si recte intro tendunt. *Cor. Cel. lib. 5.* Expedita quoque curatio est in fistula simplici, recenti, intra carnem, adiuuatque ipsum corpus, si iuuenile, si firmum est, inimica contraria his sunt. Itemque si fistula, os, vel cartilaginem, vel neruum, vel musculos læsit, si articulum occupauit, si vel ad vesicam, vel ad pulmones, vel ad vuluam, vel ad grandes venas, arteriasve, vel ad inania, vt guttur, stomachum, thoracem penetrauit. Ad intestina quoque eam tendere semper periculosum, sæpe pestiferum est. *Paulus.* Quibus multum mali accedit, si corpus vel ægrum, vel senile, vel mali habitus est. Aegre (inquit Paulus) con-
sanescit in ano fistula, quæ orificio caret, tum quæ delitescit, & in os terminatur, multifariamque fistula est. Sed ex his quidem colliguntur fistularum sedes, spatia, & noxæ. Præterea an simplices hæ sint, an multiplices, & in plures partes diductæ. Hactenus igitur de fistularum differentiis, signis, & iudiciis. Deinceps verò de medicamentis ad easdem conferentibus differere oportet.

De fistularum curatione in vniuersum.

*Ratio curæ
di vniuersæ
fistulæ.*

Imprimis genus victus conueniens, & quod substantia & qualitate, causis, quæ fistulæ consolidationem impediunt, aduersatur, instituito. Deinde corpus vniuersum à superuacancis, & noxiis humoribus (illis tamen prius, si

ita res

ita res exigat, expulsiōni paratis) idoneo cathartico medicamento purgato. Mox potionibus roborandis ac desiccandis interioribus partibus accommodis, fistulam ad consolidationem præparato. Cæterum tametsi potiones *Potiones si* multæ ad hanc intentionem à variis autoribus descriptæ *stula ido-* sint, duæ tamen sunt quæ frequenti usu, & felici successu *nea.* à recentioribus medicis probatæ sunt. Prior ad hunc modum habet:

10 Agrimoniz partes tres, plantaginis partes duas, foliorum oliuæ partem vnā, scindantur minutim, & contundantur, postea in vino albo coquantur, & fiat colatura, de qua quolibet die sub auroram cyathus vnus administretur.

Altera. Recipe osmundæ (quæ felix mas est Dioscoridi) 2
15 partes tres, gentianæ partes duas, centaurij partem vnā, coquantur in vino albo, & fiat potio, quæ vt prior administretur. Hæc postrema etiam valde efficax est in ossium corruptorum expulsiōne. Ego autem optimè factum existimauerim, si in prædictis decoctionibus nonnihil ligni
20 Guaiaci, vel Indici (quod lignum sanctum, & palmā sanctam appellat) aliquot horas maceretur, postea moderato *Guaiaci;* igne leuiter decoquatur, & ex colatura quantum assiden- *lignum san-* ti medico satis esse videbitur, manè bibendum offeratur. *tum.*

Atque hæc regimen (vt loquuntur) vniuersale concernit.

25 Quod autem ad topica pertinet auxilia, & regimen (vt Ratio con-
vocat) particulare, quatuor sunt ordine peragenda. *randi par-*
Primum quidem fistulæ orificium, si non satis hiet, hoc *ticularis.* est, si nimis strictum fuerit, imo verò & sinus ipse fistularis vsque ad fines eius, si fieri possit, dilatari debet.

30 Secundo loco callum eximere, fistulamque auferre, atque omnino destruere conuenit.

Tertiò post exemptum (quocunque modo id fiat) callum, sordities detergenda veniet.

Quartò vbi purus iam ab omni sorde sinus videbitur, 4
35 similiter reliquis vlceribus ad sanitatem perducitur: nempe glutinatoriis, seu (vt loquuntur) incarnantibus medicamentis, & epuloticis, id est, cicatricem inducentibus, atque etiam (si carnis aliqua fuerit amissio) sarcoticis, id est, carnem generantibus pharmacis. Ergo si nec aduri *Sinus fistula* ferro, nec in eidi commodè possit fistula, & eius os, aut si- *le amplia-* *rio.*

nus totus, siue vnus ac simplex, siue multiplex fuerit, non latè satis pateat, immisso collyrio aliquo, seu (vt vocant) tēta, ampliari ac dilatari debet. Materia autem ad conficienda collyria, dilatandis eiusmodi fistulis, & sinibus callosis idonea, sunt radices gētianæ, & mali terræ (quam aristolochiam Græci nominant) radix item bryoniæ, hoc est, vitis albæ, & dracontij seu dracunculi, præsertim maioris, qui serpentaria officinis, & Romanis veteribus colubrina nuncupatur. Sed imprimis huic negotio accommoda sunt frusta spongiæ contorta & validè compressa. Ex his igitur fiant collyria siue penicilla (quas tentas vocant) altera quidem parte tenuia, altera paulò pleniora. Atque ea parte qua tenuia sunt, demitti oportet in fistulam, sed filo semper appendice, vt tutius, si altius descenderint, & promptius, si nimis hæreant, extrahi possint. Dimittantur autem horis duodecim, aut certè plus, aut minus, donec scilicet latè satis dehiscat fistula. Cæterum orificio

*Fistula de
structio seu
mortifica-
tio.*

*Trifariam
fistula de-
struitur.*

1 fistulæ, atque eius sinu sufficienter dilatatis, ipsius destructio, prorsus molienda est. Id autem trifariam fieri consuevit. Nempe vel medicamentis acrioribus, & callum exterentibus, vel incisione sinus, & vñione, vel incisione citra vñionem, cum calli euulsione. Ergo si recens fuerit fistula, aut non adeò multum antiquata, nec etiam admodum profunda aut flexuosa, & chirurgiam, hoc est, sectionem & vñionē, prorsus recuset eger, medicamenta callum exterentia adhibebimus. Deinde remoto callo ad curationem reliquis vlceribus cōmunem vertemur. Itaque callos elidunt atq; excindunt, quæ ex Galeno, Paulo, Aërio Cornelio Celso, & aliis recentioribus chirurgis subiungam.

*Callos exte-
rentia.*

Sphondylii radix circumrasa, & fistulis imposita, earum callos eximit. Item veratrum nigrum, duobus tribusve diebus insertum idem præstat. Ad hæc amurca cocta, & in collutionem adhibita. Ad idem elaterium, id est, succum cucumeris agrestis, seu (vt vocant) asinini, terebinthina exceptum in collyria cogito, imponitōque: vel laserpitij radice succum infundito. Id quod sequitur etiam callos consumit Paulo Aëginetæ. Aeruginis drachmæ duodecim, ammoniaci drachmæ duæ, excepta aceto in longum inducuntur, & sunt penicilla. Hoc medicamentum efficacissimum atque ex primis esse ad callos eximendos, ex præ-

*Locus in
Cor. Cele-
mendatur.*

*Ad anti-
quas et val-
dè callosas
fistulas.*

Si fistula
longior &
transuersa
sit.
Aqua Al-
chymista-
rum.

*Secundus
modus abo-
lendi fistu-
las.*

2 Secundus modus abolendi fistulas est, qui primum per incisionem totius cavitatis fit, deinde per adustionem, quæ vel caustico medicamento, vel ferro candenti & ignito inducitur. Cæterum quæ in magnas arterias, vel nervos, vel tendines notatu dignos, aut membranam coltas succingentem, aut aliquam principalem particulam deueniunt, vel nequaquam (vt supra diximus) vel certè cū multa artificiosaque diligentia, ac prudentia attingendæ sunt. Reliquis verò hunc in modum manum admoliermur. Primum quidem tentabimus, an rectæ sint vel obliquæ, de-19 misso intrò (vt paulò antè monuimus) specillo, vel cerea candela. In quibus autem duæ, pluresve oræ habètur, quæ specillo aut consimili instrumèto tentari minimè possint, ita notàtur. Clystere in sinum per vnum os liquore compellimus, exque transitu eius in reliqua ora, facilè depre-15 hédimus, vnàne, quæ multas oras habeat, an multæ fistulæ sint. His ita exploratis, si in summo fuerit sinus, atque is angustus, specillo demissio explicandus est, supràque id accommodata figura, scalpello incidendus. Si flexus reperiuntur, hi quoque simul specillo & ferro persequendi 20 sunt. Idémque faciendum, si plures se quasi ramuli ostendunt. Vbi ad fines fistulæ ventum est, diuiso vlceri imponenda sunt penicilla, oui candido liquore imbuta, quæ labra solutæ continuitatis distendant, & inuicem coire non sinant. Postera die locus adurendus erit, vel ferro candente, vel caustico, seu adurente aliquo medicamento, nempe vel puluere asphodelorum, vel arsenico, aut alio consimili, quod facultatis sit causticæ siue vrentis. Auicénas hydrar-25 gyrum, id est, argétum viuum sublimatum admouet, quo efficitur, vt nihil corruptum, nihil callosum, nihil denique 30 quod præter naturam sit, in vlcere remaneat, quod non omnino desiccetur, elidatur, & absumatur. At si non summa occupauerint fistulæ, & sub cute non trāsuerse ferantur, sed rectæ intrò tendant, vbi quàm profundissimè po-35 test, & quatenus licet, incisus fuerit sinus, orbiculatim totum callum, modo qui nuper dictus est, si fieri possit auferemus. Quòd si aliquid ex eo relictum fuerit, adurent id medicamento absumemus. Si autem multum sit, quod ex callo remansit, nec medicamento cedat, candentibus ferramentis adurendum est. Cæterum superponenda sunt,

*Argentū
viuum sub-
limatum.
Si fistule
sub cute in-
trò tendant.*

da sunt, atque in circuitu semper admouenda quæ refrigerent, & reprimant. Nam ferè quæ circa fistulam sunt (vt Celsus ait) aliquid habent inflammationis. Signum autem, quo dignoscimus medicamentum acre atque adurens, suum effectum, quod satis est, induxisse, est vlceris e-
 5 latio siue tumefactio, ac trium dierum mora, vt communis vsus habet. Itaque adusta, & vt oportet rescicata fistula, mitigatorio aliquo medicamento primis diebus vtor, vt oleo cum oui luteo mixto. Deinde ea quæ crustas, ferro
 10 ignito aut adurente medicamento inductas resoluunt, ac deiiciunt, admoueto: cuiusmodi est, butyrum, aut aliquod aliud simile, pingue ac vinctuosum. A quorû vsu non prius desistito, quàm crustæ deciderint, & in pus conuersæ fuerint. Mortificatæ autem fistulæ euidens argumentum est,
 15 cùm pus quod antè multum, & crudum apparuerat, nunc paucum, & coctum visitur.

*Quid post
adustionē
& rescica-
tionem fi-
stulæ agen-
dum sit.*

*Mortifica-
ta fistulæ
signum.*

Tertius modus abolendi fistulas est, qui per incisionem fit, sine cauterio, vel actuali (vt vocant) vel potenciali. Ita-
 que facta quemadmodum antè proditum est, incisione vs-
 20 que ad fines, seu fundum ipsius fistulæ, callus totus vel vnguibus, vel acie scalpri, vel cultro rasorio, id est, nouacula detrahi debet, ita vt locus, seu sinus ipse purus, & ab omni sorde mundus appareat, quod viuæ ac probæ carnis præsentia deprehenditur, vt docuit Auicēnas. Et hæc vera est
 25 fistulæ curatio, quam statim, si nihil obstitit, aggredi debemus, quorū fistula nobis sanāda & abolenda proponitur. Cæterum dilatata fistula, atque in totū abolita, detergentibus, si quæ sordes adhuc supersit, & sarcoticis, siue incarnantibus medicamentis vti nos oportebit: qui postre-
 30 mi duo scopi erant in sanādis fistulis propositi. Ergo callo fistulæ eliso atque absumpto, si sordes aliqua subsit mulso, vel aqua in qua eruum coctum sit, sic vt huic quoque mel-
 35 lis paulum adiciatur, locū abluito, vel sequenti medicamento repurgandis fistulis, post remotum callum longè accommodatissimo, vtor. Terebinthinæ in aqua vitæ ab-
 lutæ vnc. tres, succi apij, succi cynoglossi (quod Romani
 linguā canis appellant) singulorū drac. sex, mellis rosacei
 colati sesquiunciam, aristolochiæ rotundæ drach. duas, fa-
 rinæ lupinorū semunciam, coquantur succi & terebinthina
 cum melle rosaceo, vsque ad cōsumptionē medietatis suc-

*Tertius mo-
dus abolen-
di fistulas.*

*Vera fistu-
læ curatio.*

Deterfio.

*Medicame-
tum fistu-
las repur-
gās, ac de-
tergens.*

*Cura ge-
neratio.*

4 corum, deinde reliqua commisceantur. Si prædicto medicamento absterforio, myrrhæ, sarcocollæ, radice peucedani aridæ, & iridis singulorum momentum adieceris, optimum incarnans medicamentum effeceris, modò ex eo turunda illinatur. Aliud Aëtij Amideni experimèto pro-

Lib. 14.

*Medicamē-
tum callū
exterius &
incarnans.*

barum, callum exterens & incarnans. Radicum liliorum crematarum cinere fistulam repleto, & callus excidet, quo ablato similacem herbam sumito, arundinibus se implican-

*Aliud fistu-
las incar-
mans.*

tem, flore candido, foliis hortensi phaselo similibus: quæ arefacta, vsta, & trita, fistulam replebis, & incarnabitur. Aliud aridum Magistriani ab eodem relatum, fistulas

*Medicamē-
tū ad fistu-
las longè o-
ptimum.*

incarnans. Chamæleontis nigri radicem, pini corticem, thus masculum, aristolochiam longam pari pondere terito, fistulæq; mulla abluta aridum applicato. Sequens quoque collyrium, à quodam chirurgo nostri temporis vsurpatum, fistulam agglutinat, insigniter desiccatur, & affectæ parti robur addit. Aquæ vitæ vncias duas, vini maluatici vnciam vnam mellis rosacei drach. decem, myrrhæ, radice peucedani tritæ, vtriusque drach. duas, sarcocollæ, aloës hepaticæ, vtriusque sesquidrachmam, id est, drachmam vnam & semissem, misceantur, deinde bulliant omnia ad ignem moderatum vnico feruore, & per auricularium clysterem, quam syringam vocant inuiciantur in fistulam. Aliud ad fistulas, vsq; ad os attingentes, ex Aëtio. Squamæ æris, æruginis, ammoniaci thymiamatis, portione æ-

*Aliud
Aëtij.*

quas, ex aceto terito, & pastillum, id est, trochiscum conftrato. Deinde collyria, hoc est, turundas, fistulæ æqualia formato, & imposito. Quomodo autem ossi vitiatò & corrupto medendum sit, in præcedentibus diximus. Hæc igitur de fistulis dicta sufficiant, superest de cancro vlcera-

De cancro exulcerato.

C A P. XII.



Ancrorum (vt in tractatu de tumoribus præter naturam diximus) alij cum exulceratione, alij circa vlcus fatigant. Ac de his quidem qui sine vlcere molestant (quos Hippocrates latentes nominauit) abunde à nobis supra dictum est. Itaque præsens locus postulat, vt de iis disseramus, qui exulcerati sunt, & adeo laborantes affligunt, vt interdum illis manum admoliri (ægris etiam vltro id efflagitan

flagitantibus) cogamur. Cæterum quibus locis maximè
 accidant cancri tam vlcerati, quàm non vlcerati, ex quo
 humore potissimum gignantur, & à quibus causis excitentur,
 quibus notis deprehendantur, qui ex illis curationem
 recipiant, & qui non, atque in totum quid de illis præsa-
 giendum sit, fusissimè à nobis explicatum est, vbi de can-
 cerosis tumoribus, qui citra vlcus inuadunt, egimus. Reli-
 quum est igitur vt compendiosam exulcerati ipsius cancri
 curationem describamus. Sed priusquam id agamus, non
 10 alienum fuerit, eius notas in memoriam reuocare. Itaque *Signa cæci vlcerati.*
 in cancro vlcerato, præter dolore, duritiem, tumoremq;
 vlcera erosa, ac inæqualia conspiciuntur, plurima ex parte
 sordida, labris prætumidis, aspectu horrenda, & concreta
 humorum colluie ingrata. Quæ verò (inquit Paulus) pu-
 15 ra videntur, fœculenta, liuida, atque interdum etiam sub-
 rubra, & cruenta apparent: sanies inde manat continuo
 tenuis, aquosa, nigra, aut fulua, grauitèr olens.

Ergo si eiusmodi affectus chirurgiam, hoc est manus o-
 peram desiderat à vacuatione humoris melancholici cu-
 20 ratio auspicanda est. Deinde totum carcinoma, si locus pa-
 tiatur, prorsus rescindendum, sic vt nulla supersit radix, si-
 nemusq; sanguinem effluere, nec statim eum inhibebimus.
 Imo pressis vicinis partibus, crassum ac melancholicum
 sanguinem exprimemus. Postea aliis vlceribus similiter cu-
 25 rabimus. Hęc curandi ratio tradita & probata est libro de-
 cimoquarto method. Therap. Cuius verba hoc loco subi-
 ,, cere placuit. Cæterum (inquit) si quando canctum per chi-
 ,, rurgiam curare audebis, cœpisse quidem ab vacuando per
 ,, purgationem melancholico humore oportebit: vbi verò
 30 totum quod vitiatum est, prorsus excideris, sic vt nulla su-
 ,, persit radix, fines effluere sanguinem, nec propere eum
 ,, inhibebis, imo premendo potius vicinas partes, exprimes
 ex his crassiorem sanguinem. Mox aliis vlceribus simi-
 liter curabis. Hactenus Galenus. Sunt qui exciso carcino-
 35 mate, & crassiore sanguine ex circumstantibus partibus
 expresso, ferramentis igni flagrantibus locum adurunt.

Alij cum partem aliquam corporis carcinoma eius-
 modi, quod cum vlcere est occupauit, hoc (si locus non
 refragetur) circuncidi opus esse tradunt, dein viuore-
 nus aduri, tritasq; cantharides ex alumine & cyprino oleo
Vt. Cantharides.

Corrosio.

superponi. Alij verò à sectione, & vitione quæ fit ignito ferriamento abstinentes, corrosione valida ex adurentibus medicamentis facta vitium hoc totum extirpant, & destruant.

*Carcinoma mitiora contemptis remedia.**Arsenicū sublimatū.*

Porro medicamenta eiusmodi si quando adhibenda sunt, valentis admodum facultatis esse debent. Nam, vt scribit Hipp. extremis morbis, extrema remedia adhibenda sunt. Tanta autem est huius vitij malignitas, vt mitiora planè contempta remedia. Inter cetera autem, præstantissimum ac tutissimum auxilium in hoc affectu Guidoni à Cauliaco prædicatur, arsenicum sublimatum, cuius egregias dotes supra iam multoties commemorauimus, & in sequentibus adhuc celebrauimus. Hoc (inquit Theodoricus) cancerum, lupum, & Rhizomenum [hoc est sphacelum, seu fiderationem] noli me tangere, fistulam, & omnes tales pessimos morbos, prima die occidit, & extirpat. Ceterum magna locorum circumstantium, interim dum admoetur, cura semper habenda est, ne scilicet ea ipsa inflammatione, atque humorum confluxu, occupentur. Quod incommodum faciliè deuitabis, si pares illas vicinas, & carcinoma cingentes, bolo armenia & id genus alijs, illeueris. Sed & modo legitimo, seu iusta quantitate quam coniectura tantum artificiali ratione definit medicus) adhibendum est, arrhenicum ipsum siue arsenicum

*Legitimi effectus arsenici nota.**Extincti carcinoma tu nota.*

(vt vocant) sublimatum. Vbi autem effectum quem desideras, præstitit (quod ex loci inflatione siue tumore, & mora triduana, deprehendes) dolor mitigandus erit, & crustæ casus, modo, quo supra docuimus procurandus. Cancro verò sic penitus extincto, ac radicitus extirpato, vlcus ipsum quod remansit, similiter abis cauis vlcerebus curabis. Carcinoma autem prorsus extinctum agnosces, si proba & sana caro apparuerit, si & nulla virulenta proluuius, se in parte affecta ostenderit, nullaque amplius graueolentia, eorum qui proximè attant, nares offenderit.

Quinam cætri vlc-rati, vitione, aut sectione de-fiderent.

Ceterum soli illi canceri etiam cum vlcere consistentes, curationem eiusmodi, quæ vitione vel sectione fit, admittunt, qui in summo corporis parte hærent, quique adeò laborantes fatigant, vt ipsi vltro (inquit Galenus) chirurgi manum efflagitent, & simul in talibus partibus consistent, quas rescare & exurere vnà cum radicibus possis.

Sed

Sed cum hæc curandi ratio, non sine graui ægróantis periculo (vt supra de cancro non vlcérato monuimus) administrari possit, temere adhuc in talibus adhibenda non est. Itaque si in penitioribus corporis partibus, constituti
 5 sunt canceri istiusmodi, aut in talibus quidem consistant, quas nec adurere, nec excindere vnà cum radicibus possis, vel si loca principibus membris vicina occupent, vel laborans ob virium imbecillitatem tale curationis genus sustinere non possit, an forsitan (quia nimis timidus sit & pusillanimis) extrema hæc remedia subire non velit, adhuc si
 10 ex hac curandi ratione deterius aliquod malum sequeretur: breuiter si periculum ex chirurgia, id est, sectione aut vstione, timeamus, nec curari affectus aliter possit, sat fecerimus, si hunc augeri prohibeamus proba impri-
 15 mis victus ratione, & commodis vacationibus solisque leuibus & quasi ad blandientibus medicamentis vtentes: à vehementibus verò, & acribus (quibus malum hoc veluti crabro irritatur, & excandescit) prorsus abstinentes. Ergo imperanda ægris talis victus ratio est, quæ tenuis
 20 sit, bonumque & minimè melancholicum succum generet. Quòd si ob iecoris caliditatem & siccitatem excedentem, prohiberi non possit, quin crassus & melancholicus in corpore sanguis procreetur cibus, refrigerantibus, & humectantibus erit vtendum, quibus hepatis in-
 25 temperies paulatim emendetur. Conueniunt itaque in hoc affectu ptisanæ oremor, lactisque serum, vinum paucissimum & aquosum, pisces saxatiles, atque omnis generis aues præterquam palustres. Ex oleribus malua, attriplex, blitum cucurbita, atque id genus alia. Acrum
 30 esus, & repletio omnis vitanda. Sed & crassior ille succus qui in venis colligitur, ex interuallo vacuandus erit, interdum purgante medicamento, interdum (nisi quid prohibeat) venæ sectione. In mulieribus quoque, si quidem liceat per ætatem, menses euocandi, atque etiam
 35 in viris hæmorrhoides (si eas pati consueuerunt) proritandæ. Loco autem affecto imponenda remedia sunt, quæ dolorem leniant, & ita ipsum firmare possint, vt nihil redundantæ humorum amplius excipiat: quæ item refrigerent & exiccant, minimè verò mordeant aut irritent. Cuiusmodi sunt solani succus, vel aqua destillata:

*Quibus cã-
cri dunta-
xat ad blã
diendũ ve-
ra curatio-
ne omissa.*

*Victus ra-
tio in cãcre
vlcérato ob
seruanda.*

*Succus me-
lancholicus
ex inter-
uallis va-
cuandus.*

*Qua loco
affecto im-
ponenda.
Succus so-
lani.*

cum succi copia non est, plumbum vstum & elotum: vnguentum album, vnguentum ex lichargyro & plumbo vsto, item medicamentum quod ex pompholyge, vel chalcite constat, aut aliis id genus metallicis vstis & elotis. Atque etiam (vt vocant) camphorata, similiter & succi in mortario plumbeo ducti, huic vitio efficacissime admoventur. Laminæ quoque plumbeæ maximo & pene incredibili vfu cancris ipsis exulceratis superinducuntur. Modus autem vsus succi solani (quod medicamentum eiusmodi affectibus vtilissimum esse scribit Galenus) talis esto, Solani succo linteam molle duplicatum imbuito, & loco affecto imposito. Extrinsecus lanam molliusculam eodem succo madentem linteo circumdato, atque hæc ne siccescant, eo succo subinde irrigato. Hoc remedium loco dolenti inductum sine dolore ac molestia (inquit Paulus) exulceratis cancris subuenit. Plurima medicamenta composita à Galeno, Paulo, Celso & Aëtio, ad hunc vsum conscripta sunt, ex quibus duo hæc selegimus. Argenti spumam, & cerusam in plumbea pila cum

*Lamina
plumbea.
Modus v-
sus succi so-
lani.*

*Vnguentum
ad can-
cres
ulceratos.
Aliud lon-
ge optimum.*

*Malua.
Althea.
Cataplas-
ma lenit.*

Aliud.

Aliud. Lenit item cataplasma quod constat palmularum datylis in passo decoctis, quibus adiecta sint ouorum lutea polentæq;. Adhæc quod ex papauere cum coriano factum est, aut polygono, aut feri: hoc est, cichorio: hæc quidem in doloribus vsui sunt. Multi (inquit Guido) mitigant eius fraudulentiam & lupacitatem, (ita enim loquitur) cum pecia scarlati, & appositione carniū gallinarum.

Hinc

Hinc vitium hoc ideo lupum appellari vulgus putat, quoniam
 5 niam carnes vnius gallinae si apponantur, quotidie ferè
 absumit & deuorat. Quòd si forsitan eiusmodi gallinae
 carnes vel similes, illi pro pabulo non offerretur, carnes si-
 bi proximas, ceu lupus quidam famelicus, ad eandem quan-
 titatem depasceretur & exederet. Quidam huic malo ve-
 luti adblandiuntur, admoto puluere stercoreis humani, &
 anethi, igne concrematorum. Item appositis quibusdam
 10 herbis, vt scabiosa, trifolio, verbasco, id est, tapso barba-
 to, & herba robertiana nuncupata, quæ quibusdam
 myrrhis Dioscoridis esse putatur. Cæterum
 vtcunq; res habeat, commemorata nu-
 per remedia, (quoniam ferè tem-
 15 perata sunt) si magnopere
 non prosint, nocere
 saltè non pos-
 sunt.

*

FINIS LIBRI TERTII CHI-
 rurgicarum institutionum, de vlceribus,
 Ioanne Tagautio Doctore
 medico auctore.

*

Cancer vl-
 ceratus cur
 quibusdam
 Lupino ap-
 pelletur.

Herba Ro-
 berti.



GENERALIS DI-

VISIO FRACTURARVM,

in librum quartum Chirurgicarum

institutionum Io. Tagau-

tij Medici.

*

Fractura, qua Græci κάταγμα dicitur, differentia.

Simplices.

Compositæ.

Simplices fractura differentia, plures sunt.

Alia enim sunt

$\left. \begin{array}{l} \text{Καυλῶδες} \\ \text{Ραφανίειον} \\ \text{Σικυῶδες} \end{array} \right\} \text{Id est, ad } \left\{ \begin{array}{l} \text{Caulium} \\ \text{Raphani} \\ \text{Cucumerum} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{fracturæ speciem} \\ \text{ac similitudinem,} \\ \text{per transversum.} \end{array}$

σχισμαῖδες, id est, quasi assens modo, per longitudinem.

Εἰς ὄνυχας, id est, in ungui formam

Αλγυτῖδες, id est, ad similitudinem farinæ, vel pollinis, quando
scilicet os in multas tenues partes confringitur.

Κατὰ ἀπὸθραυσιν, id est, iuxta abruptionem, fit cum pars ossis
per superficiem abruptionem detrahatur, ac recedit.

Composita fracturarum differentia, seu potius implexus cum
alijs morbis & symptomati.

Fractura cum vulnere.

Fractura cum inflammatione.

Fractura cum gangræna.

Fractura cum dolore.

Fractura cum pruritu.

Fractura cum fragmento ossis eminente.

Fractura cum contusione.

Fractura malè ferruminata.

Fractura cum callo nimium excrecente.

Fractura cum nimia calli siccitate, & duritie.

Fra

Generalis diuifio Fractu.in Lib. IIII.
Fractura cum fupervua calli humiditate.

365

Sunt & alie fracturarum differentia Albucasi, & recentioribus chirurgis, à locis in quibus confiftunt defumpta, quæ tamen propriè differentie dici non debent, vt,

*

Fractura in caluaria.

Fractura in maxillis.

Fractura in naribus.

Fractura in clauiculis.

Fractura in fпина dorf.

Fractura in costis.

Fractura in fcapulis.

Fractura in humero.

Fractura in brachio, id eft, cubito & radio.

Fractura in femore.

Fractura in crure fivè tibia.

Fractura in patella fivè rotula genu.

Fractura in digitis, tum pedum tum manuum.



INSTITVTIO NVM CHIRVRGI- CARVM IOANNIS TAGAVTII

MEDICI,

LIBER QVARTVS.

De fracturis.

Quid fractura, & quæ sint eius differentie.

CAP. I.



Vandoquidem tribus libris superioribus, de vitiis chirurgiæ subiectis, quæ carnosæ & mollioribus corporis partibus accidunt, abundè satis dictum est, ordo iam postulat, vt de aliis quæ ossibus contingunt, hoc est, fracturis & luxationibus, disseramus: hæc enim Chirurgiæ generi etiâ subiiciuntur.

Ac primùm quidem de fracturis agemus, quas etiâ Hippocrates luxationibus anteposuit. Est igitur fractura, vt in vniuersum dicatur, vnitionis, siue continuitatis solutio quæcunq; in osse, quâ Græci proprio nomine & omnibus suæ gentis hominibus noto, catagma vocant, vt Galenus sexto methodi medendi, & aliis plerisq; locis testatum reliquit. Paulo verò Aeginetæ, atq; aliis posterioris medicinæ Græci scriptoribus, fractura ossis est diuisio, aut ruptura, aut præcisio, discissio, à violentia quadâ extrinsecus irruente accidens. Guido à Cauliaco, & alij quidam ætatis illius medici, fracturâ definiunt, continuitatis solutionem in osse, non à qualibet re factâ, sed ab ea tantùm, quæ contundit. Vt vera sit (inquit) prima differentia solu-

*Fractura
quid.
καταγμα.*

Paulus.

*Guido à
Cauliaco.*

tionis

- tionis ossis, quòd quædā est incisa, quædā contusa, ossium enim diuisionem quæ incisione fit, non fracturā, sed ossis vulnus appellant. Cæterum plures fracturarum eiusmodi differentię sunt: alię nanq; simplices sunt, alię cōpositę. *Simplices*
- 5 Ex simplicibus quidem alię sunt, quę fracti ossis partes *fractura* iam prorsus separarunt, easq; cauledon, raphanidon, atq; *differentia.* etiam siccydon factas Græcè dicunt, hoc est, ad caulium, raphani & cucumerū fractorum speciem ac similitudinē. Manifestum autem est eiusmodi ossium diuisionē trans-
- 10 uersim per crassitudinem fieri. Hęc quibuscūq; virgalis & trāsuerſalis nominatur. Alię verò fiunt schidacidon, quasi *Fractura* afferis modo: hęc autē per longitudinē magis fiunt, dicun- *schidacidon* tūrque oblongę ossis fissurę. In iis non omnino separan- *facta.* tur à se partes sic affecti ossis, sed veluti per rectitudinem
- 15 finduntur. Præter has alię quædā adhuc simplices nume- *Alia fra-* rantur facturę differentię, quarum alię Græcis dicuntur *cturarum* fieri, *eis θυγα*, id est, ad instar vnguis, alię alphitidon, id est, *differentia.* ad farinę vel pollinis similitudinē. Alię *κατὰ* apothraus- sin, id est, iuxta refractionem, seu (vt alij interpretātur ab-
- 20 ruptionem. Fractura quę *eis θυγα*, id est, in vnguis formā fit, fissura est ossis, quę cū aliqua in parte recta sit, in ex- tremo tamen lunata euadit. Atque hęc etiam calamidon, *Fractura* id est, harundinatim ab aliquibus nuncupatur. Alphiti- *ungularis.* don ad similitudinē farinę vel pollinis dicta, est cū os *Fractura*
- 25 in multas tenues partes confringitur, quę & ipsa carye- *alphitidon* don, id est, nucatim, à quibusdam vocatur. Apothrausis, *facta.* quę & apocope dicitur, id est, abscisio seu præcisio, est cū *Fractura* pars ossis per summitatis rupturam, seu superficiēi abru- *κατὰ ἀπό.* ptionem detrahatur, ita vt pars ea quę detracta est, & re- *ελασσις* fa-
- 30 cessit, superemineat, vt ferè fit cū squamula ab osse re- *Etia-* soluitur. Cæterum hęc fracturarum differentię curiosè nimis (vt Galenus inquit) atque ambitiosè, à medicis Hippocrate iunioribus, iis propriis nominibus interpretatę sunt. Non contenti enim fuerunt oratione, os quod va-
- 35 riè seu multifariam sit fractum, explicasse. Ab huiusmodi autem appellationibus, omnino abstinuit Hippocrates, sed quo ad fieri licuit, vſitatissimis vtens nominibus, oratione interpretari non est grauatus, non has modò fracturarum differentias, verumetiam quę in capitis ossibus eueniunt. Breuiter duo potissimę sunt fractu-
rarum

Due sunt rarum differentiarum simplices Galeno, à quibus curandi
potissima indicationes sumuntur, nempe quæ per transversum, & quæ
fracturarum per longitudinem facta est. Cornelius Celsus tertiam ad-
differentia didit, quæ scilicet obliquè sit. Omne (inquit) os, modò re-
simplices. ctum ut lignum in longitudinem finditur, modò frangitur &
Composita transversum, interdum obliquum. Cæterum ossis fracturæ,
fractura nonnunquam carnis quoque vulnus accedit, sed potissimum
differentia. cum ossa multifariam fracta sunt, sæpe etiam dolor ingens,
 & interdum inflammatio. Contingit etiam aliquando ut
 aliud os super aliud efferatur, & ex ossè malè ferruminato
 ac commisso, veluti tephaceus aliquis nobis relinquatur.
 Horum autè affectuum & symptomatum cum ossium cõ-
 tinuitatis solutione complexus, compositas fracturæ diffe-
 rentias, iuniores medici vocauerunt, cum tamen propriè
 differentię non sint. Quandoquidem quod seorsum & per
 se cõsistere potest (ut alibi ex Galeno diximus) nunquam
 alterius erit differentia. Vulnus autè, dolor inflammatio,
 & id genus alia seorsum, & per se consistere possunt. Pro-
 inde veræ fracturarum differentiarum, & à propria ipsarum
 natura desumptæ, nec reuerà sunt, nec rectè dici possunt.
 Quod si quæ à loco quoque, seu parte in qua est fractura,
 differentias censeas, veluti si nares, aures, maxillæ, costæ,
 clauiculæ, caluaria, spina dorsi, humeri, brachia, femora,
 crura, digiti, fracturam patientur, fuerint profectò, & ipsæ
 fracturarum differentiarum Albucasi: non utique à propria
 ipsarum natura, sicuti neque præcedentes, desumptæ, sed à
 locis, in quibus consistunt. Verum enimverò quoniam ab
 iis omnibus supra commemoratis agendorum sumuntur
 indicationes, donemus eas cum recentioribus medicis &
 chirurgis differentias appellari.

De causis, signis, & iudicii fractura in vniuersum.

C A P. II.

CAUSAE.



Ausæ fracturarum internæ nullæ sunt, externæ
 verò ea omnia, ut breuiter dicam, quæ contun-
 dere, vel diuidere ossa possunt. Quæ contun-
 dunt, ea dura grauiorque, & mole non exigua
 sint oportet, vehemètiq; impetu deferri ac
 irruere. Ossa diuidunt quæ vulnerando incidunt: ite casus ab
 alto, præsertim si ossa sicciora sint, nec admodum crassa.
 Fractu

- Fractura quoque ossibus interdum accidit ex circumtortione in luctantibus: ut si tibia siue crus Dioclis, cruri aduersarij Socratis cum eo luctantis per transuersum supposita sit, ita ut utraq; eius capita, & iuxta pedem, & iuxta genu deorsum vehementer deprimantur, os proculdubio tibiæ ipsius Dioclis, præsertim si infirmum sit natura, hoc luctationis genere medium disrumpetur, seu si maioris frangetur. Id quod in lignis quoque, quæ à nobis ipsis circumtorquentur, videre licet. Si enim lignum aliquod neq; magnum, neque validum, sed paruum & imbecillum supra femur tuum impositum, ex utroque capite deorsum vehementer manibus urgeas, statim id in media parte frangi aspicias. Signa aut ossis fracti, & præsertim per transuersum atque in artubus, hæc ferè sunt. Tactu ossis partes disiunctæ separatè ac variè reperiuntur, membri figura inæqualis percipitur: dum membrum dimouetur, & manu variè tractatur, ossa colliduntur, & veluti crepitus quidam ex ea collisione auditur. Pars afflicta, contacta dolet, corpus membro fracto haudquaquam inniti potest: causæ quæ frangunt, aut contundunt, præcesserunt. In osse verò quod per longitudinem fractum est, substantia eius crassities non naturalis tactu percipitur, cætera signa non adsunt, præterquam quòd dolor & inæqualitas iudicio sensus etiam deprehenduntur.
- 25 Prognostica. Ossa minimè periculosè media franguntur in humeris, brachiis, femoribus, cruribus, & digitis. Quò autem propior fractura capiti vel superiori, vel inferiori ipsius ossis est, eò peior iudicatur. Nam & maiores dolores adfert, & difficilius curatur. Ea itidem quæ in artuum vicinìa est, curatu difficilis est, vel eo potissimum nomine, quòd commodè ligari non possit. Atque hæc ut plurimum motum relinquit difficilem. Maximè tolerabilis est, simplex transuersa, peior ubi fragmenta, atque ubi obliqua. Pessima ubi eadem acuta. Nam & carnem vulnerant, interdum neruum quoque, aut muscolum. Fractura quæ cum dolore vel inflammatione, aut carnis contusione incidit, mala est. Quippe quæ instaurari non possit, donec ea prius curationem receperint. Si ossis fracturæ carnis quoque vulnus accessit, in malo etiam æger est, maximeq; si id musculi femoris, aut humeri senserit. Nam & inflamma-

SIGNA.

IV DICIA.

*Per cæcos
hic gangre
nâ & spha
celum intel
lexit, sicuti
Cælys qui
busdam lo-
cu.*

tiones multo grauiores, & (vt inquit Celsus) promptiores caneros habent. Adde quòd in eiusmodi fractura, neque ferulis neque canalibus (inter quæ vulnus sanescere non potest) vti possumus. Sed nec primis fasciis, quas Hippocrates *ὑποστομίστας*, id est, subligamina vocat, vulnus contegens dum esse volunt, tum huius ætatis chirurgi, tum qui seculo Hippocratis fracturas curabant. Itaque vlcere non deligato, hinc & inde, hoc est vtrinque ab eo fasciis circumiectis, qua vlcus est, fenestellam relinquunt, per quam medicamenta vulneri accommoda imponent. Quem deligandi modum damnat ille medicorū princeps & antesignanus Hipp. libro quem de fracturis inscripsit, eumq; lemmatis ac rationibus non absurdis quidem, aut probabilibus tantum, sed scientificis quoq; & necessariis, inutile, erroneū, prauumq; esse cōuincit ac demonstrat. Si brachium aut crus fractum est, bonum est alterum saltem os integrū manere. Altero namque osse integro manente, necesse est neruos ac tendines minus contrahi, quippe qui ab integro ipso osse & non cōminuto adhuc intendantur. Adde quòd curiosius omnia in continendis ossibus fieri debent, vbi vtrunque os fractum est, & neutrum alteri auxilio est. Itaque si alterum os integrum manet, plus opis in eo quàm in fasciis, ferulisq; est. Cor. Celsus memoriæ tradidit ignorari minimè oportere si femur perfractū est fieri breuius, quia nunquam, inquit, in antiquum statum reuertitur, & summisq; digitis postea cruris eius insisti. Quod equidem à ratione, & experientia, ab ipsiusq; Hippocratis sententia prorsus est alienū. Non enim quoties femur frangitur, protinus necessario ipsum breuius efficitur. Sed duntaxat si statim quàm fractum est, minus quàm par sit, à chirurgi distentum fuerit, vel tortuose distractum, & separatæ ac distantes inter se ossis confracti partes, nō rectè atq; admodum, priusquam ferrumen impleat, coaptatæ extiterint. Tunc enim & breuius femur reddetur, & crure eius partis claudicabit homo. Sic autem de hac re lib. de fracturis scripsit Hippocrates, At verò si femoris os fractum sit, extensio imprimis diligenter facienda est, ne minus quàm debeat efficiatur. Amplior enim si sit, nullam læsionem affert. Verum quoque est vt in eodem opere idem testatur Hippo. quòd quibuscunque vtraque vel tibiæ vel cubiti

*Locum in
Cor. Celsi,
aut falsus,
aut incertus.*

biti effracta ossa fuerint, illa breuiora effici. Quod sanè intelligendum est: nempe vt Gale. interpretatur, nisi ante conformationem extensio debita adhibeatur, & commoda deligatione ossiū coaptatio seruetur, quoad callus ob-

5 ducatur: tunc enim non solum in maiorem tumore, quàm naturaliter conueniat, membrum illis attollitur, verum etiam breuius propter retractos musculos efficitur. Sed hæc præfagia particularia sunt.

Porrò in quadrupedibus, præsertim veterinariis, non o- *Prognosti-*
 10 minino eadem est de fractis præfagiendi ratio, quæ in ho- *ca quedam*
 minibus. Nam si quadrupes pedis posterioris radium fre- *de fractu-*
 gerit, præsertim mulus aut asinus, iis quòd medulla ca- *ra in vete-*
 reant, quamuis sanguinis compotes sunt, nunquam soli- *rinis.*
 descit. Quæ supra genua fracturam senserunt, vt deplora-

15 ta non continges. Siquidem ea nunquam ferruminantur. Si femur fractum sit, in periculum venit, spesque salutis in angusto est. Fractis armis, nullus medicinæ locus. Nam neruorum distensio sequitur, quæ caput scapulis annectat.

Vix vnquam sanitas contingit, si fracturæ vulnus aut lu-
 20 xatio coniuncta sit. Si verò costa perfringatur, facilis medendi ratio est. Fracturæ quæ calloso ferrumine coaluit, nunquam vrens medicamentum admouebas: quandoquidem eo callus ille tophaceus resoluitur, nec vllam ferè medicinam sentit. Hæc & quædam alia de fracturis veteri-

25 norum, Hierocles & Apsyrus veterinarij medici, nobis scripto reliquerunt. Fractura siue in quadrupede, siue in homine sit, quo verustior est, hoc est, quò tardius fracta ossa, vt oportet committuntur, eò deterior efficitur. Quan-

doquidem & callus illic gignitur, & spatia ipsa inanìa, alie-
 30 na quadam substantia opplentur. Quo fit vt dum instauratio molienda sit, maiore ac valentiore multo extensione sit opus. Magna autem & valens eiusmodi extensio, non raro conuulsionem inuehit, vt alicubi testatus est Auicenna. Fracturæ non pari dierum numero in omnibus ossi-

35 bus ferruminantur, sed in aliis tardius, in aliis citius, Caluaria trigintaquinque diebus glutinatur. Brachium & tibia si ritè curentur, diebus circiter quadraginta occalescunt. Firmatur cubitus diebus plurimùm triginta. Si in naribus os perfractum est, decem & octo dierum spatio consolidescit. Costas post vnū & vigesimū diem Celsò,

aliis non nisi post vigesimum octauum, ferrumen implet, Fere etiam intra decimumquartum, & vnum & vigesimum diem sanescunt, maxilla, iugulum, scapula, os tali calx, manus, planta. Inter vigesimumseptimum, & quadragiesimum, humeri & femina. Coxa verò diebus quinquaginta coalescit. Hippocrati, pes eidem sexaginta dierum spatio, si quiescat, consanescit. Et ita de aliis pro fracti cuiusque ossis natura dicendum est. Quinetiam confert aliquid ad celerem aut tardam sanationem, & ætas, & corpus, & vitæ propositum, & anni tempus, vt & de vulneribus dictum est. Proinde in iis nihil certum aut perpetuum est. Factionis Arabicæ princeps Auicennas affirmabat ossium agglutinationem in liliosis, conualecentibus, & primis senibus, difficillimam esse, in decrepitis verò ac valde senibus impossibilem. Cæterum costa aliquando tota, interdum non tota frangitur: nempe cum pars eius interior (quæ rara est) duntaxat leditur, summo osse manente integro. Si tota costa perfracta est, casus asperior est. Nā & graues inflammationes, & febris, & suppuratio, & sæpe vitæ periculum sequitur, & sanguis spuitur. Narium fractura peior est, vbi aut ossi, aut cartilagini fractæ, cutis quoque vulnus accessit. In cranij fractura malum portendunt, membrana immobilis, nigra vel liuida, vel aliter coloris corrupti, dementia, acris vomitus, neruorū vel resolutio, vel distentio, caro liuida, maxillarum rigor atque cervicis. Spem verò certam faciunt membrana mobilis, ac sui coloris, caro increscens rubicunda, facilis motus maxillæ, atque cervicis. Cætera quæ ad somnum, cibi desiderium, febrem, puris colorem attinent, eadem quæ in cæteris vulneribus, vel salutaria, vel mortifera sunt. Ferrum seu agglutinationem in ossibus remoratur, multa ex aqua calida perfusio, crebra superpositorum mutatio, festina nimis ac præpropera membri affecti dimotio, nimia coarctatio, & quæ parti oblata (alimenti in eam distributionem prohibendo) atrophiam inducit. Sanguinis quoque viscosi penuria. Item & fragmenta quæ remanserunt.

Note mali aut boni in dictis in fractura cranij.

Que agglutinatione remoratur in fractis ossibus.

Ossis fracti recte commissi nota.

Ossa quæ fracturam experta sunt, recte commissæ testantur, æqualis membri perfracti compositio & figura naturalis, si alteri sibi compari, nihil noxæ perpeffo, conferatur, dolor sublatus, ac veluti quidam voluptatis sensus, sang

sanguinis quoque solerti quadam naturæ providentia, ac fracturæ locum expulsi apparitio. Proinde non minus verè quàm communiter, dici solet, quòd tumor membri perfracti, post primam eorum quæ fracturæ admotæ sunt mutationem, sine magno dolore apparens, atque vbi fracti ossis partes rectè concurrerint, & in naturalem situm aptatæ fuerint, euanescent, certam salutis spem pollicetur. Sed iam tempestiuum est fracturæ in vniuersum curandæ veram methodum, quamque ipsa rei natura præscribit, tradamus.

Generalis curandæ fracturæ methodus.

CAP. III.

Quoniam fracti ossis soluta partium cōtinuitas est, utique (inquit Gale.) finis quò tendet. *Vnitio, finis primus quò tendit is qui fracturam curat.*
 is qui fracturas curabit, saltem primus vnitio est. Quòd si is primus in curatione positus finis per affectarum partium siccitatem perfici non possit, restat alter, qui est ut alterius cuiusdam interuentu disiectæ ossis partes glutinentur. Qui si nec ipse comparabilis aduertitur, insanabile esse vitium dixeris. Quòd igitur coalescere (saltem per se & nullius alterius ope) nequeat tam durum os, quàm id quod in iuuenibus & adolescentibus, & viris, multoque magis in senibus cernitur, id profectò (inquit Galenus) vel cuius patere potest. Quæcunque enim concreescere ac coalescere debent, omnino mollia humidaq; sint naturaliter oportet. *Quorū fracta ossa coalescere nō possunt: & quorū possunt.*
 Quæ igitur dura siccaque sunt, eorum diuisæ partes coire simul nequeunt, sed glutinum aliquod vinculumve, quo commissa maneant, requirunt. Itaque potest certè illud os tantum vnitioem per se, & nullius alterius interuentu recipere, quòd abundè molle est, cuiusmodi conspicitur in puerulis: in adultis verò, & siccioribus corporibus, separata fracti ossis particula, nō per se vnquā, sed substantia duntaxat quapiam interueniente, ceu glutino quodam, ferruminari colligariq; secum possunt. Interuenit autè ea substantia, quoniam omnis particula sibi familiare trahit alimentum, os autè crassius ac terrenū magis quàm aliud quoduis nostri corporis mèbrū alimentū ad se allicit, exigitq;. Quòd autem ex hoc ipso proprio ac maximè idoneo

Vnitio, finis primus quò tendit is qui fracturam curat.

Quorū fracta ossa coalescere nō possunt: & quorū possunt.

Lib. 6. metho. medendi.

Pori id est, calli substantia unde nascatur.

*Calli medio-
critas.*

*Scopi qua-
tuor, in cu-
randa fra-
ctura, que
per transuer-
sum facta
est, medico,
proponitur.*

*Recta par-
tis fractu-
rum inuicē
comissio, et
coaptatio.
Libr. 6.
Methodi.*

*Hippoc. lib.
de fractu-
ris.*

osis alimento redundat, & in labris fracturæ concrefcit, suo ipsius interuentu osi, extrema dura licet & sicca conglutinat, vt sæpè vfu euenire conspiciamus. Vocatur autem corpus id, quod sic fracturis innascitur, Græcis *καλός*, Latinis verò callus, qui (vt suprà de vulneribus ossium diximus) mediocritatem in crassitie, & tenuitate, duritie etiam ac mollitie seruet oportet. Sed de hoc adhuc in sequentibus. Age igitur dicamus, quomodo finem hunc primum, quò tendit is qui fracturam curat, nempe vnitionem assequi valeamus, initium quidem facientes ab ea fracturæ differētia, qua per transuersum os frangitur, & suo loco excidit. Quandoquidem hoc fracturæ genus sæpius incidit. itaque quatuor me hercle intentionibus, in hac fracturæ differentia curanda, est opus, quas & scopos appellare possit. Prima intentio est, vt fracti ossis partes rectè committantur, & in naturalem situm coaptentur. Secunda, vt ritè commissa ossis perfracti extrema, coniuncta atque immota maneant. Tertia vt *κάλος*, seu (vt dicimus) callo interueniente disunctæ ossis partes agglutinentur, coalescantve. Quarta est, symptomatum, hoc est accidentium, quæ fracturam sequi consueuerunt, correctio. Quod ad primam intentionem attinet, cum in hac fracturæ differentia quam *καυκασίαν ἢ παρὰ τὴν σπῆνδα*, id est, per transuersum fieri diximus, sic à se fracti ossis partes dissideant, vt è directo non iaceant, clarum est primum id esse agendum vt in directum agantur. Directum autem hic vocamus, quum in figuram pristinam naturalēque situm reducuntur. Sanè (inquit Galenus) cum situm habuerint, si quis ea quæ sic dissident integræ partis exemplo vsus, in contrarium adducat. A qua nimirum certissima iudicatio trāspositionis eorum erit. Fieri enim potest, vt tum prorsum, tum retrorsum, tum in hanc partem membri, tum in illam facta translatio sit. Quæcunque igitur retrorsum magis sunt acta ea prorsum impelli conueniet. Nec minus alteram quoque fracti ossis partem modicè ad cōtrarium retrudi. Contra quæ prorsum sunt emota, hæc rursus ipsa quidem retrorsum, reliquam verò partem sensim duci prorsum. Eodem etiam modo, & eorum quæ ad dextram sunt detorta medicatio est: si ad sinistram ducantur contrāque eorum quæ ad sinistram, si mutantur ad dextram semper scilicet

- licet altera parte modicè in contrarium acta. Guido à Cauliaco (præmissis quibusdam præceptis communibus : quæ hîc suo loco referemus) quomodo primam hanc intentionem assequi possit, verbis non adeo multis perstringit. Itaque iubet imprimis membrum perfractum ; si ossa suis sedibus (quod sæpius contingit) exciderint, aliudque super aliud efferatur, & muscoli ad capita sua retracti sint, decenter intendendum esse. Deinde os depressum attolendum, & eleuatum deprimendum, atque id quatenus fieri
- 10 licet sine dolore, donec ossis fracti fines rectè concurrant, & in naturalem situm coaptentur. Neque enim vnquam fracta eiusmodi ossa, & suis etiam sedibus mota, in suum locum veniunt, nisi illa per vim aliquis intendat. Intendere autem digitum, vel aliud quoque mēbrum si adhuc tene-
- 15 rum est, etiā vnus homo potest, eum alterā partem dextra, alteram sinistra apprehendit. At verò valentius membrum duobus eget, qui in diuersa contendant. Si firmiores nervi ac tendines sunt, (vt in viris robustis, maximèque eorum feminibus & cruribus euenit) habenis quoque vel li-
- 20 neis fasciis vtrinque capita articulorum deliganda, & per plures in diuersa ducenda sunt. Cauendum autem semper est, ne immoderatus confractum membrum extendatur. Immoderata enim distentio in duris præsertim & siccis corporibus, vehementes dolores, febres, conuulsiones, & resolutiones interdum inducit. Quin etiam per eam diuelli ac disrumpi musculorum : ac neruorum fibras aliquando contingit. Proinde summa in hac re prudentia opus est. Igitur ægro in sedili collocato, vel resupinato po-
- 25 tius, vt Sorano placuit, ministris duobus iubebimus huic, supra fracturam illi, infra digitos circumponant, atque sic tentionem perficiant. Quod si valentiore opus sit intentio ne, non solum manibus, sed etiam vt diximus habenis aut funibus intendere aggrediemur. Ergo duos funes æquales confracto membro, verbi gratia brachio aut cruri circundamus, vnum supra fracturam, alterum infra: atque
- 35 vni ministro ad ægotantis caput consistenti, alteri iuxta pedes, capita funium tradētes, iubebimus in diuersa membrum perfractum distendere. Vbi paulò longius, quàm naturaliter esse debet, membrum vis fecit, distentio remittenda est: ac tum demum ossa manibus in suam sedem com-

*Guidonis
præcepta
de reductio-
ne fractu-
re. Cel. li-
bro 8.*

*Æger quo
modo collo-
candus, in
fractu ar-
tubus.*

*Distentio
quando re-
mittenda.*

*Anace-
phalaefis.*

*Libr. 6.
Therap.*

*Ossium ex
stantia.*

pellenda sunt. Ossis autem repositi certū indicium est do-
lor sublatuſ. Cæterū ossibus fracturæ iam sic probè coa-
ptatis iuxta Hippocraticam consuetudinem membrum
deligandum erit: vt statim subiungemus. Modus alius re-
ducendi ossa fracta in suum locum & naturalem situm per
distentionem, libro de fracturis traditur ab Hippocrate,
qui & à Paulo refertur libro sexto sui operis de re medica,
quo etiam si velis, & parata habeas quæ describit instru-
menta, vti poteris. Sed hic modus quem supra posuimus
longè facilior, & magis ad manum est. Atque eo etiam 10
Soranus medicus utebatur, estque hodie apud nos in fre-
quentiore vsu. Oportet igitur (vt summatim dicamus) aut
manibus ipsis; vtique si confractum membrum exiguum
est, aut vinculis impositis, si maius est, & validiore tractu
opus sit, aut eiusmodi instrumento quod nobis Hippocra- 15
tes descripsit, antitassim ossium facere, hoc est retrorsum ea
trahere, vt è directo committantur, exactaque eorum con-
iunctio fiat; sic vt pristinam vnionem imitentur. Postea
verò quàm abundè retracta fuerint, & nullus amplius su-
perſit metus, ne se in adducendo contingant, tum isti dire- 20
ctum opponere, vinculaque relaxare, ac musculis ipsis di-
ductorum in idem commisionem permittere opus est. In-
terim verò (rectè Galenus admonet) teipsum quoque qui
operi præes, manibus subseruire expedit: ac sicubi aliquid
paulum subsultet, ac promineat, corrigere atque formare. 25
Cæterū in adducendis sic, vt supra expressimus, contra-
rio motu partibus, ne aliquæ frangantur ossium extantia
non leue periculum est. Non enim veluti (inquit Galenus)
in ferra de sectis visitur, leuis est semper vtriusque partis
finis. Quòd si illæ (ossium inquam extantia) fortè fortuna 30
frangantur, non poterunt adamussim secum coaptari fra-
cti ossis fines, tum quia forsā fragmenta inter partes vni-
endas interciderint, tum etiam quòd quidpiam ossium
fortè extra ceciderit, & comminutum perierit: vnde spatia
inter applicata simul ossa, maneant inania, in quæ sanies 35
collecta, atque temporis tractu putrescens, totum pariter
membrum secum corrumpet. Atque hæc tractandæ fra-
cturæ ratio omnibus propemodum confractis artubus con-
uenit: vbi præsertim ossa fracta suo loco (vt sæpius contin-
git) exciderint, aliudque super aliud effertur. Neque enim
semper

- semper dum franguntur ossa suis sedibus moueri contingit, sed interdum fracta in suo loco, ac naturali situ remanent. Quod ante omnia (vt nos admonet Celsus) considerari debet, & sunt notæ certæ, quibus id discrimine-
 5 prehendere possis. Nāque si suis sedibus mota sunt, resima apparent, pūctionisque sensum repræsentant, ac tactu (vt suprà an. otauimus) inæqualia sunt. Vbi vetò loco suo non exciderunt, neque punctionis sensus vllus, neque
 10 vlla quæ tactu percipi possit inæqualitas adest. Cæterum si primis diebus ossa ipsa perfracta & suis sedibus mota reposita non sunt, non leue inflammationis periculum subest. Sub qua & difficilè, & periculose vis neruis & tendinibus adhibetur. Atque hæc de prima intentione dicta sufficiant.
- 15 Secundus scopus in curandis fracturis nobis propositus, est, vt ossibus iam sic (vt suprà docuimus) probè coaptatis, & è directo admotis, eorū positura seruetur, & exactè coniuncta maneāt, sic vt pristinam vnionem imitètur. Porro nequaquā prohibere poteris, quin diuisa eiusmodi
 20 ossa, quæ sic effinxeris & adamussim secū coaptaueris, sua sede moueantur, & rursū dissideant, si laborans quoquo pacto vel vigilans, vel dormiens, membrum fractum dimoueat. Ergo vt secundum hunc scopum assequaris, perfractum membrum prorsus immotum consistat neces-
 25 se est. Quod si ipsi quidem ægrotanti, vt quietudini membri prospiciat permiseris, vigilans fortassis (quemadmodum inquit Galenus) probè id curauerit, at dormiens omnino membrum mouebit. Vt igitur non dormientis modò hominis, sed etiam ad desidendum, itémque cum
 30 cubile resternitur surgentis, eorum quæ ritè formata, & exactè coniuncta sunt positura seruetur, tuta deligatura complecti fracturam oportet, quæque fracti ossis partes secum coarctare adamussim possit. Tuta autem non erit deligatio, si vel nimis arcta, vel laxa nimis fuerit. Quan-
 35 doquidem per laxiorem ossibus moueri licet, per arctiorem verò & vehementius adstringentem, & alimenti in locum affectum distributio prohibetur, & dolor (qui humorum in ægram partem affluxus euocat, & phlegmonas creat) excitatur. Danda itaque opera est, vt vtrumque excessum declinemus. Constrictio igitur mediocris

*Nota ossis
fracti, &
sua sede mo-
ti.*

*Secundus
scopus.*

*Mēbrum
perfractū
prorsus im-
motum ser-
uandum.
Libro 6.
Metho.*

*Oss fractum
deligādum
esse, & qua-
re.*

*Cō. in libro
Hippo. de
fract. et 6.
therap.*

*Angusta
deligatio
artubus vi
lu.*

*Ratio deli-
gati artus
perfractos,
ex Hippo.
Galeno, &
Celfo.*

esto, tum nostri sensus, tum ipsius ægrotantis iudicio.
Ac si quidem æqualis esset crassitudinis membrum quod-
que, utique latissima fascia (ut Galenus ait) commo-
disset, ut esset, ut pote quæ totum æqualiter, continen-
terque ex omni parte fractum os complecteretur. Sed
quoniam id non est, quod deest nobis ex fasciarum la-
titudine, circuituum numero pensabimus, ut in artu-
bus ipsis, qui omnium maximè fracturæ per transuer-
sum factæ, expositi sunt. In talibus nanque utilior
est, angusta deligatura quàm valde lata & remissa.
Quippe quæ nec rugas, ut ea quæ latiore fascia fit, con-
trahat, & totius membri cui circumdata est, cutem con-
tingat. Eò igitur usque augere tibi latitudinem fasciæ
licet, quoad nulla eius pars laxior efficiatur. Cæte-
rùm in eiusmodi deligatura, quæ fracturis (in medio præ-
fertim brachij, vel tibie, aut femoris existentibus) adhi-
betur, duabus fasciis lineis mollibus (iuxta Hippocratis
dogma) opus est. Has autem Hippocrates ipse nomi-
ne peculiari ὀρθοσπῆλαις, id est, subligamina, seu malis
subfasciationes appellavit. Primæ fasciæ initium super
fracturam iniici debet, ac circa eam bis terue conuo-
luta, sursum versum ferri, & quasi in cochlea serpe-
re, atque illic desinere. Id tamen perpetuò obseruan-
dum est, ut multum partis sanæ fascia hæc complecta-
tur. Ita enim fiet, ut & firmiter reposita ac confor-
mata ossa contineantur, & magis ab affecto loco in cir-
cum vicinas partes humores elidantur, magisque ne hi
à superiori parte eò defluant, impediatur. Altera
etiam super fracturam debet incipere priori aduersa,
deorsumque (ubi primos complexus super fracturam se-
cit) tendere, atque inde iterum reducta in superiore
parte ultra priorem fasciam desinere. Quocirca dimi-
dius longior priore esse debet. Terminus autem longi-
tudinis earum fasciarum, non vnus ac certus statui po-
test, sicuti nec etiam latitudinis, sed pro magnitudine
fracturæ, & perfracti membri crassitie vtrique dimen-
sione varianda est. Hunc Hippocrates libro τῆς λατῆς
circundatur, ὀρθοσπῆλαις, id est, de medicina seu medici officina, & libro
de fracturis, trium aut quatuor, aut quinque, aut sex
cubitorum longitudinem, digitorum verò latitudinem
constituit

*Hæc secun-
da fascia nõ
bis aut ter:
ut in priore
ligatura,
sed semel tā-
tum mēbro
perfecto cir-
cundatur. τῆς
Hippocra-
ti.*

constituit. Digiti autem & cubiti intelligendi sunt eius ipsius qui deligatur, nempe vel viri adulti vel pueruli. Hæc autem duplicis deligaturæ ratio, ex ipsa rei natura desumitur. Quandoquidem duo hæc prima lintea fracturam quidem muniunt ac stabiliunt, nec phlegmonem (quæ in hac re imprimis est arcenda) oriri sinunt. Siquidem & ab integris ad laborantem particulam sanguinis confluxum arcent, & quod iam collectum in ea est exprimunt. Prior quidem deligatura quod in læsa parte continetur, ad superposita expellit atque elidit: quod verò ex iis (superpositis inquam partibus) in locum perfractum confluit, repellit. Altera verò primis quidem complexibus, quos, ut supra diximus, super ipsius fracturæ locum facit, itémque dispensatione deorsum tendente, quædam ad inferiora extrudit, quædam, ne quid ex iis in locum fracturæ confluat prohibet. Reliquis verò deinceps complexibus, quibus videlicet ab infimis partibus sursum versus recurrere deligaturam diximus, ut eodem scilicet loco cum priore fascia, secunda desinat, tum ad superiora (vti & priore ligatura) repellimus, tum confluxum ab iis prohibemus. Cæterum priusquam fasciis huiusmodi fractura deligetur, vnus aut alter panniculus lineus, candido oui liquore & rosaceo delibutus, nudo membro non absque ratione à recentioribus chirurgis superac-

25 commodatur, ea quidem magnitudine, ut etiam aliquid partis sanæ comprehendat. Sunt autem eiusmodi fasciæ duæ prælongæ, nempe quatuor, aut quinque, aut sex, ut diximus cubitorum, & circa tres quatuorve digitos latæ aqua aut posca potius madefactæ, & postea expressæ, præsertim si fractura inflammatione vacet, recensque sit. Si verò dolor vehemens, aut inflammatio adest, lanis tenuibus mollibusque, aut stupis leuibus oleo vel oxycrato imbutis membrum contegendum est, & non ita arctè deligandum. Satis enim fuerit tunc, si deligatura adhibeatur, quæ & membrum vtcunque fulciat,

35 & admota medicamenta, ad hæc symptomata profliganda idonea, contineat. Verumenimverò cum hæ duæ primæ deligaturæ, ad ambos hos vsus quos supra retulimus, (nempe ad fracturæ munimentū stabilimentūque, & ut phlegmone excitari prohibeatur) non satis adhuc faciant,

Prioris deligaturæ vis et facultas. Quid secunda deligatura efficiat.

Fasciarum longitudo et latitudo.

Si inflammatio adest, cum fractura.

faciant, præsertim solæ, ad earum quidem tutelam & fracturæ stabilimen Hippocrates remedium excogitauit, vt scilicet plagulæ, siue splenia à splenis forma ita appellata vnà cum exterioribus fasciis, quas, *ἐπισπασμους*, id est, superligamina vocat, desuper adhiberentur. Et hæc quidem tertiæ deligaturæ rationem quibusdam obtinent.

*Splenia cur
adhibeat
Hippocra.*

Splenia enim eiusmodi siue plagulæ, duarum primarum fasciarum quæ peculiari nomine *ὑποσπασμίδες*, id est, subligamina Hippocrati appellantur, firmamenta sunt, vt commentariis in librum Hippocratis de fracturis Ga-

*Ceratū hu-
midum cur
adhibeatur*

lenus annotauit. Ne autem phlegmone suscitetur, medicamento quopiam ex iis, quæ inflammationum iniurias arcent, vt censuit. Quale nimirum est ceratum humidum siue liquidum, quod confici solet ex cera in rosaceo aut oleo colliquata, aut eius loco rosaceum. Huius sententiæ fuit & Cornelius Celsus libro octauo, sic in-
quiens: Super has (duas inquam primas deligaturas) "iniiciendum latiore linteo ceratum est, quod eas conti-
neat. Quod si ossis fracturæ, carnis quoque vulnus ac-
cessit, neque ceratum, neque rosaceum tutò admouetur: 20
quandoquidem hæc vlcus tum sordidum tum putre efficerent, sed in vicem eorum puluilli prælongi vino nigro ac styptico imbuti, superiniiciendi erunt. Reliqua autem
curatio, quæ eiusmodi fracturis cum vulnere incidentibus conuenit, in sequentibus dicitur. Porro præter has 25

*Alia qua-
tuor Corn.
Celsi deli-
gaturæ.*

modò à nobis commemoratas deligationes: quasdam adhuc alias quatuor commemorat Aurelius Cornelius Celsus capite decimo, libri paulo antè citati. Sic autem eas dispensat, vt semper insequens priori aduersa sit, & tertia fascia (quæ duas primas ac splenia comprehendit) tantum in inferiore parte, tres reliquæ in superiore finiant. Quia satius est (inquit) sæpius circuire quàm adstringi. "Siquidem id quod adstrictū est alienatur, & cancro oportunum est. Quo loco (ni fallor) cancrum pro sphacelo, "quem vulgus medicorum esthiomenum vocat, usurpauit, 3
vt & quibusdam aliis locis. Cæterum cum multis complexibus atque inuolutionibus duæ illæ superius commemoratæ Hippocratis deligaturæ, fracturam contineant,

*Cornelij
Celsi opinio
refellitur.*

(alias enim parum tutæ essent) tam numerosis fasciis opus esse minimè censeo. Hæ enim in membro ipso perfracto, præter

præter solitum cooperto, & pruritus & dolor (quæ duo symptomata à fractis membris diligenti studio arcenda sunt excitare, atque etiam eius quod iam infixum fracturæ est, perspirationem prohibere possunt. Porro ubi
 5 decenter sic membrum confractum deligaueris, de appo-
 sita repositionis ipsius figura, maxima tibi sollicitudo habenda est. Siquidem sub alia forma aut figura membrum perfractum deligare, in aliam verò mutare ac reponere, non dolorem modò (vt inquit Galenus) excitare
 10 potest, verum etiam ossa intorquere. Necesse enim est, ubi figura mutatur, alios muscutorum tendi, ac velut contractos rotundari, alios verò solui ac remitti. Vbi autem tenduntur, tum premi eos à deligatura est necesse, tum ex compressione ipsa dolere. At ubi tensio remittitur, quo
 15 loco deligatura est laxa, ibi fracturam fulcimento destitui. Cæterum aptissima fuerit in ossium fractorum repositione, sicuti etiam & in retractione, (quam Antistasin diximus à Græcis appellari) & coaptatione, & deligatione, partis figura, quæ (vt verbo vno dicatur) maximè à dolore abest, & in qua æger persistere immotus diu possit. Hæc enim & rectissima est, & maximè naturalis membro, ac ferè consueta. Rectissimam autem hîc partis figuram cum Galeno vocamus, quæ venas, arterias, & musculos quàm rectissimos habet. Itaque angulosa figura, quæ
 25 ῥῶνι & Græcè dicitur, brachio quidem maximè naturalis est: cruri verò, quæ paulò minus porrecta est. Hæc nâque & rectissima est & à dolore maximè aliena. Cæterum tamen angularis figura, quæ Græcis ῥῶνι & dicitur, propriè ea dicatur, quæ acutum angulum, quem recto minorem appellamus, efficit, per. engonion tamen, id est angularem figuram, Hippocrates eam intelligit, quæ recto angulo constituitur, non prorsus tamen recto, vt quodam in loco Galenus est interpretatus, sed propè ad rectum accedente, ita vt paululum ad obtusum tendat: cuiusmodi in
 30 manu, quod vulgò brachium appellamus, ea figura est, nò quæ prorsus quidè inter extensionè & inflexionè media est, sed quæ ad extensionè procedere incipit. Quo plerunque positu eos qui dolore afficiuntur, si diligenter inspexeris, manus tenere deprehendes. Porro vt dolor vitetur, cum ad quietem membrum reponitur, nò modò naturalis ha-
 bitus

*De appo-
 sita repositio-
 nis perfra-
 cti membri
 figura, ex
 Galeno.*

*Repositio-
 nis figurâ
 ad duo dire-
 ctam esse.
 Rectissima
 figura quæ
 dicatur Ga-
 leno.*

Ratio in me de figura, in qua custodire membrum perfractum conueniat, ex Galeno & Hipp.

Ferula quando in fracturis circumponenda.

Quæ vitare oporteat i ferula adhibendis.

Ferulae ab initio non vitra adstringenda quam ut ossa contineant.

Ferulae quales esse debeant.

bitus cuius instrumento est utilis, verum etiam consuetudo quoque conducere nonnihil videtur. Ergo ut aptè membrum perfractum, & decenter ligatum reponatur, ea situs figura illi inuenienda est, quæ & naturalis sit & consuetæ, & à dolore maximè aliena. Sed iam hæc indicationes inter se consentiunt, & cōspirant maximè. Nam quæcunque figura magis quam alia est à dolore libera, ea & maximè naturalis membro, & ferè consuetæ esse solet. Atque econtrà, quæ naturalis & consuetæ est, ea à dolore est alienissimæ. Atque hæc quidem figuræ, in qua custodire membrum perfractum conueniat, inueniendæ ratio est. Ut autem in hac naturali, & quæ doloris minimum habeat, figura immotum prorsus (quoad expediet) membrum persilât, recentiores Chirurghi secundum deligaturam, protinus ferulas etiam circumponunt, ipsas quidem constringentes, prout sensus & tumor ex inflammatione (si qua adsit) postulat. Veteres autem, ut Hippocrates, Celsus & Galenus, à die tantum septimo vel etiam nono & vndecimo, ferulas accommodabant. Verum non abs re factum putamus, si statim ab initio post deligaturam, & ferulæ iniiciantur, modò nimis premendo dolorem non excitent, aut phlegmonem (quæ maximè arcenda erat) accersant, vel præsentem si adsit) exacerbent. Quæ igitur à principio adhibentur à recentioribus ferulæ, non eo nomine adhibentur circumponunturve, ut adstringant, sed ut adaptationis figuram contineant, & ossa in suam sedem reposita utcunque fulciant. Primis nanque diebus cum phlegmones deuitandæ consilium vinceret, tutum non erat perfractum membrum ita ferulis premere. Cum verò nullus iam amplius futuræ inflammationis metus sit, aut ea quæ prius fuit discussa, membrum aliquanto gracilius quam pro naturali habitu apparuerit, (quod intra septimum diem ferè solet contingere) tum licebit ferulas circumponere, & eas (ut fracturam stabiliant) valide satis astringere. Ferularum enim vsus idem est, qui & plagarum seu spleniorum, nempe ut fractum os contineant, & deligationem stabiliant ac firment. Sunt autem ferulæ ut libro qui inscribitur τὸ κατ' ἰατρικόν, id est, de iis quæ in medicina seu medici officina fiunt, rectè præcepit Hippocrates, læues, id est, læuigatæ & planæ, æquabiles,

- biles, id est, neque in latus, neque in superiorem, aut inferiorem partem distortæ, in summis partibus, id est, extremitatibus, resimæ, id est, leniter derafæ ac retusæ, minores hinc inde quàm deligatio est, & ea parte crassiores, id est, latiores & valentiores, *ἡ ἐξίρριπται τὸ κάτωμα*, id est, qua fractura erupit. *Læues* autem ferulas, id est, non asperas (leui enim asperum opponitur) adhibendas esse censet Hippocrates, ne sua asperitate, & inæquabilitate (quod enim asperum est, continuò etiam est inæquale) fractis partibus negotium faceffant. Vtrotque enim modo comprimunt. Cæterum quoniam fieri potest, ut ferulæ læues sint, non tamen æquabiles (inæquabile enim non protinus necessariò est asperum, ut patet de via quæ ascensus habet & descensus, non asperos) ideò non solùm læues, sed etiam æquabiles, id est, non distortas assumendas esse ferulas monet. Quæ enim distortæ sunt, similiter, ut aspera lædunt, ac illud insuper efficiunt, quòd deligationem simul distorquent, qua distorta, pars etiam fracta distorqueatur necesse est. *Simas* præterea in extremis partibus eas deligi voluit, id est, ut Galenus interpretatur, leniter derafas ac retusas in extrema parte, ne sua acutie articulum lædant, & æqualiter vbique partem fractam, propter æqualem suam crassitudinem, comprimant: quod certè fieri nullo modo debet. Vult enim Hippocrates, ut in media parte, hoc est, supra locum fracturæ, *ὡς ἔστιν*, id est, ferulæ, deligationem magis astringant. Hinc ea parte, hoc est, supra fracturam ipsam, crassiores esse iubet: quia scilicet locus is potissimùm (ut suprà ostendimus) compressione ipsarum indiget.
- Vult item minores eas esse longitudine, id est, aliquanto breuiores, quàm sit ipsa deligatio, ne cutem ultra deligationem attingant: quæ sæpenumero ex eo quod humores à fasciis expressos suscipit, paulò altius turgescit atque extat. Sed & breuioribus ferulis vten- dum præcepit senior ille Hippocrates ne pars eminentior, id est, gibba & carne nudata, attingatur, ut circa cubitum, & malleolos, ubi ossium extuberationes sunt. *Modus ac ratio* autem ac ratio adhibendi ferulas, talis est. Splenia triplicia aut quadruplicia oleo delibuta, *super*

*Quando sol-
uenda de-
ligatio.*

super fascias similiter, atq; æqualiter, si membrum in cras-
sitie fuerit æquale, circumdato. Si verò inæquale, partibus
magis concavis, per splenia repletis, membrum vndique
æquale ferulis accommodandis effcito. Deinde ferulas la-
na, aut stuppa mediocriter inuolutas, in orbem, non mi-
nore quàm vnus digiti spatio inter se distantes fracturæ
circundato, easque leniter ac moderate contringito. Sed
& in hac ferularum accommodatione summopere caue-
to, quatenus fieri potest, ne articulus aliquis, (vt paulò
antè notauimus) & præcipuè interior flexus pars, ab eis
attingatur. Vlcera siquidem in ipsis nonnunquam, & ner-
uorum inflammationes pariunt: itaque illic, hoc est, iuxta
articulos ipsos deligatione aliquantò (vt diximus) breuior-
es, tenuiores, laxiores, & magis flexibiles ferulas esse opor-
tet, quemadmodum valentiores qua fractura excidit at-
que inclinat. Cæterum si nulla prurigo, nulla inflamma-
tio, nulla suspecta exulceratio, nullusve dolor adest, & os-
sa rectè commissa fuerint, fracturæque rectè procedat, sic
manere ferulas, & ligamenta, ad decimum vsque diem,
vel quintum & decimum, aut etiam vigesimum, vtile est. 20
Si verò in membro perfracto præter solitum cooperto, vel
dolor excitetur, vel pruritus creetur, vel eius quod iam in-
fixum fracturæ est perspiratio prohibeatur, propter quam
non modò noxius pruritus quibusdam accidit, sed etiam
erosa à saniei acrimonia nonnunquam cute, exulceratio 25
concitatur, non abs re feceris, si tertio quoque die vt iussit
Hippocr. deligationem solueris, & membrum ipsum aqua
temperata perfuderis ac foueris. Hac enim perfusione
& acrem atque erodentem saniem discuties, & dolorem
mitigabis, & prurigini pulchrè medeberis.

*Tertius scò
pus.*

*Pori gene-
ratio.*

3 Porro cum nec ferulis, nec deligatione, nec figura sitú-
ve membri appposito, diuisæ ossis partes (tametsi exactè at-
que adamussim coniunctæ fuerint) citra glutinum ali-
quot vinculumve (vti suprà diximus) coire, ac concre-
re possint, maxima calli, quem poron Græci dicunt, gi- 31
gnendi sollicitudo habenda est. Ad hunc igitur gignen-
dum cogi concrescereque aliquid proprii ossium alimen-
ti, crassi terrenique oportet, quod in labris fracturæ coale-
scit. Ipsum igitur nec eluendum, nec foras euocandum est,
sed sinendum. Crassa autem hæc terrenaque substantia,
ex ge

- ex genuino, maximèque idoneo ossis alimento redundās (quæ propria est calli materia) diem circiter duodecimum, aut decimum quintum ab ossis fractura ferè gigni, atque accrescere incipit, vt recetiores chirurgi testatum reliquerant. Cæterum huius generatio (quæ in aliis citius, in aliis verò tardius aduenit) iis ferè notis deprehēditur. Dolor qui prius aderat, sedatur, nullus amplius inflammatoris, aut tumoris alicuius præter naturam metus adest, in membro perfracto bonus ac natiuus color efflorescit: vniuersa autem victus ratio poro gignendo accommodata, talis esto. Dum callus gignitur, victum paulò pleniorē, quàm ab initio fracturæ, laboranti instituito. Cibos, qui boni succi sint, & multum nutriant (nisi vulnus adsit) exhibeto. Sed & quæ offeruntur alimēta, talia sunt, ex quibus provenire succus soleat non solum bonus, sed etiā tenax, ex quali fieri callū maximè expedit. Quippe (inquit Galenus) cum ex serosa humiditate, ac tenui gigni prorsus nequeat, ex crassa verò, sed quæ fragilis sit, an pinguitudinis expers gigni quidē poterit non segniter: cæterum tempore siccescens friabilior, atque ita fractioni obnoxius redditur. Itaq; poro gignendo conueniunt Auicennæ: Risum, panis similagineus, frumentum triticeum, tandiu in aqua coctum, donec fiat (inquit) sicut puls: id Galli vulgo appellant [froumentée.] Alicam nonnulli esse existimant.
- Ad hæc, pedes, vètres, & capita animalium, sed præsertim hœdi, & veruecis: hæc enim & multum alunt, & crassi ac tenacis succi sunt. Circa initium fracturæ vsque dū callus gignitur, (quod ferè circiter decimum diem contingit) egrum tenuissimè cibato. Cibi namque subexiles (vt censuit Hippocrates) & non validæ materiæ tunc satis sunt. Venā interdum, cū scilicet res exposulat, secato, & per ventrem superuacua expellito. Carne & vino vsque ad decem dies, ex Hippocratis præscripto, abstineto. Post hoc tempus, vinum crassum & stypticum audacter concedito, tamen si Celsus vinum per omne tempus alienum esse dixerit. Magnitudo calli nec minor quàm par est, nec maior iusto sit, sed mediocritatē ad vnguem seruet: qui enim iusto minor est, hæc ossa parū rura reddit, qui maior est, dolorem musculis inuehit. Ergo calli magnitudo, vt breuiter dicam, ea sit, quæ & ossibus tuto vinculo sit, nec musculos

Callus quibus notis generari deprehendatur. Victus poro gignend aptus.

Lib. 6. Metho.

Lib. de fracturis.

Pori magnitudo.

tamen comprimat. Attendendum verò diligenter est, quemadmodum nos Galenus admonet, vt vel promoueatur, si minor iusto proueniat, vel inhibeatur, si immodicè crescat. Quibus verò hæc efficies, paulò post dicemus. Atque hæc de pori generatione, qui tertius erat scopus, in curâdis fracturis nobis propositus, dicta sufficiant.

4 Superest igitur de quarto, & vltimo scopo agamus, qui

Quartus dispositionum præter naturam, quæ fracturæ interueniunt, emendationem, atque ablationem concernit. *scopus.* Eæ autem ferè sunt, dolor, inflammatio, pruritus, vulnus, immoderata siccitas, aut humiditas callo gignèdo obliuens, *Symptoma* gangræna, durities, pori magnitudo, aut deficiens, aut excedens. Itaque si dolor, aut inflammatio adlit, deligationem, si iam facta est, statim soluto, & lanam, oleum, & acetum, congruèque id genus alia auxilia parti dolenti, *ita quæ fracturam committantur.* atque inflammatæ admoueto. Sed neque priusquam hæc sedata fuerint, vel deligaturam adhibeto, vel ferulas circumponito, nisi duntaxat eatenus, vt membrum fulciant, & vt impositum medicamentum contineant, hoc est, laxè

Fomentum admodum. Celsus consulit liberale fomentum aquæ *aqua calidæ.* calidæ, dum inflammatio adest, cum verò ea deest, modicum. Sedata inflammatione, & dolore sublato, deligationes, & ferulæ, vt suprà diximus, adhibendæ sunt.

Pruritus. Sinoxius pruritus accidit, & erosa à saniei acrimonia (vt aliquando contingit) cute exulceratio cõcitur, aquæ temperatæ tantum superinfundere oportet, quâ tum ad euocandam eiusmodi saniem est satis. Hoc quidem Hippocratis & Galeni consilium fuit. Recentiores autem chirurgici aquam salis infundi præcipiunt, aut vngueto albo, vel eo, quod vulgò populeum appellatur, membrum illi-

Vulnus. ni, & vt suprà dictum est, deligari. Cum ossis fracture, carnis quoque vulnus accessit, siue statim ab initio id factum sit, siue postea à chirurgo inductum, vt ossium fragmenta, & ea præsertim quæ pungunt, eximantur, si quidem sanguis profundatur, hunc prius aptis remediis sistito. Si *Contusio.* inflammatio oriat, præsidis in eam efficacibus vitior. *Gangræna.* Si carnes contusæ sint, partem affectam, vt gangræna periculum euitetur, scarificato. Quòd si gangræna quoque ipsa, aut alia quæpiam serpens putredo, iam occupauit, conuenienter occurrito: horum autem omnium cu-

ratio

rationem in superioribus libris tradidimus. At si nihil horum adfuerit, neque magna offis pars nudata sit, hamulis futurisque vfi, his medicamentis, quæ cruentis imponuntur, medebimur, prius tamen fragmentis ossium se euulsis. Cæterum deligatura fracturæ eiusmodi cum vulnere factæ, hoc modo adhibenda est. Orbiculares fasciæ partibus vulneris utrobique, hoc est ab utraq; vlcis parte, iniici debent, obliquè verò supra ipsum vulnus in longitudinem collocandæ sunt, sic vt per decussim ad X literæ similitudinem iuxta hiatum occlusio ex omnibus fiat. Hippocrates tamén à prima statim circumuolutione, fascia latiore totum vlcus comprehendit, ita vt nulla eius pars nuda relinquatur. Itaque si sordidum adhuc vulnus est, expurgantia medicamenta, quando opus erit impones. Si purum, carnem producentia, linteolis illita, aliâque vfu comprobata materiam adhibebis. Hippocrates tamen statim ab initio* picatum ceratum, quod ceram in rosaceo, aut oleo colliquatam, & picis siccæ aliquantulum assumit, supra vulnus in linteolis adhibet. At Galen. auctore vtilius à tertio die, cum ea quæ in vlcere sunt concoquat, adhibetur. Cornelius Celsus omnibus his vulneribus primò imponendū iubet linamentū vino madens, cui rosæ paulum admodum adiectum sit. Si æstiuum tempus est, (inquit Hippo.) splenia vino frequenter sunt irriganda: si hyemale, lanæ multæ succidæ ex vino & oleo superimponendæ sunt. Lanarum nanque superpositione, & olei commissione refrigerationis vehemētia (quæ in huiusmodi affectibus conuulsionis periculum interdum inuehit) obtunditur. Vino autem madefactæ plagulæ, ob vinum reprimendi vim habent. Cæterum vbi purgata vlcera fuerint, & in eis iam caro concreuit, ferulæ non incōmode inilicientur: aliqui verò etiam ab initio ipsas accommodat, vlcis locum vitantes, & prout necessitas, ac vsus tulerit, ipsas modò constringunt, modò remittūt: sed hæc curandi ratio ab Hipp. & Corn. Celso non probatur. Hi enim pluribus tantummodo, & latioribus fasciis, ferulas ne videlicet comprimendo lædant, similiter & canales omnino reiicientes, deligaturam in eiusmodi fractura, quæ cum vulnere incidit, fieri iubet, laxius scilicet quàm si ea plaga non esset: adeo vt assulciscē quidem, non compressæ tamen

Deligatura fracturæ cum vlcere accommodata.

Hippoc.

Ferula quando in fracturâ vlcis adhibenda.

Cor. Cels.

fasciæ ipsæ esse videantur. Ita namque (inquit Celsus) numero fasciarum efficietur, ut laxæ quoque æquè contineant. Ac satius quidem est, sæpius circuire, ut ante Celsum scripserat Hippoc. quàm astringi. Sed & in eas fascias multiplices ingerendum subinde, eodè Celsi autore, est calidum oleum, & vinum: magis que ubi sic cum vulnere fractura à principio incidit, fame, id est, exquisitiore victu utendum, vulnus calida aqua fouendum, frigusq; omni ratione vitandum, & transcendendum ad medicamenta, quæ puri mouendo sunt idonea: maiorq; vulneris quàm ossis cura agenda. Vt autem de hac re quod ad ferularum appositionem attinet, sic apud autores etiam eximios cōtrouersa, id quod res est semel statuamus, hoc tibi tanquam axioma, id est, pronuntiatum esto. Cum fractura cum ulcere interdum in longitudinem membri contingit, tunc ex utraque ulceris parte ferulas etiam ab ipso curationis principio circumdare licitum esto. Cum verò transversum vlus euasit, idque maxime si maius sit, ferulas statim ne imposito. At si squamula aliqua ex osse resoluitur (id quidem colligi ex eo potest, quod & copiosior, tenuiorq; humor profluit, & caro circa vlus laxa, & mollis effecta intumescit) deligatura laxiore ad curationem utendum est, ne scilicet pus intercludatur, sed effluere facile queat: frequentiusque, ut consulit Hippocrates religandum, quoad os recesserit, ferulæque non apponendæ. Vbi verò vel hamulo, vel quopiam alio eiusmodi instrumento squamam euulseris, deligatura iterum validiore membrum adstringes. Porro per totum id, quo vlus curatur tempus, medicamen aliquod, ex his quæ inflammationem arcent, linamentum continens vulneri incumbet, ac simplices fasciæ iniiciuntur, quæ singulis curationibus resoluuntur, cum aliæ supra dictæ remaneant. Inter hæc autem, si quod paruulum fragmentum ossis eminet, si id retusum est, in suam sedem dandum, si acutum, antè acumen eius longius est præcidendum, si breuius limandum, & utrinque (inquit Celsus) scalpro limandum. Tum ipsum recondendum est: ac si id manus facere non potest, vulsellæ (quali fabri utuntur) iniicienda est, rectè se haberi capiti ab ea parte, qua sima est, ut ea parte qua gibba est, eminens os in suam sedem compellat. Si id maius est, & membranulis fragmenta cinguntur, sinere oportet ea sub medica

*Si ossis pars
aliqua re-
cessura est.*

*Si fragmen-
tum ossis e-
minet.
Lib. 8.*

medicamentis resolui, idque os vbi iam nudatum est, ab-
 scindere: quod maturius scilicet faciendum est, potestque
 ea ratione & os coïre, & vulnus sanescere: illud suo tēpo- *Si fragmen*
 re, hoc prout se habet. Nonnunquā etiam (inquit) in *ta velut e-*
 5 magno vulnere euenit, vt fragmenta quādam velut emo- *moriātur.*
 riantur, neque cum cæteris coëant. Quod hīc quoque
 ex modo fluentis humoris colligitur, quo magis necessa-
 rium est, sēpius vlcus resolvere, atque nutrire. Sequitur *Vulnus in-*
 10 verò, vt id os per se post aliquot dies excidat. Cæterum cū *terdū ma-*
 tam misera antea cōditio vulneris sit tamen id interdum *ius efficien-*
 15 maius, diutiusque facies. Sæpe enim integra cutis offe- *dum.*
 20 abrumpitur, protinusque prurigo, & dolor oritur. Quæ
 25 soluere (si accidit) maturius oportet, & fouere aqua per
 ætatem frigida, per hyemem egelida. Deinde ceratum *Si fractura*
 30 myrteum imponere. Interdum fractura quibusdam velut *quibusdam*
 aculeis carnem vexat, quo à prurigine, & punctiōibus *velut acu-*
 cognito, aperire id melius, eōsq; aculeos præcidere necesse *leis carnem*
 habet. Reliqua verò curatio in vtroque hoc casu eadē est, *diuexet.*
 quæ vbi ictus protinus vulnus intulit. Haftenus Cor. Cel-
 35 sus de fractura cum vulnere facta. Nunc cætera prosequa- *Siccitas cal-*
 mur. Dum valēter nimis siccantur ossa, callus ægrè proue- *lo gignendo*
 nit: expedit igitur istis ita resiccatis ossibus tertio, vel quar- *obstans.*
 to die modice aquam calidam infundere. Hanc metam fi-
 niendę perfusionis habētes, cū carnes in rubrum tumo-
 40 rem attollūtur. Atque in iis quidē, priusquam subsidere
 incipiant desistendū est. Contra, vbi digeri quid volumus,
 non prius est desistendum, quā quod ex perfusione in- *Humidi-*
 tumuit, subsidat. Si verò humiditas abundantior calli ge- *tas calli ge-*
 45 nerationem impediat, ibi hanc siccare cōuenienti deliga- *nerationē*
 50 tura & perfusione aquæ, quæ vel minima omnino sit, vel *impediens.*
 55 plurima conabimur. Quippe minima (vt sexto methodi
 60 Galenus ait) cum prius desistat, quā aliquid confluat, &
 65 qui ad manum, id est, in superficie, sunt humores, per ha-
 70 litum digerit, & qui in alto sunt modice liquat. Expedit
 75 autem ita solui liquarique ea, quæ per deligaturam sunt
 80 expellenda. Plurima verò perfusio plus digerit, quā at-
 85 trahit: atque ita commodat superflux humiditati. Atten-
 dendum verò (vt supra monuimus) diligenter est, vt vel
 augeatur callus, si minor iusto est: vel inhibeatur, si ni-
 mius superuenit. Vtrumque autem vitium corrigitur

Qua ratione porus, vel augeri, vel minui possit. perfusionis quantitate, & qualitate ciborum etiam, ac medicamentorum, quæ extrinsecus apponuntur, facultate. Ac de perfusionibus quidem, & victus ratione, iam supra est dictum. Ex medicamentis verò quæcunque emplasticam substantiam habent (cuiusmodi est emplastrum, quod ex pice conficitur) ac modicè calfaciant, ea (Galeno auctore) callos tum promouēt, tum verò augment. Alimentum enim copiosius in locum perfractum attrahunt, sicuti & moderatæ aquæ temperatæ, perfusiones, & idoneæ frictiones. Quæ verò digerendi vim obtinent medicamenta, ea cal-

Si nimius callus super increment.

Lamina plumbea.

Si callus in lapideâ duritiâ & insignè nimis magnitudine euaserit.

Si ossa diuersa inter se conferueant, & membrum distortum callus firmaverit.

Ossa quâdo iterum frangenda.

los maiores iam factos eidem Galeno imminuunt. Cum recens adhuc callus est, medicamentis valde astringentibus Paulus vtendum esse censuit, compressamque admodum deligationem adhibendam, lamina plumbea etiam interdum imposita: hæc enim calli excrescentiam mirè reprimunt ac imminuit. Huic rei efficaciter quoque subuenit Celsus, multa leuissimæ ex oleo, & sale, & nitro, membri perfrictio, plurimisque ex aqua calida salsa fectus. Post hæc malagma quod digerat imponendum, adstrictiusque alligandum esse admonuit, imo verò oleribus, & præterea vomitu vtendum, Siquidem per hæc (vt existimat) cum carne callus quoque extenuatur. Conterit etiam eidem, aliquid de sinapi cum sic in alterum par membrum imponere, donec, inquit, id paulum erodat, eoque euocet materiam. Atque ubi is tumor extenuatus, & qui nimis supercreuerat callus, ad mediocritatem reductus fuerit, rursus ad ordinem vitæ reuertendum erit. At si solidus, lapideusque callus, qui sic immodicè increuit, iam euasit, aperta ibi cute deradendus est, parsque eius eminens scalpbris, & terebris etiam, si res exigat, ad motis excidenda est. Cæterum solent aliquando in fracturis diuersa inter se ossa conferuere, & membra distorta callo firmari, difficultate functionum obeundarum haud exigua subsequente. Quod ubi contingit, & breuius membrum, & indecorum fit, & si capita acutiora sunt, assiduas punctiones sentiuntur. Ergo ubi perfracta ossa sic conferbuerunt, & perperam ferrummata sunt, si tener saltem adhuc callus est, & non ultra sex menses, vt quidam dixerunt, radices egerit, frangere rursus, & dirigere ea oportet. Id hoc modo fit. Calida aqua multa, vel decocto aliquo emolliente diebus aliquot

aliquot membrum id fouetur, & ex cerato liquido perfri-
catur, aut emplastro ex althæa, vel cataplasmate ex ficis
pinguibus aridis aliisque medicamentis callum soluenti-
bus (porolytica Græci dicunt) contegitur. Deinde facta
5 sufficiens emollição, modo quem suprà posuimus, à mi-
nistris duobus qui in diuersa contendant intenditur: & in-
ter hæc medicus chirurgus pertractans ossa, vt callo adhuc
tenero existente, manibus ea diducit, compellitque id
quod eminet in suam sedem, & si parum valuit ab ea par-
10 te, in qua os se inclinat, inuolutam lana regulam obicit,
atque ita deligando (inquit Celsus) assuescere iterum ve-
tustæ sedi cogit. Nostræ ætatis chirurgi malè ferrumina-
tum os, in fractura non admodum antiquata, diebus plus
minus quindecim, vt suprà diximus, primùm emolliunt.
15 Deinde id in diuersa extendi iubent, & genu vehementer
impulso, iterum frangunt: quod tamen vetustiores medi-
ci non probarunt. Mox fracti ossis fines adamussim secum
coaptant, ac vt suprà exposuimus curant. Si ab osse per-
peram ferruminato, vetustas iam occupauit, ac callus ve-
20 hementer obduruerit, satius est manum illi (vt consuluit
Albucasis) non admoliri. Quicunque enim id rursus fran-
gere aggressi sunt, post vehementes cruciatus in extrema
discrimina laborantes adduxerunt, adeo vt valde pauci
eorum, qui hoc tormenti genus perpeffi sunt, mortem eua-
25 serint. Atqui melius est eum, qui sic affectus est claudica-
tu, aut membri alicuius deformitate affectum, ad annos
adhuc multos superstitem remanere, quàm post talem, tan-
tùmque cruciatum, miserrimè sic inter manus crudelis
chirurgi occumbere. Adde quòd sæpenumero alio loco,
30 quàm vbi fractura iam coierat, os ipsum quod lapidosus
callus firmauerat, frangitur: vt præter quotidianum ex-
perimentum, nobis autor extitit Auicennas. Quòd si la-
borans, & qui illi assident amici, importunis precibus, at-
que assiduo rogatu te compellant, vt ossis eiusmodi ma-
35 lè ferruminati, & cuius callus iam obduruit, ac inuetera-
uit, curationem suscipias, in angusto spem esse coram illis
præfator: deinde opus aggreditor. Summam igitur cu-
tem, & carnem callo superiacentem cultro rasorio aut scal-
pello dextrè, ac prudenter secato, magna cura habita, ne
nerui, musculi lædantur: deinde ossium, quæ non rectè

*Quid agat
chirurgi re-
cēiores in
osse malè
ferrumi-
nato.*

*Si ab ossi
malè agglu-
tinato vetu-
stas iā oc-
cupauit.
Albucasis.*

Auicennas.

*Ex recen-
tioribus.*

coaluerant, agglutinationem, seu continuationem (quod aiunt) excisoris scalpris dissoluito: mox verò eorum sic ductorum fines secum ad amussim coaptato, ita vt pristinam vnionem, quoad licebit, imitentur. Demum cætera fiant quæ supra scripsimus. Cæterum si ex attritu, membri corruptelæ metus impendet, protinus scarificandum erit, reliquæque facienda, quæ supra, in gangrænâ, & sphaceli curatione diximus: si verò tophacea aliqua durities post ossis perfracti agglutinationem remanserit, ea modo qui in antidotario exprimeretur discutienda, & tollenda

Si membrum ex attritu corruptum sit.

Si fractura sine callo supra definitum tempus remanserit.

erit. Fracturæ quædam, supra definitum naturæ tempus, sine callo interdum permanent, quod ob varias causas solet accidere, nempe vel ob assiduas solutiones, vel ob immodicas superfusiones, quas & fomentationes vocant, vel ob intempestiuum motum, vel ex fasciarum multitudine, nonnunquam etiam quia totum corpus, non sufficienter alitur, quo in casu membrum quoque ipsum (vt Paulus annotauit) gracilius euadit. Oportet igitur cum aliis, tum præcipuè maciei corporis occurrere: quod commodè fiet, si vel calidis admotis materiam ad membrum perfractum euocemus, vel alimentum copiosius subministremus, & balnea, reliquasque animi voluptates adhibeamus.

Libr. 6.

Note ossis perfracti callo firmari incipientem.

Porro eorum quæ iam callo firmantur, indicio esse, cum alia tum illud præcipuè potest, si fasciolarum cruentæ conspiciuntur, nullo etiam in parte oborto vulnere. Quòd idèò forsan accidit, quoniam calli substantia, dum coit, in ossium cauernosos meatus perrumpens sanguinis guttas aliquot inde extundit, exprimitque. Ac de transuersis quidem fracturis, hæc dicta sufficiant. De longis verò, quæ non tam crebrò contingunt, reliqua omnia ad eundem se habent modum. Cæterum comprimendæ hæc magis (Galeno autore) in ipso fracturæ loco sunt, tum quod recessit, retrudendum introrsus est. Ac de fractis quidem ossibus hæcenus in vniuersum dictum sit.

Lib. 6. methodi.

FINIS LIBRI QVARTI


chirurgicarum institutionum, de fracturis,

Ioanne Tagautio Doctore medico autore.

*

FOR

FORMVLA GLOSSOCOMI,
instrumenti ad gignendum callum in fractu-
ris idonei, cuius pluribus in locis me-
minit Galenus.



*A, Axis. B, Laqueus translativus. C, Laqueus in rectū pro-
cedens. D, Trochlea, seu rotula. E, Tabella. F, fractura.*
Vide huius machina seu instrumenti descriptionē apud Galenum
lib. de vsu partium. VII. & lib. VI. de morbis curandis. Item in
commentarijs eiusdem in librum secundū Hippocratis de fractura.



GENERALIS DI-

VISIO LVXATIONVM,

in librum quintum Chirurgicarum

institutionum Io. Tagau

tij Medici.

*

Luxatio, Græcis exarthrema, osu è sua sede dimotio.

Simplex. Nulli alteri affectui coniuncta.

Composita. Alteri præter naturam dispositioni complicata.

Luxatio tam simplex quàm composita,

Perfecta, siue absoluta, aut completa.

Imperfecta, siue non absoluta.

Completa luxatio, siue absoluta,

Cùm os suo loco omnino excidit.

Generis nomen retinet, diciturque absolutè **Luxatio** Romanis, & **exarthrema** Græcis.

Luxatio imperfecta, siue incompleta,

Cùm os, non in totum, sed aliquatenus duntaxat suo naturali positu dimotum est, diciturque **subluxatio** Latinis, **parathrema** Græcis.

Subluxatio, seu imperfecta luxatio,

Peruersio, siue distorsio.

Laxatio, seu elongatio ligamenti.

Peruersio osu, quæ spina vertebræ maximè est peculiaris.

Lordosis, } in { priorem partem.

Cyphosis, } posteriorem partem.

Scoliosis, } latera.

He pro-
prie diffe-
rentia non
sunt, sed cõ-
plicati af-
fectus.

Composita luxationum differentia posterioris seculi chirurgi.

Luxatio cum

{ fractura,
{ inflammatione,
{ vulnere,
{ dolore,
{ duritia,

INST



INSTITVTIO NVM CHIRVRGI-

CARVM IOANNIS
TAGAVTII

MEDICI,

LIBER QVINTVS.

De luxaris ofsibus in vniuersum.

*Quid luxatio, quæ sint luxationum differentie, &
quot modis ossa luxentur,*

20

C A P. I.

25



Vum luxationes fracturis proxi-
mæ sint, cõsequens est, vt de iis ge-
neratim, (quæadmodũ & de alijs
suprà, in quatuor libris superiori-
bus, commemoratis affectibus, se-
cimus) nunc sermonem faciamus.
Luxatio igitur, vt formula quadã
definiatur, est articuli è natiuo po-
fitu, seu proprio (quod dicitur) a-

*Luxatio
quid.*

30 cerabulo, in alienam atque insolitam sedem prolapsus,
quo motus arbitrarius impeditur. Græci exarthrema vo-
cant. Huius autem (vt Paulus inquit) nullæ aliæ differen-
tiæ habentur, præter eam quæ ex maioris minorisque ra-
tione sumitur. Quum enim articulus sua sede in totum
35 excussus deciderit, communi generis vocabulo Græcis
exarthrema, Latinis luxatio dicitur. Si autem è compa-
gibus suis paululum duntaxat emotus est, aut vsque ad si-
nus seu cavitatis supercilium (nonnulli marginem vo-
cant) prolapsus, nobis subluxatio, Græca vero cõsuetudi-
ne pararthremanominatur. Sub qua sanè differentia, &
laxationem

*Exarthre-
ma.*

*Pararthre-
ma.*

luxationem, seu vt vulgares chirurgi Auicennæ interpretem sequuti loquuntur, elongationem ligamenti cōprehendimus, sicuti & distortionem, ac peruerſiones cum pluribus ossibus, tum verò maximè spinæ vertebris familia-

Ca. II. li. 8. *Quæ ossa inter se dehiscant.* res. Ossa duobus modis potissimum suis sedibus Celsus mouentur. Nam modò quæ iuncta sunt inter se duntaxat (inquit) dehiscunt (vt cū latum scapularum os ab humero recedit, & in brachio radius à cubito, & in crure tibia à fura, atque etiam interdum à saltu, calcis os à talo, quod rarò tamen fit) modò verò suis acetabulis ex toto prolabuntur, hoc est, suis omnino sedibus excidunt. Ver-

Quæ ossa propriè luxantur. tebræ nanq; & articuli propemodum omnes, tametsi validis nervis ac ligamentis comprehendantur, sæpius tamè suis sedibus elapsi decidunt: aut vi scilicet expulsi, aut aliquo casu nervicis ligamentis vel ruptis vel infirmatis, faciliusque in pueris & adolescentulis, quàm in robustioribus. Itaque modus hic posterior exarthrema: prior verò, quò tantum ossa dehiscunt, & suis ex toto finibus haudquaquam prolabuntur, pararthrema non immeritò appellabitur. Atq; hæc sunt luxationum discrimina seu differentiæ. Præter has tamen aliquot adhuc alias posterioris ætatis chirurgi statuerunt, quæ reuerà differentiæ non sunt, sed potius quædam veluti præter naturam dispositiones, cum luxatione complicatæ: vt cū ipsi luxationi accedit inflammatio, aut fractura, aut vulnus, aut dolor aliquis ingens, aut tophacea quædam durities. Hæc enim dolor inquam, fractura, durities, vulnus, & inflammatio, cū seorsum & per se subsistere possint, nullius vnquam alterius (si saltem Galeno credimus) differetiam constituent. Si quis tamen proteruè contendat, differ-

*Affectus
eius luxationis
complicati.*

Modi luxationis à differentiis sumpti.

tias esse, cum eo certamen inire recusamus: quādoquidem hæc curandæ luxationis rationem & peruertunt, & non parum aliquando inturbant. Ac de his quidem in sequentibus suo loco dicemus. Cæterum modis quatuor potissimum, quod ad situs differentias attinet, contingit ossa luxari aut perverti, seu aliquatenus detorqueri: in partem nimirum priorem seu anteriorem, posteriorem, interiorem, & exteriorem. Alij superiorem & inferiorem addunt. Quædam autem in omnes quatuor partes, quædam in certas promouentur. Sed præstat singulorum exempla

- empla subiicere. Maxilla superior, cum non in homine so- *Maxilla*
lūm, sed & in omni animante, præterquam in crocodilo, *inferior,*
immobilis existat, luxatione non periclitatur: inferior ve- *qui luxa-*
rò subinde oris hiatu in anteriorem partem luxatur, *tur.*
- 5 ternaturve ac perueritur, hoc est, aliqua ex parte distor-
quetur, & ex naturali situ in alterum repente transmuta-
tur, quod verbo *σχαται* expressit Hipp. Sed modo altera
parte, modo utraque: toto autem loco non admodum ex-
cidit, ut idem annotavit Hippocrates: quippe quòd capi-
10 ta, id est, extrema, qui & processus appellantur, habeat in
superiori maxilla, firmiter ac tutò cardinis modo infixæ,
ex quibus nervosi tendones, validis annexi musculis, exo-
riuntur. Itaque hanc nunquam luxari cōtingit, nisi quàm
maxima oris apertio fiat. Ut cum vel maximam rei alicu-
15 ius molem ore excipere quispiam conatur, vel cum osci-
tando quàm maximè potest, os diducit, & in alteram par-
tem os traducit, quorum primum rarò contingit, secun-
dum (inquit Galenus) euenire demētibus tantum potest.
- Capitis processus, in duos sinus summæ vertebræ di- *Capitis lu-*
20 missi, in omnes partes prolabūtur: sed dum in partem po- *xatio.*
steriorem excidunt, mentum pectori agglutinator, æger
neque bibere, neque loqui potest: atque illi celerrimè mors
superuenit. Vertebræ in spina & in posteriorem partem, *Vertebra-*
& in priorem, tam supra septum transuersum, quàm infra *rum spina-*
25 subinde peruertuntur, ac nonnūquam etiam ex toto pro- *luxatio.*
labūtur. Sed cum toto loco mutatæ sunt, nulla restitutio-
nis spes relinquitur, præcipitèque etiam mortem infe-
runt. Nam intra triduum (ut Celsus ait) homo moritur.
- Clauicula (quam soli homini inter cætera animantia con- *Clauicula*
30 cessam esse Paulus existimauit) nunquam in totum exci- *qui luxa-*
dit: quippe quæ pectori ita committatur, & inhæreat, ut
ne moueri quidem in ipso possit. Interdum tamen ex vio-
lenta quadam extrinsecus facta percussione, paululum
auellitur. Sed neque altero fine, qui humeri articulo inse-
35 ritur, excidere admodum potest. Nam & à bicipiti mu-
sculo, & summo humero prohibetur. Brachij seu humeri *Brachij ca-*
caput, quod in sinum omoplætæ seu scapulæ demittitur, *put.*
modo ad ima in alam decidit, idque frequenter, sed in iis
maximè, qui non multa carne præditi sunt, modo (licet
rarò) in priorem & exteriorem. In superiorem verò ferè
nunquam

*Genu in
tres partes
luxatur.*

*Cubitus,
manus, &
femur, in
4-partes
prolabun-
tur.*

nunquam promouetur, vt quod ab vtroque scapularum processu, & eo scilicet, qui anchoræ similis est, & quod acromion Græci vocant, impediatur. Genu in tres partes excidit, interiorem nimirum, anteriorem, & posteriorem iuxta poplitem. In priorem prolabi opposita patella prohibetur. Meges tamen eum cui in priorem partem excidisset, à se (vt Celsus refert) curatum esse memorizæ prodidit. Cubitus, manus, & femur, in omnes quatuor partes prolabuntur, nempe in interiorem, anteriorem, & posteriorem: Atq; hæc pro exemplis adducta sint. 10
Nunc ad communem de luxatis ossibus tractationem reuertamur, & iuxta morem à nobis hæcenus obseruatum, causas, signa, prognostica, & curationem luxationum in vniuersum persequamur.

De causis & signis luxationis ossium in vniuersum.

15

C A P. I I.

*Cause ex-
terna.*



Ausæ luxatorum ossium & à sua sede motorum, quædam sunt extrinsecus ingruentes, vt casus, percussio, & violenta atque incongrua membri alicuius extensio, aut distortio, seu 20 peruersio. Quædam verò intrinsecus eue-

*Cause in-
terna.*

niunt, atque ideo internæ dicuntur, sicuti & superiores externæ: vt cum mucosus aliquis humor, & pituitosus, in articulis seu iuncturis acervatur, qui articulationis ipsius ligamenta primùm madefacit, deinde laxiora reddit, & 25 tandem ob eius multitudinem, sua sede os ipsum protrudit. Signa luxationum, quædam sunt omnium communia, quædam verò propria cuiusque. Ac de communibus duntaxat hîc agemus. Hæc autē factionis Arabicæ principi Auicennæ à tribus potissimum desumuntur. Nempe 30 vel à substantialiter (vt loquuntur) inhærentibus, hoc est, ab iis quæ secundum essentiz rationem insunt: vt à mala partis ipsius laborantis constitutione seu compositione, in qua & tumor præter naturam ea parte qua os prorumpit, & sinus seu cavitatis insolita ea à qua recessit, manife- 35

*Signa luxa-
tionis ossium
cõia à tri-
bus potissi-
mum desu-
muntur.*

1 itò apparent. Vel ab iis, quæ ex necessitate consequuntur (casus & accidentia vocant) vt à dolore, qui ex luxatione contrahitur. Vel ab actione læsa, seu operationibus etiam ex necessitate consequentibus, vt à motus afflictæ partis difficultate, aut priuatione. Hæ itaque notæ in luxatis omnibus

omnibus deprehenduntur, aliæ verò in singulis.

De prognosticis seu iudicijs luxationum.

C A P.

I I I.



Consequens est, ut communia quedam de luxationibus iudicia, quæ & prognostica vocant, hoc loco subiiciamus. Primum pronosticum ex Auicennæ & aliorum quorundam scriptis erutum, ad hunc modum habet: **Q**uibus luxationibus inflammatio, aut vulnus, aut dolor ingens & acris accedit, hæ præterquam quod curatu admodum difficiles sunt, periculo quoque non vacant. Adeo ut aliquoties in iis casibus tutum non sit, luxatæ particulæ reductionem aggredi, sed sic eam remanere (ne pro læsione mors sequatur) melius esse censent. Aliud. Vetusque omnes luxationes & quæ spacio temporis iam callo obduerunt, vel difficillimè, vel nunquam confanescunt. Proinde statim, si fieri potest, reponi luxata debent. **L**uxatio, in qua (inquit Guido) franguntur margines ossium, hoc est sinus seu cavitatis supercilia, pessima iudicatur. Repulsi enim in suum positum articuli, inibi diu persistere non possunt, sed leuissima quaque occasione iterum relabuntur. Articuli qui nervorum ac ligamentorum vitio prolapsi sunt, & postea in suas sedes compulsi iterum excidunt. Indicium euidens ossis in suam naturalem sedem reducti, est, cum veluti strepitus aliquis auditus est, dum in nativum suum acetabulum ingrediebatur: & membri nuper luxati figura & conformatio, suæ ipsius aut alterius paris figuræ, quàm simillima tum visu tum tactu deprehenditur. Cæterum si reposito osse nervi distenduntur, rursus id protinus (ut consultat Celsus) expellendum est. Ut excidere omnes articuli non possunt, sic non omnes reponuntur. Caput enim si in partem (ut supra diximus) posteriores aliquando prolabitur, nunquam in suos sinus compellitur, sed mortem statim adfert inevitabilem. Sic neque in spina vertebræ cum toto loco mutare sunt: neque etiã maxilla, quæ utraq; parte prolapsa est, & antequam reposita sit inflammationem concitavit, ut Celsus memoriæ prodidit. Ossa, quæ suis sedibus moventur, alia aliis facilius, alia difficilior & excidunt & reponuntur: nempe pro ratione & natura

Genu. & natura iuncturæ unde propelluntur. Itaque genu ut facile prolabitur, sic non magno impedio in suam rursus sedem compellitur. *Digit.* Digitorum luxatio nullum etiā facessit negotium. *Cubitus.* Cubitus verò ut tardius quidē ac difficilius excidit, ita prolapsus negotij plurimum exhibet. Aegerime enim propter tuberculorum, seu eminentiarum, sinuumque frequentiam reponitur. *Humerus.* Humerus autem, ut neque difficiliter admodum præsertim in macilentis, elabitur, sic nec difficillimè in sedem suam reponitur. Et ita de aliis. *Nervorum* quoque eò cōfert (ut Celsus inquit) & corporis, & nervorum, hoc est, tendinum, habitus. Nam si corpus tenue ac macilentum, si humidum est, si nervi & ligamēta infirma, expeditius os reponitur. Sed & primò facilius excidit, & postea minùs fideliter continetur. Quæ contraria his sunt melius continent, sed id quod expulsum est difficulter admittunt. Quibus in pueritia articuli exciderūt, neque repositi sunt, minus quàm cæteri crescunt. Quæ loco suo non sunt, caro ea increfcit, magisq; in proximo membro, *Ex Hipp.* quàm in vltiore. Vtputà si humerus loco suo non est, *& Celfo.* maior in eo ipso fit, quàm in brachio, & in hoc (brachio inquam) maior quoque, quàm in manus acie. Tum pro sedibus & pro casibus qui inciderunt, aut maior aut minor usus eius mēbri relinquitur: quoq; in eo plus usus superest, eò minus id extenuatur. Inter luxatorum eiusmodi prognostica numerantur & duo hi sequentes Hippocratis aphorismi. Quibusunque à coxendicum dolore molestatis, excidit coxa, & rursus incidit, iis mucres superueniūt. Quibusunque à coxendicum dolore molestatis diuturno, excidit coxa, iis crus tabescit, & claudicant, si non vran-
 10 tur. Hos autem nunc sic coniunctim legimus & interpre-
 20 tamur. Quibusunque à diuturno coxendicum dolore confectis, propter mucoris seu mucosi humoris ac pituitosi copiam, in articulo siue iunctura coxæ coaceruaram, τὸ ὀσχεον, id est, coxa ipsa, (hoc est femoris caput, quod in
 30 coxæ siue ossis ischij cauo inferitur) suo naturali acerbulo propulsa excidit, & rursus incidit, id est, in nativam suam sedem iterum sponte resiliit, aut aliter repulsa est, inibi tamen diu persistere non potest, sed soluta compage lubrica continenter relabitur iis processu temporis crus, quod Græcis οὐρά dicitur, hoc est, totum membrum,
 ram

Apho. 59.

et 60. l. 6.

Interpretatio duorum aphorismorum Hippo.

tam tibia scilicet quàm femur, necessariò alimonix penuria contabescit, & ariditate conficitur, omnesq; in claudicationem euadunt, si non vrantur, hoc est, nisi prius ferramentis igne candentibus vrendo, & mucus ille qui ossis ischij sinum occupat, absumatur, & laxitas cutis, ad quam femoris caput subinde lubricum procidebat contrahatur.


De ratione curandi luxata in vniuersum. C A P. IIII.



Vnum luxata suo natiuo positu, in aliena atq; vt supra retulimus) insolitam sedem prolapsa sint, vna nimirum communis omniũ luxationum curandi indicatio erit. Nempe luxati articuli & suo loco moti in propriam ac naturalem sedem reductio. Porro, vt scopum hunc primum & vniuersalem assequaris, luxatũ membrũ in diuersas partes, 15 decenter extendendũ est, donec spatium inter ossa liberũ sit. Tum id os quod suo loco excidit, ab ea parte in quam prolapsum est, in contrariam impellere oportet, atque ita in germanum suum acetabulum restituere: vt sinus seu cauitatis insolita vacuitas impleatur. Hæc autem leniter, 20 sine dolore, quatenus fieri licet agenda sunt. Cæterum nõ vna eademq; in omnibus extendendi ratio est: sed alia atq; alia pro natura scilicet partis luxatæ, proutq; nerui ac tendines valent, aut ossa huc illucve federũt. Modò enim manibus solis, modò habenis iniectis vtendum est, modò vero quædam alia machinamenta adhibenda sunt, vt ex vno Hippocrate, lecto lib. de luxatis & fractis, discere poteris. 25

Ab iis secundum quò tendes fuerit, vt membrum quod exciderat, & iam repositum est, non amplius deinceps sua sede prolabatur: sed inibi continenter persistat. Repositi igitur articuli iunctura, modis omnibus statim firmanda ac roboranda est. Firmabitur autẽ optimè, si rosaceo perlinatur, ac postea pannus aliquis lineus gracilis, vetus, & lenis rhodino delibutus, ipsi applicetur: deinde si stupæ lenes ac panni multiplices, ouorum candido perfusi, superaccommodentur, & postremo si fasciis posca madentibus, 35 pro ratione particulæ longis latisque, subligetur. Quintetiam ferulæ ex corio aut densa papyro factæ, si necessitas vocet, circumdandæ sunt. Cauenda autem semper est vehementior perstrictio, ne inflammationem moueat. Iis ita ritè apparatis, membrum in figura ei maximè naturali, atq;

*Secundus
scopus.*



à dolore alienissima, ad quietem, reponendum est. Nec vero ante diem septimum, aut etiam decimū, si nullum symptomata prauum accesserit, ipsum resolvere oportet, aut aliis adhibitis medicamentis curare, sed ita sinere. Porro nihil noxæ attuleris, si dum legitimo tempore resoluitur, & secundò curatur, aqua modicè calida foveris. Hic enim fortus gemina tunc ratione prodest. Nam & dolorem (si quis sit) demulcet, & quod in laborante particula noxium conceptum est, digerit. Vbi autem sic ut res exigit luxatum membrum foveris, mox huic emplastrū adhibebis, quod costet polline, id est, farina volatili, puluere rubro communiter appellato, & albo oui in vnum corpus redactis. Post hæc verò membrum strictius obligandum erit, ut Razes medicus Arabs percelebris consulit. Ad eundem quoque modum, vetus omnis luxatio, & quæ spatio temporis callo iam obduruisset, non modò fotum eiusmodi aquæ simplicis calidæ (qui in hac re plurimum confert) antequam reducatur, desiderat, sed etiam & eū, qui fit ex decocto maluæ, althææ, fœnigræci, atque id genus aliorum postulat. Quippe qui molliat, laxet, discutiat, & membrum aptius extensioni efficiat. Recentes verò adhuc luxationes, & quæ nuper inciderunt, eius naturæ foris tanquam sibi non parum incommodantes auersantur & respuunt. Hi enim calfaciendo ac humectando relaxant, & dissolunt: unde pars ipsa afflicta imbecillior redditur, & ad recipiendam fluxionem pronior. Proinde & inflammationi opportuna efficitur, & luxati sinus superflua humiditate oppletur.

Inde consequitur, ut articulus in nativum suum acetabulum diu persistere non possit, sed lubricus ab subterfugiens delabatur. Vetat etiam Auicennas pannos impensè calidos membro recentè luxato admoueri, ne fluxionem etiam euocent, & inflammationem eo loci excitent. Quin potius eos cerato (inquit) refrigeratorio, aut vino aliquo austero imbutos adhibere conuenit.

*Tertius
scopus.*

Cæterum luxato, ita ut dictum est, in suam sedem reducto, firmatoque, & ad quietem conueniente schemate seu figura reposito, ipsum à dolore, & inflammatione vindicandum est, qui tertius est scopus in curandis luxatis medendi propositus. Hunc igitur si cōsequi studueris, humorum in partē affectā influxum modis omnibus prohibeto.

- Si enim fluxione tentetur, & dolorem statim perſentifcet, & inflammationem experietur. Quæ duo incômoda in luxatis & fractis maximè vitanda ſunt. Hæc autem deuitabis, ſi quæ roborant & repellunt, parti luxatæ, v̄t paulo antè docuimus adpoſueris: ſi præterea tenuem ab initio probamq; victus rationem ægro imperaueris, illiq; venam, ſi nihil prohibeat, iuxta periti alicuius medici præſcriptū ſecueris: & ventrem, ſi opus eſt, purgante medicamento ſubdlexeris. Vtroq; enim auxiliij genere (purgatione inquam
 10 & ſanguinis miſſione) fluxionem (ſi commodè adhibentur) à laborante particula auertimus. Verùm enimuerò ſi antè quàm ad curationem voceris, luxata pars iam dolore infeſtetur, aut inflammatione occupetur, non prius eam in locum ſuum à quo excidit reponere tentabis quàm do-
 15 lor finitus fuerit, & inflammatio conquieuerit. Si enim membrum ſic dolore, aut inflàmatione affectū diſtendendo laceſſiueris, periculum eſt ne conuulſio, vel neruorum diſtèctio, aut aliud prauum id genus ſymptoma ſuſcitetur. Hoc præceptum in luxatis omnibus diligenter, curioſeq;
 20 obſeruandum: à Cornelio Celſo ex Hippocratis ſentètia, non minus doctè quàm eleganter, iis verbis traditum eſt, Quicquid loco ſuo (inquit) motum eſt, ante inflammationem reponendum eſt. Si illa iam occupauit, dum còquieſcat, haudquaquam laceſſendū eſt. Vbi finita eſt, tentan-
 25 dum eſt in his mēbris quæ id patiūtur. Oportet autem inflammationē ipſam atq; dolorē leuare ſuccida lana ex hydreleō, id eſt, aqua & oleo moderatè calido, aceti q; momēto ſuperimpoſita. Si verò etiam febris acceſſit, & oſſa quæ ſuo loco mota ſunt, validiſq; pleniſq; muſculis, & tendo-
 30 nibus còtineantur, curioſius omnia facienda ſunt: ſed maximè quæ ad victus rationem, venæ ſectiōnē, & purgationem attinēt. Cæterùm ſedato dolore, & finita omnino inflammatione, plenior victu (ſicuti & de fracturis dictum eſt) laborās reſci poteſt, cibusq; vti bonis, vti vino modicè.
 35 Ac ſub finem quidem curationis, ſi è ſentètia res ceſſerit, luxatum ipſum roborabis perfuſione aquæ decoctionis roſarū, abſinthij, & muſci albi quercini. Peracto foru, Guido à Cauliaco iubet ſuperponendū eſſe ſpanadrapū, quod vocant, aut oxycroceum. Sed iamq; ad vſus quoq; ſuos, id membrum ſenſim, ac ſuauius promouere oportet. Motus

*Quartus
 ſcopus, qui
 eſt acciden-
 tium corre-
 ctio.*

Ca. II. li. 8.

*Locus hic
 corruptus
 eſt apud
 Cel. quem
 ita reſtituē-
 dum puta-
 mus.*

enim ut in dolore, atque inflammatione noxius, ac (ut ita dicam) pestifer. sic aliàs luxato præsertim iam obfirmato, saluberrimus corpori est. Si luxatis ossibus vulnus quoque accessit, multa diligentia, ac etiã prudentia est opus. Dum enim hæc reponuntur, ingens periculum, nonnunquã & mortem etiã maturam inferunt. Nam cum ex diffensione adiacentes nerui & musculi inflammantur, dolores validi, convulsiones, & febres acutæ oboriuntur, atque hoc præsertim in cubiti gibbero, genu, superioribusq; articulis etiã magis. Quantò enim principalibus membris, luxati cum vulnere articuli, viciniore sunt, tantò maior timor est. Sed eo quoq; gravius periculum concitatur, quo maius membrum est, quòve validioribus nervis, aut musculis continetur. Ideoq; humeris femoribusq; metus mortis est. Ac si reposita ossa sunt, spes (inquit Cels.) nulla est. Non repositis tamen, nonnullum periculũ est. Eoq; maior in utroq; timor est, quo proprius vulnus articulo est. Eam ob rem Hippocrates horũ repositionem, valentiorẽq; deligaturam omninò auersatur, solisq; inflammationẽ abigebat, & mitigatibus præfidiis, per initia uti iubet. Sic enim (inquit) ipsis superesse licebit. Itaq; nihil tuto reponi posse præter digitos, & plantas, & manus dixit; atq; in his quoq; diligenter esse agendũ, ne præcipitent. Verũ ne digitus quidem in quo minimũ ut malũ, sic etiã periculũ est, reponi debet, nisi ante inflammationem, aut postea cum iam verus res est. Cæterũ quod ipse in solis digitis faciendũ consulit, id nos in reliquis quoq; articulis facere aggrediemur, ac statim quidẽ inter initia, dum pars adhuc inflammatione vacat, prolapsũ cũ vulnere articulum mediocri intensione (validã enim citra periculum perferre non potest) reponere tentabimus. Quòd si iuxta animi institutũ euenerit, in sola ratione, quæ inflammationẽ arcet, persistemus. Si verò inflammatio aliqua, aut convulsio, aut quidpiam ex supradictis, reposito osse acciderit, rursus id (si modo sine vlla vi potest) suo loco protinus expellendũ est. At si hoc quoque discrimen, seu periculum metuamus (non enim inflammatus articulus sine vi fortasse cedit, & sua sede iterũ propelletur) satius fuerit per initia in maioribus quidem membris, ut femoribus & humeris, superfedere, & repositionẽ differre. Vbi verò inflammatio cõquieverit.

(id au

Lib. de luxatorũ fracturũve ossium coaptatione.

quibus tam prolixè numen suum explicat, vt Pronœa illa non tam Epicuria, quod quidā ait, quàm chirurgos fuisse videatur: Plurima quidem ad voluptatem & delicias hominis: omnia verò ad salutem eius & conseruationē chirurgus comparauit. Nam quæcunque tota rerum facie exposita, quæcūque cauernis terræ ac visceribus latent, quicquid est aquarum, stirpium, animalium, terra, ignis, maria, chirurgus inseruiunt. In fece rerum & excrementis, in carie, in rebus minimis, obsoletis, ac propè nullis, remedia condita sunt. In re vna multiplex natura vario genere remediorum foeta est. In apicula quàm variè lulsit, quàm multas diuitias chirurgus condidit, mella, ceram, metyn, sandaracham, fauos, propolim, quicquid denique locuples illa alueorum respublica continet. Quin & apes ipsas ad auxilia transtulit. Et in homine multa sunt, quæ profunt homini, vt quocunque animum aduertat, quocunque oculos coniciat, remediorum turba sese offerat. In quo summopere probanda est maiorum diligentia, multoque magis imitanda studia, qui in ea vastitate rerum nihil intentatum, nihil inexpertum reliquerunt, omnia elaborata & summo iure æstimata, literis consignarunt, quibus iam perfrui datum est, alienis scilicet bonis.

Pronœa chirurgos potius quàm epicurea.

Primum ergo consuetudine, natura, & maiorum historia, infinita nobis materia comparata est, quæ iam deferta ac suppressa iacet, quia neglecta. Satis est capsula pauculis alueis distincta: satis pyxidicula: hic vno atque altero remedio contentus est, quæ scilicet accepit oraculo, nec vlli reuelanda putat. Sed ego sic arbitror, optima esse remedia, quæ plurimis cognita, plurimis probata sunt. Alteri elementa sordent, & quicquid elementare est. Hinc nouæ elementorum soboles, hinc æther & cælum ipsum ad remedia exprimenda sunt. Vernaculæ sunt nobis atque domesticæ, naturæ opes, quibus vulnera coniungas, re purges sordida, sinus impleas & cicatrice tegas, cæteraque præstes omnia, quæ chirurgi opere continentur. Verum suis cuique studiis frui liceat. Nos ex immensa, omnibusque exposita naturæ sylua & maiorum historia, quæ iam publica vel multorum fide consent, remedia transferemus. Exhibebimûsque rudimentum operis, suis quidem lineis descriptum, quod alius impleat, informet, suis denique

Taxantur nostri homines.

Argumentum libri explicatur.

denique numeris absoluat. Nos speciem aliquam & formam argumenti adumbrabimus, secuti Cosmographos, qui totius orbis ambitum angusta tabula contrahunt.

*Antidota-
rium.*

Idem enim condonandum nobis, cum non alios fines imperij, alios materię, de qua præsens instituta oratio, & natura posuerit. Genera quædam rerum, & præcepta artis primùm explicabimus, vtendi methodum, & leges aliquas instituemus, ex quo censebitur particularis materia, & formulæ describentur, quas partim ars ipsa reperit, partim optimorum medicorum vsus atque experientia comprobauit. Antidotarium inscribunt hoc genus argumenti, nulla ratione aut vsu veterum, sed, vt fuit annorum licentia, è Græca voce Latina analogia nomen detorserunt. Multa nobis, plurima aliis reliquimus, ne volumen, quod quinque libris Ioannis Tagautij, & hoc de materia chirurgica commentario cogendum erat, in maiorem molem accresceret deinde non plus operæ hac in re licuit collocare nobis, quàm à quotidianis studiis statâque interpretandi cura relictum fuit, idque breuiori tempore, quàm hoc institutum nostrum breue, quidem, sed varium expostulet. Ideoque dignum venia, si contracto ambitu verborum, pressâque periodo, quædam describentur. Et in tam numerosa medelarum turba potior est verborum moderatio, breuibûsque sententiis res premenda est. Adhæc ponimus idoneos esse huic doctrinæ, qui iam intincti fuerint præceptis artis, quam Ioannes Tagautius singulari ingenio atque incredibili studio informauit. In qua genera morborû diuisa sunt, circumscriptæ formæ, designata indicia, notata præfagia, institutæ leges, scriptæ medelæ plurimæ: in qua quæcunque collabebantur in disciplina vetere, constituta, quæ vitium fecerant, reformata: tota denique ars, quasi re diuino lapide instaurata est. Vnicam hanc partem operis interceptus negotiis in nos transtulit, quàm ideò recepimus, ne & publica ratio deferri à nobis, & officium necessitudinis repudiari videretur. Multa igitur è Græcis, quædam ex aliis transtulimus. Quæ à Guidone, ciuisque notæ scriptoribus rudius tradita sunt, paulò purius reddere contendimus, etiam si intelligamus vitia corporum non curari eloquentia. Sed nec barbarismo depelli possunt,

*Laus operis
in Ioannis
Tagautij.*

sunt: Probamus quidem omnem orationem, modò sententiis rerum, quasi suo succo & sanguine condita sit. Melior tamen hæc, si neque neglecta, neque ambitiosa, sed mediocriter culta est. Adde quòd barbarissimus ille
 5 multas sæpe tenebras rebus attulit, & optima quæque, sordescunt plurimis, quæ sordidis, nec ita puris vocibus describuntur. In damnandis quibusdam rebus, autores Græcos adhibuit: in remediis ea selegi, quæ præceptis artis congruerent magis, quæque vt res præstò sunt
 10 facilius comparentur. Atque hæc præfati, ad institutum opus veniamus.

De repellentibus.

C A P. I.



15 *παραγογινὰ* Græci vocant, quibus & initiis fluxionum, & post initia vtendum est, quando videlicet humor affluit: hinc enim phlegmones ortus atque incrementa, hinc vomicas, maligna vlcera, febriù dolorumque causas, alia denique permulta vitia corporum declinamus.
 20 Ideòque principiis obsta. Sed vacuandum prius corpus est, siquidem postulat casus, ac ferè postulat, quia in plethora & cacochymia rheumatismi plurimùm cò mouetur, quâquam etiam in mediocri vitio humorum & copia, vbi phlebotomo vel pharmaco natura leuâda est. Idem remedium sæpius in nouâdum, siquidem metus est, ne cùm incaluerit morâ, affecta inde pars nimium recalescat. Vis quoque remedij vitio conferenda: Leuius enim pharmacum vt lactuca, in graui ardore frustra est, fortius qualis est succus è pomo Mâdragoræ, liuore inficit, indurat scirrhum, & aliquâdo ita reprimit: vt in viscera fluxionis impetus rapiatur. Ad consilium adhibenda hæc omnia, natura, situs, figura, sensus, robur, partium, humoris copia, qualitas, corpus, viæ præterea per quas is illabitur. Neque perpetuo satis est infirmo loco repellens auxiliù adhiberi:
 35 aliquando enim superius collocandum: vt veluti præmissa manus vias intercipiat, nequid transfluat, vbi venarum ductus atque cò iugia animaduertenda. Cæterùm reprimendum consuetudine naturâ admodù controuersa est. Arabibus repellunt quæ influxum prohibêt, refrenât, crassant, illinût, oppilant: quæ denique robur partiù cò firmant. In

Utilitas repell.

Vacuatio.

Modus.

Que ad cò filium adhibenda.

Còtrouersa repellentiù natura.

Græcor

*Græcorum
sententia.*

*Cautio in
astringen-
tibus.*

Græcorum libris astringentium materia cum repellentibus
ferè commiscetur. Apud Latinos Cor. Cels. scripta reli-
quit, quæ simul repellant atque refrigerent, & rursus
quæ sine frigore repellant. Aurelianus in chronicis alia
scribit vnâ astringere atque reprimere, alia astringere quæ
non reprimant. Sed vtriusque, vt aliquot locis Arabum,
in censenda materia non sine vitio est oratio. Iustissima
Græcorum sententia: cæque nobis explicanda est. Repellit
perpetuò quod frigidum est: frigidum aliud aqueum na-
tura molli ac soluta, aliud terrenum crassiore materia: 10
quod quia astringit & magis contrahit partes, efficacius
reprimat: aut certè solum id efficit, si quidem ab actionis
vehementia repellentibus nomen inditum est. Ac certè in
rheumatibus præstantissima medicamenta sunt, quæ cum
quadam astrictione vehementer siccant vt non mordeant, 15
qualia terrena sunt. Quanquam & alterum genus, quod
aqueum est, vtcunque reprimat, & ex æquo frigidum,
vel terreno frigidius est, ac refrigerio magis conuenit.
Verùm præterquam quòd humor frigore repercutitur, si
quidem accessit constringendi vis, quod iam coit, loco 20
exstringitur, magis etiam si tenue est: & si quid reli-
quum sit, sæpenumerò resiccatur: confirmatur pars: vt
sine pharmacorum ope quod postea influat possit retun-
dere. Verùm hac parte prouidendum: ne quid nimis, ne
cutis grauius contrahatur: crassescat humor, dolor exa- 25
speretur, fluxio increseat: grauius denique incendium
irritetur. Atque vt initio quidem te iuuissè putes, reli-
quum tamen & scirrholes & contumax persistit, quod
imposterum ægerrimè discutias. Ac grauior metus: si
quid viscerum infirmius est. Excipit enim celeriter quic- 30
quid retunditur: vbi omnia firma sunt, in magnas venas
& viscera citra periculum aliquid refluat. Videndum
quoque ne vltra modum contrahas in materiæ copia,
crassitie, vitio, molli vegetoque sensu corpore, dolore
gravi pariter & calore: vbi laxanda potius via est, vt dis- 35
fluat calor, ac dolor temperetur: qui vbi cruciat vehe-
mentius, ad laxantia & anodyna omninò confugiendum
est. Adstringenti simul atque repellenti auxilio vis effi-
caciore est, si quid tenuium partium vel natura insitum,
vel arte commixtum est: modò non mordeat. Iusto enim
calore

calore temperari potest, multò magis, si (quod fere fit) ab infirmitate fluxio, à frigore infirmitas orta est. Pestiferæ materiæ non occurrimus, vbi in superficiem diuertit, sed potius illicimus, atque rapimus vi maiore, si tardius mota resistit. Neque dissimilis ratio est in criticis apostematibus, coxariis, lue venerea: vbi non repellenda in corpus, sed foras potius materia trahenda est. Iam verò quæ illinunt, oppilant, offarciunt, aliàs quidem dolorem leniunt, aliàs acrimoniam hebetant, viàsque intercipiunt. Ex quibus si vis, reprimant: ac reuera nonnunquam reprimunt, oleum rosaceum, omphacinum, myrtinum, oui candidum, aliàque id genus. At gummi genera, resina, gluten, farina pistrinalis gyris tritici, hydrelæo, oxelæo, rhodino, repellente succo: austero vino dissoluta, non tam sponte sua quàm aduentitia vi reprimunt. Adstringunt calida folium, casia, cinnamomum spica, aloë, crocus, cyperus, calamus aromaticus, myrrha, absynthium, marrubium, polium, saluia, centaureum: vina quidem austera, & aromata plurima. Reliqua verò tum austera, tum acerba in proximum ordinem referemus. Leniter repellunt, aqua, vinum, lactuca, intyba, polygonium, trifolium, auricula muris, lenticula palustris, psyllium, liquor oui, vmbilicus veneris, semperuiuum, portulaca. In summa, quæcunque frigida aqueo elemento soluta sunt. Omphacium adstringendo efficax, solanum ambigit. Hoc potentior rubus est immaturo fructu & floribus: mollioribus autem foliis & asparagis plurimum aquæ continet, ideòque leuius contrahit. Adstringunt vitium folia, & capreoli, plantago, sorborum, cornorum, mespilorum, pirastorum cydoniorum, myrtorum, spinorum fructus & folia, rhodonia, rosarum capita, obelisci: deinde sed minus femina, flores, & folia: oxyacantha mediocriter, malicorium magis, cytinus, balustia, rhus, acacia, bolus Armenus, terra sigillata, quercus, cupressi folia, germina, & nuces. Vehementer refrigerant pomi mandragoræ, hyoscyami & papaueris succus: quæ reliquis interdum temperari possunt, vbi acrior inflammatio est: sed prius auferenda, quàm inde partes liuorem ducant. Spongia è frigida expressa partim contrahit, fluxum inhibet, dissipatque in viciniam,

Vbi non repellendum.

Oppilantia.

Quæ calida adstringunt.

Materia repellentiū. Aquea.

Omphaciū. Rubus.

Quæ vehementer refrigerant.

quod iam coit. Eodem modo lana succida & splenia
Aqua. austero vino insuccata. Magis etiam, si aqua prius,
Vinum. galla & similia incoxerint. Vinum aquæ præferendum,
 & maximè austerrum, vbi reprimendum est. In deliga-
Acetum. tionibus fasciæ vino insuccantur. Acetum repellit, ad-
Caphura. stringitque vehementer. Caphura repellit, & tenuitate
Oculus po- partium facillè permeat. Oculus populi veteribus Græ-
puli Gy- cis calfacit. Repellit gypsum oxycrato maceratum. Olei
pium Ro- rosacei frequens vsus est: sed sit ex oleo omphacino, in quo
sacrum. rosæ sæpius mutatæ maduerint. Quod annum superat, 10
Rom. in exolerum est. Oleum omphacinum si desit, recenti oleo
olei. & vix acerbæ succo vnâ coctis, dum succus omnino
 exhalauerit fingito, & ad ignem saligno ratno, vel simi-
 li assiduè commoueto. Oleum verò nec sit conditum sa-
 le, nec ætate rancidum. In myrtino, melino, lentiscino, & 15
 similibus eadem vitia fugienda sunt, vetustas, rancor, sal-
 sugo. Mastichinum, nardinum, costinum adstringendo
 roborant, & calfaciunt. Vitiosum oleum, cum integrum
 desit, tandiu eluatur, dum virus exuat. Eluatur aqua vel
Olea facti- simplici, vel rosacea. Descriptæ materiæ oleum vim com- 20
tia. bibet, si vel materia ipsa, vel succus eius oleo incoquatur.
 Plantaginem gratia exempli, oleo recenti & pari aqua
 aut vino coques, dum solum oleum reliquum sit. In ar-
Cautio. dore nimio periculosus olei vsus est, quia calore incendi-
 tur & frigit. Expressis succis melius vtitur in lana succi- 25
Succorum, da, panniculis, ac spleniis. Portulaca, semperuium, vmbi-
vsu. licus veneris, ægrè succum reddunt, nisi in mortario tritis
 aliquid omphacij, vel liquoris similis affundatur.
Cataplas- Cataplasmata sunt farina in succo pista. Ex oleis ce-
mata & ce rota coeunt, & succis imbuuntur. Remedia neque dura 30
rota. sint, neque grauiâ, ne pressio loco dolores augeant. Ce-
Cautio. rusa cichorii succo & aceto leniter diluitur. Ceratum è
Ceratum è psyllio, Psyllij vnc. quatuor in aquæ lib. quatuor mace-
psyllio. rentur percoquanturque, expresso succo, adde rosacæ
 libram vnâ, ceræ vnc. sex, contra articulorum rheu- 35
Ceratum ro- mata. Non absumile ceratum rosaceum. Duplici vase ce-
sacrum. ra cum oleo liquefit, vbi refrixerint, conspersa aqua
 commouentur, aqua reicitur, succus plantaginis affun-
 ditur, vt quantum fieri potest, absorbeant. Inflamma-
 tiones sinus, vlcera genitalium quæ serpunt, adiuuat.

In tene

- In teneris corporibus idem ceratum coriandri succum *E corian-*
 imbibat. Coriandrum leniter adstringit, aliis refrige- *dro.*
 rat, Galeno calfacit: vtere incrementis. Ceratum myr- *Cerata ma-*
 tinum & melinum magis adstringunt. Herpetibus, & *gu adstrin-*
 nimio humore flaccidis vlceribus conuenit, Myrtini lib. *gentia.*
 vna: ceræ vnc. duæ: pollinis myrtorum vnc. vna. In ce- *Cera.*
 ratis vtendum cera, quam adolescentior apum populus
 confecerit: ceram virgineam apiarij nominant, eaque è
 nouis fauis separanda. Alioqui cera alba vtendum erit,
 10 non sponte quidem nata, sed factitia, qualis olim Tyr-
 rhenica, quia suauior est, & acrimonia hoc genus reme-
 diorum carere debet: ideòque præferenda cera è dolci
 ac diluto melle. In coagulato lacte, & indè nascente in-
 flammatione farina fabacea hydrelæo vel rhodina pista,
 15 mammis imponitur. Idem opitulatur testibus inflam-
 matis. *Διά χαλκίτιος* contra rheumata hoc modo tem- *Διά χαλ-*
 perari debet: Adipis suilli recentis, exemptis fibris vnc. *κίτιος.*
 duæ olei recentis, lithargyri, ana vnc. tres, chalcitidis
 vnc. dimidiæ. Conficiendum arte medicamentum, vsus
 20 tempore, vnc. duas medicamenti, olei rosacei vnc. tres
 colliquabis, vbi refrixerint, aqua frigida, succo portu-
 lacæ, psyllij, lactucæ, vino austero, vt res postulat, subiges,
 animaduertens quantum repellendum, adstringendum,
 refrigerandum, siccandum, leniendum: vt modo rho-
 25 dini loco myrteum aut melinum misceas: oxycratum,
 hunc vel illum succum alijs præferas. Quod sequitur, *De lithar.*
 exprimit vlceribus, quod influxit, & quod influit, repel- *et hydrel.*
 lit. Lithargyri vnc. quatuor: olei dulcis vel rhodini vnc.
 quatuor, aquæ vnc. tres, lithargyrum die vno hydrelæo
 30 coquitur, difficilius enim illiquefcit: teneris corporibus
 & paruis vlceribus conuenit. Defensiuæ vocant è bo- *Defensiuæ.*
 li Armeni parte vna, terræ sigillatæ dimidio, rosacei tri- *Deligatio,*
 plo, aceti vel succi repellentis dimid. Liquidis reliqua in-
 friata commiscentur: vel è bolo Armeno liquore oui con-
 35 leuato: deinde affuso succo è capreolis vitium, aut ompha-
 cij. Fasciæ ritè conuolutæ in repellentibus censerì pos-
 sunt: quales in fracturis, & qui ab vlcere sursum addu-
 cuntur, vt adstricta parte, & ita ductis orbibus paulatim
 laxes. Similiter cum altero membro atrophîâ intabescen-
 te, alterum deligamus. Vincula quoque superioribus

partibus iniecta, qua videlicet materiæ cursus est. Aliquando etiam inferiores illaqueamus, ut cum è crure exhalat virus quod viscera appetat, ex quo & epilepsiæ & syncopæ causa præciditur. Sed in vlceribus plurimum & fracturis, vias laqueo comprehendere oportet, ne si quid transfluat, dolor, phlegmone, putredo, syderatio, aliæque id genus concitentur.

De attrahentibus.

CAP. II.

*Attrahē-
tium ma-
teria.*



*Multiplex
vsus.*

*Differen-
tia attra-
hentium.*

*Quæ miscē-
da attra-
hentibus.*

Ἀσπὴν & Ἐμποασπὴν Græcis appellata, vsu quidem repellentibus conferri possunt, sed natura plurimum diffidēt, calida, tenui substantia, quæque vi quadam rapiant, quæ in alto corpore posita sunt. Ideoque viscera, internūque corpus exonerant, foras translata materia, venena in cutim euocant. Criticos abscessus accelerant, desperatos pleuriticos, & fortasse attonitos releuant, inguinum tumores amplificant, quodque vel pestiferum, vel nimis vitiosum medio corpore conceptum est, aliò pertrahunt. Tabidas ac velut syderatas partes vitæ restituūt, perfrigeratas spiritu refouent, vitiosam saniem exhauriunt, quæ nervis & cuniculosis vlceribus latet, squammas ossium detrahunt, coxarios iuuant, hydropicos exugunt, paxillos, clauos, spinas, sagittas reuocant: multo magis, si locus vlcis periculo inciditur, nec patitur egger angustior rem plagam ferro ampliori. Quod in vomicis, strumis, panis, ægilope, oculis, auribus reliquisque partibus altius desedit, eliciunt. Multiplex ergo attrahentium vsus, sed nihilominus varia materia est. Aliis ea vis à natura insita est, atque in his modò manifesta qualitas elementaris, modò occulta quædam proprietas & naturæ familiaritas attrahit. Aliud genus hoc habet aduentitia qualitate, ex putredine contracta acrimonia. Calor Galeno omnino attrahit, sed quod attrahit, non protinus calidum est. Aphrodisæus aliud sensit. Attrahunt cucurbitulæ, sanguisuga, pyulcus, suctus, dolor, vincula, frictio, cauteria. In attrahentium vsu aliquando quod fuerit attractum, corpore excludimus: sed hic modus est, ne cum vitio partem frugi materiæ eripias. Nonnunquam tantum attrahimus, non etiam discutimus: ut quum in partem emor-
tuam

tuam calor & spiritus attrahitur. Argenti spumam, ceram, resinam, picem, oleum, epispasticis veteres miscuerunt, ut & temperarent, & magis emplasticum pharmacum efficerent. Quidam etiam adstringente materia ob-
 5 tundi voluerunt. In primo genere sunt dictamnus, pro-
 polis, ceram virginē vertit Scribonius. Rudis est & crassa materia in apum officinis, nondum cera, odore graui, ut
 qua pro galbano veteres vterentur. Ea mellatione verna,
 separari potest fauorum pars quæ cellas obstitat. Sed iam
 10 exemptis fauis, posteaquam mella diffluerunt, quicquid
 est in fauis, vnâ confundunt, ut nihil syncerum haberi
 possit. Magna verò synceræ propoleos virtus est: spiritus
 crassos & vitiosam materiam ex alto elicit. Recens per se
 satis est mollis & pinguis. Sic in puncto neruo agricolæ
 15 Galenus vsus est: quæ ætate induruit, oleo veteri molliri
 debet. In mollioribus corporibus oleo illiquatur. In duris
 lacte multo tithymalli: cum terebinthina satis attrahit.

*Particula-
ria mate-
ria.*

Thapsia recens vtilis: bimula & vetustior exolefcit. Cerato misceri solet: quæ quia ut viscum plurimum aquæ
 20 continet, quatuor & quinque horas insistere oportet.
 Radix arundinis cum melle. Sagapenum, galbanum, am-
 moniacum, opopanax, calx viuæ, cinis è fæce vini vel aceti,
 quæ loco nitri est, struthion, aristolochia longa, quæ &
 spicula, & squammas extrahit, lepidium, sinapi, nastur-
 25 tium, tithymallus, dracontium, pyrethrum, ranunculus,
 sales, tum qui edi possunt, tum ammoniaci. Quædam in-
 friata affricantur, aut gummi & resinis concorporantur.
 Lixiuum in subtili calidâque materia extillatum: ex ea-
 dem cinis Anemonæ, calamintha, narcissi radix, cyclami-
 30 nus. Sparthi quo vites alligant fructus, & è foliis succus.

*Thapsia ei
viscum.*

*Loco nitr
fæx crema-
ta vini ve-
aceti.*

Acetum, sed hoc suspectum, vbi siccitas, dolor, inflam-
 matio, vlcus, adstrictio, & à nervis dolor est. Cantharides
 ex polenta & melle pistæ. Medullæ & adipēs ætate acri-
 moniam contrahunt: vsinus adeps, hyæninus, pardali-
 35 nus, leoninus, & alij, sed hi maxime. In alopeciis & proflu-
 uis capillorum vitium discutiunt, attrahuntque quod ad
 capillitium vtile sit. Oleo & oleæ flore, tela sibi refrigerare
 elephantos, testis est Aelianus. vetus sit oleum tenue &
 calidum. Sulphur infriatum melle, oleo, terebinthina,
 salua hominis, axungia. Idem in œnostragmate feruescit

Acetum.

*Medulla
& adeps.*

Oleum.

Sulphur.

Euphorbium.

Modus euphorbiæ & similitum.

Quæ trahunt aduentitio calore.

Mendiculus lue venerea curatus.

Fermentum.

Coagulum.

Quæ qualitate occultata.

dum enatet lentor quidam (oleum appellant) quem concha excipere oportet, aliquoties commutanda aqua, dum satis olei collectum sit, quo demersum corpore hydrargyron foras elici voluerunt statim illito à balneis. Euphorbium recens acrius est: bimum trimumque paulatim remittitur, quinto & sexto anno exolefcit. Cerato temperatur, quod vel decuplum, vel duodecuplum oleum habeat, & triplam ceram. Modus est vt tantum erubescat locus, & pruriat, non vratur, nec vlcus contrahat, nisi & hoc etiam necesse fit. Cerato largiore dilui potest quod est acrius: quod verò languidius pharmacum, aucto euphorbio, cerato imminuto augeri debet. Eadem lex in reliquis eiusmodi seruanda est. Ardor affusa aqua, aceto (quod vim thapsiæ efficacissimè diluit) cerusa è rhodostagmate lota extinguitur. Succus cyrenaicus medicus, opobalsamum & alia, quæ partim exoleta sunt, partim vsui esse possunt, ex 3. de comp. pharmacorum κατὰ γινῆ, & aliis Græcorum libris repetenda. Aduentitio calore trahunt, fermentum, sterus anserinum, gallinaceum, columbinum, arietinum, humanum, & quæcunque talia sunt. Scatebat quidam è egre mendicabulorum lue venerca: aliquot diebus vniuersum corpus equino fimo obruit, vt tantum esset quæ respiraret. Erat sterus stabularium, equino lotio sæpius perfusum, quodque iam computruerat. Effecit ille hac arte, vt totum virus exprimeret: addidit aliquoties enchrison ex axungia, larigna, & hydrargyro. Nec alia vitæ lex seruata est, quàm mantica offerebat: atque his remediis curatus est. Fermentum oleo incoquitur: fundit, liquat, furculos trahit, pedes contusos sanat, mollit, discutit. Axungia veteri, larigna, terebinthina & resinis liquidis pistum efficacissimum est. Aliàs cum cepa cocta subigitur: coquit, trahit, discutit, aperit. Coagulum quò vetustius, eò efficacius. Ex echino animalium (quæ πολύκοιλα) lepore, & vitulo marino colligitur. Lac est in lactentium animalium ventriculo vel omaso ita concoctum. Aristoteles ad alui profluvia vtile facit magis leporinum: equinum Diosc. Arabes & quidam è Græcis adstringens frigidum, ac reprimens auxilium faciunt. Alij acrimoniam elementis, reliqua occultæ qualitati attribuunt. Hoc certò habet, quod dissipata cogit, & coact

- & coacta dissoluit. Magnes ferrum attrahit: repellit Theamenes. Succinum illicet festucas ignorata vi. Cancer fluuiatilis tritus tela extrahit: lacertæ caput: rana summis partibus resectis. Cochlearum & limacum carnes, *Cochlea.*
- 5 aliàs per se, aliàs cum suis volutis tritæ, ac mixto interdum coagulo, tela rapiunt, atque hydropicis aquam exungunt: non prius soluere oportet, quam totus humor exdauerit. Ostrea viua pestiferos bubones loco transferunt, & ad se trahunt. Scorpio tritus & impositus, quod *Ostrea viua.*
- 10 infixit virus, retrahit. Oleum quod ex eo fit, idem efficit, & calculos educit illitum glandi, si in cole restiterint: vel pubi ac perinæo, si superius inhæserint. Cucurbitula summa vi rapit. Hirudines superficiem sugunt. Pus, vrinas, calculos, suctus elicit: ore mundo ac prius loro fit qui *Scorpio.*
- 15 exugit. Pyulcus * catheter iisdem vtilia sunt: vincula, frictio, phœnygmus, dropax, sinapismus, ferrum candens, vel admotum, vel impressum, calore trahunt. Sed hoc violentum remedium est. Verùm quæ non sanant pharmaca, sanat ferrum: quæ nec ferrum, sanat ignis: quod
- 20 Hippocratem in Aphorismis scripsisse volunt. Mixta remedia sunt theriaca. Psoricum dupla chalcite & lithargyro, aut æquis partibus cadmiæ & chalciteos: vel duabus chalciteos, & tribus cadmiæ: fortius est quod cadmiam, quàm quod lithargyrum recipit: minus acre lo-
- 25 tis metallicis. Ex acerrimo aceto trita & fistili clausa sepeliuntur fimo. Hac arte macerata, triplo, duplòve cetrato excipiuntur. Ceratum sesquialtera ratione dupla, tripla olei, ad ceram conficitur. Ea metallicorum cura pharmaca tenuiora fiunt, facilius penetrant,
- 30 & inde trahunt. Oleum fit vetus, ricininum, sinapinum, sicyonium. Raphaninum, è terebinthina, larigna, strobilina, pinea, picea, abietina, arte chymica si vis distillatum: quæ resinæ etiam è profundo trahunt, sed in primis terebinthina, deinde strobilina: in quibus non mo-
- 35 dò calor, sed tenuitas partium in attrahendo spectari debet. Formulæ sunt. Cerati vncia quatuor, terebinthinae vnciæ dimid. liquatis immisce puluisculi, euphorbij drachmas tres. Interioris fermenti vncia vna, terebinthinae liquidæ vncia vna: concorporata plurimùm valent in punctis neruis. Propoleos acris & pinguis (nam cera virgi-

Aph. Hip.
Psoricum.

Quomodo
tenuiora
metallica.
Olea com-
moda.
Resina &
inde olea.

Formula
ex Galen.
Orib. Aët.

nea abutendum non est) vnciæ duæ, olei veteris vnciæ quatuor: galbani vnciæ dimid. coëant ad ignem. Picis liquidæ, picis aridæ, propoleos, partes æquales. Lithargyri, cerussæ, salis, ana drachmæ decem, seorsum tusa, & cum olei vnc. tribus in mortario pista, ad ignem diu versentur, paulatimque decoquantur. Lithargyri, cerussæ, nitri, ceræ Colophonix, ammoniaci, ana vncia vna: olei veteris vnciæ sex: reliqua vnciis sex lxxiij ficulnei dum non inquinant, concoquantur. Deinde cera Co-

Relatũ ad Andromachum. lophonia, ammoniacum, deinceps quidem ac paulatim¹⁰ adiiciantur. Nucleorum è dactylis crematorum, nitri rubri, salis ammoniaci, vel gemmæ, aristolochiæ rotundæ, radicis cucumeris agrestis, terebinthinæ ana drachmæ viginti: piperis nigri & albi, ammoniaci, amomi,

xylobalsami, myrrhæ, resinæ siccæ, capitum lacertæ, la-¹⁵ stei succi mori, ceræ, ana drachmas decem, adipis caprini drachmas quindecim, olei lirini quod sufficit ad emplastrum. Vix parari potest, nisi ad vocaca ἀντιβαλλόμενα confugas. Quod sequitur admirandum ad stru-

Necesse sonis è cupresso.

mas, ramicem gutturis, parotidas, omnem duritiem, &²⁰ œdemata. Cupressi folia neque teneriora, neque duriora in puluerem comminues, tortiuo vino consperges, atque ita volutabis, dum in fœcis corpus coëant. Inde struma vel ramex inducitur, tertio primùm die soluitur medicamentum: contractum locum inuenies, qui digi-²⁵ tis exprimi debet. Rursus ad tres dies idem pharmacum applicabis, eodémque modo solues & exprimes: septimo die, vel ad summam nono, strumæ velut miraculo abolebuntur. Exugit hoc saniem per poros affectæ partis. Olei antiqui vnciæ vigintiduæ, ceræ albæ vnciæ quindecim,³⁰ nitri vel salis torrefacti, aut fœcis crematæ vini vnciæ tres, terebinthinæ vnciæ duodecim, lixiuij querni, vel ficulnei vnciæ octodecim: cera cum oleo liquatur, terebinthina adiicitur, refrigeratis nitrum conspergitur, lixiuium paulatim affunditur: omnia pistillo conuoluuntur.³⁵ Plurima ex tertio & sexto de compositione pharmacorum κατὰ γένη, & 15. Aët. repetenda. De sinapismo, dropace, phœnygmo, & aliis alio loco. Addunt Apostolicon Nicolai, Oxycroceum, & alia.

De resoluētibus. CAP. III.



Incrementis rheumatum discutiens materia cum repellente misceri debet. Inclinate vicio diaphoretica pura sint & horum vnicum fortasse genus est: sed clarior doctrina fuerit si duplici differentia separemus, vt alia quidem

leuiora, quæ ἀραιωτικὰ: alia fortiora, διαφορητικὰ si vis appelles. Aræotica mediæ naturæ vicina sunt eo calore, quem humiditas temperet, ex quo minimè siccant, do-

Ἀραιωτικὰ.
Διαφορητικὰ.

lorem leniunt, relaxant cutem, spiramenta corporis rarefaciunt, tenuitate partium intrò penetrant, quòdque inhæsit parti liquefaciunt: hinc ex humore vapor fit, qui subinde expirat, dum omnino locus detumeat. Et adhuc quidem satisfaciunt, vbi tumor in superficiem exponitur.

15 Locûsque mollis est ac rarus, materia verò calida, humida, & tenuis est. Quòd si in alto corpore humor deponitur, si idem frigidus, crassus, glutinosus, si dura densaque cutis, si viæ longitudo quædam, & flexus & anfractus, iam vi maiore opus est, videndumque non quale

Consilia in
vfu resoluē
tium.

20 in præsentia, sed quale futurum sit medicamentum, quum eò peruenierit. Ex quo nec acribus quidem parcendum erit. Etenim pars exterior perferet, quæ ægra dolensque tolerare non potest. Maiora verò remedia in diaphoreticis numerentur, iam vicina epispasticis: quan-

25 quàm vtraque virtus euocandi atque digerendi plurimis rebus insita est: sed vt in vnoquoque vis altera superat, ita genera distincta sunt. In hepate, liene, ventriculo, atque id genus partibus, à relaxantibus metus est ne dissoluant vires: ideòque adstringens materia, qualis est aromaticum, misceri debet. Frigida crassaque materia, incidente

Cautio.

30 auxilio priùs comparanda. Mollienda quoque vbi durior concreuit, ex quo à leuioribus ad maiora remedia gradus paulatim fiat, vt sine periculo discutias. Alioqui distillabit tenue, lapidescet quod crassius est. Cum parte stupida durius: cum ea quæ Vegetius sentit, clementius agendum est: quanquàm stupore partis abutendum non est, vt ea impes-

Ab acriori
bus quum
contingat.

35 res, quæ exulcerent. Sic enim sensibile corpus intabescet, contrahetur, non rarefcet: cogetur materia, non liquefcet: horror, dolor, fluxio irritabitur: dehiscet venæ, omnia in deterius commutabuntur: multò magis si pharmaca crassiore

consistent materia & siccant. In phlegmone quæ vetus est, videndum nunquid affluat : id ferè accidit tumoribus qui inueterascunt, ubi medela quæ reprimat, commiscenda est. Posteaquàm verò subsedit tumor, ac nihil quod exhalet reliquum est, confirmanda pars, quæ longo vitio elanguit, multò magis si statis periodis, rheumatismo vexari solet.

*Particula
ris mace-
ria.*

Arzotica sunt, chamæmelum, lini semen in maluis efficacissima, althæa : sequitur agrestis, domesticæ vis nimio humore elanguit. Aqua calida vtitur Hippo. in fracturarum exolutione, quàm vocat *ἐπίλυσις*, vinum exiccat, reprimat, & digerit : lana sordida bene carminata inebriata vino, & inde pressa, ceratum similiter. Butyrum digerit, mollium corporum parotidas, bubonas, oris phlegmonas, aliq; innumera, vt per se satis esse possit. Oleum dulce, calens,

Olea.

*Oleum li-
corii cum
croco.*

*Nux ran-
cida.*

& in quo illa esierbuerint. Sicyonium è foliis, fructu & radice cucumeris agrestis. Crinelaon intinctum croco, omnes inflammationes discutit. Oleum caryinon efficacius è rancidis. Nux rancida per se, vel cum melle trita efficacissime suggillata rapit, inuritur, aut candète ferro premitur, vt reddat oleum, quod optimè discutiat. Omne oleum concalfactum igne, quale est lucernarum, vel ignito ferro, extortum, efficacius est. Oleum vetus, ricininum, canabinum, anethinum, quod è rosmarino, maiorana, zambace, leucoio, hyssopo, alijsq; eiusmodi œnelæo coctis, dum omnino expiret vinum. Raphaninum, sinapinum, melanthion, terebinthinum, hypericinon, potenter digerunt. E radice bryoniæ, & vocati sigilli Mariæ, cnico, grano gnidio, hydropicis & œdematis olea comparantur. E galbano, ammoniaco, & similibus quæ molliant ac digerant. E dauco, caro, cumino, ruta, vt flatu excutias, cui rei galbanarium vtile est. Si quid incidendum, detergendumve, aliquid aceti vel oxymelitis affundi potest, quo tempore absinthium, polium, centaurium, iris, aristolochia, gentiana, vrtica, hyssopus, & similia œnelæo incoquâtur. Hic vinum melius non adstringens, giluum, tenue & odorum. In phlegmatibus & parotidibus duriorum corporum talia ex usu sunt. Brassica per se, vel cum axúgia trita, induratas phlegmonas & vetera erysipelata discutit. Adipe & medullis recentibus laxando, veteribus discutiendo vtendum est. Mastiche, furunculis. Ammoniicum & similia chœradibus, & articulis

- articulorum tophis conueniunt. Fermentum oleo pistum, & cum cocta cepa mixtum, potenter coquit, mollit, ac digerit. Pellibus animalium recens detractis, in contusis, verberumque plagis vti conuenit. Fœnum græcum duris phlegmonis adhibendum. Acetum achoribus & *Acetum.* œdematis vtile est. Agrippa concalfacto aceto pedes im- *Agrippa* merfit, vnde intolerabili pedum cruciatu liberatus est. *aceto libe-* *perίαιπα* callo appenduntur & vilatente, vel elementari *ratus.*
- 10 pœonia. Mirum est quod affirmant. Coluber è cauda suspenditur subiecto vase aqua pleno, in quod ille dehiscat ore: aliquot post horis vel diebus lapidem euomit, qui in breui totam vasis aquam combibat. Alligatur lapis hydropicorum ventri, atque in totum exhausta aqua li-
- 15 berat. E sambuco & ebulo oleum œdemata iuuat, & hydropicos. Composita sunt Cerata, quæ simplicia, oleo *Cerate.* minus digerunt, sed fortius hærent. Oleum abietinum, chamæmelinum, anethinum, samfuchinum, & similia, cum subquadrupla cera vase duplici colliquabis: liquatis
- 20 duodecimam partem terebinthinæ, vel larignæ commiscebis. Iisdem oleis & giluo vino erinaceus coquitur, dum putrescat, oleum pinguius relictum arthriticis conuenit: idem è vulpe, lutra, melle, fieri potest. E lini semine oleum mola exprimitur, cum sarmentitio lixiuium subigitur, mo-
- 25 dicum larignæ ad lentorem adiicitur. Panis cibarius, sal- sus, fermentatus è ricinino pistus, sugillata delet. Fauos mellis è vino frigens, cum loliacea farina, momento buty- ri, & larignæ subiges. Bdelium cū melle teritur: calx cum veteri axungia, laſerpitium cum sulphure: hæc omnia,
- 30 molliunt, tergent, discutiunt. Sulphur cum oleo vetere, *Sulphur.* melle, terebinthina, vel saliuâ mixtum, aut vrinâ macera- tum, in venenatis morſibus deterget, attrahit, discutit. Calce lota, & recenti axungia mixta in tenellis corpori-
- 35 fabacea, conuenienti oleo pistâ, calidiori phlegmone conuenit. *Διὰ χαλκίτιος* vnciâ vna, in olei veteris, vel ricinini *Vſus Διὰ* vnc. duabus liquefit, declinanti phlegmone: ante declina- *χαλκίτιος.* tionem, & in vigore oleum fit dulce ætate media. Orobi farina diluto oxycrato cocta, vt fit calidum cataplasma, crassa & viscida secat, & discutit. In contumaci vitio & minus

minus calente: olei chamæmeli vnc. tres: ceræ drach. tres: axungie anatis & gallinæ ana vnc. vna: chamæmeli & anethi ana drach. duæ, omnia lento igne cocta percolantur vt fiat vnguentum. Olei sicyonij vnc. tres: ceræ drachmas sex: terebinthinæ drach. duæ. In frigidiore materia ita temperabis: seminis fœniculi, anisi, anethi ana drach. duæ: farinæ lupinorum, seminis fœnigræci, lini ana vnc. vna, cocta vino, tusa ex oleo & aceto imponantur. Papaueris cornuti folia cum axungia & propoli pingui trita, strumas, bubones, & similia molliunt, atque discutiunt. Colophoniz lib. vna: ceræ sesquilibra: oleo liquentur: liquatis addito salis torrefacti vnc. sex, vbi refrigerint manibus conuoluito, cylindros vel magdaleones fingito, vsus tempore aluta intendito, adhibitum hoc pharmacum: pus in se rapit, quod cum hæreat, eradi debet, ac rursus aluta imponi, idque sæpius repetendum. Nam veluti miraculo conditum pus emulget, & vitium discutit: sed quia durius, in dolore abstinendum. Eidem rei picis aridæ, ceræ nouæ ana lib. vnam: olei lib. duas blando igne fusa coniungito. Adipis porcini, picis, ceræ nouæ, saponis nigri ana vnc. duæ: liquata transcolato, hydropismos & dothienas adiuuat. Vehementer discutit galbani, castorei ana vnc. vna: liquefiant in olei ricinini sesquilibra: expresso &colato oleo adde picis, terebinthinæ ana drach. quatuor: ceræ quod sufficit, vt fiat solidum pharmacum. Hæc autem contumacibus vitiiis imperanda sunt, in quibus est quod molliat, coquat, trahat, discutiat. Plura sexto & leptimo de compositione pharmacorum κατὰ γένη, 15. Aëtij & aliis Galeni libris. Partem chalasticis fouebis, ex quo diaphoreticum induces, quod initium quidem lenius: postea verò vt subsidet tumor efficacius esse oportet.

De mollientibus.

CAP.

IIII.

*Malagma
tum natu-
ra.*

Vfus.

*Scurrii ge-
nera.*



μαλακτικά sunt, quæ modicè calida nulla vi siccandi vel humectandi manifesta indurata 35 corpora emolliunt, quanquam (vt omnia ferè multiplici natura coierunt, in malactis censentur plurima, quæ primo ordine calfaciant, secundo siccant, ac tertio. Sed quæ malactica sunt, humido calidoque elemento temperari necesse est. Plurimus

mus

mus vsus est in tumoribus, quos *συνέχουσιν* Medici appell-
 lant. Hi in musculorum finibus ferè concreſcunt: aliquan-
 do in mediis musculis, glandibus, vlceribus, vlcerum la-
 bris, ex materia crassa, lenta, & frigida, qualis est pituita,
 5 & melancholicus succus. Sed è melancholico succo omni-
 no cancroſi ſunt, & malagmatis exaſperari ſolent. Inflammationes in ſcirrhum cogi contingit, ſi materia craſ-
 ſa & lenta eſt: ſi adhibita pharmaca, quæ nimium ſiccant
 & calfaciant, qualia ſunt *πιοπατινὰ* & *ἑξίππωτινὰ*. Hinc
 10 enim tenue exprimitur, reliquum occaleſcit. Sic enim to-
 phi in articulis, & calculi in renibus lapideſcunt. In tenui
 ſeroſâque materia non ita metuendum: tota enim facilè
 exhalat. In crassa & viſcida omninò declinanda quæ ſic-
 cant, diſcutiunt, adſtringunt: ſiquidem ſola molliendi cu-
 15 ra eſt. Malaſticis quod clementer digerat, interim com-
 miſcemus, vbi iam malagmate cœperit tumor durus edo-
 mari. Phlegmone & eryſipelata in ſcirrhum degenerant
 nimis refrigerante atque adſtringente materia. Sed à
 phlegmone ſcirrhus amplior eſt. In vſu malagmatû cer-
 20 tæ ſunt leges. Primùm enim cognoscendum, quantû pars
 ægra à ſua ſymmetria receſſerit, quantûque vitium in-
 creuerit: ex quo æſtimandæ remediorum vires. Tum na-
 turas partium diſtinguere oportet: poſtremò artiſcioſè
 colligendum, qua ratione emollias: num quid ammiſceas
 25 quod detergeat, incidat, diſcutiat. In quorum omnium
 vſu modum, occaſionem, quale, quantûque animadu-
 erſas. Deſperatur ſcirrhus qui ſic occaluit, vt iam non ſen-
 tiat, & inde glabreſcat locus. Deſperari dico, quia nullo
 malagmate domari poſſit. Etenim reſcindi ferro, & ſepti-
 30 cis exedi poteſt, niſi à ſubiectis nêrvis, venis, & arteriis me-
 tus eſt. Scirrhus cui ſenſus aliquis vel obſcurus, vt magis
 minûſve induruit, ita leuius aut efficaciùs auxilium re-
 quirit. Mulieribus, eunuchis, pueris, vrbaniſ, ocioſam at-
 que vmbraſtilem vitam degentibus, lenior medela: meſſo-
 35 ribus, foſſoribus, duris omninò & laborioſis corporibus
 fortior vtilis eſt, In lenta & contumaci materia miſcen-
 dum aliquid quod incidat, atque detergeat: quod in chor-
 diſ & tendonibus faſcitari ſolet. Tale eſt acerum mul-
 ſum, vel per ſe, vel in quo hyſſopum, thymum, pulegium,
 & ſimilia præcoxerint. Eſt & hoc animaduertendum.

Scirrhus

Scir. cãcro-
ſus irrita-
tur mala-
ſticis.

Cautio.

Leges in
vſu malag.Deſpera-
tus ſcir-
rhus.

Particula- rum mate- ria. Scirrhus quidam simplex, alius *φλεγμονώδης*, ut quædam inflammatio *σκιρρώδης* est. Scirrhum malacticis & diaphoreticis excuties: phlegmonem lenies & concoques. Vbi utrunque coit, ut hoc vel illud superat, ita remedia temperabis. Leniter emolliunt butyrum, tùm cœsypus, & lana succida: hæc oleo infuccanda amygdalino, chamæmelino, in quo semen lini, althææ fœni Græci: in quo malux, cucumeris agrestis, & liliorum radix, tenella malux agrestis, & liliorum folia, vel anethi cacumina præcoxerint: in quo illiquatum fuerit aliquid galbani, ammoniaci, bdellij. Lentiscinum, terebinthinum, mastichinum, vsurpari debent ubi molliendum digerendum, ac leniter repellendum. Hyoscyamino locus est in calida & iam durescente inflammatione. Hæc ergo olea in lana sordida molliter apprimenda sunt: hinc enim multò commodius malacticon impones. Omnia verò prius intepefcere oportet, & frigida omnino vitanda sunt. Expressa oleorum materia, & cum adipe pista, malagmata confinges. In hoc quoque genere censentur, vitellus oui, crocus, cera pinguis, caricæ pingues, *κρίλαιον* è duplo oleo, ut sit humidissimū: aqua-
αγγέλιον. li ut sit medium. Iam crassius est, quod ceræ partes quatuor, & olei tres continet. Caricæ pingues cum irino tritæ, scirrhis hepatis & lienis opitulantur. Id habet peculiariter scirrhus hepatis, quod leniter mollientia desiderat, mixtis aromatibus, quæ calfaciant, & attenuent. Siræon è
Siræon. pinguibus caricis ad melliginem coctis mollior, deterget, ac digerit. Adeps & sebum: utrumque coquit, laxat, & mollior. quæ quia materia vnde generantur, genere animalium, & loco ubi cōcrescunt natura denique (nam adeps humidior est) differūt, cum Aristotele distinguas licet: ut in natura molli, adipe, in dura sebo potius utendum putes. Rursum quia minimum est quod dissident, misceri possunt. verum utrunque genus natura, & specie animalium, ratione vitæ, & pabulo, sexu & ætate: deinde quia hæc recentia, illa vetusta, alia syncera, alia condita sale, aromate: vel ex-
Mirum de axungia. terna imbuta qualitate distinguendum est. Lenissimus suillus adeps, axungiam vocant, in qua mirum est, & experimento constare veteres scripserunt, quod ea genibus
Tres natu- ra adipum. adligatā, reedit in os sapor, ut etiam expui videatur. Ex quo

quo fortasse non vnus hydrargyri qualitati, sed totius
 mixturæ ex hoc & axungia illitis in lue venerea, os gra-
 uius exhalat, & salua madet. A suillo sunt vitulinus,
 hœdinus, caprinus, bubulus: quibus si vis, vulpinum &
 5 leporinum adiciēs. Atque hi leniunt magis, & conco-
 quunt. Efficacissimus est leoninus, cui proximi sunt
 hyæninus, pardalinus, vrsinus, & hi duriora corpora
 emolliunt. In medio sunt taurinus, hircinus, cerui-
 nus. Involatilium genere efficax anserinus, anatinus,
 10 olorinus: ficcior è gruibus: suauis gallinaceus: calidior
 columbinus. Ex anguillis & piscibus fluuiatilibus lan-
 guet: humanus mediocriter valet ad omnia. Domesti-
 corum animalium pingua humidiora sunt, vt suum,
 quàm aprorum: è maribus ficciora & calidiora. Ca-
 15 strati mares fœminis respondent. E iunioribus humidior,
 è senioribus ficcior est adeps. Pingua oleo magis mol-
 liunt, & calfaciunt, ætate tenuiora fiunt, & acrimo-
 niam contrahunt. Purgatur adeps exemptis venis,
 quas fibras vocant. Salsus vel conditus aromate ficcior
 20 est: constat verò pepticis & malaëticis aduersari, quæ
 nimium siccant, quanquam Plinius conuenire scribit
 salsam axungiam mollire magis. Id in suillo fortasse
 concedi potest. Recens adeps si deficit, & vetus ad curam
 reuocandus est, liquefieri prius oportet, mox frigida sæ-
 25 pius lauari: postremò etiam vino quàm odoratissimò.
 Eo modò sæpius liquatur, cogitur, lauatur aqua,
 dum omne virus exuat. Medulla in sebalibus sebo, in
 adiposis animalibus, adipi respondet: viscera, chordas,
 tendines, musculos emollit. Ex ossibus humidior, è spina
 30 ficcior est. Prima laus ceruinæ, quæ nullis malaëticis in-
 ferior est: virulina sequitur, tum ouilla, & caprilla, acrior
 taurina quàm vt emolliat. Atque hæc leuiores sunt. Du-
 rioribus naturis conueniunt: Ammoniacum quod aceto
 liquari potest, leniter decoquendum: ne effuerescat.
 35 Bdellium molle ac pingue salua hominis subigitur,
 molli, coquit, modicè digerit. Styraç idem efficit.
 Galbanum præter hæc septon, & anodynon est: re-
 purgatur, liquefit vino vel aceto, neque coctionem susti-
 net: his efficacior opopanax. Ladanum molli, ac repellit.
 Propolis

*Salsus a-
adeps.*

*Vet' adeps
vt recens
fiat.*

Medulla.

*Secundus
ordo.*

*Emplastica
esse oportet
malac.*

Propolis ammoniaco vicina est. Sint hæc omnia mollia & pingua pro sua quæque natura. Malacticis resinæ commiscantur, qua hæc emplastica esse oportet. Resinæ sint, quæ acrimonia careant. Chia, larigna, picea, abietina, terebinthina. Pinea nimium siccatur, strobilina acrior est. Bitumen, pix aridior: in summa, quæ nimium siccant, quæque acria sunt, reicienda. Pix mollis & bene pinguis, qualis olim brutia, commisceri potest. Succedit his miraculosum ex aceto remedium. Scirrhus malactico oleo fouetur, tum emplastico malagmate inducitur, idque aliquot diebus repetendum. Sitque initiis leuius malacticum, postea etiam paulo efficacius, ac postremo aliquid aceti combibere oportet: vbi verò mollior tumor extiterit, pyritem, lapidem molarem, aut silicem vnde scintilla decutitur, candentem igne, acerrimo aceto de-

*Hoc primo
lib. dictum
est cap. de
curatione
cirrhi ille-
gitimi.*

merges. Exhalabit plurimus vapor, quo scirrhus aptè infundendus est contacta parte, & omnino præclusa via, ne dissipetur fumus, sed totus in scirrhum coeat. Locum verò, satis infumatum oleo tepido fovebis, & ut prius, malagmate conteges: post dies aliquot aceti usum reuocabis, ut sit iaceti & remediorum vicissitudo. Verum neque diutius, neque sæpius halitu aceti pars vexanda est, ne in lapidem concreascit, & nervosum genus grauius lædatur. Sed ut molliendo profeceris, ita acetum repeteris. Et in malacticis vsus similiter interpellari debet, primum enim è caricis, medullis, adipibus, cera & oleis, exigua resina, malagma conficies. Tunc ut res succedet, ad ammoniacum & similia veniendum: ac primum quidem citra acetum, post etiam cum aceto comparentur: quibus cum vno, vel altero die fueris vsus, ad ea, quæ leniora, quæque sine aceto sunt, redeundum: ut veluti circulo quodam, & è re nata auxilia repetantur. In musculis & liene tutior aceti consuetudo est. In chordis & tendonibus neque diutius neque frequentius vtendum erit. Ammoniacum aceto fufum manibus ducitur, ut sit luti crassitudo. Fermentum coquitur aceto, hepato duro & leni, ac fortius acetum in quo tritum hyssopum, thymum pulegium, & similia maduerint. E lini semine hydrelyzo cocto, & adipi mixto: althææ radice arida trita, vel inde rasa parte medullacea, resinæ momento mediocre

mediocre fiet malagma. *πάρυσρον* recens (si quid phlegmones) inueteratum alioqui, Heræ & veteribus laudatum est. Adipis suilli recētis & bene purgati vnc. quadraginta quatuor, ceræ vnc. viginti quatuor, cerusæ, lithargyri ana vnc. sex. liquabilibus fufis reliqua trita misceantur.

- 5 Aliud, Lithargyri, cerusæ ana vn. tres, succi seminis lini, olei, ana vnc. viginti, ceræ vnc. octo, adipis suilli vnc. quatuordecim, colophonix vnc. octodecim: pernionibus, & callosis rimis calcaneorum competit. *Διαλθαίον*, carbunculis, clauis, furunculis: litharg. olei, ana lib. vna: galbani libræ dimidium, ceræ terebinthinæ, ana libram vnam, radicum althææ, fasciculos quatuor: litharg. diu ex oleo reritur in mortario, cera & terebinthina fusa commiscuntur: postremo radices tusæ ligneo pistillo concorporantur. Radicum *Μνάσα* secundum ordinem.
- 10 althææ & liliorum, ana vnc. duæ, coquantur in hydrelæo ad aquæ consumptionem. tum Recipe olei inde expressi, adipis suilli, lithargiri, ana libram vnam: litharg. ol. coquitur dum non inquinet, & adeps commiscetur. Colophonix purissimæ vnc. duæ: ceræ albæ vnc. quatuor mastiches vnc. vna, olei, quod sufficit, vt sit iusta crassitudo. Terebinth. ceræ, ana vnc. nouem: galbani, nitri, ana vnciam, thuris pinguis, sesquunciam, medullæ cerui, vncias duas, propolis pinguis, sesquunciam, olei laurini, sepi vitulini, ana drachmas duas, vel eo plus, vehementer molliet, atque discutiet. Violentum quod sequitur, tantum rusticorum, & iam præmolito scirrho. Caprinum stercus solutum oxycrato, polētē iunges, & affuso si vis oleo, cataplasma finges.

- 25 Stercoris caprini vnc. duæ, radiceis cucumeris agrestis, ficuum immaturarum, ana vncia vna, staphios agrias, bdellij, farinæ fabarum, amygdalarum amararum, ana drachmas quatuor, fæcis olei antiqui, quod sit satis ad emplastrum. E veteri caseo, ac iam putri, potentissimū fit remedium. Subigitur caseus, è iure in quo suilla perna bene pinguis coxerit. Tophos mollit quasi miraculo coccum candidum desquammatum, cum myrrha & aceto tritum.

30 *Διὰ χυλῶν*, Aquæ sext. viginti [Orib. duodecim] radicū althææ recentis, lib. tres: [Orib. quatuor] fœni græci, seminis lini, vnciæ nouem: [Orib. vnc. octodecim] radices purgatæ tusæ, diem integrum macerentur aqua, postridie fœnum græcum lotum fideliter & purgatum adiciatur: tertio

lini semen similiter lotum eadē aqua in qua reliqua etiam-
dum madent, immergitur, quarto die coquuntur omnia
ad crassitiem, tum expressa & traiecta colo materia vsui
seruatur. Jam verò Recipe olei pinguis æstare lib. septem &
semis. hyeme lib. quatuor: succi prioris lib. quatuor: mixta &
in primis coquito, dum bullæ extent, tum litharg. triti lib.
duas sedulò commisceto, agitato bene puro foco, bullire
finito dum non inquinent, & medicamentum colorem fla-
uum iucundumq; trahat. Hoc sublatum igne conuoluto
rude, manibus subigito, in pastillos fingito. Vsus tempore
Recipe pastillorum vnc. duas: ceræ, olei, ana vnc. vnā, colli-
quato. Potest medicamentum aliis malacticis vniri, tam
efficax, vt hoc vnum sine aliis chirurgis satis esse possit: glu-
tinat superficialia vlcera solutū rosaceo, vel myrtino: alias
implet, & cicatrice regit. Liquatum chamæmelino, vulne-
ra neruorum inflammatione liberat: podagricis quouis
tempore opitulatur: veteres vteri phlegmonas persanat in-
ditum pessario.

*Vs medica
menti Διά
χυλῶν.*

*Διά χυλῶν
Ορίδας.*

E semine lini, fœni græci, hordei, radice althææ, vt prius
maceratis, coctisq; succus exprimitur: tum libris duabus
succis, additur litharg. olei, ana libræ duæ, ceræ vnciæ octo:
lithargyrum cum oleo diu teritur, & cum cera leniter con-
coquitur, infuso oleo postremò succus adiicitur, versantur
omnia, & sedulò commiscuntur. Sunt & alia Διά χυλῶν
malagmata, vt Alexandri è psyllio, quod Aëtius describit:
& Magnum Mesuæ ad strumas sine gummi, & gummo-
sum quodq; paruum, album: & magnum passim conficiun-
tur. Paruo vtendum in duris inflammationibus: album
mediocres scirrhus adiuuat: magnū reliquis efficacius est.
Est & Διά μελιότων veterum, & recentiorum dialthæas de
muscillaginibus. Oleo è maiorana & sicyonio, aliisque id
genus molliri possunt, & adiecto galbano, & similibus, for-
tiora reddi. Priuatim conueniunt duris inflammationi-
bus mammarum, violaria & althææ folia hydrelæo cocta,
adipe vituli conteruntur ouorum vitelli duo, insecta cro-
co commiscuntur. Hædina capita, veruecini pedes cum
althæa & violaria percoquuntur: in expresso succo, oryza
bene munda, & asperiore linteo attrita, decoquitur: buty-
rum recens iniicitur: postremo cum iam corpulenta pul-
cula est, ouorum vitella croco tincta commiscuntur.

Plura

Plura malagmata septimo de compositione pharmaco- *Malagma*
 rum κατὰ γένη, & decimoquinto Aëtij describuntur. Sed *ta quæ v-*
 octauo κατὰ τόπους alia sunt quæ siccant, contrahunt, indu *surpanda.*
 rant, nec emolliunt: quanquam malagmata & Asclepiadi,
 & Andromacho appellata. Quæ verò malactica, corpu-
 lenta & emplastica sunt, si neque dolor, neque phlegmo-
 ne prohibet. Locus oleo fouendus, ex quo subiiciatur ma-
 lagma remollitum pingui vel oleo, ne celerius exarescat,
 tum enim reuellendum est, & aliud imponendum, alio-
 qui pluribus diebus hæere conueniet.

De suppurantibus.

CAP. V.

I Am hoc genere vtendum nobis est, cum ab *Quando &*
 aliis remediis desperatio est. Ac ferè maiores *vbi preci-*
 phlegmonæ suppurat, pulsant, dolent. Dum *pne viedm.*
 pus conficitur, inquit Hippocrates, dolores
 fiunt ac febres. Suppuratis, omnia ferè con-
 quiescunt. In sugillatis hæc eadem remedia sæpe conue-
 niunt. Sunt autem natura modicè calida & humida,
 iisdem limitibus circumscripita, quibus temperiem homi-
 nis definias. Ideoque eligenda materia, quæ naturæ cor-
 porum elementari familiaritate consentiat. Emplastica
 sunt διαπυρρική (sic enim hæc appellant vt ἐκπυρρική & *ἐκπυρρική.*
 πεπτική) vt præclusis inde spiraculis, natium calorem in-
 hibeas, in quo concoquentis naturæ robur est. Ita substan-
 tia quidem calor augebitur, neque qualitate crescit: solidæ
 partes confirmabuntur, insitus humor persistet: dis-
 sipabitur verò, qui inanibus spatiis alienus est. Ex quo vi-
 tium concoquetur, & consuetudine partium similiarium
 exalbescet, fietque tandem pus album, lene, & vniforme:
 quod quia alimento esse non potest, exesa cute vias sibi fa-
 ciet, atque ita effluet. Non absimili ratione χαλαστική vo- *χαλαστική*
 cata ἐκπυρρική fient, si accesserit crassities partium: eodem *sunt ἐκπυρ-*
 modo quæ leniunt, calfaciunt, & adstringunt. Emplastica *ρική.*
 modicè calida, omnia concoquunt. Præter in iis, quod est
 tenue: reliquum verò vel contracta, vel illita cute vias in-
 tercipit, ne quid spiritus exhalet. Contra verò si expirat
 calor, nec emplastica materia est, nihil suppurat, & aliquā-
 do alienus calor succenditur, vnde putredo. Echecolla per
 se hærent: reliqua verò vel gummi, vel resinis implicanda,
 vel commodè alliganda sunt. Malactica calidiora sunt, *Malacti-*
ca quomo-
do differat
à pepticiis.

& leniter siccant, insitumque humorem paulò minuunt:
 quo nomine à pepticis distinguenda, ne similitudine fal-
Vitanda. lant. In pepticis vitanda, quæ detergent, & vehementer
 calfaciunt. Nihil enim quod valde discutiat, pepticum est:
 & quod deterget, poros expurgat, quos illinere oportet. 5
 A siccantibus metuitur, ne frugi materiam exorbeant:
 multò magis, si præterea calfaciant. Neque verò contra
 nos faciet, quòd in historiis medicorum permulta pepti-
 ca sint, quæ mixtis diaphoreticis, deterforiis, atque siccantibus temperentur. Qualitas enim rerum mixtura retun- 10
 di potest, & multa vitia eodem tempore interdum còeunt,
 vnde varia misceri necesse sit. Ac sæpe facit abscessus natu-
 ra, vt acria etiam misceamus. Peptica sunt, aqua tempera-
Materia. tè calida affusa parti: modus est, vt inde erubescat locus, ac
 leniter extumeat. Nimium fit, si inde subsidet, aut expal- 15
Aqua. leat. Hydrelæo, & oleo pingui ac dulci, modicè calidò, &
Oleum. butyro similiter vtendum est. Triticum ore præmansum,
Triticū, farina, panis. saluaque hominis commolitum rusticis corporibus con-
 uenit: leniora sunt, farina tritici, & inde panis, perpur-
 gata furfure, dissoluenda aqua, oleum, vel butyrum additur: co- 20
 quantur omnia vt sit cataplasma quod lenit inflammatio-
 nes vulnerum, & celeriter maturat. Vbi calor aliquis su-
 pereff, minus cocto pane ac recenti, quem vel hydrelæo,
 vel pauciore oleo insperferis, vtendum erit. In contumaci
 vitio, sed minus calenti, panis siccior vberiore oleo molli- 25
 ri debet. Panis còditus sale, efficacior est. Farina hordea-
Farina hordeacea. cea per se inutilis, verum quæ bene purgato grano extun-
 ditur, & castratur furfure, eodem modo quo triticea com-
 parari potest, hydrelæo cocta, conspersa oleo, mixta buty-
 ro: sic enim pus faciet, & calidioribus phlegmonis confe- 30
 ret, præsertim hydrelæo cocta. Tale fuit cataplasma vete-
 rum ὀμήλυσσι, vel ὀμήλυσσις ex farina hordei, quod prius to-
 stum non fuerit: quanquam etiam licentia quadam ad
 alia farinarum genera nomen transtulerunt. Est & alia
 ὀμήλυσσις ex farina hordei, fœni græci, seminis lini, in sapa 35
 coctis ad glutinis corpus, adiectis interim duobus vel tri-
 bus vitellis. Adeps suillus phlegmone familiarissimus,
Adeps. deinde vitulinus. Taurino & caprino in duris frigidis-
 que tumoribus vtendum est. Leoninus, & reliqui huius-
 modi, inutiles. Gallinæus, & hoc paulò acrior anseri-
 nus

- nus vsurpari potest. Pix & resina in feruenti phlegmone, rosaceo: in frigidiore, vetere oleo, Sicyonio, vel simili liquanda sunt. Pix arida, qualis Coracina & Colophonia, vberiore oleo dissoluitur: pauciore, quæ liquida est:
- 5 mediocri, quæ natura mollis, digitis cedit, lentoris particeps, qualis olim Brytia & Lytia. Picatum ceratum, & anodynon, & pyopeon est, ideoque inflammatis vlceribus conuenit. Resina sit terebinthina, & lentiscina. Cera languidior, resina acrior, confusa ad suppurandum valent.
- 10 Eluantur prius, si quid acrimoniæ conceperint: molliantur oleo, vel butyro, cum exaruerint. Oesypon veteres in pepticis censuerunt. E flore lilij succus exprimitur, supurationes concoquit, & vuluas mollit, quod mel, & syrian veteres appellarunt. Siræon verò melligo è coctis
- 15 caricis detergendo & molliendo idoneum est. Decoctum caricarum lenissimum est, quod maxime coquit, ac digerit: In aquæ sextariis sex, pinguium caricarum lib. quinque decoquendæ, dum sextarij duo reliqui sint: magis maturabis, si inde pista farina triticea, cataplasma fines.
- 20 Vbi verò digerendum magis, ac refrigerandum, hordeacea melior est. Eodem modo althææ decocto, & vix passæ succo, farinas vel panem purissimum incoques, & inde cataplasmata intinges croco. Crocus coquit, & leni adstrictione confirmat partes, & poros contrahit. Pinguisimas passas, exemptis nucleis, per noctem aqua macerabis, postridie coques ad melliginem Inueteratis & callofis tumoribus conueniunt, colla librariorum quæ sit è purissima farina: viscum aucupatorium, styrax pinguis, ladanum, galbanum, thus in corporibus temperatis mol-
- 30 le, album, pingue, dumque manditur, minimè friabile. Rhodinum & myrtheum in calidiore & dolenti phlegmone misceri possunt: vt pix, resina, viscum, colla, & similia: vbi perucax malum & platysmata diutius hæere necesse est. Miscentur quoque stercus suillum, columbinum, caprillum, nitrum. Et iam notum mulierculis remediû, pueri stercus calidû, duris & inflammatis mammis: aliis quoque partibus impositum. Certum experimento est, breui tempore concoquere: ac in foeditate excrementorum auxilia inuenta sunt. Furunculos & parotidas mollit,

*Pix.**Picatum, ceratum.**Syrian.**Siræon.**Decoctum**caricarum.**Cataplasmata.**Croco.**Melligo**passæ vix.**Efficacio-**ra reme-**dia.*

ac suppurat cataplasma è coctis ficibus, calce, iridis radice,
Loco nitri. vel nitro. Omnino si nitrum deficit, sale torrefacto in mollioribus, vsta fæce vini, vel aceti, quæ acrior est, in durioribus, vtendum erit. Fæx sit recens, nam celeriter exolescit: vulgò etiam nota est medela è cepis cineribus coctis. Te-
Tetrapharmacum. trapharmaco veterum primas tribuit mouendo puri, non aspernabilis autor Cornelius Celsus. Idem remedium à Græcis suppurando vsurpatum. Constat pice, resina, cera & adipe: vsus tempore, oleo, vel butyro subigitur. Pix sit mollior, resina fricta, vel Colophonia, quæ in teneris corporibus oleo molliiri potest: cera pinguis, adeps in mollioribus naturis, vel suillus, vel vitulinus: in durioribus, taurinus, vel hircinus. Hoc tetrapharmacum Paulus basilicum, Scribonius emplastrum Aristi nigrum appellauit, & aliud basilicon descripsit. Tetrapharmacum thus additum facit Macedonicum, quod & pepticon est. Basilicon minus, hoc imbecillius commutato adipe in oleum, quanto adeps oleo efficacior est. Sic oleum quoque, variè commutare licet. Oleo rhodino, myrtino, vel simili, tetrapharmacum durius molliatur, vt corpus & affectuum natura exigit. Mirabile hoc ad molliendum & suppurandum. Cera, terebinthinæ, medullæ cerui, adipis vituli, anserini, bubuli, butyri recentis, mellis optimi, olei rosarum, myrrhæ, ana vncia vna. Myrrha cum melle subigitur, & prunis leuiter incoquitur, ex quo reliqua adiecta sedulo misceantur. Picis vnc. vna, cera vnc. tres, axungia veteris purgata vnc. sex, adipis taurini, æsypi, ana vnc. tres, resina pineæ, vel magis piceæ vnc. quinque: liquatis vtitor. Resina vnc. duodecim, cera æruginis rasæ ana vnc. 8. sepi vituli vnc. duæ, aceti, mannæ, ana vnc. i. manna & erugo cum aceto liquantur & conteruntur, reliqua dissoluta commiscuntur: molli, coquit, purgat, digerit. Ceparum & alliorum coctorum in cinere ana libr. vnam, vitellorum numero quinarium, radices lapathi coctæ lib. dimid. farinæ, fœni græci, vnc. tres, fermēti vnc. duas, axungia lib. vnam, fiat corpus. In frigidis & crassis humoribus conuenit. Locus oleo peptico, succo, vel hydrelæo foueatur, sympepticon medicamentum inducatur, mollis stuppa, vel lana succida superponatur: omnia decussata fascia colligentur, vt qua parte diuisa fascia est, conus abscessus aduertat, nec affe-

affectum locum opprimas: semel in die vel rarius commu-
tari debet, nisi vel dolor vrgeat, vel pharmacum exarescat,
ita verò formari sympeptica oportet, vt neque liquidiora
diffluent, neque corpulenta nimis locum opprimant. Iu-
stum corpus est cerotomalagmaton & emplastrorum, ac
quod antè dictum est *ἐχονδρα* & glutinosa esse melius est,
vt per se sine vinculis hæreant: quanquàm & emplastice
lanam succidam, aut mollicula splenia superdari & omnia
colligari nihil prohibet, idque hyeme magis & frigore.

De aperienda vomica. CAP. VI.

10



15

Væ suppuratio, sponte sua non rumpitur, fer- *Noxa sup-*
ro, igne, vel medicamenti aperienda est. Alio *pressa ja-*
qui serpit sanies, & cuniculos agit: venas, ner- *nei.*
uos, arterias, & vicina corpora depascitur: at-
teruntur ossa, & cariem ducunt, liuescit cu-
tis, & in rugas quasi senio marcescens contrahitur, idque
metuendum magis in digitis, articulis, partibus corporis,
quæ in decliue patent. Sic enim parotides, femorum ab-
scessus in fistulas cauantur, & quæ facillè putrescunt, qua-
lis anus est, os, & loci genitales. Quare etiam si tumor non-
dum satis maturuit, ea pericula ferro anteuertunt, multò
magis si pestifera aut virulenta materia, vomica includi-
tur: quanquam animaduertendum, vt ne nimis citò. Nun-
quam enim vis naturæ gratis inferenda est, sed semper ali-
quid beneficii, nihil maleficii proponi debet. In vomica *Cautio.*
quæ tardius erupit, membranæ, neruacea corpora, & alia
semiputria sæpe occurrunt, quæ nec intempestiuè rescin-
denda sunt. Sua enim putredini maturitas est. Alioqui
noua inflammationis & conuulsionis pericula creari so-
lent. Neque perpetuum est aperire vi, quod suppuratum
est: sed si nullum in mora periculum apparet, diaphoretic-
um remedium imponendum, quod loco mollior absces-
sus est, & digito cedit. Sic enim sanies exugi potest, idque
faciendum magis, cum alta parte vomicæ, non decliui, sup-
puratio se colligit. Quod si ferro, vel igne vtendum est, *Animad-*
prius animaduertere oportet, ne quod vas insigne, neruus, *uerièda*
tendo, vinculum, ne quid neruosum, quales membranæ *vsu ferri*
quædam sunt, aut potius lati tendines conuulnerentur. *ignu.*
Parcendum etiam quibusdam partibus, quæ vegetius fen-
tiunt, & à quibus vis ignis ad principia transeat celerius.

*Vbi caute-
ria pericu-
losa.
In capite.*

In collo.

*In exte-
rio humero.*

*In meso
pleurij.*

In ilibus.

In sede.

*In genita-
libus.*

*Sub nati-
bus.*

*In buboni-
bus.*

*In articu-
lis.*

*In ischia-
dici.*

In musculis fibrarum interstitia cultello ligneo, vel digito diducenda, ne fibræ præcidantur: idque cum in profundo sanies refedit. In his omnibus anatomica disciplina opus est. Cauteria periculosa, occipitio, temporibus, & vbi-
que caluaria mollior est, vbiunque vel exitus neruorum, vel aditus vasorum est: nec ea ipsa oculus sustinet. In cranij fracturis, vbi modiolis, cyclificis, terebellis, via puri fit, a futuris, neruorum radicibus, molliori ossæ ferrum declina-
mus. In strumis, & colli abscessibus, a carotide arteria, vena sphagitide, vocali neruo abstinendum. Illinc hæmor-
rhagia, quam ægrè supprimas: hinc vel omnino mutus, vel certè semimutus homo relinquitur. Exteriore parte hume-
ri tendo est, qui ignem ferrumque non sustinet. In em-
pyicis & deploratis pleuriticis scalprum & cauterium in-
feriore parte mesopleurij collocamus, quia videlicet supe-
riore vena, arteria, neruus est. In extremis ilibus multi
sunt tendines, multa vasa coeunt ex quo vomicas hac par-
te prudenter aperire necesse est. Inuritur carnosus podex,
& ferrum sustinet non ita, quod illic neruaceum est. Ea-
dem ratio in genitalibus seruari debet, vbi ab arteriis can-
nendum, quæ illuc plurimæ coeunt, hiantque maioribus
clausulis: nam inde hemorrhagiæ non ita facile suppri-
muntur. Sub natibus, neruus est, qui si iuxta suppuratio-
nem præciditur, aut nudatus violatur frigore, subiectum
crus stupidum relinquit. Idem animaduertendum in re-
liquis partibus, ne nudi maneant nerui, & frigore cōtrahan-
tur. In bubonibus glandule sunt, quas perreptant venæ
& nerui. Ideoque si quando inurendum, apprehendenda
prius cutis est, & in vulneribus, quæ ferro fiunt, eadem ra-
tio seruari debet. Hoc reliquis partibus commune est, qui-
bus subiectæ venæ, nerui, & arteriæ. In articulis perpe-
tuo suspectus ferri & cauteriorum vsus: ideoque ischiadi-
cis inferiore parte quàm malum est, ignem adhibemus. In
perinæi tumoribus qui inciduntur, summopere cauendum,
ne quid intus vulneres, quod postea egerrimè glutinetur.
Hæc omnia pericula facile declinabit, & alia, quæ breui-
tatis studio omissa sunt, quisquis in anatomicis operibus
fuerit exercitatus. Alioqui sæpenumero errare necesse est.
Et quia non semper similiter, sed variè, nerui, venæ, arte-
riæ, in corpus diducuntur, si quid è profundo rescinden-
dum

dum ferro, lentè quidem, & perpetuò duce oculo culter dirigendus est. Id quod in strumis, & vbi pus altius descendit, facere oportet. Primùm ergo cutem nudabis, si quid *In alto pure.* vaforum aut nerui occurrit, id ipsum digito, vel ligneo veruculo separandũ distinctis fibris, nec ita momētaneis membranis, quibus illa inter se coniugatur. Atq; vbi ad locum perueneris, in quo colluuius latet, & iam omnia tuta sunt, opportune parti gladiolum infiges, & ita vomica repurgabis. In reliquis vomicis videntũ, vt quantum oporteat, *10* culter descendat. Profundius vulnus hæmorrhagias commouet. Superficiale sæpenuero frustra est. Eodem modo cauterium superficiẽ exurit, vel altius imprimitur. Et hoc cauterium in molliore corpore mollius, quale è subere, & qui *Cauteria. Figura vulnerum.* busdam radicibus confingi potest. In metallicis aureum æneo & ferreo clementius est. Sed de his alio loco pluribus. Rectum verò, an transuersum, vel obliquũ vulnus esse *15* debeat, figura partium, flexus, rugæ, fibræ primũ indicant, quẽadmodum consiliũ iuuant subiecta vasa & corpora: præterea in collo, qua parte eunt vena, arteria, & neruus, rectum magis quam transuersum adigitur. Alioqui *20* transuersum melius. In fronte è rugis transuersum sit nec ita profundũ, quia membrana subest: aliis rectum placuit magis. In inguinibus è flexu transuerso ducitur: duplex interim angustum, & oblongum in myrti folium. In ventre, *25* nisi flexus prohibeant, vt sunt fibræ musculorũ. Eodẽ modo in reliquis. Simplex aliquãdo sufficit declini parte, duplici aliquãdo & trigono opus est. Atq; omnino ea parte scalprum imprimitur, quæ mollior digito cedit, magis acuminatur: & qua cõmodius sanies effluat, *ὀρόρησις* appellat exanitionẽ, vel vt alij, exaniationẽ, in qua & *ἐπιδιαίρεσις* est, & *ἀντιδιαίρεσις*. Nam vbi propensa parte foramẽ est, *ὀρόρησις* est, & *ἐπιδιαίρεσις*. Nam vbi propensa parte foramẽ est, *ὀρόρησις* est, & *ἐπιδιαίρεσις*. facile purgatur sordes: vbi verò in sublimi, restitare solet, deorsumq; subsidet, & sinuat: siquidem vomicosã pars nequeat pro arbitrio commutari. Quale est in trunco corporis, ac ferè capite & parotidibus. In manu & crure, etiam si *35* altius os vlceris positũ sit: poterit tamen ita inclinari, vt sanies liberè excurrat: tũq; manus quidem è mitella suspendi debet, vt carpus gibbero sit altior. Crus autẽ puluino innitatur, sublato genu & decliui in coxas femore. Vtrũq; ea ratione collocadum, vt sine dolore ita persistat. At si cui

parti id denegatum est, nec ea potest pro libidine conuerti, aduersa parte vulnus inferendum, quod *ἀντιδιαίρεσις* appellant. In aliis quoque manu & crure, quæ commodè inuerti possunt, quum sinus longior, cuniculosum vlcus, fordes vberior, etiâ aduersa parte lanceola immittitur: vt duplici exitu dato, vitiû celerius expurgetur. Est cum ab ore vlcus ad fundû ducto gladiolo, tota cavitates detegitur: vt in fistulis. Nonnûquam angustius orificiû ferro ampliatur, aut quod amplum quidem sed rotûdum, aucto vulnere in longum, aut aliter deformatur. Sed hoc nō tam purgâdo, 10

Cautio. quàm glutinando fit. Quibusdâ locis plurimæ concurrunt arteriæ, plurima vitalis spiritus materia est, hic paruo vulnere cōtentus eris, ne confertim ac semel erūpente sanie, simul magna vis spiritus diffuat: vnde animi deliquia, & nec opinatæ mortes consequantur. Et hæc quidem de fer 15

Medicamēta aperientia vomica.

ro & cauterio in aperiendis vomicis breuiter dicta sint. Reliquum est, vt eodem cōpendio de medicamentis quæ aperiunt dicamus: quibus ideò vtendû, quia mollior æger est, quàm qui vel ferrum, vel cauterium sustineat: quanquam medicamenta hæc cauteria quædam sunt naturâ quidem 20 caustica. Ideoquæ à quibusdâ veterû cauteria frigida vocata, à recentioribus potentialia: cauteria quidē quia reuera vrunt, frigida, vt ad ferrum & similia quæ igne rutilent comparētur. Neq; tamen sic vrunt, vt quæ caustica & septicæ postea describentur. Theriaca igitur adhibita, vomica 25 aperit vrticæ semen è vino tritum, frangit, purgat, incarnat, cicatrice tegit. Caulium radices vltæ, tritæ, & vetere axungia exceptæ, ita è radice cannæ, volutis ostracodermon, & testis prius crematis: adeps collectus è ranis viridibus arboreis: lac ficulneum, & tithimalli, cantharidum puluis, batrachij caulis, & folia: caninum stercus album tritum: terebinthina, vel adipe vetere concorporantur. Melligo anachardina similiter excepta. Sed hæc ita insistere oportet, vt aperiant, nec crustas ducant. Mixtum est, Fæcis, crematæ, vini vnciæ duæ, 35 fimi columbini, propoleos, salis torrefacti, æruginis, ana drachmæ tres, aquæ marinæ, vel in qua subduplum sal illiquauerit vncia vna: olei antiqui, aut feruescentis, vnciæ duæ: arida seorsum tundito, æruginem, fæcem, salelem in mortario simul terito: tritis in puluisculum aquam consper

conspergito, & iterum oleum misceto, vt fiat vnū corpus,

- Ex quo fictili vase, placido igne omnia coquito, dum tota exhalet aqua: postremo præmollitam propolim imposito: & vbi sublata igne paululum refrixerint, columbinum
 5 finum inspergito, pusillæ plagulæ, & oblongæ, quantum medicamento opus est, inducito, & conuenienter adaptato: tum amplius splenium malagmate illitum superdato. Fimi columbini, nitri, ana drachmæ quatuor, caricæ septem: quibus arida trita commisceto, ac bene pinfito, inducitōque vt prius: quod si durius medicamentū videbitur, purgatam axungiam & mel coniungito. Arsenico, puluere angelico, vel vocato mercurio, prudenter vtendum est, vt habeatur ratio corporum & vomicarum. Excipiantur butyro, axungia, terebinthina, visco. Superponendum
 15 folium ex iis quæ leniunt, vel molliunt: alioqui splenium epicerastico, vel malaetico illitum. Obseruandum in vsu horum medicamentorum, vt æstus vomicæ, & phlegmones acquiescat: vt quantum vulnus esse velis, tantum splenium constituas, in quo aperiens pharmacum positum est: videndum ne venam, neruum, arteriam violes, ne diutius relinquant. Quod si dolor acciderit, non committendum diutius vt vexetur æger, sed statim reuellendum pharmacum, & leniendus dolor est, pauloque clementius agere oportet. Minus vexabit pharmacum, prius forā parte laxante remedio. Epicerastico iam facto vulnere, temperandus calor. Plura libro decimoquinto Aëtij, & capite de pyroticis.

De purgantibus.

CAP. VII.



- 30 Equitur, vt purges. Ac si vomica dehiscit foras, neque fistulosa est, molli flocco, vel linteolo tum sinum ipsum, tum labra vlcis expurgabis: deinde medicamentis in concepto linamento cauum implebis, dum rubens, ac nimium neque siccum, neque humidum cauum extiterit. Quod si non ita expositum vitium est, sed intus latet, difficilior cura est. Et si quidem capite includitur, neque per aures, nares, vel aliter diffluit, modio loco, cyclico, ac terebellis patefacere viam oportet. Ad thoracem vnica ferè via est ab ore per asperam arteriam, nisi vulneris orificium in superficiem veniat: hic pyulcis collyriis, suctu puratio

Ratio purgandi.

καθαρί-
ναι.

*Triplex ex
cremētum
vulcerum.*

Vitanda.

*Scopi distin-
guendi re-
media.*

*Animad-
uertendum.*

*De ratione
abluendi.*

puratio exorberi potest, iisdemque machinis, vel melicra-
tum, vel aliquid tale iniicere licebit, vt aliquid sputis repur-
getur. Ad ventriculum, & intestina prima per gulam adi-
tus est. Clysteribus intestinum crassius expurgabis. Medi-
camēta verò καθαρτικά detergeant modicè, & siccent. De-
tergenda sordes, quæ corruptelâ corporis concreuit. Exic-
canda sanies, humidumque recrementum, quod stata na-
turæ lege ab alimento partis reliquum fit, aut aliunde illa-
bitur: ac ευσπινικά peculiariter appellant, quibus vis purgandi
data est. Vitanda quæ adstringunt, vnde sordes pertinacius
inhæreat: quæ laxent, vnde robur partium elangueat: acria
vt quæ colluue sordium cauum impleât. Sale, & eadē ma-
teria ideo abstinendum, quia vt detergeant, adstringunt
tamen & sordes impingunt, ac sæpenuerò vellicant. Hæc
autem ita inaudire necesse est, si non serpit vlcus, atque pu-
tre dine vicina depascitur: si non est callus, aut aliquid tale
vnde cōsiliū euariet. Vt sunt corpora, & sordes vlcerum,
ita qualitas remediorum distingui debet. Adde quod vel
recens, vel inueteratum malum est. Molli corpori, recenti
malo, nimium neque sordido, neque humido, parti præ-
tereà sensus acrioris leniora auxilia conueniunt. In cōtra-
ria conditione, contrariis consiliis locus est. Quod si pars
aliqua apostematis maturuit quidem, & pus reddit, alia
verò cruda est, huic sympeptica, illi cathartica: si quid du-
rius, illic malactica: si quid phlegmonodes, lenientia suis
quæque locis eodem tempore accommodabis. In purgan-
do plurimum valet recta abluendi ratio, de qua obiter di-
cendum est. Vbi ergo molli vellere, vel linteolo finum &
labra extēseris, si præterea abluas, magnoperè curationē
adiuuabis, vt ad cætera per se natura sufficiat. Itaque si sa-
nies acris est, sero, si copiosa sordes, melicrato: si multa si-
mul, & acris, sero in quo sacchari octuplum, vel tantūdem
mellis diffusum sit. Cū iam cœperit cauum esse purius,
œnomelite: post etiam vino è dulci austeriusculo vtendum
erit. In fœtido sinu putri & cruento, oxycratum conuenit.
Acetum, oxymeli, œnomeli, dilutum marrubij, absinthij,
aloës, myrrhæ, pauculo conditum melle putredines effica-
citer iuuant, & affato melle vti, melius fuerit. In fluxis, hu-
mentibus, & malignis vlceribus, ex atramento futorio, &
caricis in cinerem vstis, puluisculus œnomeliti inspergitur.

Nec

Nec improbandum ligni sancti remediū. Alij ænostagma probant, quia siccāt, & putredinem prohibet, cui aliquid mellis infundere licebit. In nomis, phagedænis, chironiis, & omnino malis vlceribus, veteres vsi sunt iis, quæ & detergeant, & adstringant, sed hæc rectè diluas, vt liquida infundatur. Ideoque aqua aluminosa, vel in qua malicoriū, myrra, ceteraque eiusmodi coxerint, vsurpari possunt: verum melius fuerit detergente materia prius expurgare, quàm adstringentia iniicias. Lixiuum è calce sæpius elota terget & siccāt, nec sine re laudatum est. In callosis, ægrè cohærentibus, cuniculosis, nimium sordidis, ex cinere ficus, tithymalli, aliisque id genus lixiua fit, qua quotidie sinus perfunduntur. Cancerosa adimit, quæ è sanā, id est, oliuæ nucleo comparata est. Aqua è larigna destillata, & resinis eiusmodi, detergendo idonea est. Melicrati & corum quæ mel vel saccharum recipiunt, modus est, vt sit decupla, sexcupla, vel octupla aqua: dilutione vti oportebit, cum iam purior sinus est: in sordidiore acrius cōuenit. In vlcere satis exposito linteolū prius insuccatur, leniter exprimitur, insinuatur cauo: humidiori exactissimè triti puluisculi insperguntur. Sicciori, & quod sorde offarctum est, emmota vel sine tilitis pharmaca mollia imponuntur: ex quo bene carminato vellere, os vlcis obstitandum est: deinde superponenda mollis spongia, vel quod Syriaca, & iam vulgari lingua cotton appellatur. Alioqui linteo aliquoties in se cōuoluto, tota vlcis regio cōtegenda est. Atque hæc omnia vino inculcabis, & expressa iniicias. Postremò artificiosè colligabis. Omnino tamen cauendum erit, ne quid durius aut grauius vlceri incumbat. Postea verò quàm tempus redierit, in quo vincula soluantur, atque reuellantur indita cathartica, recognoscendum sedulò, quanta qualisque fordes fuerit. Si enim minor appareat, bene est. Optime verò si purum vlcus est, & iam aliquid carnis succreuit. At si solito magis sordescit, ita distinguendum est. Nam si caritas maior, nouus calor & dolor adfuerint, id acriori medicamento attribues. Téperabis ergo cerato rosaceo, si maior calor est: si verò flaccidum vlcus apparet, myrtino. Quod si nihil horum extiterit, magis tamen obsorduerit vlcus, imbecillius catharticum adiecto melle temperabis. Et si humidius, siccantem pollinem sine mollibus insperges. Aliquando

*Cathartici
quomodo
vtendū.*

*Probatio
medicamēti.*

quando verò nimium siccando, & cōtractum, & exuccum vlcus reperiēs, qua in re siccantia humido dilues. In summa: iustam pharmaci qualitatem æstimabis, si purum vlcus inde redditum est, si naturaliter sentit locus vlcēis, qui sensu præditus est: si modicè rubet, ac nimium neque siccus, & neque humidus est. At quicumque sensu caret si non naturaliter sentit, si nimium aut aridus, aut flaccidus est, si pallidus, albidus, liuidus, aut niger est, is nondum purus est.

*Vermiculā
tia vlcera.*

Accedit aliquando ad sordes vlcērum: vt etiam vermiculētur, quo tempore aloē cremata inspergitur, veratrum album cum melle, polij & absinthij puluis cum pice imponuntur: vel nuclei perfici ē perficariæ succo pisti: plantago arefacta, cētaurium minus, marrubium, calamyntha, porrum, & similia vsurpantur. Arida teruntur, vel inde exprimitur succus. Eidem rei lixiuium conuenit, vrina, tilta denique imbuta ieiuni hominis salua.

Cancerosa.

In cancerosis cancri fluuiatilis cinis cum cadmia, aut cerato inditur, Irionis semen cōleuigatum melle, lens cocta cum melle, mel in tegula torrefactum, & solani succo madidum: oleæ virentis surculi exuccati, malicorium vstum, aizoi succus, vmbilici veneris, solani, intybi, lactucæ, psyllij, omphacis, atriplicis. Exprimere oportet, diu trita materia pistillo, & mortario plumbeis. Eodem modo tritus pompholyx diu conuoluitur, affuso succo qui conueniat. Floccus, aut vermiculus iisdem succis madidus imponitur, ac sæpius repetitur, vt succi frigus contineat. Sed hæc ad accidentia vlcērum magis pertinent, quanquā & quædam

Materia.

in his cathartica sunt. Repurgant tincta melle linamenta, aridum mel quod melitæis vasīs inhæsit, quodque in regula crematum est: mel rosaceum, quod & alienum calorem attemperat: serum lactis, terebinthina, cum melle & rosaceo pari mensura. Eadem cum butyro neruis utilis est: liquefieri oportet, & vnā commisceri. Iris serpentibus & pleinis sorde: marrubij succus cōditus melle, ærugo lota, caprinum sterces exustum & ē vino pistum desperata sanat.

Radix dracōis.

ligna curat dracōtij radix, colligitur sub canicula, siccatur vmbra, aliquot post diebus secta in taleolas filo traicitur, atque ita prudens vmbrosa domo, asseruatur: vsus tempore trita inspergitur: melli mixta vel cerato, ne acrior sit imponitur. Ex eadem radice cerusa factitia clementer purgat.

gat. Cicer, orobus, faba, hordeum, fresa omnia, & melli infriata: Lupinus vstus, tritus, & inspersus, maligna tibia-
rum vlcera purgat, implet, cicatrice claudit. Testarum, &
voluminum crematorum cinis, eorum quæ *ὀξυχρόδερμα*,
5 erinacei cinis, amygdala, stæchas, anagallis, aristolochiæ
radix, gentianæ, cyperi, vrticæ semen & irionis, humidio-
ribus, cancriosis, putrilaginosis, gangrænosus, mirificè
profunt. Dipsaci radix in cinerem vsta. Eadem ad mel-
lignem vino cocta, & pyxide seruata. Radices solani, cor-
tex, herba, succus, cacoëthe iuuant, & nomode vlcera. In
10 summa, quæ nitrosa, & amara: quæcunque ita detergent
& siccant, vt non mordeant, non astringant, purgandis vl-
ceribus idonea sunt. Arsenicum, & quæ ex hydrargyro
conficiunt, quandiu acrimoniam retinent, irritant vlcera:

15 sed putredini repugnant, vbi nec astringentibus, vt alumi-
ne scissili, nec mordentibus metallicis simul, astringenti-
bus, vt squama æris, ferri, stomomatis abstinendum est.
Nam & arsenico, & chrysocolle veteres vsi sunt. Minium
quod è sulphure & hydrargyro fit, his coniungi debet.

20 Clementius quod cerusa vsta comparatur, vel plumbi gle-
ba sterili. Secundum genus Græci *σαυδινά* vocant. Ex
quo diuturnis vlceribus & maleficiis medicamentum pa-
rant. Sandic. lib. vna, olei dulcis, lib. duæ coquantur lento
igne, dum non inquinent. Aerugo octuplo, decuplo, &
25 duodecuplo cerato mixta. Cere terebinth. ana drach. sex,
vel vn. vna; olei vnc. tres, vel 4. liquefiant in vase duplici.

Liquefactis adde ærug. drac. tres. Clementius est vsta
prius, & lota ærug. Potest dupla cere terebinthina com-
misceri: terebinthinæ libræ duæ, cere libra vna, rosacei,
30 vnc. tres vel quatuor, ærug. vnc. duæ vel tres. Liqua-
tis & coctis reliquis ærugo inspergitur. Quod plus ærugi-
nis recepit, magis siccatur, & deterget: quod minus, glutinā-
do idoneum est. Aegyptiaca fere similia sunt: Aeruginis
vnc. i. squamæ æris vnc. 2. aceti, vnc. 8. mellis vnc. 2. Arida
cū aceto terito; mel adiecto: omnia dū rufescant, coquito:

35 maleficiis cōuenit. Clemētius est, ex mellis, & terebinthine
pari pōdere. Cera viridis in Aegyptiacis numerari potest,
trita inspergitur, vel mollita oleo imponitur. Maligna
iuuat: Lithargyri libra vna: leuiter coquatur in aceti libra
vna: olei li. duabus. Iam inspissatis adde ærug. vnc. i. iterum
coquan

*Lupinus.**Minium.
Mixta.**E sandice.**Ex ærugi-
ne.**Viride An-
dromachi.**Aegyptia-
ca.**Cera viri-
dis.*

coquantur, dum ruffescât. Mellis libr. i. aceti, libr. semis: ærug. vn. i. aluminis, drac. 4. coque ad spissitudinem, dum ruffescat. Alij quoque aliter, modò vsta, modò lota: alias etiam vsta, & elota ærugine parant cathartica. Modus sit, vt ne mordeat. Habes $\chi\lambda\omega\rho\alpha$ è cruda: $\alpha\iota\sigma\tau\alpha$ è cocta descripta

Alia è farina.

à Gal. primis libris de comp. phar. $\alpha\lambda\alpha\gamma\epsilon\upsilon\upsilon$ E farina hordei, cicerum, fabarum, orobi, cum vitellis, momento mellis, & terebinthinæ, fiat catharticum. Alioqui farinæ conuenientis, vnc. tres: succi apij, absinthij, marrubij, vel similibus, libr. i. mellis, vnc. nouem: ad iustum corpus conco-
quuntur. Hordeacea in duabus partibus aquæ, vna mellis
rosacei percoquitur: purgat, lenit, calorem temperat: pote-
ris addere momentum larignæ, quam è succo plantaginis
elueris. Farinæ in memoratis succis coctæ, contra caneros
& fistulas valent: in laboribus neruorum, terebinthi coue-
nienter additur: myrrha & aloë, in putredine: in calore, fa-
bacea & hordeacea præferenda: calidior orobea, & è cice-
ribus. Amicissimum neruis, quod sequitur: Resinæ,
mellis, terreb. ana selib. myrrhæ, sarcoc. farinæ, sænig. sem.
lini, ana vnc. i. Liquatis aliis reliqua commiscuntur. Pus

*Neruis
amicum.
Pus eue-
cans.*

educit, & purgat mellis selib. terebinth. vnc. 3. farinæ, sæni
græci, vnc. i. radic. ireos drachmæ quatuor. Puri crassiori,
galbani, ammoniaci, resinæ, terebinthi. sepi taurini, ceræ,
olei antiqui ana in aceto mersa, paulatim fundantur igne.

Puluis ocl. Efficaciter purgat, & siccatur. Iris Illyricæ, vn. quinque
ad fistulas. farinæ orobi, vnciæ tres, mannæ thuris, calcis lotæ, ana
vnciæ tres, aristolochiæ, vnciæ tres, & drachmæ quatuor:

terantur omnia in puluerem: fistulas expurgat, & gluti-
nat. Quod sequitur, vetera vlcera repurgat, excre-
scen-
tem carnem reprimat, cicatricem ducit: Chelidonæ, plan-
taginis, scabiosæ, ligustici, vrticæ, ormini sylvestris, ana

*Viride ex
herbu.*

manip. i. conuasata, septem diebus in oleo macerantur:
deindè cocta exprimuntur: expresso succo adde ceræ. vnc. 3.
terebin. vn. 6. resinæ. vnc. 2. bulliant ad corpus. Subductis
igne, adde sarcoc. aloës, ana vnc. i. aristolochiæ lōgæ, æru-
ginis, ana vnc. sex. Fiat vnguentū. Vnguentū Apostolorū
variè describūt: respōdet ferè veneri antiquorū, quo hi vfi
sunt, attrahēdo, moliēdo, glutinādo, & contra ferarū mor-
sus: quod quia variè describitur, ex Aëtio vertimus, tantū
thure addito, & myrrha. Litharg. vnc. 25. ammoniaci, vnc.

9. Colophon. vnc. 16. æruginis, galbani, ana vnc. 2. bdellij, opopan. ana vnc. 3. aristoloch. longæ, vel rotundæ, thuris masc. ana vnc. 6. myrrhæ, vnc. 4. ceræ, ol. ana lib. 2. Lithargyron in oleo coquitur, media ebullitione inditur ærugo
 5 [recentioribus, decoctionis sine, vt melius purget] vbi nō inquinant, puluisculus colophoniz inspergitur. Summoris igne, reliqua ex aceto trita immittuntur: postremò versata in mortario commiscentur. Mellis costi. lib. 1. thuris drach. 4. myrrhæ drach. 2. Efficacius est, si drach. 1. æruginis, & tantundem terebinthinæ exceperit. Plura ex primo
 10 de comp. phar. natā γυν. 14. & 15. Aëtij.

De sarcoticis.

CAP. VII.



Vod iam purum quodque ἀπείριστον vlcus ἀπείριστον
 15 est, carne impleri debet. Tale est, quod sordibus purgatum, modicè siccatum, sine rheumate, dolore, phlegmone, callo, intemperie constitutum est. In summa, cui nihil accidit, quo minus impleri possit. Hic ergo carnē regenerato. Sed
 hoc naturæ opus est, quæ carnē è sanguine cōficit. Opor-
 20 tet ergo tantū talēmq; sanguinem naturæ suffici, vt inde carnē procreet. Instituenda vitæ lex: cibi boni succi, vitatis acribus, auis, venatio, suilla elixa dari potest. Vinū in dolore & phlegmone alienū est: datum alioqui modice, nec ita
 vetus, aliquando prodest. Reliquū verò sarcoticis medica-
 25 mentis perfici debet. Quæ reuera sarcotica, iustā materiā naturæ cōparant, modicè detergēt, siccant primo gradu: vel ita, vt ne nimis calfaciāt, Licentiæ est vocare sarcotica, quæcunq; repellunt, tēperant, molliūt, intemperiem corrigūt: in summa, summovent, omnia, quæ naturæ opus
 30 intercipiāt. In sarcoticis vitāda, quæ adstringūt, immodice siccāt, quæque acrimonia mordicāt. Illa frugi humiditatē partiū, & materiā carnis ebibunt: acria colligūt, & aucta sorde vlcera amplificānt. Seligenda materia, quæ naturæ
 35 impleat, statim & Socratē iuuare potest: nec quod in glā de carnē instaurat, protinus & præputiū incarnabit. Finge Socratē, cui femur vlcera-
 tum sit, thure alioqui sarcotico putredinē gignes: aristolochiæ puluere carnem restitues. Et enim Aristolochia carnē generat, vbi thus sordes cōmo-
 40 net. Ac rursus Diō sit paulò humidior tēperatis: huic thus
 Aristolochia.

Sarcotica.

Vitanda.

Distingue-
da materia
quomodo.Tus & A-
ristolochia.

commodū, aristolochia inutilis est. T hus quod in Dione carnē cōstituit, in humidiorē, vel sicciorē nihil tale efficit.

Natura partium. In siccioribus partibus, sicciora, in humidioribus, minus siccantia vtilia sunt. Ideoq; & præputio, & toti pelli, quæ colē induit, sicciora: peni, & glandi minus siccantia cōue-
niunt: carni etiam, quæ minus siccant: oculo minus, quàm nari: huic quàm auri. Sinus humidior, siccior: aridus minus siccate curari debet. Nudatis ossibus vitada pingua,
In ossibus nudatis. aridis vtendum, vt carne impleas. Vlcerebus pudendi, quæ
Vlcera pudendi. humidiora sunt, anethum vstū inspergitur, cucurbita sic-
ca, vsta, pompholyx, lapis hæmatites, pini cortex: horū ali-
quid in pollinē tritum, & mannæ momēto mixtum. Quæ verò madida nō sunt, aloë sicca, & mânæ portiuncula in-
carnatur. Eadem ratio in ano, & eius naturæ partibus seruari debet. Omnia ergo remedia suis finibus distinguēda, 15
& naturæ partiū vlcerūmq; accommodada sunt. Languidius sarcoticum, vel saniem acervat, vel mollē carnem, flaccidamq; gignit. Efficaciorē cauum exarescit, vel callosum germen enascitur, sæpē etiam excitatur dolor, & grauius vlcus arroditur. Sarcoticorū genus, quod multa perficit, 20
Signa imbecilli sarcotici, & acriori. sæpē vsurpatur: quia videlicet eo cura celerius absoluitur. Quod volumus subiecto exemplo intelligas, idq; in vsu reliquorum pharmacorū semel dictum sit. Glutinat, siccatur, deterget, & carne implet: Strobilina vnc. 3. cera vnc. 1. æruginis rasæ drach. 4. thuris masculi drach. 2. aceti, quod sufficit: æruginem pluribus diebus conterito, thus vno die: tum cæteris, liquatum commisceto: gangrænis nomis putrilaginosus, & vetustis conuenit. Fiet clemētius, strobilina mollita prius, rosaceo: vel terebinthina, strobilina loco mixta. Quod si terebinthina careas, quod sæpē fit, larigna, 30
quæ omnino terebinthinæ similis est, vtēdū erit. Alia larignæ differentia, cætera quidē terebinthinæ similis, sed gustu mordacior, sensu carior, & odore grauior est. Mitius quoq; fuerit cerato mixto, cera lota, diutius trita æruginē, aceto, non ita forti, sed vinoso: postremo, si æruginem mi- 35
Viride Gal. nuas. Atq; vbi vincit, consiliū glutinandi, sit thus pari pōdere cum æruginē: si magis siccandū, lithargyri, vel similis metallici bene triti partem aliquam commiscebis. Ex aliis etiam acrioribus, vt squamis, tostis, tritis, lotis, aliquid potest adiungi. Si flaccidior caro est, præter metallica, myr-
teo

teo oleo, vel melino, si calor extitit, rosacco vti oportebit:
 si parum processit caro, aristolochiâ, & aliquid è sarcoticis
 vnies. In duritie, adipēs, medullas, ammoniacum, & simi-
 lia colliquabis, alumen interes, si quid affluit, ladanū quod *Ladanum.*
 5 simul mollit, ac reprimat, aloē, quæ repellit, terget, dige-
 rit, & sarcoticon est. Sic ergo ~~ad hoc~~ temperabis, quod
 & aliter aliis accommodes, & ad multa vitia transformes,
 vt interim carnem repleas. In contumaci vlcere ani- *Duplex ge-
nus vlcera
contumaciū.*
 10 desideret aliud, cui non nisi acris, extremisque auxiliis
 prodesse possis. Pudendorum, & sedis vlcerā maligna, ne-
 que acra, neque vim ignis sustinere possunt, qua videli-
 cet parte neruacea, & suauissimis medicamentis curari
 debent: qualia sunt, oui candidum, cadmia lota, cerusa,
 15 pompholyx, amydon, manna, myrrha, styrax, succus so-
 lani, aizoi, & similium extusus in mortario plumbeo, pi-
 stillo plumbeo: vel chymicorum oleum, quod extillant
 plumbo. Spodion, antispodion, quod fit ex oleastri flori- *Antispod.*
 20 lorum, ficulno ligno, lentisci, cytonij, myrti folijs, cum te-
 nerrimis ramorum partibus, moris immaturis in sole are-
 factis, vel è buxi coma, rubi, & terebinth. testis, & volutis
 ostreorum, buccinorum, purpurarum, & similium, tauri-
 no glutine, & linteorum cinere, fæce vsta & elota: vrun-
 25 tur ea omnia crudo fictili in fornacibus, donec figlina
 percoquatur: tenuissimè læuigare, & si quid superesse pu-
 tes qualitatis ignis, eluere oportet: si nolis adstringere,
 aceto macerabis, & siccabis. In fluxionibus leniter ad-
 stringere melius est: in putredinibus, aceto, oxycrato, &
 30 nomelite, vel oxymelite: in cancriosis, solani succo & plāta-
 ginis imbui, & inde siccari conuenit. Corallo similiter vti
 licet. Cristallum laudat in oris vlcerebus & cancriis. In ele- *Crystallus.*
 35 mētibus auxiliis aloē est, fuligo thuris, terebinth. mithæ. *Fuligo.*
 E styrace, & pice liquida valentior est: ex œsypo, & butyro *Pix & re-
fina.*
 suauior. Elui potest, quæ acrior videatur. Manna repe-
 lit, & ad multa vtilior thure est. Coloph. pix, refina, præfer-
 tim siccæ, humidioribus corporibus conueniūt. Coloph. *Colophon.*
 modò per se, modò cum thuris polline vlcera genitali-
 bus inspergitur. Caries lignorum, magis exadstringen- *Caries.*
 te, & detergente materia, peculiariter, quæ vltimo collecta

est, expurgat, implétque humida. In Chironiis, maleficis, & extremorum vlceribus per se, vel cerato mixta vsurpantur: farina corticis capparis interdum cômiscetur, quæ eadem purgat, siccátq; maligna: farina hordei & fœni græci humidiora corpora iuuare possunt. In secúndum ordinem 5 referuntur: Aristolo. iris, & similia, quæ detergent, digerunt, euocant, farina lupinorum, orobi. Pumex crematur carbone puro, & vino albo eluitur: per se tritus, vel cû sexta sulph. parte, iuuat chironia: his longè optimum medicamentum est plumbum vsum & elotum, vt & putrilaginosus, & cancerosus. In acriore sanie, contumaci vlcere, parte humida, quæq; facilius putrescat, acria vitanda sunt. *Vbi vitanda acria.* Acrimonia multorum, partim vstrina, partim lotura, vel vitroque diluitur vel cerato rosaceo mitescit. Talia sunt *Metallica.* quædam metallica, squama, chalcitis, atramentum sutorum, quibus vstis lotis, & aliis rebus temperatis, & parè quidem vtendum erit. Lauantur pluuiâ, si quæritur adstrictio, alioqui puteali, fluuiali, vel fontana. *Chrysocol- la.* Chrysocol- la concreta sanies è putri vena metallica, difficilium vlcerum efficax remedium est: factitia quoque ex æruginè, quæ alumen recipit, & salem, in iis, quæ nimio humore madent, & rheumate vtilior est. In hoc genere cêsentur, quæ Græci vocant κεφαλικά, & καταγματικά. Illa caluarix, hæc reliquis quoque ossibus fractis imperantur, quâquam interdum vtriusque ratio commiscetur. *κεφαλικά. καταγματικά.* Cephalica catagmaticis acriora sunt, squamas & ramenta ossium detrahunt, foras euocant, quæ in alto latent: vtraque tergent, digerunt, & siccant. Miscetur his, quod adstringat, sed oportet ex aceto fortè tam diu in æstu atteri, dum in tenuissimum pollinem abeat. Sic enim quod influat reperi- 30 tur, & vis tergétium altius penetrat. His autem sic vtendum est nudato osse, quod in caluaria sæpe fit ad vocatam *Vsus cephalicæ.* ἀπλόνη, arida inspergenda. Nudatis enim ossibus pingua male conveniunt. Sintq; paulò acriora, vt nò solum squamas, sed viscidum humorem ex alto trahant. Videndum 35 etiam ne qua parte syderatum vel corruptum os liueat: eliminandum enim, ac omnino repurgandum. Atque vbi cœperit caro succrescere, & os integri, cephalica cerato temperada: sic enim coges sarcoticum, quia videlicet, quæ euocant, tergent, discutiunt cerato, mixta implere possunt. Ce- rati

- rati modum definiunt natura vitij, corporis virtus, denique medicamenti. Parantur cephalica ex iri Illirica, erui farina, manna, aristolochia, panacis Heraclij radice, magis cortice (opopanax calidior est) radice bryoniae, in summa, his quae detergeant sed non rodant. Acria enim miscentur, ut ramenta auferant, Cephalicon, quod tollit squamas, ossa corrupta rapit, & caua implet. Iridis Illiricae, panacis, ana drach. quatuor: aristol. rotunda, manna, ana drach. mæ duæ: tusa leuissimè, & traiecta cribro insperguntur, vel melli mixta imponuntur. Farinae orobi rubri, drach. octo, iridis, drach. decem, manna, aristoloch. rotunda, squamae, ana drach. quinque, tritis, vel cum melle vitior. Sunt qui addant radicem bryoniae, & aliter parent. Corticis pinei, squammæ, pumicis vsti, ana drach. sex, manna, thuris, aristolochiae, iridis, resinae, pityinae, ana drach. quatuor, mirrhæ, aloës, ana drach. duæ, tritis vtere, vel cum melle. Athenæus loco corticis pini, drach. quatuor, gallæ miscuit. Plura ex secundo & quarto de compositione pharmacorum *ἡ ἀτὰ γινῆ*. Iam verò multa per se nocent, mixta sarcotica sunt. Oleum fordes colligit, sic & cera: ærugo rodit: tria hæc mixta, carnem regenerant: magis etiam, si quid sarcotici ammiscas. Sic enim purgāt, & carne implent. Quale est, Cerati rosacei libra vna, æruginis vnc. vna, manna, thuris, vnciæ duæ. Cerae terebinthinæ, ana vnciæ, quatuor, æruginis ex aceto lotæ, vncia vna, vel ut efficacius, vnciæ duæ, thuris, vnciæ duæ. Ita ex olco, cera, æruginè, resina, terebinthina, thure, manna, & materia sarcotica, sexcenta pharmacaca confinges, ea arte, quam Galenus tradidit, quibus extergeas, fices, repellas, ac simul impleas. Trigener, cera colophonia, terebinthina, pariter colliquatis: refrigerata hæc in frigidam cōiciēs, diūque manibus volutabis: nuda ossa capitis incarnat, squamas deducit, & cicatricem trahit. Admirandum est, mastiche pariter mixta in ossium fracturis. Iudæi, Colophonix. libra vna, mastiches vncia vna, olei sesquuncia, liquata, & in frigida pista sine linamento vlceri impones: purgat, & præ ceteris implet, sed cicatricem non generat. Optimè incarnat farinae pistrinalis è tritico vnciæ duæ: picis, colophonix valde trita, vncia vna: arido cauum impletur. Gal. Cerae drachmas sex: olei vncias tres, liquefactis adde thu-

*Materia cephalic.**Cathegma.**Ex orobis.**Sarcotica mixta.**Trigener. In fracturæ ossium.**E farina pistrinali.*

- ris, iridis, aristolochiæ, ana drachmam vnam: æruginis drachmæ dimidium. Aliud, Radicis Anchusæ, vnc. duæ, aloës, vnc. 4. Fiat puluis. Theriaca efficacissimè purgat, incarnat, cicatricem ducit. Maleficis vlceribus tibiæ, litharg. vnc. sex, cum adipis caprilli, olei rosacei, ana vnc. sex, coquito: coctis adde mastiches vnc. sex, parum refrigeratis misce vitella quinque ouorum. Hactenus experimenta veterum, nunc ad recentiorum remedia transfundendum est. Aureum Mesuæ. Ceræ vnc. quinque, resinæ vnc. tres, terebinthinæ lib. vnam, mellis sesquunciam, mastiches, thuris, sarcocollæ, myrrhæ, aloës, croci, ana drach. tres: fiat vnguentum. Fuscum Nicolai multa habet vnde concoquat, & emolliat. Similiter & quod Croceum describunt. Tetrapharmacum dolorem lenit, maturat phlegmonem, putredinem augere potest: siccare verò & expurgare non potest. Galenus locis aliquot Thessalum reprehendit, & alios, qui tetrapharmacum vt siccante, purgante & incarnante, vterentur. Actuarius iam à doctrina veteri degenerans, vim molliendi, coquendi & incarnandi tetrapharmacum tribuit. Omnia vlcera persanat. Artemisia, scabiosa, absinthij, ormini, senecionis, tamaricis, apij, verbenæ, pilosellæ, lanceolæ, pimpinellæ, linguæ canis, mille folij, chelidoniæ, ana manip. vnus: ex omnibus reiectis radicibus exprimatur succus, cui adde axungia veteris, lib. duas, sepi hircini. libram vnam, olei libras duas, mellis vncias tres: mediocriter bulliant, & in mortario pista vniantur. Dia ireos: Sepi vaccini, selibra, olei rosacei, vnc. tres, ceræ vnc. duæ, radicis ireos, vnc. vna, thuris, sarcocollæ, mastiches, aloës, aristolochiæ, ana drach. duæ: cum terebinthinæ vnc. tribus fiat vnguentum. Puluis Rafis: Olibani, aloës, sarcocollæ, sanguinis draconis, radicis ireos, ana. Itacum mastiche, farina fœni græci, & id genus remediis farcoticos pulueres confinges. Oportetque exactissimè conleuari, ne asperitate lædant. Itaque materia in pila tunditur, tenui cribro secernitur, postea molitur, ac deinde tenuius cribratur: quicquid non transmeat, repetitur in pilam, ac tam diu conteritur, dum ad extremam tenuitatem perueniat. Hæc arida sunt, quæ humidioribus vlceribus conueniunt. Alia per se induntur cauo, vel penicillo vulnerario capta imponuntur. In fistulas mittuntur clysterio,
- sed

sed diluta. Ab his thorulus mollis vino madens superdatur. Vinum fit è dulci austeriusculum. Postremò omnia commodè alligantur. Aestate bis, hyeme semel in die commutantur, sæpius etiam si dolor, phlegmone, vel aliquid tale intercefferit. Ac lintei lanugo bene munda impacta cauo sæpe sufficit.

De epulotici.

CAP. IX.



10

Lenum vlcus clauditur cicatrice. Epulotici *Natura e pulotici.* cum siccatur, adstringit, sed citra morsum, atque hinc reprimat, & quod in carne humidum est, sorbet: carnem contrahit & cute tegit, aut certe callo tenui, qui cuti similis est. Ex quo siccare magis necesse est, quam quod carnem gignit, vel glutinat. Aliud genus est, quod quia excrecentem carnem *Secundū genus epulotici.* adimit, epuloticon appellant, acri natura, & iam mordaci. Addunt & tertium genus, quod siccatur quidem sed non adstringit. Cicatricem ducunt, galla immatura, myrta, malicorium, æris squama, chalcitis, misy, ærugo vsta, lota. Et quod præstantissimum est, æs vstum, & elotum. *Tertiū genus. Epulotica* Metallis acribus excrecens caro consumitur vstis, & elotis trahitur cicatrix. Vruntur hæc fictilibus crudis, carbone puro: extinguuntur vino, mortario interuntur affusa pluvia, mox siccantur, cribrantur linteis: in mortariū aliquoties repetuntur, ne quid arenosum aut scabrum reliquum fiat. *Ratio vtri di metalli ca.* Abluuntur etiam ea ratione, quæ ex Dioscoride & Gal. repetenda: ut eadem materia excedentē carnē adimas, in duris ac mollibus corporibus cicatricē ducas. Erysimi semen, scorina plūbi, stibia, cerato myrtino excepta. Erinaceorū, purpurarū, buccinorū, ostreorum, calculorum marinorū, silicū, & similium crematorū cinere, metallis acribus similiter vtendum est: ut crematis quidē superfluum carnē adimas, vstis & elotis, cicatricem contrahas. Hæc omnia tam possunt mansuescere lotura, quam suavis est cerusa lota. Flaccidis carnibus balaustia affatim insperguntur. Liberalius iniici oportet, vbi *Distincti remedior.* caro demenda est: parcius, & in subtilissimum puluerē conleuata, atque acie cultelli capta, vbi cicatrice plaga regenda est. In calloso stupidique sensus corpore, si neque plethora, neque cacoehymia, acrioribus ad cicatricem vti licet. Quæ enim molliora corpora colliquant, duriora in cicatricem contrahunt: & acria cerato rosaceo fracta epulo-

Vinum. tica sunt, vt vel pluuiā, vel adstringente vino lota. Vi-

num sic neque recens, neque ætate mordax, aut languidum: præstat quod annis est & qualitate medium. Sic-

cent, nec ita stringunt, myrrha, argenti spuma, ostrea,

ἐπίπασα. diphryges. Iam verò alia *ἐπίπασα*, quæ arida tenuissi-
ἐμπαστά-διν. mè insperguntur. Alia *ἐμπαστάδιν*, & firmo corpore.

Hæc in platysmate adhibentur. Corpus accipiunt à cera, quæ pinguis sit, vel natura sua, vel myrtino melino, lentiscino oleo remollita. Ac sit olei pars decima, vel duodecima. Terebinthina quoque, & larigna temperare licet: vt æsypo, si quid tumoris vel calli vlcusum labris reliquum fuerit. Eodem modo medulla cerui & vituli. Sic enim epuloticon diutius insillet, neque breui exarescet, vnde lædet scabrie, & ante tempus decidat: ac tertio quoque die absolvere satis est. Cerata conueniunt è rosa-
 15
 ceo, myrtino, melino, terebinthino, lentiscino, fraxinino. In ceratis epulotica applicantur multo magis, si hæc acriora: nec ita malignum vlcus est. Elarigna, & dupla

Vitanda. cera cerotum confici potest. Spodos factitia, quod antispodium vocant, in epuloticis censetur: vis eius eluatur, vt
 20
 sunt corpora, & vlcera, fugienda *μαλτακώδιν*, quæ quæ *μαλκτικὰ*, adeps maximè suillus, oleum, cera, resina, ammoniacum, & similia in vlceribus, quæ difficilius cicatricem trahant. Fugienda acria, piper, sinapi: sed præcipuè vbi vel plethora vel cacochymia. Ad hæc quæ humectant: vt
 25
 aqua. Quòd si omnibus ritè institutis vlcus cicatrici pertinacius reluctatur, aut iam opertum, clausumque rescinditur, horum aliquid subesse conicies. Nam vel plethora: vel cacochymia est, vnde perpetuò madescit vlcus: hic purgante pharmaco, illic phlebotomia, quæ vacuet, 30

*Causa re-
bellis vlc-
ris.*

& reuellar, opus est. Aliquando in quantitate & qualitate vitium est: tumq; primùm phlebotomo, deinde cathartico medicamento occurrere oportet. Emulgendus atque etiam præcidendus varix est, si inde materia transfuit. Quibus ab hepate, liene, capite, aut alia corporis
 35
 parte scaturit colluies, necessarium parti remedium adhibebis. Aliàs vicina malè habita scalpro lacerabis: callosa labra adimes: partem ægram, totamque viciniam, pristinae naturæ reddes: os subiectum si qua parte syderatum, aut eariam duxit, abrades, aut etiam cauterio inures: vel
 si qua

- si qua resistant ramenta, maturè detrahes. In summa omnia summouebis, quæ cicatricem tardant: aut eandem refricant. Lithargyrus per se trita attrita operit. Eadem è vino lota tritaque reficcatur: tenuis plumbi lamina, *Redit ad materiam.*
- 5 plumbum vstum, lotum summoperè medetur cancris. Implet, & ad cicatricem ducit cadmia cremata, pluribus diebus ex aceto vel vino modò giluo, modò albo austeriusculo terere oportet. Ladanum molle & recens è vino, vel salua pistum cum elegantia iuuat. Cerusa, *Mixta remedia.*
- 10 pompholyx, calx elota, bolus Armenus, terra sigillata, & similia, quæcunque siccant, adstringunt, nec mordent. In mixtis prætulit Galenus *διὰ καδμίας*, & *διὰ λαδάνου* medicamenta. Quæ cùm multa sint, ac variè concinnentur, pauca, & paratu facilia describemus. Cadmiæ, 15 lithargyri, cerusæ, ana vncia vna: ceræ, vnciæ quatuor, rosacei, vnciæ tres. Cerusæ, cadmiæ ana vnciæ quatuor, ceræ, myrtini, ana vnciæ sex. Plumbi vsti vnciæ tres: cadmiæ æris vsti, ana vnciæ duæ, colophoniæ, olei myrtini, ana lib. duæ, vini antiqui odorati, quod sufficit. Cadmia 20 pluribus diebus in sole teritur ex aceto: vel conueniente vino. Quòd si æs vstum similiter lauatur, melius est *διὰ καδμίας* *διὰ λαδάνου* medicamentum: *διὰ λαδάνου* prætumidis vlceribus auxilio est, implet, & ad cicatricem perducit. Picis aridæ denar. centum: æruginis rasæ, denar. viginti qua- *Critonin.*
- 25 tuor, æris vsti denar. quindecim, squamæ rubræ, denar. viginti quatuor, ladani, vnciæ nouem, lithargyri lib. tres, olei, vini optimi, ana vnciæ triginta. Litharg. oleo coquitur, coctione media reliqua metallica iniiciuntur, voluntantur rude, dum non inquinent: hic pix immititur: re- 30 frigescentibus ladanum vnitur è vino tritum: omnia immortario conficiuntur: hoc & reliqua medicamenta, quæ siccent, & non mordeant, diutius coqui melius est. Adhibetur hoc in platysmate, deligatur, nec ante quartum diem exolui debet. Alia quarto de comp. phar. *κατὰ γινν.*
- 35 Sunt & hæc epulotica. Aeruginis, æris cremati, ana semuncia, aluminis fissilis drach. duæ, ceræ drach. sex: æruginè vsta melius est, metallica excipiuntur cera præmollita igne, vel cerato ex larignæ semuncia, & ceræ vncia vna, alioqui cerato myrteo, vel rosaceo. Squamæ, æruginis ana vncia, ceræ pinguis vnciæ sex, larignæ semuncia. Liquatis

ceræ & resinæ reliqua trita coniunguntur, hæc in platysmæ te apponuntur, quod vlceris locum nec eo amplius circumscribat. Munitur vicinia his, quæ phlegmonem arceant: tertio quoque die, vel quarto, medicamentum reuellitur, austero vino fouetur locus, platysma innouatur. Repertur hæc dum cicatrix duci incipiat, resinæ loco, vel cælypus, vel medulla est, si quid inest durius. Et hæc quidem effica-

Albū è cerusa & lithar.

Aliud.

cia sunt, & maligna iuuant. Aliud: Cerusæ lithargyri, ana libra vna, olei myrtini libræ duæ, ceræ, felibra, terebinthinæ, vnciæ tres, aluminis scissilis vncia vna, piperis, semunciam: vel paulò minus: leuius erit si sesquunciam thuris addideris. Parabile & mirabile: Aluminis scissilis semuncia, sa vini, aquæ pluuiæ, vel quæ in cauis quercuum desiderat vnc. nouem, diluitur: linteolum vetus, sed mûdum aqua inculcatur, exarescit sole depectitur, & conceptum imponitur. 15

Lamina plumbi.

In sedis vitiis, & inueteratis, vino quàm aqua, vti melius est. Aliud in quo veterum & posterorum cōsensus est: Linteolum aqua illa, vel vino madens: sed expressum molliter apprimes loco: cui deinde pertenuem plumbi laminam induces, & alligabis. Cerusæ drach. duæ, gallarum, myrti, recrementi plumbi, ana drach. vna, fiat puluis. In ignis exustionibus & calore: Cerusæ, lithargiri, hordei tosti, ana vnc. vna, ceræ vnc. tres, rosacei, vel myrtini, vnc. octo, metallica è vino terito, ceram cum oleo liquefacito, hordeum cribratum inspergito, omnia coquito, excolato in mortario conficito. Aliud, litharg. cerusæ, ana libra vna: coquantur in olei albi libris duabus, aquæ purissimæ felibra, dum aqua exhalauerit, & purum pharmacum consistat: purus

Albū Gal.

fit ignis: liquatis adde terebinthinæ, vel larignæ potius in potior est, malignis, vncias duas, vel tres, ceræ albæ, vnc. quatuor vel sex, vt augetur resinæ modus, sic & cera augenda est. Postquam verò hæc cum cæteris coierint, adde thuris semunciam, pompholigis, ostreorum, cadmiæ, ana vnciam vnam.

Ratio in his abludendi metallici.

Vsta hæc in cinerem trita, & ex aqua lora dulci quidem in acri sanie: marina, vel aceto in callosis, & tumentibus labris vsurpentur. Inopia marinæ, subduplum salem aqua diffundes. Quòd si multus humor affluit, vino albo pel-

Calx.

lucido, leniter adstringente, commodè lauabis. Calx septies elota, è rosaceo, vel aqua diluitur, in æstu medio subinde versatur, teritur, abluirur: postremò cum iam

fatis

- fatis lota, tritæque exaruit, è rosaceo pista imponitur: cicatricem trahit, vlcera neruorum maligna, & am-
busta iuuat. Probanda quoque remedia posteritatis: *Recentio- rum phar- maca.*
- 5 Cerusæ vncia vna, lithargyri semuncia rosacei libra vna, aquæ rosacæ sesquuncia, metallica in mortario fortiter *Vng. albū communi- tatis.*
- perfricantur pistillo duro, quod cum sit, deinceps ac pau- *Album Rasis.*
- latim liquida affunduntur. Vng. deficcaturum rubrum. Al- *Palum epu- loticus.*
- bum Rasis: Olei rosacei libra vna, ceræ vnciæ duæ, cerusæ *Plantago.*
- vnc. vna, caphuræ drach. vna, albumina ouorum tria. Mc- *Album è cerusa.*
- 10 lius fiet cum drach. sex lithargyri. Aliud, Balaustiorum, sanguinis draconis, cadmiæ argenti, æris vsti, loti, ana fiat puluis. Addunt santalos, nymphæam, minorem plantagi-
nem, rosas, vbi calor inest. Vtraque plantago cum radi-
ce trita epulotica est. Emplastrum album è cerusa non
- 15 omnino dissimile albo Galeni. Ceræ vnc. quatuor, rosacei lib. dimid. terebinth. vnc. tres, cerusæ vnc. duæ, lithargyri vnc. vna, thuris, aluminis, cineris è cochleis crematis, ana semuncia: cera, oleum, terebinth. simul funduntur, fufis reliqua commiscuntur, pista omnia in mortario vniuntur.
- 20 Aëuarij, Litharg. sesquilib. cerusæ lib. quatuor, ceræ albæ lib. septem, olei myrtini quantum sufficit: litharg. ol. co-
quitur, cerusa additur, & cera. Lithargy. nutritū Rasis, & Auicennæ: Lithargyros tenuissimè teritur, ex aceto & ro-
saceo diu exercetur in mortario, vt quidam volunt, plum-
25 beo. Modus est, vt inde crassior fermentetur, & extur-
geat. Sunt qui addant vni parti lithargyri iam nutriti, sextulam æris vsti, vel cremati plumbi, aut tantundem a-
luminis, balaustiorum, rubiæ, sanguinis draconis, cadmiæ argenti. Idque singulari ope in malignis & pertinacibus
- 30 vitiis. In cancris cerusa iungitur pistillo & mortario plumbeo. Cerusa per se curat abrasa, ex vino trita, hu-
midioribus vlceribus idonea est, ex aqua rosacea lota pel-
lit, cicatricem contrahit, & calorem attemperat, butyro mixta mollit, coquit, & epulotica est: vti licet & empla-
35 stro deficcatiuo rubro, & aliis. Epuloticis vtimur, iam propè pleno, sed nondum adæquato vlcere. Celsus lina-
mento è frigida presso integit: vbi iam æquatum est, sicco: ac bene fiet, si in frigida alumen maduerit, & quod siccum imponitur, in ea mersum, postea inaruerit. Et hæc quidem in leni vlcere faciunt satis. In malignis, linteolo bene puro
- sinum

sinum molliter extergebis, epuloticum induces, quod plurimum siccet: deinde si quid est durius, platysma quod attenuet labra, superdabis: quod æquali linteo conteges, ex quo splenion subiicies expressum frigida, alioqui vino, ac frigiditatem splenij affusa subinde frigida continebis: postremò commodè ligabis, tertio primùm die solues. Hic linteolo sicco, molli, puro, saniem detergebis, & vt prius, omnia reuocabis. Recentiores vino calido cui balauitia concoxerint, aut similia, vlcus fouent. Alioqui aqua, quæ vim aluminis conceperit, vbi calor aliquis est, molli vellere humorem sorbent, pharmacû imponunt, superdant stupas vino madidas vel aqua: omnia glutinantibus fasciis constringunt. Galenus interdicit aqua, nec vlcus nudum contingere oportet. Plurima epulotica ex 1. 2. 4. de comp. pharm. κατὰ τὴν. & 14. Aëtij.

15

De glutinantibus.

CAP. X.



Ongius fortasse quàm res postulabat de glutinantibus sermo dilatus est: verùm ita nos coëgit, traxitque consequens medelarum ratio: nec alius locus obtrigit commodior, in quo de illis orationem institueremus. κολλη-

Facultas
glutinan-
tium.

τι Græci vocant, συμφορτικὰ & τραυματικά. Quidam etiam ἰναιμα: & peculiariter quæ cruentis vulneribus adhiberentur. Siccant hæc omnia ad 2. ferè gradum, media ratione inter ea quæ cicatricem trahunt, & quæ carnem regenerant: non detergent, sed astringunt, prohibentque ne quid humoris labris vlcis erueniat: nec in cruentis solum vsurpari solent, sed ad sinus, fistulas, maligna vetustaque vlcera transferuntur. Opitulantur celerius, si integra partium natura est, si paucus sanguis idemque purus affluit, si non abrasa, non præcisa, sed vel salua, vel parte aliqua etiam dum herens cutis est. Et tenim cuti cum subiecta carne naturalis quædã amicitia coit, vt ægerimè sanescant, quibus omninò illa excidit: facilius, vbi incolumis seruata est. Mirum quòd præcisa, sed loco suo reddita coalescit ac mortua reuiuiscit, quòdque è plaga liuore ducto, non in iuvene solo, sed etiam sene viuudum colorem recipit. Magna igitur cutis habenda ratio: non ob id tantum quòd inde celerius glutinatur vlcus: sed quia interiecta cute plurimis iuuatur, quæ nuda alioqui caro nò perferat. Nudû vlcus

Cuti quâ
faciat ad ce-
leritatē glu-
tinationis.

- vlcus linteo, lana, spongia irritatur : medicamentis pare-
 goricis fordes colligit: vellicatur catharricis: iuuatur omni-
 bus si familiari tectorio munitum est. Ideoque & abrafa
 cutis & pendula, suo loco inducatur, & reducta molliter
 5 apprimatur : sic enim vnà cum vlcere celerius coalescet.
 Animaduertenda quoque labra sunt, quia videlicet, alia *Ratio ad-*
 contracta, alia euerfa plurima dehiscunt. Contracta deli- *hibenda la-*
 gatione abducenda, quæ in vlcere laxior, hinc inde sana *bris.*
 parte arctius contrahatur. Colligenda verò quæ pluri *Ratio deli-*
 10 mum hiant, à sanis partibus ineunte fascia, quæ vt ad oras *gandi.*
 propius accedit, ita firmitus constringatur: sed ita vt ne ni-
 mis cogendo nimis comprimas & dolorem ingeneres.
 Euerfo tantum altero vlceris labro, hinc linteæ abduces,
 & in alteram partem quasi trahendo volutabis. Si vtrun-
 15 que euertitur, ea quam *ἰνδοοῖν ἀρχῶν ἰνιδιοῖν* vocant, ne-
 cessaria est: & vt sunt vlcera, ita remedia distinguuntur. In *Paruū vl-*
 recenti paruoque vlcere fasciola in orbem nexa, satis esse *cus non ne-*
 potest, nisi vel à cacochymia, vel plethora, vel acriore sen- *glegendū.*
 su partium subesse periculum videas: hic enim vel si acus
 20 minima pupugerit, dolor, phlegmone, conuulsio denique
 ad exitum sequi consuevit. Statim ergo colleticis absti-
 nendum, & paregoricis vtendum erit. In maiori vulnere,
 maiora remedia querenda sunt, deligatio, sutura, fibula,
 medicatio: hicque audienda sunt magnum & paruum in
 25 sectione, non quorundam veterum more qui *ἐπὶ τὴν ἀγορὰν* in- *ἐπὶ τὴν ἀγορὰν*
 signe vulnus è natura loci, *μὴτὰ* è periculo statuunt. At- *vulnus μὴ-*
 que in glutinando, natura corporum distinguenda: quia *γὰρ.*
 videlicet vt illi loquuntur hoc *διὸ τὸν αἵμα*, illud *ἐν τῷ αἵματι*. Ac
 difficultas ferè nascitur ex his quæ in rebelli vlcere proxi-
 30 mo capite tradita sunt. Primum igitur in cruento vulne-
 re, siquidem neque profundum est, neque hæmorrhagia
 extitit, spongia, lana succida, molli panniculo detergen-
 dus cruor est, atque illa prius inculcanda frigida, expri-
 menda, atque ita adhibenda. Quod si altè descendit vul-
 35 nus erupitque sanguis, frigida loco aceto vtendum erit, vt
 inde grumum attenues & sanguinem supprimas. In ner-
 uis, ab aceto metus est: ideoque specilli extremo linteolum
 alligabis, quod vel sapa vel mesicato madefacies. In lacu-
 nis vbi iam glutinandum, vinum & cœnomeli idonea sunt. *Ratio gla-*
 Ac cum iam deterfus cruor est, nihilque labris intercedit, *rimandi.*
 qualia

qualia sunt, pilus, grumus, oleum, pluma, & similia, sequitur ut latera lateribus, oræ oris rite coquant. Ponimus autem neque dolore, neque phlegmone, neque vlllo alio vitio vlcus laborare: ac iustam carnem lateribus vulneris interesse. In rectis vulneribus labra facile adducuntur, multo magis si molle corpus est, adducta fasciis continenda sunt, ex duplici initio: alioqui simplicibus, sed sutura interdum addita, & fibulis. In transverso vulnere, oræ dissident magis, quare suturis & fibulis opus est. In magnis & profundis vulneribus vincula ex duobus initiis necessaria: eadem quoque in latis simul & profundis, sed hæc præterea altis suturis cogenda sunt: neutra verò præpropere glutinanda, ac fascias austerio vino & nigro maduisse iuvat, quod in vulneribus cæteris præferendum est, quia repellit, phlegmonem prohibet & cogit: in quo etiam aliquid eorum quæ astringant licet incoquere: sed modus sit, ne nimis contrahas, unde excitetur dolor. In molli parte, extrema auricula, imo naso, fronte, bucca, pericranio, palpebris, cute gutturis, ventre, membranis quæ non sunt tendines, sutura conuenit. Præputium assuitur & infibulatur, ut & carnosum genus ubi nimium dehiscit vulnus, nec oræ facile coniunguntur. Sed de his alio loco pluribus. Particularis materia, ut sexus, ut molle durumve corpus, ut recens vetustum, paruum magnumque vlcus est, ita distingui debet, quod in fasciis, suturis ac fibulis similiter seruandum est. Ebulus, sambucus, symphytum, syderites, palmæ cortex, plátago, fraga, equisetum, pini, tedæ, dracontij folia recentia, anagallis, salix, androsæmon, astragalus, phlonunculus, aranæ tela, & ea præcipue cui è pistrino farina infederit, spongia, lana succida, linteolum expressa è frigida, vino, vel liquore qui contrahat, caseus recens & oxygalactinus, isatis satiuu neruos etiam præcisos in fine musculorum iungit, & duriora corpora conglutinat. Neruos etiam iuvat pentaphylli folium cum melle, allia affata tritaque, myrrha vlceribus capitis idonea. Sarcocolla, gummi genera & resinæ quæ non mordeant nec ita detergeant. Pix sicca magis quam humida, hordeum vstum, aloë ex aqua trita: herbæ succus & folia, quam ex India comportant, & patrio nomine zambanam appellat. Aloë vulgaris est quæ tenace vita in multos menses

*In rectis
vulneri-
bus.*

*In trans-
uersis.*

*Vinum ni-
grum au-
sterum.*

*In quibus
suendum.*

*In quibus
etiã fibula.*

*Particula-
ri mate-
ria distin-
ctio.*

*Isatis sati-
ua.*

*Zambana.
Aloë.*

ses viget: è laquearibus ædium & tabulatis magna viroris
 cōmendatione suspenditur. Cōstat hoc remediū certo ex-
 perimento nautarū. In collecticis quæ ad manū sunt, præ-
 cipua laus attractylidi. Eius cacumina austero vino vel
 5 oxycrato incoquuntur: excipitur concha quod enatat. *Vlmi, et d*
 mi cortex alligatus, eiusdē quoque folium intritum glutin- *folliculu a-*
 nat & ambulta iuuat, vt sine manifesta cicatrice coeant. *qua.*
 Purgat, implet, cicatricem ducit, glutinat, & artificialibus
 balsamis miscetur aqua quæ vlmi folliculis cōcluditur, be-
 10 ne purgata vermiculis. Et balsamo quodā raro & præ- *Balsamū.*
 cioso principes vtūtur glutinādo. Sunt qui aquā quæ ca- *Aqua vi-*
 stratis vitibus exudat vere, vitreo vase excipiant, annū in- *tu.*
 tegrum bene operculatū vas & clausum exponūt soli, lo-
 15 co subdiali, sed qui ab iniuriis cœli tutus sit: vas subinde
 ad solē vertunt, melligo tandē concrescit quæ sit balsamo
 viribus æqualis. Efficaciora sunt sorbus, mespilus, piraster,
 quercus, & quæcūque acerba sunt, teruntur, affuso inter-
 dum vino, quod astringat: atque ita alligantur. Addunt bo-
 lum Armenū, terram sigillatam & similia. Cōposita sunt: *Composita*
 20 Cerati myrtini vnc. 3. ceruss. vnc. 1. verusta glutinat. Aloë *remedia.*
 arida, ænomelite coquitur, emmotū inde tinctum impo-
 nitur: capitis vlcera coniungit. Galenus pharmaca tempe-
 rauit mollioribus naturis ex Lithargyro oxelæo & æne-
 læo, durioribus ex bitumine, ærugine, squamma, aloë &
 25 myrrha: Litharg. vnc. quatuor, olei & aceti, ana vnc. 8. vel *Ex litharg.*
 eo plus, vt diutius coquatur, Oxelæo facilius liquefcit ar- *& oxelæo*
 genti spuma: diutius tamen vexari mortario, ac deinde *nigrum.*
 integrum diem excoqui necesse est, idque luculento foco,
 & sereno aëre: quod bene coctum ritē coit, nigrum eua-
 30 dit, non absimile ei quod nigrum vocant: fortius fit, si
 oleum vetus est: acetum verò tenue, pellucidum. & acer-
 rimum. Fistulas sine callo, maiora minorāque vulnera,
 cruenta, lacunosa, difficillima & parotidas glutinat.

Quod verò ex ænelæo, cruenta iungit: Litharg. lib. di- *Ex æne-*
 35 mid. teritur diebus quindecim ex vini gilui, tenuis, & o- *leo.*
 dori selibra, vel libra vna: deinde affusa olei libra vna, vt
 prius coquatur. *Διὰ χαλκίτης,* fistulas & magna vlcera cō- *Διὰ χαλ-*
 iungit, & cicatrice regit, Axungia veteris bene purgatæ *κίτης.*
 fibris, & sine sale lib. duæ, olei veteris, litharg. ana lib.
 tres, chalcitridinis vnc. sex: conficiatur ex arte: quod si spa-
 tha

tha palmaria defuerit, saligna rudicula commouebis potius, quàm radice cannæ, cui non exigua vis inest abstergendi. Diuturnis maximisque vlceribus, & quæ ægrè cicatricem ducunt. Succī foliorum lilij vnc. quinque, mellis & aceti, ana vnc. i. coque ad crassitudinem: efficacissimè glutinat. Cochlearum carnes cum thure & myrrha trite, nervorum vulnera, & alia quoque vniunt. Cruentis, sugillatis, excisis, quacunque corporis parte: vitiligini, lepræ, masculis & crustis auxilio est. Attractylidis effossæ cum radice & siccatæ umbra, deinde trite, olei dulcis ana vnc. quatuor, Colophoniz vnc. i. 8. ærug. vnc. 2. ceræ vnc. octo: liquabilia simul liquato: excolatis æruginem primum, deinde attractylida commisceto, mixta in frigidam conuicito, diu manibus versato ac per noctem frigida macerato: postridiè vsui reponito. Barbarum Gal. Ceræ, picis resinæ, bituminis, thuris, ana vnc. septem. Aliud: Picis lib. i. bituminis, ceræ, ana sēlib. ammoniaci, mannæ, ana vnc. 3. ceruss. sesquunc. ol. drach. i. 8. aceti vn. i. 8. Aliud ad cruenta. Aerug. rasæ, denarij. 12. litarg. denar. 20. aluminis, picis aridæ, resinæ, pini aridæ ana denar. i. aceti, ol. ana vnc. 9. Plura primo & secundo de comp. medic. *κατὰ γέν.* Iam verò adscribenda remedia posteriorum. Pulvis ruber ex sanguine draconis, & sesquialtera ratione, vel dupla thuris. Alij calcem, bolum Armenum, vel santalos commiscēt. Sunt, qui hoc modo cōficiant: Symphyti maioris, boli Armeni, ana vnc. i. picis Græcæ, vn. 3. mastiches, olibani, ana semun. sanguinis draco. mummæ, ana dra. 2. Pulueres futuris insperguntur, vel in cerato imponuntur. Sanguinē draconis colleticon variè conficiunt. Thus, mastichē, bolum Arm. æqualiter mixta, hirci sanguine mactati Augusto mense concorporant: alij aliter ex eadem materia: quidam bolum Arm. terunt, efficiuntque vt multum forbeat sanguinis hircini, & sorborum succi. Plinius sorborum succo, & caprillo sanguine compingit. In his omnibus prouidendum, ne supra modum contrahas: quod si metuitur, cerato pharmaca temperabis. Eidem Pl. & Solino sanguis est draconis, qui dum vulneratus elephas cōcidit, colliso casu dracone colligitur. Aëtius è succo herbæ Indicæ quā dracontēā vocāt, singi credidit. Dracontio nostro vis inest glutinādi. Plantaginis, vtriusque cōsolidæ betonicæ.

*℞ succo lilij.**Barbara.
Receptio.**Pulvis ruber.**Viride Bo
mantini.*

- tonicæ, verbenæ, pimpinellæ, pilosellæ, millefolij, linguæ
 canis, caudæ equinæ, ana manip. i. Conquassata coque cū
 lib. tribus sepi arietini: colatis adde resinæ, ceræ, galbani,
 ana quart. tria: sarcocollæ quart. i. terebinth. quar. i. & se-
 5 mis. Liquata omnia miscentur. Centaurij minoris manip. *E centau*
 6. macerentur per noctem in vino albo, tum in eodem co- *rio.*
 quito, dum medium vinum consumptum sit, colatum suc-
 cum iterum coquito ad mellis crassitudinem, postremò
 reponito: vsus tempore accipito terebinth. lib. i. ceræ nouæ
 10 quar. i. resinæ, thuris, gummi Arab. mastiches ana vnc. i.
 succi prædicti vnc. 3. lactis muliebris vnc. 2. Fiat emplastrū.
 Betonicæ, centaurij, ana manip. 2. coque, & cola vt prius: *Dini.*
 excolato succo adde resinæ quar. i. terebinth. selibrā: sarco
 collæ vnc. i. ceræ vn. 2. Liquata omnia bulliant, acetū pau-
 15 latim affundatur: vbi refrixerint, omnia manibus è mulie-
 bri lacte conuoluantur. Ceræ albæ, resinæ, ana quar. i. olei *Anserini.*
 vnc. 2. terebinth. lotæ, vn. i. thuris, mastiches, ana semunc.
 Fiat vnguent. Pimpinellæ, betonicæ, melangianæ, vel loco
 huius telephij, vel maioris semperuiui, verbenæ, vermicu-
 20 laris, aut potius semperuiui minoris, ana manip. i. coquā-
 tur vino vt prius, dum duæ partes exhalauerint: & aliis si-
 militer percolentur, colatus succus iterum coquatur, tum
 adde resinæ lib. i. ceræ albæ selib. mastiches vnc. 2. refrige-
 rata vt prius è muliebri lacte subigantur. Aliud: Olei be- *Vng. gl*
 25 degaris lib. i. ceræ quart. i. seminis albarū rosarum semunc. *ria.*
 fiat vng. Ol. bedegaris finges, cymis bedegaris, aut si defit,
 attractylidos in ol. & vino nigro coctis, dum vinum expira-
 uerit. Semen rosarum est, quod detractis foliis, & apicibus
 luteis, excussio capite decedit. Chelidonæ, panis cuculli, *Viride e:*
 30 ormini, lybistici, scabiosæ, ana manip. i. sepi arietini li. i. ol. *herbis.*
 selib. ceræ, mastiches, thuris, aloës, ærugi. ana vnc. i. E ver- *E vermi*
 mibus neruosis partibus glutinandis, vtriusq; symphyti, *bui.*
 cynoglossi, pilosellæ, vtriusque plantaginis, ana manip. i.
 vermium terrestrium lib. dimid. trita omnia macerentur
 35 septem dies in olei sesquilb. Deinde cocta leuiter excolen-
 tur: expresso succo misce sepi arietini purgati lib. i. picis na-
 ualis selib. picis Græc. quart. i. ammoniaci, galbani, opopa-
 naxis, terebinth. ana vnc. i. thuris mastiches, ana semunc.
 macerata pingua in aceto, & soluta ceteris vniātur. Lum- *Vermes*
 brici terræ per se triti, & impositi neruos glutināt. His ergo *terreni.*

utendum, vt prius, constituto vlcere, stupa, è vino rubro pressa superponenda: hipodesmides, splenia, & reliqua lintea eodem vino insuccanda: ligandusq; vulnus, vt cõtineas, reformes, cogas, quantum videlicet vlcus expostulat.

De pyrotici.

CAP. XI.

5

Δρόπαξ.



Υδροτικά sunt Δρόπαξ. συνκλισμός, & κενύ-
μις, καυρητικά, σπηλικά, & ισχυρητικά:
ignis denique & inde cauteria. Dro-
pacas picationes vertunt, non è verbo
quidem, sed πύρεξ & πύρεξ veteres
appellarunt, vnde Latina vox conuer-
sa est. Alij etiam Δροπικισμός è pice, &
quarta, vel quinta parte olei, quibus

Υψμ.

subdecuplum, plus minúsve piperis, pyrethri, euphorbi,
& similibus, misceri solet. Sic enim melius calfacit, vt acce-
pto sulphure, cinere sarmentorum, & sale siccando magis
conuenit. Nam & dropax, quiq; describentur, sinapisinus
& phœnigmus, eo sunt vt refrigerata calfaciant, confir-
mentq; partes, quæ partim frigore, partim assidua fluxio-
ne elanguescunt. Alia quidè possunt plurima: hic tamè
præcipuus eorum vsus est. Et hæc in genere μιτασυκρητικά
veteres appellarūt. Alutæ dropax impingitur, vel linteis
cōplicitis, quæ πτύσμαξ & διπλώμαξ Græci vocant. De-
glabratur cutis eraso pilo, dropacissimus calens inducitur:
idem subinde reuellitur, priusquã refrigeret. Renouatur
pharmacū, dum inde efflorescat locus in ruborè, & leniter
extumeat. Nimium est, cū mora pharmaci subsidet tu-
mor, & exalbescit. Hoc enim volumus, vt dropacis ope re-
uocata anima, pars velut intermorta reuiuiscat, calorem
suū, ac spiritū recipiat, & iam proprio alimēto perfruatur:
postremò etiã corporetur, quæ cōfecta macie intabuitive-
rūm alia tardius, alia celerius vitā recipit. Quæ breui ru-
bet, & celeriter instauratur: tardius quæ ægrè recalescit:
desperatio est, quū neq; frīctione, neq; foru tepidæ, neque
dropace melius coloratur. Aliis satis fuerit, si trib. aut qua-
tuor diebus adhibeatur dropax, nec assiduè quidè, sed bis
hyeme, semel æstate. Aliis bis tēve singulis diebus, nōnun-
quã tertio, vel quarto quoq; die, vt videlicet vel facilè ce-
dit, vel cōtūmax lāguor est. Ac tepida prius fouisse cōfert:
vel sinegmate affricasse, quod aliquid thapsiæ, sinapi, eu-
phorb

Μιτασυ-
κρητικά.
Πτύσματα.
Διπλώμα-
τα.

Modus.

- phorbij piperis, pyrethri, capparis receperit. Quòd si affixus dropax pertinacius hæsit, tepida diluendus est: quem quòd detraxeris, furfurù decocto, & similiū, partē extergabis. Sinapismus paralyticos, coxarios, podagricos, inueterata rheumata, hemicranias, quæq; caloris inopia languent, adiuuat. Caricæ vno die aqua macerandæ aut cappares, si grauius malū est: vel si lenius, & acrior sensus est, panis triticeus: hicq; magis, cū in superficiē tantū agere oportet. Macerata tundēda sunt: lenis erit sinapismus, qui subduplū sinapi seorsum triti acceperit: acrior, qui duplū: mediocris, in quo vtrunq; ex æquo temperatū fuerit. At quo tēpore pinfitur medicamentū, paulatim affundenda aqua est, in qua illa maduerint. Sunt in veteribus, qui acetum prætulerint: alij aquā, quòd experimento didicerunt, sinapi vim aceto exolescere. Eodem modo, quo dropax, vsurpari debet. Si quis dolor, aut feruor à medicamēto extiterit, tepidæ, vel rosacei fotu, illitu cerati rosacei, cerusa è rosaceo trita, & aliis id genus extinguitur. Phœnigmus rubore factō etiam vesicas mouet, & exulcerat: in eorū genere, quæ quia illita exulcerāt, vocantur ἀμυντικά. Ex nasturtio, sinapi, radice helenij, bryoniæ, lepidij, columborū fimo, maxime syluestriū, caprillo stercore (vnde διανοσφάρικος) aceto pistis. Scilla trita, nucleis allij, & tunicis, lacte thymalli, ficulneo, pulegio, cantharide, vrtica, ranunculis, thapsia, euphorbio, fæce vsta, metallis acribus, & aliis id genus: lana fordida bene carminata, & calente igne, asis car nibus, & ouis, dū vehemēter calent, impositis. Visco melle, axungia veteri, terebinthina, cerato, acrioribus, gummi, & resinis, vt res exigit, & corpora vel mollia vel dura sunt excipere oportet. Aliàs quoque friabilia affricantur: emplastra verò imponūtur loco: hīc prius palpatur manibus, exercetur ferulis, aut afferculis euerberatur: affricatur etiā vt laxatis spiraculis medicamenti virtus celerius penetret.
- Anacardia trita septē diebus macerāt aceto: in eodē coquant, dum pars tertia euanescat: refrigerari sinunt: excipiunt concha, quod enatat oleosum. Id mel anacardinum est. Alij conquassant anacardos: sepeliunt melle, dum hoc vim anacardij satis conceperit. Fermentum aceto tinctum, anacardino melle, vel causticis rebus concorporatur. Puluisculus è sinapi, piperis euphorbij, ana drach. vna

Sinapismus

Materia.

Phœnigmus

ἀμυντικά

Materia.

Mel anacardinum.

Cathareti-
ca.

Septica.

Escharoti-
ca.Vfus septo-
rū & escha-
roticorum.Ratio vite
in vfu escha-
roticorum.

Septa.

infriticatur: vel infperfus anaçardino melli. Ita cerato è tha-
plia, & alijs vtendum eſt. Breui mora rubor fit, deinde bul-
læ excitentur, vlcus etiam, ſi diutius inſtiterint: veſicæ con-
ſinguntur humor exprimitur: relinquatur vlcus, dum vi-
tium reddiderit: hac arte coxarij, podagrici, hemicranici 5
ſæpe releuantur: repurgantur viſcera, ſexcentaq; vitia per-
curantur. Cathæretica ſunt ex vſtu non lotum, æru-
go, ſquama æris, & rubra magis: teſta, & terra furnaria,
teſtarum, concharum, & ranarum cinis, alia quoque in
epuloticis deſcripta: hæc ferè in ſuperficiem agunt, excre- 10
ſcentem carnem complanant, ac leniter radunt. Septica
alijs ſubeunt, tenellam carnem tabefaciunt calore mul-
to, nec ita craſſo corpore. Arſenicum, ſandaracha, dryo-
pteris, chryſocolla, pityocampe, aconitum, ſanguis equi
admiſſarij. Eſcharotica vt nihilo plus caleant, rodunt 15
tamen acius, craſſiore materia, quæ duris & calloſis cor-
poribus conueniunt, vt ſepta mollioribus. In eſcaroticis
calx viua, vini ſæx cremata, & aceti, quæ ſecundum men-
ſem non ſuperet. Nam quæ vetuſtior, examinari ſolet:
ignis denique & cauteria: vtriuſque generis vſus eſt in 20
calloſis fiſtulis, putrilaginofis, humore fluentibus, ac ſolu-
tis vlceribus. Eſcharoticis peculiariter vtimur in can-
cris, carbunculis, hæmorrhagijs: hîc frugalis vita, frigida
liberaliter pota, vini abſtinentia, alimenta refrigerantia,
magis etiam ſi ſub eſt febricula, imperâda ſunt. Septon, 25
quod ex eſt ſine morſu: Sandarachæ, auripigmenti, ana-
drach. duæ: calicis viuæ, mannæ thuris, ariſtolochiæ, ana-
drachm. ſex: pumicis, reſinæ, ana drachmæ quatuor, iri-
dis drach. duæ: teruntur omnia. Arſenici libra vna: cal-
cis viuæ drachmæ duæ: diebus triginta in aqua merſa tun- 30
dere oportet, idq; in ſole, & bis quotidie aquam commu-
tare. Auripigmenti, ſandarachæ, calcis viuæ, pumicis, ana-
drach. quatuor: eodem modo merſa, tuſa, & ſiccata vſur-
pantur. Squammæ æris drachmæ quatuor, ſandarachæ
drachm. duæ, ellebori nigri, aluminis ſciſſilis, vel auripig. 35
ana drach. vna. Squamæ, ſandarachæ, auripigmen. elle-
bori nigri, ſeminis yrticæ torrefacti ana cum roſaceo
trititis vtire. Sandarachæ, aluminis ſciſſilis, ana dra-
chmæ quatuor: auripig. ſquammæ ana drachm. vna: in ſer-
pente vlcere, & humore fluido, vtêris arido. In cancro, &
ſtruma

- struma, cum rosaceo subiges: bis in die commutatur. Atque hæc ferè materia septicorum est, quam exuras, eluas, cerato & aliis temperare possis. Elleboro magna vis inest *Elleborus.* contra callos: fistule injectas, ad tertium diem callum admi- *Callus* 4a
5 mit. Callus, dura quædam est, & compacta caro, vnde pars stupet, albicat nec expirat. *Arteria* sunt, quæ callos detrahunt. *Arteria* 4a
Oppugnantur calli, primum quidem malacticis: deinde causticis: postremo igne & ferro, vnguibus eradun- *Curatio ca-*
tur, lacerantur scalpbris, excinduntur cultris ad viuum, & *li.*
10 si quid reliquum sit, caustico remedio absumitur, vel candente ferro inuritur: sed fluxio reprimenda, prius quàm execetur callus. Exciso callo tepida fouendum, tum abluen-
dum aqua, vbi alumen disfluxerit. Repurgandum melle, & ærugine, si qua sordes extiterit. Esculotica sunt: scilla *Materia.*
15 cocta, & cum calce trita: nitrum, sal torrefacta: fex cremata veteris acrisque vini, vel aceti, cortex salicis vstus, & aceto pistus. Vsta calx cum pueri impubis vrina: ærugo mel-
li, sali, thuri æqualiter mixta. Laser aut calx cerato irino vel ligustrino capta: Testa terræque furnaria, pumex cre-
20 matus ex aceto, trita: nasturtij farina aqua subacta bdellium pingue cum melle: ammoniacum aceto fusum cum pari ærug. Radix lilij vsta in cinerem: ærugo cocta, leuigata: amygdala è melle trita. Squammæ vncia vnâ, æruginis drach. duæ, cerati lentiscini, vel myrtini, vnciæ octo,
25 plus minúsve: harpax cum modica ærugine. In hoc genere laudatur oleum lentiscinum, quia præterquam quòd molli-
t: & digerit, etiam adstringit repellitque: quibus omnibus difficilia vlcera cum oris induratis egent. Terebin- *Olea esch-*
thinum similiter & mastichinum quæque similia sunt *tica.*
30 *ΛΟΤΙΝΑ & ΟΝΤΙΝΑ* iisdem rebus quibus amyctica excipi possunt, visco & aliis. Satis profecisse putes, cum suis marginibus vitiosum corpus à sano excesserit. Quòd si septicum nihil effeceris, ad escharotica, ignem, & cauteria veniendum, atque omnino vis pro magnitudine & contumacia vlcus
3: adhibenda est. Escharotica ex septicorum materia confici- *Escharoti-*
cæ, sed vt firmior trahatur crusta, è metallicis acribus mu-
scendū erit, quod fit crassa & adstringente potentia. Quæ
lis est cadmia, chalcitis, chalcanthum, quæ per se cruda, tri-
ta, & salua hominis, vel aceto capta, crustam contrahunt.
Eadem vsta leniora quidem, verum escharotica. Septa mi-

Vitio ab igne. scuntur, cum altius imprimenda crusta. Celerius operatur ignis, & melius si ægri perferunt. Atque is non vno modo adhibetur. Conceptus aqua feruida, ligneo tubulo, canali, penna scriptoria inducitur, extrema parte in æquabilem circulum circumscrip̃ta, quæ clauos, verrucas, & similia, quæ vrere oportet, includat: altero extremo dehiscente, aqua feruens, plumbum fusum, vitrum, & similia illiquantur: dum vim suam vnà collabens ignis satis impreſſerit. Alioqui lana mollis, specilli nucleo alligata, feruente oleo, vel butyro intingitur, atque ita imprimitur. Fortius est, si vel è vitreolo, vel antimonio, & vocato sublimato, aliisque id genus, oleum fuerit extillatum. Quidam nucali testa, voluta cochleæ & oui vrunt posteaquàm igne incanduerint. Alij radice Aristolochiæ, gentianæ, struthij, ramentomyrti, buxi, & similibus, cauteria effingunt. Oportet igne contineri, dum extrema parte carbunculent. Vitione Arabica veteres, vt post etiam recentiores, vsi sunt. Auro & argento lenius: ære, & ferro acrius inurunt. Cæsim, punxim cauteria imprimuntur, adiguntur longius & latius, & in circulum circumferuntur: vno loco vel pluribus: semel ac sepius: vt natura rerum, partium, & corporum sustinet, & vitia requirunt. Ex quo variæ cauteriorum formæ affinguntur. Locum igni circumscribere oportet, nucali testa vel re simili, quæ suis marginibus constans pateat in medio: Cerato rosaceo: lana vino tincta muniendæ sunt vicinæ partes, ne iusto latius euadat ignis violentia. Alioqui spleniis imbutis oui candido, mucagine psyllij: cerussa è rhodostagmate lota, refrigerante succo & iis omnino quæ ἀφλεγμαίνοντα Græci vocant. Crusta nō statim detrahenda: sed nutare prius oportet, ac veluti maturitate sua excidere. Alioqui vis afferri solet, profundum vulcus relinquatur, dolor, fluxio, phlegmonæ irritantur. Tēpestiua deduci potest butyro & rhodostagmate loto, farina tritici in porri vel rutæ succo. Lenticula cocta & cum melle mixta, foliis oleastri cum melle litis, sulphure trito ex oleo, contusis nucum interaneis, porri foliis salua tinctis, & in mollioribus lacte cum melle cocto, albo stercore canino, cinere ystarum hirundinum, & minoris centaurij, humano stercore siccato, crematis cochlearum terrestrium carnibus. Chalcite trita & subtriplo melle vel chalciteos vnc. i.

ireos semuncia per se tritis aut cum melle. Nutrito lithar-
 gyro cum vstulato butyro, radice anonidis, columbino
 stercore è melle, quod & carbunculos scarificat. In summa,
 abstergente & incidente materia, quæ paregorico & mol-
 5 liente remedio temperari potest. Recentiores chirurgi in
 septs numerant, stuppas canabinas, hermodactylos, bryo-
 nix radices, alumen, vnguentum apostolorum. Et in car-
 ne dura & multa, vitreoli genera, & cuperosam, quibus
 pro chalcanto & chalcite vti solent, æruginem. Vnguen-
 10 tum viride, Aegyptiacon. Trochiscos è viux calcis vncis
 quatuor tritis & cum melle iunctis: sit autem mellis plus
 minúsve, vt sunt corpora. Trochisci capsula figulina or-
 dine collocantur, siccantur in clibano: pulvis inde utilis est. *Recenti-
rum septs
Trochisci
calce.*
 Succi radicis asphodeli vnc. 6. calcis viux vnc. 2. auripig.
 15 vnc. 1. arida succo mersa sub canicula insolentur, dum squa-
 leant. Calcem viuam modò melle, modò sapone incorpo-
 rant. Cantharidum ventres fermento cogunt vel sepo: sed
 à cantharidibus vrinx ardor metuitur: Nam & hæc illitæ
 capiti id genus vitij inferre possunt, cui malo gargarismus:
 20 & infusio è lacte succurrit. Eadem quoque parata è pa-
 regoricis. Septa adipe vel sebo excipiunt. In adipibus septicus
 est è ranis viridibus, quas in arboribus venantur. Quæ
 sequitur ex quinto de comp. pharm. *latà riva* transfule-
 runt: Malicorij drach. 10. Aristoloch. rotundæ, gallæ, drac.
 25 8. aluminis scissilis, aloës ana drach. quatuor: myrrhæ, chal-
 canthi (vitreolum vertunt) drach. 2. thuris drach. 4. Exe- *Trochisci
arsenici*
 dunt sine morfu: Sandarachæ, id est, arsenici rubri, auripig.
 ana drach. 2. calcis viux, drach. 4. mannæ thuris tantun-
 dem: tritis vti tor: Sic enim Galenus. Recentiores hoc mo-
 30 do: Calcis viux lib. 1. auripigmenti rubri & citrini, alkali,
 acaciæ, ana. lib. dimid. trita vniantur cum capitello. Est au-
 tem alkali, sal niger, quem è quercu, corylo, harundinis
 trunco, carbuncularis & aqua dulci vel marina coctis ve-
 teres fingeant: nunc è brassica marina, betis, & nitrosus
 35 rebus comparari potest. Alioqui torrefactum salem cum
 hydrargyro, tandiu pistillo volutabis, dum sal nigrescat.
 Alij aliter alkali interpretantur. Capitellum ita fit: Calcis
 viux salis ammoniaci, ana lib. 1. trita subigantur lixiuium è
 fabaceis scapis. Deponuntur olla quæ à fundo hiet angu-
 sta rima: aliud figlinum subicitur, quod paulatim lixiuium

*Lixiuum
ficulneum.*

diffluit, sed vas vtrunque statim initio defodi terra opus est, vbi septem dies præstiter. Cathæreticon, septicon, & lene eschaorticon capitellum est. Alij tres partes cineris fabaceorum, vnam viue calcis, subinde perfundunt aqua, identidem conuoluunt, & per quasillum rarum transcolant. Rami ficulnei cremantur, cinis aqua maceratur, qui vbi in aquam vim suam demisit, exprimitur & abiicitur, nouus aliquoties reuocatur. Eodem modo è ramis tithymalli & causticis cineribus lixiuum parari potest. In quo spongia subinde mersa apponitur. Alia capite de epuloticis. In humido ac sordido vlcere, pingui abstinentum: arida iniperguntur. In calloso, & squallente malo arida pingui excepta adhibentur. Seprica faciunt Arabes quæ à Græcis descripta sunt, & alterum genus relinquunt, quod humido calore cum fœtore partes corrumpit. Quæ ex hydrargyro fiunt, præcipitatum, sublimatum, cinabrium, brassicæ succo, solani, limonum, & similiû attemperât. Licet etiam, quod veteres factitarunt, non tribus, sed triginta & quadraginta diebus terere in sole sub canicula, bis mutata aqua. Et vt sunt corpora & vitia, ita magis minus-
ve acria comparari possunt: nec lotura solû sed vstrina & mixtura diluuntur. Minium è micis metallicis, è sterili gleba plûbi, è cerussa vsta, quod alij syricô, alij sandicê vocât, ad epulotica potius referendum. Quod verò è sulphure & hydrargyro factitiû est, in causticis cœseri debet. Vsurpant præter hæc, aquas fortes, & vt dicunt Alchymistarû. Salis ammoniaci, auripig. rubri citrini, cuperose, æruginis anatri-
trita in alembicum vitreû bene stipatû luto, & vndequaq; clausum deponantur, & ita extillêtur lento igni, quod primum fluit, vel abiicitur, vel in alembicum repetitur. Ignis augetur duplo: quod secûdo stillat, fideliter reponitur. Alij ex aluminis rotundi, vitreoli Romani ana lib. i. salis nitri, aut si defit, crematæ fecis aceti sesquilibra aquam eliciunt, hæc callosis & duris idonea sunt, suspecta in naso, labris, palpebris, digitis aut pudendis, mollibus atque exiguis partibus, vbi vena, neruus, arteria insignis est: ac primû quidem minimû sit, quod imponitur: deinde vt res exigit augeatur. Aliquando cerato rosaceo, vnguento albo, dialthæas, & similibus mixta retunduntur: muniunt vicina: doloribus medentur vt prius.

Minium.

*Aqua
fortes.*

De dolore.

CAP. XII.



5 **A**ccidunt multa vomitis & vulneribus, quo-
 rum remedia aliquot conspersa locis: vt pro-
 prio capite contra callos: alio cōtra vermes,
 cancrōsa, putredines: & quæ rheumata inter-
 10 cipiant, præcidantque phlegmonum causas,
 ac feruorem partium à pharmacis extinguant: alia quoque
 obiter annotata sunt. Iam de dolore & hæmorrhagia insti-
 tuenda oratio, quæ vt plurimum curandi consilia inter-
 15 turbant. Itaque dolor omnino fit subita alteratione & so-
 lutione continui, cui quamcelerrimè occurrendum, nun-
 quam enim committendum vt diutius crucietur æger, sic
 enim rheumata commouentur, oriuntur phlegmonæ, la-
 befactantur vires, conuulsiones rapiunt ægros, ac sæpe mor-
 20 tes. Et quod ad institutum maximè pertinet, vlcera inde
 madescere contingit: quæ sicca esse, seruata naturali ratio-
 ne, & vacua excrementis necesse est: *ἀνώδυνά* vocant & *πα-
 25 γγορρινά* quæ dolorem leniunt, tenui substantia, primo
 gradu calida: vel ita temperata vt familiaritate elemento-
 20 rum, naturæ partium consentiant. Adde si vis, quæ quali-
 tatē contraria causam oppugnant, quale est oleum lauri-
 num in refrigeratis, violaceum in calefactis, siccatis hydre-
 læum. Humiditas non tam qualitate quàm copia dolorem
 25 facit, ideòque phlebotomia, catharticon, clyster, & similia,
 quæ sublata copia dolorem tollunt, in hoc genere colloca-
 re licet. A calore, & frigore dolor acerrimus: à siccitate me-
 diocris: ab humiditate propè nullus, vel stupidus excitari
 solet. Tertium quoque genus adiiciunt, sed improprie eor-
 30 um quæ stupefacto sensu dolori remedio sunt, quia quod
 doleat sentire necesse est, & extincto sensu dolor necessario
 conuiescit *ναρκοτρινά* & *ὀπνωτρινά* talia appellant: Anody-
 35 na sunt oleum dulce ætate medium, oleum Chamæmeli,
 oleum è lini & althææ semine, & è dulcibus amygdalinū,
 oleum lumbricorum, vulpinum melinum, è meli, è pullis
 cygni, extortum tritico candēti ferro, è sarmentis vitium,
 ex ouis pressum, sambacinum, sambucinum, è floribus, &
 alia, de quibus postea. In quibus distinguenda, quæ non
 solum leniant dolorem, sed etiam causæ repugnant: quale
 est rosaceum, vbi à calore dolor est: aut à dolore commotus
 calor. Chamæmelinum vbi leniendum simul atque discū-

Causa d
ri.Anody-
na.
2 Genm

3 Genm

Olea.

Adipes. tiendum aliquid est. In anodynis sunt butyrum, cæsyus, lana bene succida, suillus adeps, vitulinus, è cercopitheco, & simia, gallinaceus, anserinus, humanus, ex anguilla & cuniculis, vulpinus, melinus, asininus, lac muliebre, & vaccinum. Althææ, malæ, seminis lini & cydoniorum, lilij, violariæ, pedum arietis, capitum & interaneorum, hœdi similiter decoctum, & hæc lacte coqui melius est, aut cocta lacte butyro condiri, vel conteri rosaceo. Crocum, thus, *Materia decoctorum.* mannam, galbanum & similia pharmacis commiscet, ut quæ aliquid habeant quod paregoricon sit. Calorem temperant, & anodyna sunt, aqua tepida, oleum rosaceum, violaceum, nymphacon, papaverinum, cucurbitinum, & quod è candido alterci semine, priuatim vsurpatum feruidis doloribus podagricorum: lactucinum, portulacinum, psyllinum, cucumerinum. Et ex horum oleorum materia, succus ac muccago colligitur, vel eadem in lacte coquitur, ex conuenienti oleo subigitur. Linteola in decocto merguntur, succo & muccagine imbuuntur, & ita iuuant. Ac subinde inculcare linteola & auxilium repetere necesse est. Cerata & enchrusta è cera alba lota, oleo cõueniente, mucaginibus, cerussa, lota, populeo vnguento & similibus cõfingi possunt. Dolores è frigore iuuant, quæcunque ferè in anodynis numerata sunt, oleum chamæmelinum, anethinum, è leucoio, meliloto, hyperico, lirinũ, atque his magis è baccis lauri & iuniperi vino maceratis, extunditur mola coxariis, & frigidis articulorum vitis. In lue venerea frigidus dolores iuuat galbanarium, sulphurinum, styracinum, in quo thus, manna, & similia diffusa sunt, & quod è nuce myrepica, incude & candenti ferro pressa extinguitur. Sed eadem conquassata, ut & cinamonum, oleo incoqui possunt: ita è calendula, maiorana, roremarino & similibus parare licet. Irinum, ex acori radicibus, centaurio, gentiana, aristolochia, bryonia, hyssopo, thymo, pulegio, vbi crassus humor impactus cruciat. Sinapium, cnidelæon, & alia id genus efficacissima sunt. Vino ferè & pari oleo materia coquitur: quæ prelo vel mola oleum non reddit. Cùm iam vinum exhalauit, ea exprimitur, oleum reliquum vsui est. Terebinthinum oleum, è terebinthinæ libra vna laterum antiquorum, vel ut Albucasis recentium, quia plus olei combi-

bant, vncia vna, mastiches, & styracis ana vnc. vna: late-
 res igniti extinguuntur oleo: extincti tritique cæteris com-
 miscentur in Alembico vitreo: tres liquores effluant, quo-
 rum tertius est optimus. Flores rorismarini amphoravitrea
 5 duplici linteo obstipata, deinde etiam cera includuntur:
 elicitur oleum calida arena, Chymicorum more. Oleum
 philosophorum, Mesuæ petrelæon, & quod ex euphorbio.
 Contra flatu & dolores frigidos ventris atque vteri: quod
 sequitur plurimum facit: Olei anathini libra vna semis:
 10 agni casti, seminis rutæ ana vnciæ tres, cinnamomi vnciæ
 sex: conquassata hæc quadragintadiebus insolentur: mer-
 sa oleo vel lento igne incoquantur. Forus è chamæmelino
 & meraco vino calidus, dolores omnium partium corporis
 15 compescit. E garyophillis oleum, & calamo aromatico
 efficacissimum est. Radix cucumeris agrestis in taleolas
 cæditur, cum absinthij cacumine hydrelæo coquitur, hinc
 forus & cataplasma hemicraniis singulare. Erinaceus ter-
 restris oleo & vino excoquitur, dum solum oleū reliquum
 sit: contra dolores articulorum. E sex vitellis: assis, myrrhæ
 20 drachmæ dimi. ellebori nigri granis quatuor oleum: expri-
 munt singulare vlceribus puerorum, callosis ac dolentibus
 vlcerum labris, putrilaginosi ac vermiculantibus vitiis &
 scabiei. Styracis pinguis vnc. duæ, vel eo plus in sesqui-
 libra olei colliquatur in duritie dolente, addita octaua par-
 25 te ellebori albi, scabiei conuenit. Agrippa & Marciato qui-
 dam vtuntur in frigidis doloribus. Vulgatum est, anody-
 nō: mica panis soluta lacte vel incocta ex tribus vitellis oui
 & sesquuncia rosacei subigitur, cataplasma fit. Sit panis
 lib. vna, oua momento croci intinguntur. In desperatis
 30 narcotica vsurpantur: vnguento rosato, & dialthæas aliquid
 populei vnguenti & opij commiscetur. Cerati rosacei vnc.
 tres, opij. drach. vna, castorei scrupuli duo, vnguenti ro-
 sacei vnc. vna, terebinthi. vnc. dimi. colliquatis adde opij
 scrup. vnum, croci grana quatuor. Aliquid etiam Philonij
 35 scriptis vnguentis & ceratis miscere licet. Oleum in quo
 viua torpedo coxerit, narcoticum est. Dialthæa vnciæ duæ,
 galbani semuncia, opij scrupuli duo, croci grana sex. Gra-
 uissimis quibusque doloribus singulari ope succutrit, ex
 aduersa parte detractus sanguis, quem statim initio mi-
 nuere melius est. Sic enim præciduntur malorum causæ, &
 quæ

*E floribus
 rorisma-
 rini.*

Phlebot.

quæ nocent vulneribus omnia ferè sanguinis vitio cōmo-
uentur, dolor, phlegmone, gangræna, syderatio. Multò
magis, si affecta parte venæ sunt insignes, quæ oppressæ co-
pia dolorem cient: postea verò cū non expirent, gangræ-
nam pariunt & σφαιησις, id est, syderationem: hoc vitium
corruptela est, primum quidem ossium, deinde partiū re-
liquarum: cui periculo phlebotomo occurrédū, atque etiā
cultello scarificandus locus est, vt leuatus onere & vitio, ad
spiritum liberè attollatur. Cucurbitula quoque ad hanc
rem sæpe cōtulit, de qua seorsum à nobis libellus editus est. 10

Scarifica-
tio.
Cucurbi-
tula.

De hæmorrhagia.

C A P. X I I I.



On solūm è recenti, sed & inueterato vlcere
sanguis effluit, apertis, ruptis, exesis vasis. Et
ex arteria hæmorrhagia periculosior: deinde
maioribus venis, quæque plus sanguinis ef- 15
fundunt, quas inde αἱμὴν vocauit Hippo-
crates. Apertis astringentia: ruptis, glutinantia: exesis, sar-
cotica, & boni succi alimenta remedio sunt. Aperta simul
& rupta iuuant plantago, balauſtia, hypocisthis, rhus, om-
phacium, galla deflagrans & vino vel aceto tincta, acacia, 20
malicorium, symphyti radix, porrum contusum, polygo-
nō, peruinca, terra sigillata & siglina, bolus Armenus, rha-
barbari magna, rubigo ferri, lapis hæmatites, passæ vuæ
nucleus, gallæ flos, lanugo quæ cotoneo & mascula salice
insidet, quæque in ea peniculę dependent, fraga herba, cy- 25
nosbatus, aqua frigida, vinum astringens, acetum, oxycra-
tum, & alia quæ in epuloticis, glutinantibus, & repellenti-
bus antea descripta sunt. Peculiariter ruptis conueniunt,
thus, manna, aloë, mastiche, tragacantha, amyllum, gum-
mi, glutinum, larigna, terebinthina, pix sicca, colophonia, 30
gypsum, farina pultrinalis, cochlea cū domo trita: horum
alia in puluerem comminuta insperguntur: meliora ferè
emplastica, ideòque in oui candido, resina liquida, conue-
niente succo imponi debent. Linamenta, pili leporis, lanu-
go illa salicis & cotonei succis liquidis inculcantur, atque 35
indè penicillus aut vermiculus pharmaco madens hianti
vasorum ori inseritur: floccus ex eadem materia & phar-
maco saturatus superdatur, ligatúrque commodè, iniectis
vasi modò tribus, modò quatuor fasciarū orbibus, ad eam
partem vnde profluit sanguis, ex quo fascia radicem versus
paulatim

Apertis.

Ruptis.

Vtendi ra-
tio.

paulatim adduci debet, vt sursum versus magis magisque stringas atque illabentē sanguinē reprimas. Tercio die resoluenda lintea sunt, neque cōmutanda linamenta, flocci, vermiculi, si quidem firmiter inhærēt, sed tantū irriganda
 5 da pharmaco, ac vt prius colliganda. Quōd si vacillant, digitus vasi imprimēdus, reuellenda turunda, & reliqua tum noua vt prius omnia repetenda, eadēque ex præscripto vincienda sunt, id ēue tandiu reuocandū, dum renata carne, ac bene stipato vase, extra periculum omnia videantur.
 10 Aliquando verō vbi in superficiem vasa exponuntur, digitus impressus hæmorrhagiam sistit, coactō grumo. Quæ si in profundo latent, nec facile digito continguntur, hamo prehendere, leniter intorquere & laqueo intercipere oportet. Nonnunquam vossella capta vtrique funiculo illa-
 15 queantur, & media præciduntur, vt extrema in se reuulsa coeant. Id verō in maioribus vasis nō caret periculo. Desperatis aliis auxiliis, ad ignem & cauteria veniendū, multo magis si quid putre, vermiculosum, serpens, rodens: si eiusmodi locus est qui faciliē computrescat, qualis est sedes,

*Ferrum.**Ignis.*

20 os, & genitalia, quique vim ignis sine periculo sustineat.

Escharotica.

Escharotica hoc loco vehemētius contrahere oportet, vt firmam nec deciduam crustam efficiant. Alioqui maior vis sanguinis erumpet, ante tempus resoluta crusta. In remediis laudantur phlebotomia, cucurbitula, sanguisugæ, vin-
 25 cula aduersa parte & *next to the wound* reuellendo adhibita, & constringens epidesis. Cucurbitulæ ratio ex libello nostro repetenda. De phlebotomia & sanguisugis alio quod paramus, opere differemus. Purgatio sæpe necessaria, sed tardius opitulatur. His ferē remediis materiæ cursus re-

*Phlebotomia.
Cucurbit.
Sanguisuga.**Purgatio.*

30 trahitur: quanquam non temerē renitendū sanguini: quia ex omni vulnere, nisi sit in ventre, crebrō sanguinem fluere utile est: autore Hippocrate. Tempestiuē ergo suppresses, iusta ratione leuato corpore: vt inde siccius effectum vlcus celerius possit coalescere. Ac fortasse tutius fuerit vl-
 35 cus emplasticis obstipare: frigidis & astringentibus medicamentis vias intercipere, quā sanguis decurrit. Frigidum enim & astringēs vlceribus mordax. Et in iis frigidum vten-
 dum, vnde fluit sanguis vel fluxurus est, nō ad ipsa, sed circa ipsa inquit Hippocrates. Aliæ quoque partes, vt thorax & quæ neruacæ sunt, frigidum leduntur magis. Ideoque

Vsus refrigerantium.


iam

iam auersa materia, neque etiam locis omnibus, frigida adhibere conuenit. Columbæ sanguis peculiariter reprimat hæmorrhagias è membranis cerebri. Memorabile remedium est quod sequitur, Spongia noua, alioqui uetus, sed marina vel lixiuio querno repurgata, acerrimo aceto inebriatur, tum inquinatur liquefacta pice, deinde trito bitumine, galla, vel re simili conspergitur, atque ita crematur testa figulari clausa, dū cinerescat. Alij aceti loco, taurino sanguine imbuunt, ex odoro uino propinant singularem ope dysenteris, mensuris, & aliis hæmorrhagiis. Emplastra sunt, gypsum crudum, gyris, si oui candido excipias: Thuris partes duæ, aloës pars una, vel eo plus in durior natura: Loco thuris vsurpatur manna, ut quæ melius astringat, sed thus *ἑμπλαστὶκώτερον* pharmacum reddit: concorporantur liquore oui: vermiculus è mollissimis pilis leporis medicamento intingitur, & si fuerit opus, de hiscenti uasi immittitur. Ex iisdem pilis conficitur flocus qui eodem pharmaco imbuitur: atque imponitur cauo, ut incumbat vermiculo. Eunuchus è manu summa profluens sanguis eo pharmaco non restitit: qui deinde linamentis ex dilutissimo oxycrato pressis omninò cōquieuit. Loco pilorum leporis, linoxyllo quod uocatur *cotton*, & memorata lanugine bene depexa atque carminata uti licebit. In erosione ubi uniuerso corpori consulueris, nec aliter mederi datum est: veniendum ad pastillos Andronis, Pasionis, Polydæ, ex lib. 5. de comp. phar. κατὰ γέν. In vehemēti hæmorrhagia primū quidem validè astringentibus materiæ impetus retundi debet, quibus paulatim pastilli commiscentur, postremò solis pastillis utēdum erit. *Ἰσχαίμα* verum. Chalcitidis drach. 16. alij 8. mannæ drachm. 30. 12. alij 16. terebinthinæ frictæ & aceto extinctæ drach. 12. Chalcitidis drach. 6. mannæ drach. 2. tereb. colophonix ana drach. 4. Mirabile. Chalcitis, resinæ aua drach. 8. mannæ drach. 16. infriata ænea pyxidicula reponuntur, vsus tempore par pondus gypsi commiscetur. Addūtur his ad crustas, chalcanthum, misy, auripigmentū, sandaracha, calx uiua. Debilior crusta est à calce uiua & auripigmento, nisi astringenti materiæ coniungantur, ferrum candens, æs, aurum, & argentum cauteria sunt: sed ab auro & argento mollior escara relinquitur. Celerius auxilium à ferreo, cauterio

*Spongia.**Historia.**In erosione**Vsus pastillorum.**Ἰσχαίμα.**Escharotice.*

cauterio percipitur. E subere vel spongia orbiculus tenuis feruida pice immergitur, & ita calens impingitur. Alij malicorio, galla, radicibus astrictoriis prius ignitis, crustas efficiunt. Recentiorum escharotica sunt. Vitreoli Romani
 5 semuncia, Balaustiorum vnc. 3. aluminis vnc. i. fiat puluis. Colophonix vnc. 3. boli armeni sesquuncia, mastiches, oliban, sanguinis draconis, ana semuncia, radicis symphiti, rosarū, ana drach. i. vtuntur puluere rubro, sanguine draconis, & aliis, de quibus antea: ac plura escharotica ex proximo capite repetenda. Adhibitis remediis membrum
 10 ita collocari debet, vt altior sit locus, vnde hæmorrhagia, reliqua vena, quæ radici propior est: vt veluti decliui quasi vase deorsum, sanguis refluat. Sit membrum in quiete, & ea figura situm, quæ dolorem non afferat: ac mitella con
 15 firmare manus, & puluino crura melius est: æger quoque aduersa parte decubat. Instituatur vita vnde sanguis acquiescat, aquæ potus, & similia. Interdicatur iis vnde efferuescat, qualia vina quædam sunt fortia, & calida alimenta.

De vtili materia in vitii ossium. CAP. XIII.

20  Itis quæ ossa fecerint, eodē ferē mōmēto succurrere oportet. Alioqui phlegmone succēditur quæ sanie facit, agit cuniculos, vlcera dis
 25 ossa, carie inducūt, & syderationē cōtrahunt. Laborāt fracta, cōfusa, fissa, forata ossa, & mota articulis. Accessio mali est, si cū vulnere læsa sunt, multo magis in articulis, vbi nerui, tēdines, nuda carne & ossea loca sunt, in quæ laxa & cō-
 30 tilago quædā est, in qua cicatrix firmari nequit: hic ergo asperior casus, dolor, vigilia, conuulsio, deliria, sæpenumero cōmouētur. Atque vt maior articulus est, ita grauius periculū créare solet. Verūm nō alia parte dicitur supellex veteris disciplinæ: nusquā hæc curiosa magis, quā in ossiū
 35 medelis. Infinita propè reperit & literis tradidit, quædam etiam autoritate principum, ære publico in ciuitatibus extruxit, quæ ad hanc curam ossium pertinerent: ferra-
 40 menta varia, cauteria, excisorios cultros, scalpra, rasoria, limas, specilla, aliquot terebrarum genera, modiolos, forfices, *μυνηγορῶντες*, volsellas, scalas, scamma, repagula, vestes,

*Celeriter
medicandū
ossibus.*

Vitia in articulis.

*Multiples
materia
mechanica*

480 Institut. Chirurgicarum Lib. VI.

lo, vestes, canales, glossocomia, spheria, stathmia, trochisco, pennas, iuocatos canaliculos, fistulas, setas, fila bysso & auro texta, alia quoque plurima, quæ ad purganda, tēdenda, reformanda, constituenda denique ossa facerent. Et in vna deligādi arte quā plurima vsu diuersa suis etiā nominibus veteres distinxerunt: linteola, fascias, hypodesmidas, splema, apodesmos, regulas, ferulas, spathulas, habenas, laqueos, mitellas, puluinos modò scorteos modò molliusculos, nodos, acus, acias, & alia sexcenta: quorum multa quidem retenta, alia antiquata, quedam deserta, 10 quia videlicet multis in rebus facilior, nec tam operosa cura inuenta. Corruptū os ad viuam scobem eliminandum, exterebrandū, inurendū, excidendū, etiā vt asperū, malum est. Atque hic medicamentis opus est, quæ vehementer siccant: quorum materia capite de purgantibus pharma- 15 cis & epuloricis instituta est. Nec antè vias claudere oportet, quæ ad læsa ossa pertinent, quā hæc omni carie, nigredine, sordē, corruptela sedulò purgata sint. Quin & præclusum iter vel angustum, ferro ampliare necesse est, spongiæque aut penicillo implendum cauum, vt ne coeat, 20 sed dehiscat vulnus, dum vel integendum carne, vel ferruminandum callo bene purum os & iam incolume, videatur. In altis cuniculis, spongia, linamenta, penicilli summa parte deuincta sint filo, quod foràs propendeat, vt illa faciliè reducantur. Videndum quoque 25 priusquam impleas, ne qua squamma, vel fragmentum exceiserit, quæ scilicet ossi suo coaptanda sunt, aut si acumine carnem subintran, molliter præcidere oportet, verū incolumi radice alioqui eliminanda scalpro. Quòd si nihil molestiæ adferunt, verū nō possunt ossi suo com- 30 pingi: in horū altero consilium est. Nam vel medicamentis detrahes vel permittes dum veluti maturitate quadam & sponte sua excidant. Ita enim os celeriter carnem inducet, vel callum contrahet: ex quo medicamentis, quæ mediocriter siccant vel astringant, cicatrice operies. Quæ 35 verò squammas, ante maturitatem rapiuntur ferro, aut vi reuelluntur, fistulas ægrè sanabiles relinquunt. Omnino ergo declinanda vis est. Squammas detrahunt medicamenta, tam superius capite de glutinantibus memorata, tum erucæ radix, cucumeris agrestis, vtriusque, bryoniæ.

In deligādo quā multa.

Compendiaria curationis materia.

Aperta sit via ad os.

Squamma.

Quæ squammas detrahunt.

- bryoniæ Aristolochia peculiariter elicit testulas casuariz. In abscessu paruo ossiū deligatio *καταγματική* idonea est, *Abscessus.* sed paulò laxior & sine ferulis. In magno non est deligandū *καταγματικώς*. Satisfaciunt splenia, insuccata vino nigro, subaustero, quæ deinceps atque cōtinēter, hinc inde adhibenda sunt, non vt hoc illi infideat. Longiores sunt Splenes magnorum ab *Splenes magnorum ab* quàm quæ solum ambitum membri comprehendant: nam *scessum.* si quadrantalibus circulus est partis, paulū longiores splenes triētalibus esse oportet. Obliquē inseruntur membro, & aduersa parte decussant. Sanantur vlcera aliis similiter: nisi quod ossa magis siccantia desiderant, & quæ continenter ossibus generatur caro, vt est paulò siccior, ita magis siccantibus pharmacis gaudet: vt verò ducenda carne ab ossibus recedis, ita vis siccantium temperanda est, donec iam cicatrix trahenda sit. Ac carne ossa tegere sæpenumero opus est, vbi callū cogere nō licet, nimīū dissidētibus fracturæ labris, & vbi in circulū os excisum est: verūm ē callo multò stabilius vinculum est. In fractis ossibus & luxatis multarum rerum cura est: ac circa initia omnino prohibenda fluxio, dolor, inflammatio. Os ergo quod vel abiit loco, vel fractum dissidet, omnino constituere oportet; deinde ita continere vt ne excidat. In quo hæc sunt præcipuē *τάσις.* *τάσις, διάπλαισις, ἐπίδωσις, ἀπώθεσις* vel *ὑπόθεσις*. Extenditur membrū, vt diductis & adductis marginibus soluti ossis oris 25 oris molliter consuefcent, nihil exasperetur, nihil diffingatur, quod in fracturis dēticulatis, scabris ac ferratis sæpe cōtingit. Videndū quoque, ne in distentione neruus, vena, arteria, musculus, cōtra naturā extorqueat. Extēsum mēbrum & loco redditū, manibus palpari, tractari, atque legitimē cōformari debet: *διάπλαισις* 30 *διάπλαισις* appellant. Quod si tractatum, tensum non constituitur os, ad *μολίαν*, lorum, habenas, & machinas eiusmodi veniendum erit. Sequitur *ἐπίδωσις* quam *καταγματικήν* appellant: in qua multorum prouidentia est, sed maximē, vt contineas, phlegmonem 35 arceas, procures callum. Ac primū an sit diligendū, statuere oportet: tū quæ deligandi forma ac ferē *ἀπὸ δύο ἀρχαίων* varia tamen ratione: ex quo decernendum, quibus, quàm multis, longis, latis, quàm denique firmis fasciis opus sit. Adhec idonea forma linteis quærenda est. Cognoscendum præterea vnde primum iniicias, quæ sit futura

progressio, quàm multi & quales circuli, quomodo distinguendi orbes, quibus interuallis, ubi & quâdo laxior vel astrictior deligatio, qua parte definat, quo loco, & qua arte nectantur nodi, acie figantur, cōducantur habenæ, quâdo regulæ, ferulæ, puluinaria, mitellæ adhibenda sint: quâdiu continere omnia, & quâdo soluere oporteat. Atq; in sano membro probanda prius deligatio, quàm in ægro periculum facias. Postremò providendû, vt in ea figura collocetur pars, in qua diutissimè constare possit, & minimè doleat. Iustos hæc cōmentarios desiderant, verùm hæc breuiter, nec tam docendi, quàm monedi causa dicta fuerint.

Quæ in fasciis repellunt.

In fasciis remedia adhibentur quæ repellant, & maiorem scissiliū linteorū contineant: sic enim prohibetur dolor atque inflammatio: fasciæ initio plures & astrictiores, si neque dolor, neque phlegmone, vulnus, vel aliquid tale prohibeat. Ac ferè inebriantur vino crasso, nigro, modicè austero: vinum hoc superficie cogit, vim suâ ad repellendû altius imprimit, & ita præcidit inflammationum causas.

Vini quale.

Vitanda.

Quod nimium stringit, dolorem excitat. Tenue, album, giliū, fuluū etiam si cōtrahat repudiandū tamen est, vt reprimentiū genus quod humectat, papauer, cicuta, mandragora, multo magis si in articulis & neruaceis partibus labor est. Nec enim qualitas sola, sed horum etiam corpus intrò penetrat & neruosa lædit. Atque inde calor, qui regit corpus, interdum extinguitur. Vino igitur crasso, nigro, modicè austero, fasciæ & splenes saturandi sunt. Minister adsit, qui subinde affuso vino ligamenta compluat: alioqui cum periculo resicantur, quod ne fiat noctu, præcipuè providendum erit: hyeme vini loco

cenelæum.

cenelæo vti satius est, quo etiâ tempore succida lana splenibus præferri debet: fumoso vino & odore abstinendum, ne caput feriat. Iustum quoque in succandis linteis medicamentum ex oui cãdido, oleo rosaceo vel myrtino.

Qui candidum cãro-facet.

Acetum.

Alij aceto & oxelæo contra phlegmonē fascias imbuunt. Detur id bene carnosa parte & sine vlcere. Ceratum album in vsu est, suspecta ministri diligentia, ne videlicet lintea inarescant: quod vino quidem minus efficax, repellit tamen & phlegmonem inhibet. Verùm cerato vti post initia satius est, iam abeunte periculo inflammationis, & ubi fractura simplex, nec in fragmenta varia contritum

Cerati album.

ritū os est. Cerato ergo pars ægræ, fasciæ, & splenes illi-
 menda sunt, adhæc extremæ partes, sed manus præcipuè,
 ne quod deligatione exstringitur, infirmum scilicet frigi-
 dūque corpus imbibat: Ceratum *κατάφρασις* est cera
 5 pingui & duplo oleo conficitur, oleum sit recens rhodi-
 non vel myrteū. Cera sicciore paulo liberalius oleo emol-
 litur. Picato veteres vsi sunt, si quid contusum esset, si *Ceratum*
 quid coquendum atque mitigandum. Liquidiori cerato *catum*.
 albo pix addita picatum facit. Omnia verò lenia sint &
 10 mollia ne asperitate lædant: vitetur pondus, quod callum
 prohibeat & partem opprimat. Perfusiones sunt ex aqua *Perfusi*
 tepida, ita calore temperata, ut in qua manū iucundè con-
 tineas. In frigoribus hydrelæum melius est. Perfunditur
 pars tertio ac quinto die, quoties videlicet linæ dissoluū-
 15 tur, idque liberaliter ut inde prurigo acquiescat, & mate-
 ria eius dispergatur. In articulis tepida, tensa relaxat, lenit
 dolentia, & phlegmone aduersatur. Septimo die vel nono
 iam affunditur, nō ut discutiatur, sed ut euocet sanguinem,
 vnde conereto poro ossa conserantur (*πώγων* Græcè vo- *πώγων*
 20 cant, & inde *πρωγινά* quæ callum gignant.) Callus ne- *πρωγινά*
 que caro est neque os, sed inter vtrunque ambigit. Ita-
 que deposito metu inflammationis, circa hoc tempus om-
 nino cogitandum, ut coctat porus, vnde effracta solidan-
 tur: sic ergo moderanda perfusio, ut inde pars virido co-
 25 lore efflorescat, & leniter attollatur: nimium est, si subsi-
 det & pallorem ducit. Alimenta sunt, quæ probum san-
 guinem, multum, crassum, viscidūque creant. Panis tri- *Alimen*
 ticcus est farina primaria & triticum legatur graue, densum,
 vnde pituitosa comparatur: chartilagineæ animalium partes,
 30 neruaceæ cutaceæ & pingues, ligamenta, tendines, petioli,
 ventres, linguæ, rostra: capita hœdorum, veruecum &
 porcellorum, agnina caro & suilla, palmulæ pingues, ca-
 staneæ, vinum stringens, & similia. Medicamenta sunt *Medic*
 35 emplastica, quæ modicè calfaciant è gyri, similia, rhure, *ta*.
 manna, gummi, fabili glutine, mastiche, tragacantha, li-
 quore oui, pingui cera, oleo, lachrymis & succis, quibus
 emplasticum nec ita calens corpus est. Ac iam antea de ca-
 tagmaticis, & cephalicis sermo habitus est: sed hic quo-
 que ea materia locupletanda est. Caninum cerebrum in *Cerin*
 luteo adhibetur; superdatur lana inculcata oui candido: *rebra*

Hybiscus. vbi squalescit remedium, commutari debet: quatuordecim diebus solidat. Aliis purgatur hybisci radix, atque hinc medulla eraditur, quæ per se farinæ tritici mixta liquori oui, effracta iungit. Radix hæc aquæ indita & sub
Muscu. dio posita: aquam cogit. Musco viticis vtuntur veterina-
Conserua. rij: alij quernum præferunt. In honore est veteri exemplo,
Historia. quam conseruam vocant. Muscus est densus, herbaceus, spongiosus, hærens aquatilibus petris. Putator quidam ex alta arbore deciderat omnibus ferè ossibus confractis: præsto aderant amici, qui corpus eius vniuersum co mu- 10
 sco obligarunt: atque ita relatum domum in quiete tenuerunt, subinde conspersa aqua, ne muscus emarcesceret. Rarò nec nisi deficiente herba remedium mutatum est. Atque hac medela vix credibili celeritate conualuit. Aestate, bene carnosò duròque corpore, recenti malo, exem- 15
 plum vetus liceat imitari. Farinæ triticeæ vnc. 6. sanguinis draconis, mastichis, thuris, sarcocollæ ana vnc. 1. trita hæc cum farina & oui candido subiguntur. Triticea farina, gummi, & manna incoquantur aqua: fit cataplasma, quod reprimat, continet, & poron generat. Exigu- 20
 partibus effractis, pelliculæ affiguntur illitæ gummi & fabrilis glutine. Canaliculi afformantur cauis, emplastro inducitur & contineant, & solident. Fuligo thuris liquori oui & farinæ tritici coniungitur. Emplastra quæ per-
Panali- tinacius hærent, tepidæ fotu reuelluntur. Panalithes ad 25
thes. contusa fracta etiam cum vulnere, vulnera neruorum, vertebrarum, purgandas collectiones, incisum scrotum, bestiarum etiam venenatarum morsus, & alia. Olei dulcis vnc. 9. bituminis, ceræ, resinæ piceæ, picis aridæ ana lib. 1. litharg. cerussæ ruginis ana drach. 10. thuris, ammoniaci, myrrhæ, aloës, ana drach. 8. opij, succi pomorum mandragoræ ana drach. 6. aluminis scissilis, chalcanti, chalcitidis, croci ana drach. 4. aceti, quod sufficit. Omnia à litharg. ad crocum in puluerem trita, & affusa conducuntur mortario, vt sit luti crassitudo: oleum, cera, bitumen in fabales pillulas diuisum nihil versando colliquantur: 30
 liquatis pix & resinæ ammiscentur, colantur omnia, atque recoquantur. Aegyptium Andromachi, eadem potest, mollit, ac maligna operit. Ceræ, litharg. ana vnc. 5. & semis, ammoniaci vnc. 7. & drach. 6. terebinth. vnc. 4. succidæ

succidæ lanæ vſtæ, vnc. 2. & drach. 2. Aristolochiæ, thuris,
squamarum æris & stomomatis, id eſt, perpurgati ferri
ana vnc. 1. myrrhæ drach. 3. opopanax drach. 2. ol. ricini-
ni, ſicyonij, vel antiqui lib. 3. litharg. oleo coquitur, dum
concreſcat: ſquamma iniicitur: vbi non inquinant: cera &
ammoniac. exactiſſimè tuſum impōnuntur: liquatis tere-
binthina additur: ſublatis igne thus, & lanarum cinis in-
ſperguntur: refrigerata manibus ſubiguntur. *Nigrum*
Aſclepiadæ mirabiliter vnit laxata & confracta. Litharg. *Aſclep.*
10 vnc. 8. bituminis vnc. 6. ceræ, picis, ana vnc. 3. reſinæ picæ
ſeſquicia, aluminis, propoleos ana vnc. 1. ammoniaci drac.
6. æruginis drach. 2. & ſemis. ol. quod ſuffi. In oleo li-
tharg. coquitur dum non contaminet: cera & bitumen
ſeorſum liqueſcunt, neque commouentur: his pix adiun-
15 gitur: traiecta colo omnia, lythargyro coctæ vniūtur: am-
moniacum vehementer tuſum immittitur atque ita in ſo-
lidum corpus omnia concoquuntur, hîc præmollita cera
& propolis coniunguntur: vbi coierint probè & igne de-
ceſſerint, alumen & ærugo in pollinem trita inſpergun-
20 tur: verſantur omnia & oxycrato merſa manibus ſubigū-
tur. Moſchionis ad eadem. Litharg. vnc. 3. picis aridæ, *Moſchio-*
adipis vituli, ana vnc. 20. teribinth. mannæ ana vnc. 10. *nis.*
ceræ vnc. 5. æruginis, opopanax, galbani, ana vnc. 1. picis
liquidæ ſelibra, aceti, ſucci mororum, olei ricinini ana lib.
25 1. litharg. oleo coquitur, vbi efferbuerit, adeps iniicitur:
Iam non inquinantibus, cera & pix immittuntur, moro-
rum ſuccus cum pice liquida ſeorſum coquitur, cocta
hæc aliis permifcentur: Subductis igni manna & ærugo
in puluerem reſoluta inſperguntur: opopanax, aceto fu-
30 ſus coniungitur: conſectum pharmacum vino in tertium
diem maceratur, & manibus piſtum ſedulo reponitur: v-
ſus tempore thorulum madentem vino, vel ſaſciam ſuper-
ponere oportet. Alutæ intenditur vel duplo roſaceo
dilutum non aliter quàm ceratum album in ſaſciis ac pla-
35 gulis uſurpatur, nam & fracturas conſerit vlcera coniu-
git, & phlegmonæ aduerſatur. Concreti calli ſignum
eſt, quum iam ſine vulnere exudat ſanguis, qui lintea
contaminet. Id ſerè fit criticis diebus, 14. & aliis. Con-
ueniens callus eſt, qui neque maior neque minor, durior,
aut mollior quàm oportet, neque diſtortus eſt. Iuſtus cal-

ſignum con-
creti calli.
Conueniens
callus.

*Quæ calli
firmant.*

Persusio.

Sparadrapum.

Callus maior.

*Asinor cal-
lus.*

lus confirmari debet medicamentis quæ *ἰσχυρά* vocant,
quæq; cruentis vulneribus adhibentur. Siccant leniter,
& callum mediocriter confirmant. Ac de enaimis multa
capite de glutinantibus. Perfundunt vino quod *τιθαλασ-
σαῖνον* & *θαλαττικόν* Græci, Latini salsum & marinum vo-
cant, quod si desit, salem vino liquefcere oportet. Rosæ, ba-
laustia, myrta, muscus è quercu albus, absynthium & alia
vino incoquantur. Addunt poroticis quæ callum con-
trahant, bolum Armenum, galbulos cupressi & alia. Sed
hic moderatio quædam adhibenda est: ne nimium strin-
gendo callum supra modum atteras. Confirmant pa-
ron: Rosacei vnc. 4. resinæ vnc. 3. cera vnc. 2. colophon, ma-
stiches, thuris ana semuncia, coni cupressi, radice rubiæ
maioris ana drach. 1. Melius fiet auctis emplasticis, minuto
oleo & adiecto momento croci. Thuris mastiches, picis,
farinæ pistrinalis, boli Armeni ana vnc. 2. sepi arietini, ce-
ræ albæ ana s libra: Liquefactis cera & sepo reliqua in-
friantur in his linteam sæpius inculcatum fracturæ impo-
nitur, Sparadrapum vocant. Vtuntur, Apostolico, oxycro-
co, & aliis. Atque hic meminisse oportet instituenda esse
callosis corporibus quæ magis contrahant: mollioribus au-
tem, quæ id mediocriter præstent. Callus maior extenpan-
dus est: deducta parte alimenti & mutata qualitate. Diu le-
nitérque affricanda pars est, ex oleo, sale, nitro. Eademque
calida salsa foueri debet, induciq; malagmatis quæ discuti-
ant. Colligandum arctius: oleribus vtendum & vomitu.
Alterum membrum sinapismo linere oportet, vt eò diuer-
tat alimentum. Paulus in recenti callo qui supercreuit ve-
heméter stringentia instituit, arctissimè ligat, lamina plum-
bea interdum apposita. In eo verò qui iam vetustate indu-
ruit, & vnde pudendum ac deforme membrum est, neque
officium facit, cutem aperit, deradit poron, lacerat scal-
pro, terebra pertundit, & quantum superest excarat.
Quod si nulla inde actio naturæ intercipitur neque con-
spicius membri pudor est, nullus denique dolor, præstat
abstinere ferro. Qui verò infra modum crescit aut non
crescit quidem suis terminis alia ratione promoueri de-
bet. Idque contingit plurimum, cum nimis ac sæpius
fouetur locus: parum conuenienter alligatur, sæpius &
ante tempus fasciæ resolvuntur. Sæpe etiam in ratione
vitæ


- vix peccatum est. Omnia ergo commutanda in melius. Quod si atrophiam totius corporis callus non provenit, imprimis consulendum corpori. Sæpe etiam astrictioribus linteis, naturæ partis vitio membrum quasi fideratum ac marcidum gracilescit: hic affecto membro instauranda vita est, & laxanda deligatio. Id verò in dropace magna ex parte descriptum est, capite de pyroticis. Extenuatum membrum vehementer iuvat commoda deligatio, sed contra quàm in fracturis. Marcescente tibia femur superius al-
- 10 ligamus, ab inguine ad genu deducta fascia, atque initio quidem arctior, paulatim relaxatur, ut communibus venis quasi riuis deorsum sanguis exprimatur. Femore dextro contabescente vel toto crure, sinistro femori facias iniicimus à genu ductis orbibus, astrictius quidem, qui cum de-
- 15 sinant in inguine, hic etiam ita constringant, ut parte aliqua veluti diuerticulo, sanguis in gracile membrum deriuetur. Sit autem deligatio ea ratione temperata, quæ neque dolorem creet, neque vniuersum sanguinem ab incolumi membro reprimat: hoc enim alere frugalius, nutrire tamen
- 20 statutum est. Eadè ratio in superioribus membris seruari debet. Distortus callus siquidem mollis est, laxante fotu & diaphoreticis exinaniri debet: fouetur tepida, hydreleo, althææ & simili decocto. Discutitur arida sicu mista, ster-
- 25 capite de resoluentibus abundè dictum prius est. Si verò occaluit, eadem quæ in supercrescente & inueterato poro, consilia sunt. Mollior astringentibus emplasticis firmari debet. At vix durior esse potest, nisi ea de re causa fragilior sit: atque hic tota gignendi calli institutio sæpenumero re-
- 30 petenda est. Est quum è neruaceis partibus & osseis mucosus humor eliquescit, puri similis, qui ferè in alto latet, nec facile discutitur: quanquam laxata parte, fusa incisaque materia conuenientibus pharmacis dissipari debet: alioqui facto vulnere repurgandus
- 35 est. Atque is neglectus in scirrhum coit, qui præscriptis antè remediis capite de malasticis expugnari debet.
- F I N I S.

*Extenua-
torum mē-
brorum in-
stauratio.*

*Distortus
callus.*

Mollior.

*Mucosus
humor ab-
scedens.*



INDEX IN SEX LIBROS SEQUENTES,

cuius numerus prior paginam,
posterior lineam
denotat.



Abscessus apertio pa- gina 43 linea 36	431.23	Adglutinatio dimiform duplex	181.9
Abscessus aperien- di ratio 33.10		Adglutinatoria deligatura	182.23
Abscessus à quibus fiant humoribus 16.13		Adipes anodynus	474.1
Abscessuum iudicia 23.31		Adipes pepticam vim habentes	436.38
Abscessus qui dicantur Galeno 18.22		Adolescens ex cerebri vulnere curatus	153.22
Abscessus quid 1.9		Adstringentia calida	417.16
Abscessus quādo secandi 32.35		Adurentia medicamenta	53.12
Abscessus vnde 17.10		Aëris ambiētis nomine quid in- telligendum	236.7
Abscessuum curatio in vniuer- sum 31.15		Aeris ærugo	327.24
Aceti vsus in malacticis 432.10		Aeris squama	328.28
Aceti vsus ī scirrhis ibi. & 128.38		Aerugo quid	80.1
Acetum mulsum incidit & de- terget 429		Aeruginosa bilis	63.18
Acrida vbi vitanda 452.12		Affectus cum luxatione compli- cati	396.24
Acrimonia quomodo auferatur à medicamentis ibidem		Affectui contumaci & minus ca- lenti remedia	427.40
Acrochordones quæ 8.2. & 78.2		Affectuum cum vlcere compli- catorum curandi quatuor in- tentiones	309.37
Acus forma & qualitas qua su- tura fit 185.25		Agaricus conuenit conuulsis ex crasis & pituitosis humori- bus	211.25
Adenæ 37.35		Albara	10.19
Adeps & sebum differūt 430.30			
Adeps recens laxat, vetus discu- tit 426.38			
Adeps vetus quomodo fit recens			

Albara Punicorū est leuce Græcorum & Celsi	ibidem	Apostema aliter à Græcis, aliter à recentioribus accipitur	1
Aldaron trochiscus	58.35	Apostematis absoluta definitio, & definitionis examinatio	3.2
Alhasaphum	11.17	Apostematis curatio est extractio materiæ extraneæ quæ ipsum faciebat	32.31
Alkali quid	471.16	Aquæ aluminosæ vis ad pituitosos abscessus	106
Almatum Avicennæ Græcorum terminithi	14.4	Aquæ fortes	472
Almismar	78.21	Aquæ vitæ	228
Aloë vulgaris	462	Aquosi tumores	17.12
Alphi duplices	9.29	Aquosi tumoris curatio	96.16
Alphitidon facta fractura	367.	Aquosum apostema	95.1
23		Aræotica cuius naturæ sint	425.
Althæa officinis bisinalua	405.	7	
26		Ardor alicuius partis quomodo extinguitur	422.13
Akerationes tres in animalis corpore fiunt	301.23	Argentum viuum sublimatum fistulis callofis vtile	357.29
Altercum	319.30	Arsenici vsus & mensura	116.15
Alumen	528.1	Arsenicum sublimatum	58.37
Amurina quæ	467	Arsenicum sublimatum viuum à corrupto optimè separat	339.40. & 360.11
Anadendromalache	126.24	Arteria incisa aliquando vnitur	162.3
Analogia in tumoribus præter naturam	21.3	Arteriarum vulnera	259.31
Anaxipædis causæ	246.10	Articulorum doloribus conueniens oleum	475
Andronis trochiscus	55.5	Ascites vnde	95.10
Aneurisma quando fit	265.29	Ascites à maiore frigiditate fit quàm tympanites	96.2
Anélura quæ	473	Aspanar	197.17
Antecedentes tumorum causæ	16.9. & 299.5	Astriktionis mensura	416.24
Antidotarium quid	414.11	Atheroma	100.39
Anthraces qui	36.29	Atheromata sub quo genere tumorum contineantur	7.3
Antimonium	327.33	Atheromatis curatio	117.31
Antispasmi	33.22. & 306.15	Attract	
Apertis vasis conueniunt adstringentia	476.24		
Aphorismi 59. & 60. lib. 6. interpretatio	400.31		
Apocope	367.27		
Aponerina	415.14		
Apoplexia	214.30		
Aponerina quæ	19		

I N D E X.

Attractylis colletica sūmē	463.2	Calli curatio	469
Attrahentia aduentitio calore		Calli in osse fracto conueniens	
422.18		proportio	485
Auerfio sanguinis duplex	261.	Calli in osse fracto magnitudo	
24		decens	385.36
Auerfio cum vacuatione sangui-		Calli in osse fracto materia	449.
nis	261.32	37	
Auicennę locus de incisione me-		Calli ossis generari incepti no-	
dullę interpretatus	286.38	tę	384.35
Auicenna myrmecias confundit		Calli siue πύργου concreti signa	
cum herpetibus	73.27	485	
Aureum Mesuę sarcoticō	454.9	Calore quę trahunt	446.1
Autoris antidotarij institutum		Calor facit motum immodicum	
& consiliū in libro describēdo		222.39	
de materia chirurgica	414.33	Callos aufert helleborus	469.2
B Arbarum Galeni	543.29	Callosis labris vlcerum medica-	
Batitura æris	464.15	mentum conueniens	475.20
Belulcum ferramentum	171.21	Callosis vlceribus cōueniens me-	
Bilis atra	62.35	dicamentum	330.32
Bilis duplex	ibid.40	Callos quę minuunt	390.10
Bilis quid	ibid.37	Callum iustum firmantia in osse	
Bocium	102.9	fractō	486.36
Borago	197.16	Callus	8.9.& 469.5
Bothor	4.2	Callus ossis dicitur, cuius inter-	
Bothores iuncturarum	14.2	uentu ossis fracti partes adal-	
Brachij caput quomodo luxetur		ligantur	188.15.& 437.15
397.36		Callus quantum differt à clauo	
Bronchocœle	98.13	61.17	
Bubo	102.27	Caluaria fracta solidescit trigin-	
C Acochymia quid	28.13	taquinque diebus	371.35
Cacoëthe vlcera	64.13	Calx viua quid	266.5
Cacoëthe vera iuuantia	447.10	Cambil	329.15
Cęsim & percussim plagis factis		Cancer à carcinomate differt	
medicamentū ephæmum ne-		7.26	
cessarium	314.36	Cancerosis vlceribus quę impo-	
Cadmia	327.10	nuntur	447.12
Calamentum officinarum	318.	Cancer quid	131.22
38		Cancer quando curationē, quan-	
Calcis modus lauandi	282.38	do non admittit	133.30
Calidicon trochiscus	58.34	Cancer vlceratus cur lupus vo-	

I N D E X.

cetur	363.1	est	437.15
Cancrī exulcerati	64.12	Caries	294.22
Cancrī signa	132.13	Caries lignorum	451.39
Cancrī signa scirrho Guido tri- buit	123.10	Carnem detrahunt quæ vehemē ter exiccant, & natura acria sunt	241.27
Cancris medicamēta topica quæ conueniant	135.38	Carnem facere est naturæ opus	232.31
Cancris quibus adblandiendum vera cura omīssa	361.4	Carnē minuētium supercrescen- tem quædam valentia quædā imbecilliora, & inter hæc quæ dam media	242.7
Cancrī vlcerata notæ	359.10	Carne replent siccantia & deter- gentia	346.22
Cancrī vnde	122.27	Carni generandæ quæ obsunt	449.32
Cancros aliquando Celsus gan- grænam & sphacelum appel- lat	370.1	Carni-regignendæ quis sanguis aptus	232.19
Cancroſa vlcera purgātia	447.5	Carnis excreſcentias reprimens med.	448.29
Caninū cerebrū ossa fracta qua- tuordecim diebus solidat	484.21	Carnis generationi duplex adest excrementum	233.10
Canis rabiei notæ	252.19	Carnis mutatæ à venenato telo notæ	175.2
Canis rabie sæpius capitur	ibid.	Carnis supercrescentis detractio naturæ opus non est	241.24
Cantharides quid mali adferant	471.17	Carnosi vulneris diuīſio	224.1
Caphura	418.6	Carnosi vulneris simplicis in car- ne summa acceptis, curatio	224.31
Capitellū quomodo fiat	471.37	Carnosum vulnus & eius diffe- rentiæ	223.33
Capitis luxationes	464.30	Caro-temperamētum proprium seruare debet priusquam vlcus curari possit	312.26
Capitis vlcera coniungēs	397.19	Κάταγμα	385.21
Capnos græcè fumaria latinè di- citur	125.14	Cataplasma ad phlegmonas ex fluxione natas cōueniēs qua- le	75.30
Capparis cortex	329.7	Cataplasma ex orobi farina	54.11
Carbunculi	36.28	Cat	
Carbunculi curatio	51.17		
Carbunculi iudicia	50.38		
Carbunculi notæ	49.37		
Carbunculi qui pessimi	50.38		
Carbunculis conueniens medi- camen	433.9		
Carbunculum maturans & rum- pens	54.1		
Carbunculus vnde oritur	49.35		
Caricarum decoctum pepticum			

I N D E X.

Cataplasmata vnde fiunt 418.29	speciales 16.1
κατὰ πλάτ curatio 281.25	Cautica dum admouemus, videndum ne vicinæ partes inflammatione tententur 360.36
Cathæretica quæ 239.39	Cautica qualiter admouenda 316.6
Cathæretica, & eorum potestas 468.10	Cauticorū diuersi modi 470.12
Catharticus quomodo vtendum in vlceribus 444.14	Cauticum ruptorium 35.7
Catharticorum vlceri impossitorum probatio 445.28	Cauteria dū adhibentur quomodo muniendus locus 470.12
Catheter quomodo trahit 423.15	Cauteria sūt leniora auro & argēto quā ferro & ære 470.17
Cathimia 327.10	Cauteria hæmorrhagiis conuenientia 479
Cauitas omnis præter naturam impleri postulat 231.29	Cauteriorum & ferri vsus semper suspectus in articulis 478.40
Cauis vlcis implendi indicatio à temperamento, tum corporis totius ægri, tum laborantis particulæ sumitur 225.28	Cauū vulnus priusquā impleri possit, oportet particulam siue carnem subiectā ad naturalem suū habitū reducere 405.15
Cauis vulneris cū amissione cutis vtriusq; & carnis subiectæ geminus curandi finis 231.16	Centaurij facultas 282.9
Cauis vulneris curatio iuxta vulgarem chirurgorum modum 237.32	Centaurij minoris radix ibid. 16
καυλὸς y fractura 374.23	κεφαλὴ 452.23
Caules rubri 107.2	Cephalicorum materia 453.2
Causa coniuncta nihil differt à morbo 18.10	Cera alba quæ 419.9
Causæ duæ tantum morb. secundum quosdam 17.33	Cera & resina confusa valent ad suppurandum 437.6
Causæ externæ curationem non indicant, sed affectum 149.21	Cera quali vtendum in ceratis 419.6
Causa effectrix in omni morbo primum tollenda 322.30	Ceratum κατὰ γυμναστικὸν 483.19
Causæ influxionis in partem aliquam 27.18	Ceratum humidum 38.13
Causæ inuentio est principium curationis 26.34	Ceratum myrtinum 419.3
Causæ tumorum præter naturam generales 14.20	Ceratum è psyllio 419.32
Causæ tumoris præter naturam	Ceratum refrigerans 69.21
	Ceratum rosaceum 418.36
	Cerebri vulnera 152.31
	Cerebri vulnera cur lethalia 154.6

I N D E X.

Cerebrum promptissimè compa- titur neruosis partibus inflam- matis 222.25	Centia 239.35
κερίλαια 430.20	Cicatricis inducendæ methodus 238.12
Cerota vnde fiunt 418.29	Cirrhum medic. 349.8
Chalastica medicamenta quæ 31.19	Clauī Auicennæ 78.18
χαλαστικά fiunt interdum κεπυ- τικά 435.31	Clauicula quò luxetur 397.29
Chalcanthum 327.28	Clauis cōueniens medica. 433.9
Chalcitis 327.17	Clauus 8.3
Chalcitis cruda crustas inducit ibidem 14	Climia 327.10
Chironia vlcera 221.21	Coagulum 422.33
Chironiis vlceribus conueniens med. 331.28	Cochlearum carnes 423.4
Chironis vlceribus & malignis quid vtiliter inspergatur 452.1	Collectio in tumoribus fit bifa- riam 18.38
Chironiis vlceribus med. conue- niens in mollibus corporibus 333.12	Colleticon Dini 465.31
Chironium vlcus Celso quod di- citur 321.31	Colleticon è centaurio minore ibid. 25
Chirurgia non temerè adhiben- da in cancris 137.30	Colleticorū vtēdi modus 465.10
Chirurgorum imperitia in vlce- ribus quibus admota sint me- dicamenta plus satis acria 308.13	Colcotar 327.18
Chirurgus non purgabit, venām que incidet citra medici con- siliū 68.16	Colubri lapis quomodo acqui- ritur 427.10
Chærades 7.20	Concoctionem iuuans drageta 92.12
Chæradibus cōueniētia 426.37	Concrefcere quæ debēt, oportet mollia & humida esse 373.26
Cholera naturalis 62.2	Congestio 15.1
χολή φυσική ibidem 2	Conserua quid 484
Chrysocolla 328.22	Confracta vniens med. 485
Cicatrice inducturo quid facien- dum 239.23	Consolida maior 54.12
Cicatricem per accidens indu-	Consumptiua quæ 239.40
	Continētes vlcerū causæ 299.14
	Continētis causæ definitio 17.33
	Conti vulgo probæ dicuntur 341.20
	Conuulsioni ex plenitudine fe- bris superueniēs bonū 212.29
	Conuulsio vniuersalis 206.8
	Conuulsio particularis ibid. 14
	Conuulsis a quacūq; causa sem- per cerebrum corroborādum & quomodo 213.35
	Con

I N D E X.

Conuulsis remedia continuo adhibenda, interpositis tamé breuius interuallis &c. 202.27	Crocea bilis 63.23
Coriandrum 419.2	Crocus 437.23
Cornua verrucarú genus dictú Auicennæ 8.8	Crocus utilis in anodynis 47.8
Corpora quæ medicamenta leniora requirant, quæ fortiora 429.34	Cruentis vtile quacunque corporis parte 464
Corpora dura vehementiora requirunt remedia, mollia contra 59.10	Crus fractú ne breuius fiat, quid faciendum 370.34
Corporis figura multifariam vulnerati 165	Crustæ à cauteriis factæ quando & quibus detrahendæ 470.29
Corrosiuorum vsus in pituitosis affectis 117.4	Cucurbitulæ vsus in magnis moribus virulentorum animalium. 354.36
Corruptelæ particularum indicia 22.22	Cucurbitula quomodo trahit 423.12
Contundendo soluentia vnitam 260.27	Cuniculosa vlcera omnia vulgus fistulas nominat 340.18
Contusa caro in gangrænam degenerans quomodo tractanda 245.7	Curandi ratio optima tripliciter indicatur 31.34
Contusum vulnus quomodo curetur 243.6	Curatio morborum commoda non ex nominum, sed rerum recta opinione contingit 224.24
Costæ fracturæ diuersæ 372.15	Curationis ordo in vlcere 34.36
Costa fracta quod dierum spatio ferrumen accipiat 371.40	Curationum communis indicatio in tumoribus præter naturam 136.16
Coryledon 69.19	Curatio propriè est rei præsentis 149.32
Coxa diebus quinquaginta coalescit 372.5	Curatio tumorum in vniuersum 24.37
Cranio fracto, quæ imminere mala portendunt ibi.22	Curatio tuta tria requirit 31.34
Crassa & viscida molliri volunt 429.13	Cutis habenda ratio in glutinatione vulnerum 460.38
Crassa & viscida secans medicamen & discutiens 427.40	Cutis regigni nõ potest. 238.19
Crises tumorum sequuntur analogiam humorum ex quibus constantur 21.1	Cynoglosson 196.12
	Cystis fellis vulnera 156.9
	Cystis membrana dicitur, quæ integit excrementas 103.3
	Acridion. 67.27
	Dartæ Gallicæ 12.31

INDEX.

Declinatio in tumoribus præter naturam	21.20	Detergentia	34.17
Defœdationes cutis vnde	18.26	Detergentia quatenus vulnera requirunt	233.29
Defensiuæ quæ	419.31	Διὰ βρωσις	260.16
Deligandi fracturarum. modus recentiorum Hippocrati dam natus	370.7	Διὰ χαλκίτις	463
Deligatio ad repellentium genus refertur	419.36	Διὰ χαλκίτις præparatio ad rheu mata	419.16
Deligatio ferularum quando soluenda	384.16	Διὰ χαλκίτις vsus in neruo vulnerato	283.23
Deligatio tuta ossis repositi	377.23	Diachylon ireatum & commune confert œdematis	111.13
Deligatura conueniens membro atrophia affecto	419.39	Diachylon Mesues prodest pituitosis tumoribus	ibid.17
Deligatura conueniens ossis fracto	289.4	Διὰ χυλὸν tria genera, & eorum diuersus vsus	434.24
Deligaturæ duabus fasciis factæ ratio atq; explicatio	378.29	Διακοπταρίας medicamen	467
Deligaturæ indicationes vnde sumantur	184.30	Dia ireos	454.27
Deligaturæ instrumenta	480.6	Διὰ λαδάνη Critonis	457.22
Deligatura fracturæ coniunctæ cum vulnere	387.5	Διὰ λαδάνη emplastrum	330.33
Deligatura in œdemate	87.32	Diapalma	136.33
Deligatura retinens quomodo fiat	183.40	Diapedesis causæ	246.13
Deligaturarum tres differentiæ	182.18	Diaphoreticorum vsus, canon	428.29
Deligatura vlceribus conueniens	336.29	Diaphragmatis vulnera	155.2
Delirij ex vulnere curatio	223.1	Διὰ πλῆσις	481
Deliriis opitulantur res frigidæ odoratæ	ibid.18	Diapompholigos vnguentum	136.32
Delirium quid	222.3	Διαπυλινὰ debent esse emplastica	435.22
Delitescentiæ regressionis tumorum indicia	22.26	Digerentia siue resolutoria do mestica	248.23
Deriuandum quando in vulneribus	195.17	Diphriges	242.34
Deriuatio	261.39	Διπλώματα	466
		Directum in osse fracto reponendo quid dicatur	374.26
		Discissa quæ dicantur	162.20
		Dolia	171.19
		Dolor durans quæ symptomata inuehat	473
		Dolores acerrimos calor & frigus	

I N D E X.

gus faciunt	ibid.	sint	264.28
Dolor fluxionem prorit , &		ἐμπλαστρώδη epulotica	456.6
phlegmonem excitat	226.11	Emplastrum album epuloticum	
Dolor in fracturis quomodo cu-		Auctuar.	459.20
ratur	38.13	Emplastrum album epuloticum	
Dolor in vulneribus quomodo		ibid.	14
sedetur	200.1	Emplastrum Auicennæ ad tumo-	
Dolor sedandus , læsæ particulæ		res vulnerum & phlegmonas	
dolorem faciens	223.10		201.12
Dolorum causæ	473.10	Emplastrum Auicennæ ad for-	
Dothienas adiuuans medicamen-		dida vlcera	339.17
	428.21	Emplastrum ex cancris	137.21
Dracontion morbus siue dracun-		Emplastrum ex metallicis	275.8
culus	8.12	Emplastrum de arnoglōssa	52.14
Dracontij radix curat maligna		Emplastrum Galeni conferens	
vlcera	329.11	strumis , panis , parotidibus	
Dropacum vsus	466.17	&c.	110.36
Dubelata	6.38	Emplastrum Guidonis de lima-	
Duritie in particulis causæ	127.7	cibus ad œdemata resoluenda	
Duritie omni conueniens me-			112.7
dic.	424.20	Emplastrum Gulielmi de Sali-	
Δυσκολία vlcus	461.28	ceto	60.12
E cchymoma quid	245.24	Emplastrum nigrum	229.10
Ecchymomatis propria cu-		Emplastrum nigrum Aristi.	438.14
ratio	248.19	Emplastrum Rasis ad œdemata	
Ecchymomatis species	246.21		87.12
Echecolla per se hærent	435.38	Emplastrum viride Androma-	
Εκπύτικα	435.22	chi	438.29
Ecthymata	12.6	Emunctoria	37.35
Εκτίλινα quæ	469	Enhæma qualia	347.13
E directo secare venâ quid	40.28	Epidermis	62.12
ἐγώνιος figura	381.28	ἐπίσμοι	380.4
ἐλκος ὀδυνηρόν	305.8	ἐπίλοιπὸς καταγματικὸς	481
ἐκτίλινα quæ	420.10	ἐπικαίον vulnus	461.25
Elongatio ligamentorum	396.2	Epilepsia quid , & quântū distet à	
Elychnion Tarficum	87.29	conuulsionibus aliis	206.29
Emphysema quid	5.7	ἐπιπλοῖς quid	426.10
Emplastra diuersa ad hæmorrha-		Epinyctides	11.3
gias	478.3	Epinyctis vnde dicta	ibi.12
Emplastica medicamenta quæ		ἐπιπαστα epulotica	456.5

I N D E X.

Επιδιρκνιζ quæ	420.10	Erythrodanum	196.5
Epulotica quam facultatem ha- beant	239.4	Eschara quid	265.31
Epulotica recentiorum	459.2	Escharotica, & quibus conue- niant	468
Epuloticis quando & quomodo vtimur	459.35	Escharotica recentiorum	479.4
Epuloticorum natura, & eorum triplex genus	455.8	Essentia tumoris præter naturâ tria in se continet	25.23
Epuloticorû remediôrû distin- ctio, & ex ea vtêdi mod'	455.27	Essere	11.13
Epuloticum album è cerusa & li- thargyro	458.9	Esthiomenica corruptio	26.38
Epuloticû albû Galeni	ibid.26	Esthiomenos herpes	72.39
Epuloticû emplastrum nondum tamen sanans cacoëthe vlcera	330.17	Euphorbium	422.4
Epuloticum medicamentû quod	239.4	Exanthemata	12.6
Erethrias terra	319.38	Exarthrema	395.36
Erosio si non cedat mitioribus medicamentis, vsitio adhiben- da erit	337.26	Exesis valis conueniunt sarcotica	476.13
Erosio venis vbi accidat	260.33	Excisio vtile quacunque corporis parte	463
Error interpretis Auicennæ in dictionibus, myrmecie & for- micæ	6.27	Exiccantia affatim	329.10
Erysipelas non legitimû & eius species	62.19	Exiccatio valida duos habet sco- pos	289.33
Erysipelas quid	61.33	Exitura	86.30
Erysipelatis curatio	65.38	Exituræ Arabibus sunt abscessus Latinis, Græcis ἀπορύματα	4.5
Erysipelatis exulcerati curatio	71.1	Exituræ Auicennæ quæ	1
Erysipelatis refrigerationis ter- minus	68.38	Exituræ vnde	17.10
Erysipelatis summaria curatio explicata aphorismis	71.10.	Expulsoria deligatura	183.48
Erysipelatis veri causæ	64.19	Extenuatorum membrorum in- stauratio	487
& deinde iudicia & signa		Ερυσιπελος vlcus	461.28
Erysipelaton genus qui tumores referunt	6.24	F arina hordeacea	436.26
		Fasciæ latitudo & longitudo pro vulneris & partis ratione variatur	184.18
		Fasciarum latitudinis modus	378.13
		Fasciarum longitudo	378.32
		Febres à quibus fiant humoribus	16.29
		Febris leui vulneri superueniens est perniciofa	202.10
		Feb	

I N D E X.

Febris vulneratum prehensens quomodo curanda.	202.4	Flatuosi tumores	17.14
Ferinos Auicennæ quid	123.28	Fluxio	14.23
Fermentum	422.28	Fluxionis auersio quibus perficiatur	40.24
Fermentum quomodo potenter mollit, coquit & digerit	ibid.	Fluxionum auersio quomodo fiat	27.40
Femur fractū non necessariò breuius fit	370.28	Focilia quæ	286.29
Ferro quando vtimur, quæ partes vitandæ sunt	439.35	Forceps ad amplianda vulnera in carne	179
Ferrum teli quomodo eximatur	171.18	Forceps ad globos & tela barbata educenda	177
Ferrum infixum quo instrumento commodè extrahatur, & quod vice terebræ inuersæ Guidonis esse possit	178	Forcipes Albucasis ad extrahenda tela	176
Ferulæ fracturis quando apponuntur	382.15	Formicæ Auicennæ	72.9
Ferulæ quales esse debeant ibi.	37	Formicæ genus verrucarū	78.35
Ferulæ quomodo applicandæ ossibus fractis	289.16	Fractura	287.10
Ferularum vsus	382.35	Fracturæ cum vulnere curatio ex Celso	289.10
Fibulæ Græcè ἀγκυρῆς	181.11	Fracturæ curatio generalis	388.32
Fibulæ quando imponendæ vulneri	ibid.30	Fractura brachij, tibiæ, aut femoris quomodo deligāda	378.14
Fibulæ quatenus vtilis	186.25	Fracturarum causæ	368.34
Fibula vbi adhibenda	462.20	Fracturarū generalis diuissio	364
Figura partis rectissima quæ	381.22	Fracturarū prognostica	369.25
Fistulæ quō noscantur	350.36	Fracturarum veterinariarum alii quot præfagia	371.9
Fistula quid, & quomodo ex sinu fiat	340.19	Fraudulentum vlcus	338.20
Fistulæ quomodo incidantur	442.6	Fugillæ Auicennæ	98.18
Fistularum curatio	352.35	Fuligines sarcoticæ	451.33
Fistularum vera curatio quæ	357.24	Fumus terræ	125.14
Fistula vnde sit dicta	350.12	Fuscus color	123.4
Flatibus ventris conueniens oleum	475.8	Galla omphacitis	329.2
		Gallicus morbus quādo primum irrepsit	13.20
		Gallicus morbus veteribus ignotus	ibid.
		Gangliorum per chirurgiam curatio	110.21
		Ganglium	8.18
			Gan

I N D E X.

Gangræna	76.29	76.34	
Gangranę et sphaceli curationis capita	60.24	Herpetis curatio	74.19
Gangrænę signa	60.23	Hiera picra conuenit conuulsis	
Genitalibus inspergitur vtiliter colophonia cum ture	451.36	ex crassis & pituitosis humoribus	211.25
Gentianę radix quandoque penicilli loco imponitur	109.15	Hiera Ruffi	135.13
Genu i tres partes luxatur	398.3	Hipp. non fuit ambitiosus in fracturis nominandis	367.36
Glandosę pustulę	13.38	Hirudines supficię fugūt	423.13
Glandulę	37.34	Hispanica lues	13.29
Glandula vnde dicta	98.37	Hordeatum vel hordeū mundatū est pituitosa hordeacea	197.12
Glaucium est membra	77.9	Humores proprię qui	16
Glossocomi formula	393	Humores vniuersi in venis aut arteriis continentur	16.32
Glutinandi ratio	540.33	Hydroa	11.15
Glutinantia remedia recentiorum	464	Hydrophobia	252.35
Glutinantium facultas	228.25	Hydrophobię notę	254.10
Glutinantium finis	346.32	Hydropicorum aquas elicentia	423
Guidonis error in myrmeciis & formicis	73.32	Hydropicorum vulnera quare difficulter sanantur	423.4
Gypsum	418.8	Hyoſcyamus anodynum familiare	47.15
H æmorrhagię causę	476.12	Hyperſarcosis	241.8
Hæmorrhagię varia remedia	477	Hyperſarcosis oblatio	315.13
Hæmorrhagia quando cauteriis fisti debeat	477.16	<i>ὑποσφαιδισ</i>	378.19
Hæmorrhagia trifariam sistitur	261.17	Hypopia	246.21
Halitus oris grauis & foetēs quare oppressis lue venerea	431.3	<i>ὑποστιχ</i>	473.131
Hepatis vulnera	134.19	<i>ὑποσφαις</i> quid	441.29
Hernia gutturis	98.13	Hyposphagmata	246.21
Herpes	72.25	I chthyocolla	328.22
Herpes & eryſipelas vlceratum differunt	73.39	Ieiuni intestini vulnera	156.8
Herpes exedens	64.9	Ignis sancti Antonij	56.17
Herpes miliaris	72.25	Imbecillitas partium ab intemperie prouenit	311.3
Herpes pustulosus	72.38	Impages quid	190.21
Herpetas inueteratas curantia		Impetigo	8.37
		Incantamēta, insuffrationes, & cōiurationes ad tela extrahenda non	

I N D E X.

da non conducunt	175.17	Iugulariū venarū vulnera	556.1
Incarnatiua deligatura	182.21	L Acertæ caput	79.36
Incarnatiua futura fit quinque modis	185.6	Lesio melior quā mors	201.1
Incarnantium ordo	347.23	Lana succida vino austero insucata	418.1
Incidens materia quibus conueniat	425.30	Lapis lazuli Græcis Cyaneus dicitur	125.16
Incrementum in tumoribus præter naturam	21.11	Larigna pro terebinth. substitui potest	450.30
Indicatio communis omniū tumorū præter naturam	125.23	Laxatio	396.1
Indicationes communes tumorum præter naturam quibus varientur	25.5	Λάσις χαλκῆς	328.29
Indicationum primarum differentię duæ	234.14	Lepra	9.16
Indurationis tumorum indicia.	37.27	Lepræ med. conueniens	464
Induratis tumoribus vtile cataplasma	47.29	Lepra Halyab. quid sit	10.20
Inflatio est apostema ventosum	91.30	Leuce Græcorū & Celsi est Punicorum albara	9.25
Inflatiōis curatiōis capita	94.19	Leucophlegmatia vnde	95.4
Inflationum causæ	90.19	Leucophlegmatia ad œdematū species refertur	7.3
Inflationum signa ibid.	39	Lichene	8.37
Inflationum curatio	91.10	Lienis scirrhis conueniens med.	430.22
Inflammatiō fracturis adiuncta quomodo curatur	386.13	Lienis vulnera	156.37
Intemperierum vulnerum signa & curationes	201.27	Ligamēta vulnerata valētissima tolerant remedia	272.7
Intemperierum in vlcere summa ria consideratio	311.29	Limacum carnes	423.4
Ioannis Tagautij laus	414.27	Linamenta	189.4
Ionthi	10.36	Lichargyrum nutritum	459.22
ἰὸν ἔστιν ὅν	329.34	Lixiuum ficulneum	472
ἰσχυρὰ verum	478	Lohū iuraia Fræcis dicitur	58.15
Iſchiadicis vbi ignem adhibemus	440.32	Lupia quid	100.41
Iudicij ferendi formula de vulneratis	159.3	Lupia curatio	108.32
		Lupia recentiorum, Auicennæ glandula, Græcorum gangliō eundem videntur	109.30
		Lupus morbus	100.19
		Lupus cancer vlceraſus dicitur	363.1
		Luxata partis dolor vitandus & inflammatio arcenda	402.34
		Luxatio	

I N D E X.

Luxatio cum fractura sine vlce- re	405.11	decimū quartū & vigesimū primum diē coeunt	372.3
Luxatio cum fractura & vlcere ibid.	15	Maxilla superior imobilis i omni animāte excepto crocodil.	397.1
Luxatio pessima	399.20	Medicamenta acrimoniā lotio- ne deponunt	282.36
Luxatio quid	395.17	Medicamenta hyperfarcosin tol- lentia	315.12
Luxationum causæ	465.35	Medicamenta ignis vires habentia	76.10
Luxationum curandarum sum- ma	398.17	Medicamēta quare varia miscen- tur	436.10
Luxationū curatio, & eius præ- cipua indicatio	401.7	Medicamentum vnum idēque non est conueniens omnibus corporibus	325.11
Luxationū generalis diuisio	394	Medicum prudentem esse conue- nit in victu instituēdo	198.37
Luxationum signa	398.27	Medicus præsentiens de longin- quo obuiam it malis	223.21
M Agnes	423.1	Medullæ & adipēs quando acrimo- niā contrahunt	291.28
M Magnū & parū in vulne-	461.24	Medulla panis	200.19
ribus quo accipiendū	428.34	Medulla recens laxat, vetus discū- tit	426.38
<i>μαλακτική</i>	428.34	Medullarum natura & ordines	431.22
Malactica quatenus à pepticis differunt	436	Medulla taurina ob acedinē nō emollit	ibid.32
Malacticon applicandi modus	435.40	Mēra vulnus	461.26
Malagmata quomodo cōsingu- tur	436.13	Melanacardinum	467.36
Malicorium	329.3	Melācholia fit ex sanguine & pi- tuita supercalefactis in corpo- re	121.5
Malum terræ	ibid.9	Melancholię differentię	120.12
Malum punicum vlceri inflam- mato vtile	314.12	Melancholicus humor in cancro quomodo vacuandus	134.32
Manna	315.34	Meliceria	300.37
Marciaton frig. doloribus conue- nit	475.25	Meliceridas, atheromata steato- mata exedentia	118.23
Marginem nonnulli subluxatio- nem nominant	395.33	Melicerides sub quo genere tu- morum	
Materia fiens in tumoribus & fa- ta quæ fit	15.32		
Matricis vulnera	156.10		
Maturantia	44.40		
Maxilla inferior solū luxatur in anteriorem partem	397.1		
Maxilla, iugulū, scapula, os tali, calx, manus, plāta fracta inter			

I N D E X.

morum contineantur	7.1	bent	80.25
Meliceridis curatio	117.31	Myrmecis conuenientia	79.17
Meliceris	101.10	Myrtha ossa nudata carne vestit	288.30
Melligo vix passæ	437.25	Myrrhis	196.7
Mentagra	12.37	N ^{Αρνορια} Narium fractura mala	473.31
Mesux laus	219.11		372.20
Metallica elota morsum demittunt, sed minus siccant	243.4	Nata tumor	7.16
Metallica quomodo tenuiora sunt	423.28	^{Νάρθηκας}	383.27
^{Μετασχηματισμὸς}	466	Naturaliter se habentia sui custodiam per similia indicant: contra naturam verò ablationem sui per contraria	234.28.
Misy	327.30	Neruæ partes læduntur frigido	478.1
Modicè siccantia metalla	ibid.7	Nerui, arteriæ, venæ diuise aliquando coalescunt	161.30
Mollientium particularis materia	430.5	Nerui cæsim vulnerati cõsideratio & curationis scopi	278.17
Morbilli	12.2	Nerui contusi cute illæsa curatio	285.6
Morbis extremis extrema competunt remedia	360.5	Nerui & tẽdonis pũctura	157.20
Morborum verus curator quis	148.30	Nerui puncti curatio	272.39
Morphea	9.24	Nerui vulnerati & nudati curatio	282.22
Morsus animalium duplici constat differentia	250.29	Nerui vulnerati signa	271.5
Morsus an sit factus à cane rabido, quomodo probetur ex Oribasio	253.15	Neruo cõtuso vnà cum cute quæ adhibenda	286.15
Morsus hominis quando virulentus	250.23	Neruosarum partium vulnecuratio	272.15
Morsus omnis virulenti gemina curandi indicatio	255.6	Neruosarum partium vulne. differentiæ	272.23
Morsus virulenti signa	251.30	Neruus punctus quando præcidendus	201.2
Morsus virulentos quæ animalia inferant	250.12	Nitri loco quæ ponũtur	421.23
Mortificatio alicuius partis quid	37.36	Nodi Auicennæ	6.35
Mortificationis causæ	56.19	^{Νόμος} vlcus quod dicatur	304.5
Mortuus sanguis quid	248.36	Nomina apud Barbaros nõ attẽdẽda, sed rerũ descriptiões	11.35
^{Μότος}	264.26	Nomi	
Myrmecix	8.1		
Myrmecix educi quomodo de-			

I N D E X.

Nominibus parum fidendum propter diuersum vsum corū apud autores	10.25	Ordo tractandorum in hoc li- bro	26.18
Notæ tumorum præter naturam vniuersales	19.29	Os adiutorij	286.26
O culus populi	418.7	Os corruptum quomodo tra- ctandum	480
Oedema Barbari Vndi- miam vocant	5.31	Os fractū qualiter collocādū	483
Oedema maturantia	38.17	Ossa luxantur quatuor modis	396.34
Oedema non verum	95.20	Ossa nudata quomodo carne in- teguntur	450.8
Oedema quid	81.29	Osse fracto quæ intētionēs præ- cipuè adfunt	481
Oedematis causæ tres	83.22	Osse fracto quomodo turunda vulneri applicanda	288.19
Oedematis curandi scopus du- plex	84.6	Osse maiore fracto si medulla exeat, periculosum	286.27
Oedematis signa	83.27	Osse nudato erysipelas malum	286.15
Oedematis curationis capita ge- neralia	89.15	Osisbus fractis atque luxatis ini- tio prohibenda fluxio, dolor, inflammatio	481.
Ocnostagma siccatur, & putredi- nem prohibet	445.1	Osis caries altè descēdens qua- liter tractanda	320.18
Oesophagi vulnera	155.3	Osis cavitatis impleri non potest	288.15
Olea anodyna	473.31	Osis fracti rectè commissi signa	372.37
Olea cōposita resoluētia	426.14	Osis fracti & sua sede moti si- gna	377.5
Olea cōstyolica	469	Osis fracti reponendi modus per funes	375.32
Olea rarefacientia	426.17	Osis fracti repositi signa	376.1
Olea trahentia	423.30	Osis fracti repositio per tensio- nem	481
Oleorum vitia	418.18	Osis fracti sanationem celerem aut tardam faciunt, tempera- mentū, ambiens aër, &c.	372.8
Oleum cum sale digerit	99.30	Osis vitiatæ notæ	319.20
Oleum è sambuco & ebulo quid faciat	499.32	Osis vulnus quod	285.13
Oleum ex vitellis ouorū	323.22	Osiū abscessu incarnātia	481
Oleum Sabinum	323.1	Ossium	
Oleum terebinthinum	474		
Oleū vitiosum quō eluatur	85.2		
<i>ὀμὴ λυγρὴ</i>	70.9		
Omphacium	417.25		
Omphacinum oleum	418.11		
Oppilātia aliās leniūt dolorē, a- liās acrimoniā hebetāt	417.8		
Oræ distantes vulneris trifariam in idem adducuntur	781.38		

I N D E X.

Ossium affectus	419.20	Pes columbinus	196.9
Ossium glutinādorū quatuor scopi	287.25	Pes fractus sexaginta diebus si quiescat, conſanescit	372.5
Ossium vitii celeriter medican- dum	479	Phagedæna	64.11
Ostracodermorum piscum testæ crematæ & lotæ siccant citra roſionem	328.36	Phlegma aquosum, tenue, flatuo- sum quod	82.18
Ostrea viua quid faciant	423.8	Phlegmaticarū excreſcētiarum curatio	105.30
Oxycraton	42.6	Phlegmonarum genus tumoris qui referunt	6.16
Oxyrhodini facultas	85.2	Phlegmone quid	27.3
P Analithes ad diuerſa mala vtile	484	Phlegmones duplex acceptio 35. 19.	
Panis sordidus	197.22	Phlegmones causæ tres	36.32
Papulæ	74.12	Phlegmones notæ	37.12
Papulæ duplices Celſo	12.22	Phlegmones curatio	32.22
Paralyſis quid	214.21	Phlegmones curandæ quatuor intētiones particulares	39.28
Paralyſeos curatio ex medica- mentis forinsecus admotis & tantūm ad chirurgicum per- tinentibus	218.35	Phlegmones ex humorum influ- xu factæ summæ curationis capita	48.30
Pararthrema	395.40	Phlegmones symptomata	44.21
παρθρημα quæ	473	Phlegmones symptomatum cu- ratio	37.31
Parocheteuſis	262.1	Phlegmones tēpora sunt	4. ib. 21
Parotidibus cōueniens medica- mentum optimum	424.20	φλόγῳσις	35.24
Pars languida quando confir- manda	426.5	Phlyctene vnde	95.13
Pastilli Faustini	315.36	Phœnigmi vsus	466
παλιδὸς à plerisque fuscus color in corpore dicitur	123.6	Phœnigmus quando adhibēdus & eius materia	467.5
Penicilla	189.4	Picati vsus apud veteres	483
πεπλινὰ	435.23	πίλινα quæ	466.10
Pepticatorū vtendi modus	438.75	πίττωτα quæ	ibidem
πεπλινὰ quomodo in vsum ve- niunt	427.6	Pituitæ eruptiones	74.12
Periodi siue paroxysmi tumorū, humorum ex quibus constan- tur sequuntur analogiam	21.1	Pituitā ducētia per aluū	106.25
περίοδος	286.30	Pituita quid	82.6
		Pituitosorum abscessuum causæ, 103.23	
		Pituitosorum abscessuum parti- cularis curatio	107.35

I N D E X.

Pituitosorum tumorum materia	103.27	forium mas	179
Pituitosum tumorum genus qui tumores referant	6.35	Pforicum quomodo paretur ad trahendum	423.21
Pix peptica quomodo fit	437.3	Psydraces	11.36
Plagarum differentia	141	Psylli populi Italix	53.32
Planta noctis	11.15	Pfora	9.18
Plantago epulotica est	459.13	risicaia	466
Plarysma quid	331.35	Pulmonis vulnera	155.20
Plethora quid	28.2	Puluilli quomodo fiunt	188.10
Plethoræ curatio	ibid.7	Puluillus quid	336.16
Plumaceoli qui sint	188.9	Puluis Auic. sistens sanguinem	269.20
Plûbi lamina epulotica est	458.17	Puluis ruber.	464
Plumbi recrementum	328.25	Pumicis præparatio	452.7
Plumbi vis in cancriosis	137.13	Purgatio necessar. interdum vulneratis	190.37
Plumbum vstum	328.24	Purgatio in vulneratis quando adhibenda	193.33
Podagricis quouis tempore conueniens remedium	434.16	Pus album, lene, & æquale quomodo fit	435.28
Pollen est farina volatilis molèdini	186.37	Puris generatio vnde	301.20
Polyidæ sphragis	55.14	Pus optimum quod	24.26
Polyidæ pastillus	ibi.19	Pus mouentia	44.40
Porra Gallis verrucæ dicuntur	8.1	Pustulæ	4.2
Porracea bilis	63.15	Pustulæ vnde	17.11
Posca vel pusca quid	76.19	Pustulæ corosiuæ	64.14
Posca inflammato vlceri utilis	314.6	Putrefactæ particulæ alicuius suppurantis curatio	48.9
Porus	374.4	Putrescentia calido & humido constant	314.27
Porus sarcoides	161.18	Putridis medicamentum conueniens	58.12
Pori generatio	384.35	Pyulcus quomodo trahit	423.15
Poro gignendo victus ratio conueniens	385.10 & 483	Q	
Porosissima quæ	483	Væ auferri non possunt transferuntur in locum alium	32.8
Porolytica quæ	391.4	Quies optimum medicamentum vulneratis	197.31
Porus quomodo augeatur & minuat pro necessitate	390.2	R	
Prægressæ causæ	16.5	Adix vasis quæ sit	183.30
Propolis quid	421.5	Ragxviden fractura	374.23
Propulsorium foemina & propul-		Recto	

I N D E X.

BB 2

I N D E X.

Scirrh i legitimi siue scirrhusi tumoris curatio	ibid. 36	quirunt	233.16
Scirrh i illegitimi generatio	126. 36	Siccantium medicamentorum in vulneribus curandi gradus	239.10
Scirrh i non exquisiti curatio	ib.	Siccum sano vicinius, humidum non sano	228.39
Scirrh i emolliendi modus & ratio	432.9	Sigillum lemnium	327.6
Scirrhi Græcè, Latine durities, Arabicè Sēphiros dicitur	5.33	Sinæ ferulæ	383.20
Scirrhorū differentiæ ex mixture humorū ortorum	122.17	Sinapismorum vsus	466
Scirrhusi tumores & qui ad atrabilem spectant	7.24	Sinapismorum materia & præparandi modus	467
Scirrhusis	127.5	Sinus Gal. quid dicatur	350.8
Scirrhorum tumorū curationis capita	130.5	Sinus quid, & eius differentiæ multiplices	340.21
Scirrhus hepatis quomodo tractari vult	430.23	Sinuum curandorum sanationis. ordo	312.31
Scirrhus verus ac legitimus vnde fiat	122.9	Sinus curatio nondum callosi	342.5
Sclerotica durities	37.40	Sinus qualitas vnde deprehenditur	ibid.
Scolecòdes vlcus	305.11	Siræon quid	437.14
Scolopomacherion	80.37	Situs partis vulneratæ	267.35
Scolopomacherion quid	328.25	Solani radix laudatur in sedando vulnerum dolore	200.14
Scorpio virus quod infixit retrahit	423.9	Solanum	417.26
Scrofulæ	7.19	Solutæ vnitatis species apud Auiucen.	140
Sebum coquit, laxat, mollit	430. 27	Sordes quid	233.16
Sedantia dolores triplicia generant	473	Sordida vlcera quos affectus sequuntur	338.22
Selaa	6.37	Sordidi vlceris propria curatio	338.40
Sēphiros Arabum quid	122.7	Sori	327.30
Septica Arabum	472.13	Spanadrapii vsus	403.38
Septica & eorum potestas	468	Spasmi curandi primum ac commune præceptum	208.26
Serosorum tumorū causæ	95.27	Spasmi signa	207.10
Serpentinum instrumentum ad euellenda tela	176	Spasmus alius vniuersalis, alius particularis	206.5
Sertula campana	362.31	Spasmus omnis aut est à repletionē	
Siccantia quatenus vulnera re-			

I N D E X.

tione aut inanitione	203.6	Strumarum inter sese differentia	105.6
Spasmus ex vulnere lethalis quo modo interpretandum	157.27	Strumas diuino quodam numine Galliarum reges sanant solo tactu	107.25
Spasmus ex ficitate absoluta incurabilis	208.5	Strumas quoque rex Angliæ sanat sed per hymnos & ceremonias	ibid.31
Spasmus quid	202.32	Strumas detergentia	112.4
Sphacelos	36.29	Strumas incidendi modus	114.5
Sphacelus à gangræna differt	56.8	Strumas maturantia	113.17
Sphaceli ex gangræna creati extirpatio	57.25	Strumosis affectibus quæ medicamenta conducant	105.30
Spicula extrahentia	423.6	Stupidum quando crus euadit ex suppurationis præcisione	440
Spiculatorum discrimina	167.28	Succorum vitiū in vlceratis quomodo corrigitur	140.23
Spinacium & spinargiū	197.18	Succorum vsus	418.26
Spina dorsi quid & quibus affimilatur	219.29	Suctus quæ eliciat	423.14
Spinam, Auicenna exquisitum erysipelas nominauit	62.9	Sudamina	11.15
Spinas, officula, vitri fragmēta, surculos extrahentia	175.22	Suendi vulneris ratio	185.21
Splenia quæ sint	336.13	Sugillata quæ	246.22
Splenia vnde dicta	380.3	Sugillatis remedium conueniēs	427.26
Splenium magnitudo & applicandi modus	481	Sulphur	421.39
Squammas in osse fracto detrahentia	480	Sumach	75.36
Status in tumoribus præternaturam	21.14	Suppurantium natura	435.18
Steatoma	101.20	Suppurantibus quando vtendum	ibid.12
Στεατώματα sub quo genere tumorum contineantur	7.3	Suppurationis tumorum indicia	22.19
Steatomatis curatio	117.31	Sutor malus vnico calopodio omnes calceat	237.32
Stercus bubulum	79.32	Suturæ remouendæ tempus & modus	187.35
Stercus pueri calidum, est pepticum	437.35	Sutura in quibus partibus conueniat	462.17
Stibi vel stibium	327.33	Suturis quando opus est	181.2
Στίμι	ibid.34	Syderatio ossium	56.6
Stomachus	213.25		
Stomoma	328.27		
Strumæ quid	7.20		

I N D E X.

<i>Συμψύκνις</i> quæ	460.22	diæta imperanda	198.14
Symphycum	196.8	Theriaca datur contra carbunculos	55.1
Symptomata phlegmones	46.10	Theriaca purgat, incarnat & cicatricem inducit	454.3
Symptomatum correctio in vulneribus	199.17	Thafma	245.35
Syncope quid, & eius instantis notæ	220.38	Thoracis vitia per quas vias purgantur	519.16
Syrion quid	437.14	Thorax læditur frigido	443.38
T Alpa	7.15	Thrombos quid	264.24
Tarfecum	78.34	Tophis articularum conuenientia	427.1
Telephia vlcera	321.22	Topica non sint dura neque graui	413.30
Tela quæ nostris corporibus infiguntur quibus differunt	167.18	Toto genere præter naturâ per chirurgiam amouenda	31.27
Telis extrahendis octo instrumenta accommoda	168.20	Tracheæ arteriæ vulnera	155.25
Telorum extrahendorum modus duplex	169.8	<i>Τρυπανισμός</i> quæ	460.22
Telorum extrahendorum observationes	169.19	Trigener	453.29
Tempora tumorum præter naturam à tribus potissimû discrimen assumunt	21.23	Triticum ore præmansum pepticum est	436.17
Tensionem facientia	160.30	Trochisci de arsenico	471.8
Têtio quomodo & quâta faciendâ, vt os fractû reducatur	375.8	Tubulus	171.18
Tenta	189.4	Tumor crudus quis Hippocrati intelligatur	271.34
Tentæ cannulæ	190.8	Tumores à bile creati	61.26
Terebra directâ ad ampliandâ ossa quibus tela inhærent	178	Tumores præcipui quatuor qui ex influxione fiunt	6.11
Terminationes tumorû præter naturam quæ meliores	21.31	Tumores præter naturam in tria genera diuiduntur	3.32
Terra sigillata	327.10	Tumores derepente detumescientes malum portendunt	151.5
Testudo	7.13	Tumores præter naturâ quatuor modis terminantur	21.31
Tetrapharmacum	31.24	Tumoribus curandis quæ obseruare oportet	38.2
Tetrapharmacum thus additum facit Macædonicum	438.15	Tumorum accidentia	4.34
Tetrapharmacum natura	454.14	Tumorum differentiæ à quibus sumantur	4.17
Tetrapharmacum est suppuratorium	314.30	Tumorum præter naturam quatuor	
Theodorici & Henrici error in			

I N D E X.

tuor sunt tempora	21.7	Vermes auriū quē enecāt	318.40
Tumorū præter naturam ex pi- tuita octo differentiæ	82.37	Vermes vnde nascantur in vlce- ribus & quomodo arceantur,	319.2
Turundæ 189.6. & earum vsus		Verrucæ 7.37. & earum diuerſa genera	77.30
ibid. 36		Verrucarum curatio & iudicia	79.20
Tuſum	78.34	Verrucarum diuerſæ curandi ra- tiones	80.3
Thymion	8.4	Vertebrarum ſpinæ luxationes	397.24
V Acuatō à toto fit duplici- ter	210.30	Veficæ vulnera	156.10
Vacuatio duplex tumorum præ- ter naturam	68.37	Vibices	246.25
Vacuatio humoris in parte ali- qua influxi	41.17	Viçtus bona ratio præſcribendâ ſtatim vulneratis	190.38
Vari	10.38	Vigiliæ conuulſionem ex ſiccitâ- te augment	210.8
Varices quæ	305.21	Vinculorum materia in vâſis di- uifis	115.22
Varicibus conuenit deligatura expulſoria	97.20	Vini natura	426.10
Varicum curationes	371.22	Vinum	418.3
Varicum cum vlcere complica- tarum curatio	317.6	Vinum quando & quare couul- ſis interdicens	213.5
Variolæ	12.2	Vini nigri auſteri vsus & eius ſa- cultas in vulneribus	462.13
Vâſis oſculū fundentis ſanguinē quomodo obſtruatur	264.22	Vires non ſemper in ægris au- gendæ	198.15
Vâſorum radix quæ	265.21	Virgalis fractura	367.10
Venæ ſecundæ electio vnde in- dicatur	40.35	Viride æris	327.25
Venæ ſiue arteriæ incifæ ſignum	261.1	Virus	301.10
Vena media duplex	193.2	Virus ſua natura ad cor ſerpit & eius deſtructionem appe- tit	251.13
Venarum & arteriarum vulnera an ſint ſuenda	263.35	Virus eiaçulatum in morſu va- cuanitia	255.9
Venenata vulnera qui autores tractarunt præcipuē	249.40	Vitellina bilis	63.15
Venenatis morſibus remedium	427.30	Vitia corporum neque eloquen- tia neque barbariſmo abigun- tur	414.39
Venenum quomodo exugatur ex vulneribus	175.8		
Ventriculi vulnera	156.7		
Ventus meridionalis vlceribus nocet	308.24		

I N D E X.

Vitiligo quid	10.2	ta	442.15
Vitiliginis nomine alphō & leu- cam cōprehēdit Celsus	9.38	Vomit in vulneribus vitilis	195.10
Vlcera dyſepulota quæ	321.14	Vox perit, quibus spinæ pars quæ in ceruice eſt afficitur	216.14
Vlcera inſanabilia ſunt quibus os corruptum ſubeſt	300.9	Vnico calopodio omnes calcea- re	237.33
Vlcera maligna à quibus humo- ribus excitentur	334.14	Vnio in quibus partibus poſſibi- lis, & in quibus non	160.30
Vlcera quibus abluenda	444.26	Vnitatis ſolutæ cauſæ vniuerſa- les	149.3
Vlcerebus ſanandis tria ſummè cōueniētia enumerat	336.22	Vnitatis ſolutæ curandi comu- nis indicatio	164.9
Vlceris cum oſſium corruptione complicati curatio	319.8	Vnitatis ſolutæ nomina ac diſſe- rentiæ ex Galeno	140
Vlcerum cauſæ geminæ	398.31	Vnitatis ſolutæ ſpecies variæ	146.13
Vlcerum curatio in vniuerſum.	308.36	Vniuerſalia maniſeſtiora ſunt nobis quā particularia	20.10
Vlcerum curationis vna præci- pua indicatio eſt mediocris ſiccatio	76.5	Vnguētum Aegyptiacū	53.11
Vlcerum differentiæ	290	Vnguētum album Rafis epu- loticum	459.7
Vlcerum differentiæ à quibus po- tiſſimum ſumantur	295.30	Vnguētum album communi- tatis	ibid. 6
Vlcerum differentiæ veræ vnde ſumantur	297.7	Vnguētum Agrippæ conuenit in frigidis doloribus	475
Vlcerum ſigna & iudicia	303.20	Vnguētum Apoſtolorum & eius virtus	448.36
Vlcus & vulnus differūt	294.30	Vnguētum baſilicon	441
Vlcus qd vulgo chirurgis	293.38	Vnguētum diachylon	ibid. 32
Vlcus quomodo detergendum	337.6	Vnguētū ex vermibus	279. 2
Vlcus ſimplex quod	297.9	Vnguētum gloriæ	465
Vlmi foliis incluſa aqua ad quæ vtilis	463.5	Vnguētum optimum maligna vlcera ad cicatricem perau- cens	329.28
Vomica aperienda ferro etiam ſi nondū ſatis maturuit	440.28	Vnguētum Rogerij ſpaſmo con- ueniens corpore prius repur- gato.	211.36
Vomicæ aperiendæ ratio	441.2	Vrendi & redigendi in cinerem medicamenta, modus	451.25
Vomicæ aperiendæ locus vulne- ri quis aptiſſimus	440.31	Vrend	
Vomicarum aperiendarum cau- tiones	443.16		
Vomicas aperiētia medicamē-			

INDEX.

Vrendorum metallicorum ratio	455.23	Vulnerum curandorum diuersæ	
Vrinam cientia in pituitosis affectibus	106.35	occasiones ex temperamento	
Vfnea quid	88.14	vulnerati nascuntur	191.6
Vfio expeditiffimum remedium ad morfus virulentos	258.36	Vulnerum differentiarum extrinsecus accedentes	143
Vfionem qui non ferūt, debent vti medicamentis ignis vim habentibus	337.34	Vulnerum generalis diuifio	140
Vfionis vtilitas in offe cariofo	320.31.	Vulnerū iudicia ex Celso quæ periculofa & quæ tutiora	163.21
Vulnera cacoëthe	192.8	Vulnerum labia quomodo adducenda	461.6
Vulnerantia	216.26	Vulnerū figna & iudicia	150.9
Vulnera praua quæ	151.18	Vulnus cruentū quomodo primo tractandum	540.24
Vulneratorū victus ratio	196.36	Vulnus degenerās in vlcus quomodo curandum	461.30
Vulnera triplici ratione magna æftimanda	150.17	Vulnus & vlcus pro eodem	146.32
Vulnera tutiffima & curationem facilem habentia	158.29	Vulnus nudum quomodo tractandum	461.1
Vulneribus quæ nocent omnia fere fanguinis vitio commouentur	476.1	Vulnus quid	145.23
Vulneris in vena curatio	269.35	Vulnus quot modis fiat cum depreditione fubftantiæ	224.10
Vulneris pars quæ fuperior & quæ inferior	183.28	Vulnus recens qualiter curatur	347.10
Vulnerum caufæ	149.1	Vulnus fimplex quod	225.22
Vulnerum cruentorum differentiarum à tribus potiffimum fumuntur	141	Vulnus fimplex quomodo committitur	181.12
Vulnerum curandorum intentiones	164.20	Vulnus vnà cum fractura quomodo curetur	387.5
		Vuluas molliens med.	437.13
		Z Ambana	462.39
		Z Zegi	327.19

FINIS.



CATALOGVS LI-
BRORVM.

35
9

Primus Liber, tradit tumores præternaturam. Fol. I

Secundus Liber, generatim de plagis, seu cruentis vulneribus tractat. 145

Tertius Liber est, de vlceribus curandis. 293


Quartus Liber fracturas tradit, & curat. 366

Quintus Liber, luxata ossa distinguit & reponit. 393

Sextus Liber, materiam chirurgicam docet. 412

GENERALIS, ET COMPENDIARIA

Chirurgi institutio, facili &
artificiosa methodo
tradita.



In perito ac rationali Chirurgo, Duo in chi-
duo potissimum desiderantur: rurgo desi-
derantur.

- 1 Exacta cognitio eius partis ter-
tiæ, therapeutices medicinæ:
quæ, quia manu medetur, χει-
ρουργικὴ Græcis nominatur.
- 2 Peritia, ac solers promptitudo,
seu prompta quædam dexteri-

tas, exequendi ea omnia, quæ ad affectus Chirurgiæ
subiectos attinent.

1 Ut exactè cognoscatur scientia siue ars, quæ Chirur-
gica dicitur, scire oportet.

1 Quid sit Chirurgia.

2 Quæ sit subiecta Chirurgiæ materia,

3 Quis sit finis Chirurgiæ.

4 Quis ordo seruandus sit, in addiscenda Chirurgia.

2 Ut peritè, promptè, ac dexterè exequatur Chirur-
gus, quæ ad artem quam exercet, pertinent: eum co-
gnoscere oportet.

1 Quodnam sit chirurgi officium, hoc est, quâsnâ ope-
rationes in vniuersum chirurgus exercere debeat in
humano corpore.

2 Quomodo manuales suas operationes hic artifex ex-
qui debeat.

3 Methodum, ac media, quibus deuenire possit in cogni-
tiones singularum operationum, quas exercere debet
in humanis corporibus.

Quatuor
ad chirur-
gia cogni-
tionem ne-
cessaria.

Condi

Chirurgi Institutio.

4 Conditiones requisitas vt probè fiant huiusmodi manuum operationes.

1 Porro cognoscimus quid sit chirurgia, per

Quibus cognoscatur quid chirurgia.

Rationem nominis, quam etymologiam Græci vocant. Diuisionem, quæ & partitio dicitur, ac distributio, didu-
αίσις.

Ratio nominis.

Definitionem: quæ oratio est, eius ipsius quod definitur naturam breuiter & apertè ostendens atque explicans. Chirurgia quod ad rationem nominis attinet, idem sonat quod manuum operatio. Dicta enim est ἀπὸ τῆς χειρὸς καὶ τοῦ ἔργου, id est, à manu & opere vel ἀπὸ τῆς ἐργίας, id est, ab operatione. Siquidē hæc ars manuum opere exercetur. Hinc chirurgus & chirurgicus, manualis operator, χειρουργός, enim quasi χειρὸς ἔργος, & χειρουργία quasi χειρουργία dicitur.

Est igitur chirurgia, si nominis rationē spectes, manualis operatio, uel ars quæ docet rectum usum operationū, quæ in humano corpore manu exercentur.

Diuisio chirurgiæ duplex.

Chirurgia bifariam diuiditur: Nempe in suas Significationes diuerfas. Partes.

Diuisio chirurgiæ in diuersas significationes.

Prima,
Secunda.

Prima diuisio chirurgiæ in diuersas significationes.

Chirurgia generaliter accepta.

Chirurgia speciatim sumpta.

Varie definitiones chirurgiæ. Chirurgia generatim accepta & considerata, est Ars quæ manus opera, morbos, & eorum symptomata profligat.

Chirurgia uerò presiore uocabulo, ac specialiter sumpta est

Tertiū therapeutices [id est medicinæ curatricis] instrumentū, vel si mauis, pars tertia therapeutices quæ morbis medetur incidēdo, vrēdo, artus luxatos, & ossa suis sedibus mota in naturalem locum reducendo, atque id genus alio conatu chirurgico, & manuum artificio.

Hæc definitio communis.

Sed aliter quoque ab omnibus fere recentioribus, tum medicis,

Generalis & compend.

medicis, tum chirurgis definitur, Nempe hoc modo,
Chirurgia, est scientia, quæ docet modum & qualitatem operandi præsertim adglutinando incidendo, & alias id genus, quæ manu fiunt, operationes exercendo: Homines quatenus licet sanitati restituens.

*muniter so-
let chirur-
gie assigna-
ri, & essen-
tialis nomi-
nari.*

In Introductorio uerò medicorum hoc pacto diffinitur,
Chirurgia est alieni, ut propriè vocant, per diuisiones compositionesque cum via quadam & ratione ablatio: ad hæc vulnere atque vlcere humano corpori accidentium curatio.

Alia definitio.

Nos autem ex ipsius subiecto & fine (ex quibus finitio omnis suscipitur) breuem, apertam & essentialem sic illi nunc definitionem accommodamus:

Chirurgia, est ars, quæ ad humani corporis (cuius præcipuè curam habet) aduersam valetudinem manus præsertim opera & administratione, profligandam, comparata est, vel sic,

*Propria est
essentialis
chirurgie
definitio.*

Chirurgia est ars, quæ præcipuè manus opera & artificio corporis humani morbos ac vitia propellit.

Secunda diuisio chirurgiæ, quantum ad illius significata attinet, communiter talis solet assignari.

*Secunda di-
uisio chirur-
gie in sua
significata.*

Chirurgia theorica.

Chirurgia practica.

Chirurgia theorica, est

Quæ docet, & scientia dicitur.

Hæc enim per demonstrationem acquiritur, & per cognitionem principiorum artis. Hanc autem quis habere potest, tametsi nulla vnquam artis opera exercuerit, ut peritus medicus, qui ad vnguem tenet præceptiones artis chirurgiæ.

Scientia.

Chirurgia practica, est

Quæ per scientiam & rationem manuali opera rectè ac promptè ea quæ inuenta sunt perficimus. Et hæc inter artes mechanicas adnumeratur. In qua quidem nemo vnquam absolutus esse potest, nisi qui in ea frequenter se

Art.

se

Chirurgi Institutio.

se exercuerit, & alios artis huius peritos, sapissimè viderit operari, ac quæ viderit, diligenter obseruari. Hæc nonnulli vsualem etiam appellarunt.

Diuisio chirurgiæ in suas partes

Diuisio chirurgiæ in suas partes.

Generales,
Speciales.

Chirurgia quantū ad illius partes generales, gemina est.

1. Exercens operationes in membris, seu particulis mollioribus,
2. Exercens operationes in particulis durioribus.

Partes chirurgiæ speciales, sunt scientia quæ docet recta cum ratione operari, circa

Tumores præter naturam

Plagas, seu vulnera [adhuc cruenta.]

Vlcera

Fracturas

Luxationes,

Et circa alia id genus, quæ manus operam desiderant.

Subiecta chirurgiæ materia.

- [2] Subiecta chirurgiæ materia, id est, id quod maxime ac præcipue consideratur in scientia chirurgica, & circa quod tota eius versatur intentio, est

Corpus humanum sanitati & ægrotudini obnoxium, manus operam expostulans: omnia enim quæ ratione perlustrat chirurgia, & manu facere docet, ad ipsius vtilitatem refert & accommodat. Alia verò ratione consideratum, subiectum est alterius scientiæ.

Finis seu scopus chirurgiæ.

- [3] Finis, seu intentio chirurgiæ, est Manus opera & administratione, humani corporis morbos qui curationem admittunt profligare: Hunc autem scopum non semper assequitur, vt postea dicitur.

Modus procedendi in chirurgia.

- [4] Modus procedendi in discenda chirurgia, est A communioribus ad particularia, siue ab vniuersalioribus ad minus vniuersalia.

A rebus notioribus ad obscuriores, & minus notas, quod & in aliis, similiter disciplinis obseruari solet.

Hactenus de iis quæ ad cognitionem chirurgiæ attinent.

Nunc

Generalis & Compen.

Nunc de iis quæ ad eius executionem requiruntur: Et
primùm de operationibus.

[2] Operationes quas exequi debet chirurgus ut asse- Operationes
ad finē sciē
tiæ chirur-
gicæ asse-
quendū ne-
cessariæ.
quatur finem, quem sibi proponit: sunt tres, Nempe

1. Continuum diuidere, seu separare.
2. Diuisum seu disunctum coniungere, atque in probam
vntionem reducere.
3. Superfluum demere.

Porro continuum *separamus*

Incidendo, & excidendo.

Venam secando.

Scarificando.

Cōtinui di-
uortium.

Disiunctum ac diuisum coniungimus,

Vulnera glutinando,

Luxata in locum suum adducendo:

Fracturas curando.

Coniunctio
diuortij co-
stitui.

Superuacuum demimus

Tumores qui præter naturam consistunt, auferendo:

Ganglia, carcinomata, nodos, strumas, myrmecias, & id-
genus alia radicitus extirpando:

Serosum humorem ex ventre hydropicorum educendo:

Sextum, in manu aut pede, digitum resecando.

Superflui
ablatio.

[2] Manuales huiusmodi operationes obire atque ex-
qui debet chirurgus

Citò,

Tutò,

Citra dolorem,

Sine vlla fallacia, aut impostura,

Non lucri, aut corradendæ pecuniæ cupiditate, sed pio
quodam erga proximum affectu.

Modus ex-
ercendi ma-
nuales ope-
rationes.

Nullo modo apud ægrotum se iactans posse morbos cu-
rare, qui prorsus inexpugnabiles sunt atque insanabi-
les, cuiusmodi sunt canceri occulti & exulcerati, vel ele-
phantiasis quæ iam inueterauit.

Rursus ut tutò curet chirurgus, tria sunt propria, qui-
bus intentus sit oportet.

Vnum,

Chirurgi Institutio.

Lib. 14.

*Methodi
med.*

- 1 Vnum primumque vt omnino absolutionem operis consequatur.
- 2 Alterum, vt sicubi scopum hunc non consequatur, saltem cubantem non lædat.
- 3 Tertium, vt vitium non facile reuertatur.

[3] *Media quibus chirurgus deueniet in cognitionem eorum quæ illi agenda sunt, tria statuuntur à Galeno.*

- 1 Prima
 - 2 Secunda
 - 3 Tertia
- } Indicatio.

*Prima in-
dicatio
quid sit.*

- 1 Prima indicatio (quæ insinuatio est eorum quæ agēda sunt) sumpta ex natura rei cuius finis intentio dicitur.

*Enumera-
tio eorum
quæ secun-
dum natu-
ram sunt.*

Conseruatio eius quod secundum naturam est.
Expulsio eorum quæ præter naturam sunt.

Secundum naturam sunt,

- 1 Sanitas, id est affectus secundum naturam ad efficiendum actionem idoneus.
- 2 Causæ sanitatis.
- 3 Effectus sanitatis, id est, actiones quæ secundum naturam sunt.
- 4 Vires, id est, natura quæ præsens est & aduersus morbum certat.
- 5 Consuetudo, quæ velut altera est natura.
- 6 Temperatura. Quæ omnia similibus conseruantur.

*Quæ dicun-
tur præter
naturam.*

Præter naturam sunt,

- 1 Morbus, id est, affectus præter naturam per se ac primo actionem lædens
- 2 Morbi causa. Quæ nõ per se ac primo, sed per accidens, ac secundo (morbo scilicet interueniente) actionem lædit, & impedit.

*Lib. de sym-
pto. differ.*

- 3 Symptoma speciatim sumpto nomine, id est, accidens quod morbum sequitur, velut vmbra corpus.
Hæc autem per contraria expelluntur.

*Expulsio morbi (cui propriè debetur curatio)
Simplicis,*

Com

Generalis & compend.

Compositi, & implexi.

Expulsio morbi simplicis fit

Admouendo ea quæ morbo contraria sunt.

Prima igitur indicatio, à re præter naturam sumpta, nobis manifesta fit ab ipsa contrarietate, ut

Vnitio	}	à	{	soluta continuitate.	
Refrigeratio				caliditate.	
Calefactio.				frigidityte.	
Humectatio				siccitate	
Desiccatio		ab		humiditate	
Minutio	}	à	{	quantitate excedente	
Augtio				quantitate minuta	
Ablatio				numero excedente	
Productio				numero deficiente	
Apertio	}	ab	{	obstructione	
Ampliatio				angustia	
Astrictio				ampliatione	
Reductio in propriam figuram				à figura mutata	
Repositio in proprium locum				à positu variato, vt	
membro luxato, intestino in scrotu delapso, & ita de aliis.					

Prima indicatio sumpta à re præter naturam unde insinuat.

In propulsione morbi compositi considerare oportet

Cuiusque morbi contrarietatem,

Ordinem contrarij cuiusque admouendi.

In morbo composito quæ cõsideranda.

Vt ordo debitus contrarietatis admouendæ seruetur, cognoscere oportet

Quis affectus primum curari debeat.

Affectus qui primum curari debet, is est,

Cuius curatio causa est curationis alterius,

Sine quo alter curari non potest.

Qui magis vrget, & periculosior est.

2 Secunda indicatio est, quæ nobis declarat an id quod tendimus, & prima postulat indicatio, sperari possit, ut

Secunda indicatio quid insinuat.

Chirurgi. Institutio.

Anseruare possimus quæ secundum naturam sunt.

An quæ præter naturam sunt, expellere valeamus.

Secunda igitur indicatio, à re secundum naturam sumpta, disquirat, an

Sanitatis reuocatio speranda sit.

Vires ad vitam seruari possint,

Causæ sanitatis seruari possint,

Et ita de cæteris.

Modum tri-
um potissimè
is, cognos-
timus mor-
bi non pos-
se propelli,
et incurra-
tilem esse.
expansum
is est cura
io qua fit
nam ch-
urgi. quo-
viam mor-
bi aliter
curari ne-
quit.
Iungitur
primus locus,
deinde ætus
aut hamu-
lus infigi-
tur.
Hip. apho.
12. lib 6.
Morbus ex
sua essentia
incurabilis
à quibus de
prehendat.
Substantia,

A re uero præter naturam sumpta hæc indicatio secunda, insinuat, an

Morbi aut symptomatis expulsio, sperari possit,

Causis possimus præcauere.

porro, nos cognoscimus morbi expulsiōe fieri nō posse,

1 Quando morbus ex sua natura, seu essentia incurabilis est, ut elephantiasis iam absoluta.

2 Quando laborans renuit auxilia, ad morbi alioqui ex se sanabilis curationem necessaria, exempli gratia, excisionem in cancro membrum aliquod particulare occupante. Aut in hydrope *παραυγχευ*, id est, præcutionem, & ita de aliis.

3 Quando curatio morbi nobis propositi occasionem præbet maioris mali: ut si malum mortuum (quod vocant) inueteratum, curetur. Aut diuturnæ hæmorrhoides omnino tollantur. Si enim vna ex iis non seruetur, periculum est, aquam intercutem [maniam,] vel tabem adueniri.

Morbum autem ex se, siue ex sua natura incurabilem esse deprehendimus, ex læsa partis

Substantia,

Actione,

Vsu,

Situ.

Indicatio à substantia sumitur, uel

A missione in

{ Calido
Frigido
Humido
Sicco.

A pri

Generalis & compend.

A primordio, vnde formata sit substantia, & eiusdem consistentia.

Indicatio à mystione, in calido, frigido, humido, & sicco.

Aequaliter vitiata	Insinuat id non posse præstari quò tendimus.
Inæqualiter vitiata	Insinuat id præstari posse quò tendimus.

Indicatio à primordio, ex quo formata est partis substantia, & eiusdem consistentia.

A substantia	}	Solida læsa	Insinuat non posse præstari id quò tendimus.
		Carnosa vitiata	Insinuat id posse præstari quò prima indicatio postulat.
		Spirituali oblata	

Indicatio secunda ab actione partis.

Actu

Per quam est vita.	}	Insinuat si perierit præstari nò posse quò tendimus.
Sine qua vita esse nò potest		Insinuat si perierit aliquo modo præstari posse quò tendimus, sed tamen non a successu tēporis maiore futurā.
Per quam melior est vita	}	
Per quā conseruatur vita.		

Indicatio ab usu, seu commoditate, ad alterius assequutionem, à natura insita.

vsu

Partis	X	Necessaria ad vitam	Insinuat si perierit præstari non posse id quò tendimus.
		Actionis	Non necessaria ad vitam

Indicatio secunda à situ partis sumpta

Situ

Ad quā medicamenta pertingere	}	Possunt	posse	}	obtinere quò prima indicatio postulat, in (suaui)
		Nò possunt	nò posse		

Chirurgi Institutio.

ia in-
tio.

3 Tertia indicatio (que remedia muenit quibus as-
sequi possumus id quod prima indicatio postulat,
& secunda fieri posse sperat) nobis insinuat,

media
remedia

† Auxilia opportuna, ad finem quod tendimus, asse-
quendum.

finē quō
rimus cō
sēdum.

• Vsum remediorum conuenientium.

remedia
munita.

† Auxilia conuenientia, que & instrumenta dicuntur
Communia,
Propria.

Instrumenta siue remedia communia dicta, hoc est, que
omnibus corporis partibus applicari possunt,
Medicinalia,
Ferreā.

medicinalia-

Instrumenta medicinalia.

Optima viuendi ratio, in rebus sex non naturalibus.

Pharmacia

Phlebotomia

Emplastra

Vnguenta

Pulueres, & similia

In q̄s tribus primis
applicandū, chi-
rurgus debet pe-
riculum aliquē me-
dicum consulere.

Instrumenta.

Vnguenta, quibus munitus esse debet chirurgus, ut com-
munioribus sue artis intentionibus satisfaciāt nu-
mero sunt quinque,

Basilicum

Apostoli-
cum

Aureum

Album

Dialinaum

ad

maturādū, & pus mouendū:
detergendū siue purgādum.
implendum seu (vt dicunt)
[incarnandum.
glutinādū seu cōsolidandū.
demulcēdū, mitigandūve.

ferrea in-
strumenta
munita.

Instrumenta ferrea communia, quibus utitur chirurgus,
sunt

Forfices

Nonacula, seu culter rasorius

Scalpellum chirurgicum, quod
phlebotomon appellant.

} Ad incidendum &
excidendum.

Caute

Generalis & compend.

Cauterium, ad vrendum.

Forcipes, vulgo tenaculæ

Vulsellæ, seu volsellæ,

Hamus recurvus,

Ferramentū, quod Diocleum grae-

phiscū Græci vocāt. Cuius descri-

ptionem & vsum vide apud Cor.

Celsum lib. 7. cap. 5.

Specillum,

Acus

Cannulæ

Ad extrahendū.

Ad explorandum.

Ad suendum.

Ex ijs magis necessaria, & quæ in usum veniunt quoti-
dianum, atque ideo semper à chirurgo circumferri
debent, sunt;

1 Forfices,

2 Vulsellæ seu Vulsellæ,

3 Nouacula,

4 Specillum,

5 Scalpellum,

6 Acus.

Siseaulæ.

Pincetes.

Rasoir.

Esprouette.

Lancette.

Aesguille.

} Gallie.

*Infirmi
ta ferr
chirurg
magis
cessaria
6*

Instrumenta propria ferrea, id est, quæ alicui particulari
membro dicata sunt.

Modiolus, quem *χρυσίον* Græci vocant capiti.

Falx, seu fauceolus. sedi siue ano.

Speculum oris, Speculum matricis.

¶ Vfus remedium conuenientium ad finem propositū
assequendum, ex singulis tractatibus habetur, iuxta
uarietatem rerum (ut uocant)

Naturalium,

Non naturalium.

Et præter naturam.

Item eorum quæ illis
annexa dicuntur.

Res naturales dicuntur, quæ corporis nostri constitutio-
nem ingrediuntur. Et hæ numero sunt septem, &
*Res n
rales.*

1 Elementa, ignis, aer, aqua, terra.

2 Temperamenta, calidum, frigidum, humidum, sic-
cum, &c.

Chirurgi Institutio.

3 Humores, sanguis, pituita, vtraque bilis.

Annexa sunt. Tetra esse induita.

Principalia, cerebrum, cor, hepar, testes.

Facultates sortita infitas, & manantes à principibus, pulmo, ventriculus, renes.

4 Mēbra

Principibus subministrantia, arteriæ, venæ, nervi vasa spermatica.

Ab infitis sibi à natura facultatibus gubernata, os, chartilligam. &c.

5 Virtutes

6 Operationes

7 Spiritus

} Animales, vitales, naturales.

Proprietates.

Res non naturales, sunt, quæ corpus humanum si rectè adhibentur, conservant incolume: si uerò hauri rectè accommodantur corpori, tunc idem deserviunt. Sunt autem numero sex.

1 Aër ambiens.

Annexa

2 Cibus & porus, siue ea quæ assumuntur.

si, tepus,

3 Motus & quies, & totius corporis, & partium singulorum.

gio, veti,

4 Somnus & vigilia.

locæ, cor-

5 Excreta retenta.

conſue-

6 Animi affectus.

do.

es præter naturam.

Res contra naturam, seu præter naturam dicuntur, quæ humane naturæ contrariæ sunt, ipsamque demoluntur, uel ledunt, aut agrotare faciunt. Et hæ tres sunt numero, ut supra dictum est.

1 Morbus

2 Causa morbi

3 Accidens, morbum sequens

Græcis *σύνεσμα*.

} Quorum definitiones supra descriptæ sunt: horum differentias Gal. peculiari lib. explicuit.

Morbos

Morborum in uniuersum tria sunt genera,

ne gene-

1 Intemperies, siue mala complexio

2 Mala compositio

3 Vnitionis dissolutio

} in } similaribus partibus.
} in } partibus instrumentariis.
} utriusque.

Diuisio perficienda ex lib. de differentiis morborum.

Causa

Generalis & compen.

Causa morborum generica, recentioribus tres solent as- *Mo-*
signari. *caus*

- 1 Prægressæ, siue euidentes, quæ & primitiue dicuntur
vulgo: Græcis autem προκαταρτιναι. Quæ extrinse-
cus corpori adueniunt.
- 2 Antecedentes seu præcedetes. Græcè προαγούσαι. Quæ
paratæ sunt statim morbos efficere.
- 3 Coniunctæ siue continentes. Græcè συνιυγναι. Quæ
iàm morbum excitarunt.

Symptoma siue accidens morbum sequens, trifariam di-
stinguitur, Aliud enim est

- 1 Actio laesa,
2 Qualitas mutata, vt caliditas vehemens in phlegmone.
3 Vergens ad mutationem, vt immodica Excretiones,
excrementorum } Suppressiones.

A Etio læditur trifariam,

Quum est abolita }
Diminuta } vt { Cæcitas
Corrupta } { Visus hebes } in oculis.
 } { Deprauata visio }

- 4 Ea quæ requiruntur ad manuales operationes probè
exercendas, multiplicia sunt. Alia enim spectant ad
Chirurgos ipsos,
Laborantes,
Assidentes,
Exteriora.

Quatuor in uniuersum deſyderantur in bono chirurgo. Bon
Nempe ut ſit, turgo

- 1 Doctus, & disciplinarum gnarus, earum præsertim quæ ad suam artem pertinent.
- 2 Multa experientia exercitatus,
- 3 Acri ingenio,
- 4 Bonis moribus doctus.

1 Doctrina atque eruditio boni chirurgi, consistit in De

Generalis & compen.

Theoria seu speculatione rerum { Naturalium,
Non naturalium.
Præter naturam.

- Praxi { Exercendo probè, celeritèr, concinnè, & expeditè
operationes manuales.
Consulendo medicum in iis quæ ad pharmaceuti-
cæ attinent & diæteticæ.

Ex rebus naturalibus, præcipuè hæc illi cognoscenda sunt,

Corporum tēperamenta, Substantia
Singularum partium { Tēperamentū
Conformatio
Compositio. } Ab his enim cu-
ræ indicatiōes
desumuntur.

Experientia 2 Experientia chirurgi, consistit

In iis quæ certa ratione excogitata sunt, & frequenti
vfu confirmata:

Aliàs empiricus & temerarius censendus erit, nisi scili-
cet experientiam habuerit rationi coniunctam.

Ingenium. 3 Ad chirurgi ingenium pertinent,

Bona ac prompta apprehensio,

Tenax memoria,

Reminiscencia facilis,

Rectum iudicium,

Operandi dexteritas,

Solertia ac promptitudo in remediis inveniendis.

Ex Corne. Ad operandi dexteritatem ac promptitudinem, hæc re-
quiruntur,

1 Acris oculorum acies claræque.

2 Manus strenua, stabilis, nec vnquam tremiscens.

3 Vt non minus sinistra quàm dextra sit promptus.

4 Optima corporis conformatio, atque habitudo.

4 Mores qui decent chirurgum, sunt, ut sit

Audax, & animo intrepidus, in reb^o tutis, & necessariis.

In rebus dubiis ac periculosis non admodum præceps.

Comis & affabilis erga laborantes.

Mansuetus ac facilis erga suæ artis homines, & vt. Græ-
cè dicam *φιλάργος*.

Prudens ac circumspectus in præsagiendo.

Castus, ac temperans.

Generalis & compen.

Misericors erga pauperes,

Pecuniz non nimis cupidus, nec exactor iniquus.

Quæ ad laborantem attinent, tria sunt precipua, ut

*Laborantis
conditiones.*

- 1 Pareat medico, non secus ac seruus domino, & in nullo suæ indulgeat voluptati.
- 2 Fidat medico, & chirurgo.
- 3 Patienter ferat omnia, quæ fiunt à chirurgo Dogmatico & experto.

Qui assident ægro, debent esse

Assidentes.

Prudentes,

Pacifici,

Fideles.

Exteriora omnia apparatus esse debent

In utilitatem laborantis,

Et ut morbus desiderat.

Nomine exteriorum comprehenduntur

Habitationes vel } idoneæ, & omni turba vacantes.

parum comodæ, & turbarum plenæ.

Quæ nunciantur, aut aguntur.

Quæ iram, tristitiam, aut aliquem alium affectum infligunt ægrotanti.

Quæ somnum abruptunt & interturbant.

FINIS COMPENDII CHIRURGIAE.



TV MORVM QVI

PRÆTER NATVRAM

*consistunt, Generalis Divisio, In pri-
mum Librum Chirurgicarum*

Institutionum Ioannis

*Tagautij me-
dici.*

*Primæ, ac generales tumorum præter naturam disse-
rentiæ.*

- 1 Phlegmone, Sanguinea fluxione
- 2 Erysipelas, } Biliosa fluxione
- 3 Oedema, } Tenuis pituitæ substantia
- 4 Scirrhus, } Limoso & fæculento sanguine
- 5 Inflatio, seu } Ex flatuoso spiritu collecto nasci-
Flatuosus tumor } tur.
- 6 Abscessus. Quod Græci ἀπύημα nominant.

1 Phlegmone duplex est,
φλεγμονή. 1 Ex sanguine syncero, Vera phlegmone vulgò appel-
latur.

- 2 Ex sanguine optimo a- } Recetioribus chirurgis phle-
liis humoribus cômisto } gmone nō vera nominatur.

Ex sanguine alijs humoribus commisto, fit

Phlegmone { Erysipelatodes,
Oedematodes,
Scirrholes.

Phlegmonosi affectus sunt,

Dothienes, { Furunculi Celso, Auicennæ Aldemure-
nul. Tuberculum acutum, cum in-
flammatione & dolore.

Bubo, Simplex laxarum partium inflammatio.

Phyge

Genera. diuifio Tum. præ. nat. in lib. I.

Phygethlm, { Panus vocat Celfo: Græcis Phlegmo- *Panus tu- mor est non alius, sed la- tus, panus f- militudine referens.*
ne eryfipelatodes, vel eryfipelas phle-
gmonodes. In inguinib' & alis nascit.

Phyma { Inflammatio glandularum, quæ citò auge-
tur, & ad fuppurationem accelerat. Celfo
tuberculum dicitur.

Carbunculus. Græcis *ἀράχνη*. { Cum puftulis.
{ sine puftulis.

Nihil aliud quoque quàm Phlegmonæ funt.

Vux, { Gurgulionis, qui Græcè Hippocrati *γυργυλιών*,
& *γυργύλη* dicitur, Latinis etiam columella.

Tonfilla, { Glandularū, quæ in fauciu principio fibi
opponuntur, amygdalas vulgò appellat.

Paristhmia, corporum, quæ in pharynge confiftunt.

Hæc moborum & partium funt nomina.

Phlegmonem fequuntur, atque eius proles funt

Absceffus, { Qui etiâ funt aliquâdo protinus ab ini-
tio, nulla inflammatione præcedente.

Sinus, { Græci *κίρκου* nominant, recētioreſ chirurgi
vlcus profundum & cauernofum, quod non-
dum occalluit.

Fiftula. { Græcis fyrinx dicit. Hæc nihil aliud eſt quàm
ſinus arctus & oblongus, q nō ſtatim curat, tē-
poris pgreſſu obduruit, & callo obductus eſt.

Gangræna, Partis affectæ *γὰνγκραις*, Latinis mortifica-
tio non tamen abſoluta.

Sphacelus. { Latinis ſyderatio. Abſoluta atque omni-
moda partium etiam ſolidarum mortifi-
catio & corruptela.

2 Eryfipelas bilioſæ fluxionis ſoboles: geminum eſt, *ἰγυρίπτερος*

1 Verum ac legitimum, { Solius cutis paſſio eſt, & abſ-
que vlceratione incidit.

2 Non exquisitū ſeu illegitimum. { Non ſolâ cutim, ſed etiam ſubie-
ctam carnē occupat, ac moleſtat.

Eryfipelas non legitimum, duplex eſt,

1 Ex bile craſſiore & acriore, { Nominatur eryfipelas
exacta tamen & ſyncera, { cum vlceratione.

Ex

Chirurgi Institutio.

- 1 Ex bile aliis humoribus permixta, alios tamé succos exuperate. } Dicitur erysipelas } Phlegmonosum
Oedematosum
Scirrhosum.

Erysipelati similis est herpes, qui geminus est Galeno,

- 1 Herpes exedens, siue depascens. } Græcè *ἰσθίμυς*. A bile fit acriore & exacta totâ cutim vsq; ad subiectâ carnem exulcerante. Eiusdem generis est cum vlcerato erysipelate.
- 2 Herpes miliaris, siue pustulosus. } Cêchrias Græcè. Ex bile fit tenuiore & dilutiore, pinde & minus acri calidâq;.

Ad erysipelas etiam pertinent,

Bullæ similes iis, quæ in corpore à feruida aqua vstulato contingunt, Phlictenæ à Græcis vocatæ.

Oidema.

- 3 Oedema bifariam consideratur,

- 1 Vt symptoma, } Tumor rarus, & sine doloris sensu, ex pituita, vel flatulento spiritu, periculosos quosdam affectus sequens, vt tabem, cachexiam, hydropem.
- 2 Vt morbus.

Oedema morbus.

Oedema morbus duplicem habet originem,

- 1 Ex pituita sola, } Tumor etiâ laxus, fungosus, & absque doloris sensu, ex tenuis pituitæ influxu ortum habens, quod verû ac legitimum oedema nominant.

- 2 Ex pituita aliis humoribus permixta, sed tamé illis præpollente. } Recetioribus oedema non verû atque illegitimum appellatur.

Oedema morbus ex pituita alijs humoribus commixta, in tres differentias findi solet. Nempè in

- 1 Oedema phlegmonodes,
2 Oedema erysipelatodes,
3 Oedema scirrhodes.

Ad oedema referuntur,

*Tumores
oedematosi.*

Hydrocele, } Vulgò hernia aquosa. Quum humor aqueus in testium tunicis congregatur.
Ascites

Chirurgi Institutio.

Ascites { Aquosus hydrops. Quum serofus humor in membrana abdominis interiore continetur.

Leucophlegmatia { Hypofarca, & anafarca eria dicitur. *ἀναρῶν*
Quum corpus inæquale est, tumori *ῥνο voca-*
bus aliter, aliterque per totum id *bulo aut*
(vt Celsus ait) orientibus. *duobus*
ἀναρῶν.
Σύψις.

4 **Scirrhus**, tumor durus sine ullo dolore,

1 **Exquisitus**,

Sensu caret, nec curationem admittit.

2 **Non exquisitus** { Non omnino est sine sensu, ægrè
tamen admodum sentit.

Scirrhus tam exquisitus, quàm non exquisitus;

1 Statim ab initio paulatim concrefcens, & augescens

2 Ex coincidentia creatus.

Scirrhi qui à principio paulatim cōcrefcunt, & augētur,

1 **Ex pituita lēta, crassaq;** tenuiore ei⁹ substantia resoluta,

2 **Ex atra bile, seu melancholia.**

Scirrhi ex atra bile, seu melancholia (ut vocant) naturali;

1 **Sola, & aliis humoribus** { Legitimi & veri scirrhi nostræ
bus impermissa, ætatis chirurgis appellantur.

2 **Aliis humoribus commissa, dominium** { Illegitimi
tamen super illos obtinente. censentur.

Scirrhus ex atra bile aliis permista humoribus.

1 **Phlegmonodes,**

2 **Oedematodes,**

3 **Erysipelatodes.**

Scirrhi ex coincidentia, uel transmutatione, fiunt

Phlegmone,

Erysipellate,

Oedemate,

} impendio refrigeratis.

Melancholici ac scirrhosi tumores censentur

Cancer, Græcè *κάρκινος* aut carcinoma. Fit ab atra bile,
sine ebullitione.

Phagædæna cum tu- { Cum cutem pariter subiectam
more. attingit & depascitur. In quo
differt ab herpete.

Vlcera

Generalis diuifio.

Vlcera cacoëthe, id est } vt ſūt Chironia & Telephia.
 maligna, cū tumore,

Pſora, }
Lepa, } Cutis tantum affectus ſunt.

Elephas, ſeu } Ex ſanguine melancholico ducit origi-
elephātiſis. } nem; tempore verò bilis atra ſanguine
 copioſior redditur.

Satyriaſmus, id eſt, elephas incipiens.

Vicina ſcirrho ſunt,

Enchymomata } Senibus ex venarum contuſione acci-
Melaſmata, } dentia, ſanguine ex venis effuſo ob ex-
 tremas earum adaperſiones: & interdū
 ob tunicarum contuſiones,

Aneurisma, } Arteriæ adaperſæ affectus, ex quo inter-
 dum, grumo ſcilicet innato, ſphacelus
 gignitur.

Varices, } Id eſt venæ dilatæ in cruribus à ſanguine
 craſſo.

Scirrhi ſunt à parte affecta nomina ſortiti

Chœrades, } Strumæ glandularum.
 } id eſt } Ramex teſtium, vulgò hernia ear-
 } noſa, ſit cum caro inter tunicas
Sarcocœles, } teſtium increſcit.

Inflatio } Ex inflationum genere ſunt.

Tympanias, ſeu } Hippocrati aqua intercutem ſicca
 tympanites, } vocatur.

Priapiſmus, qui } Pudendorum intentiones nō remit-
 & ſatyriaſmus } tentes, à ſpiritu halituoſo cauerno-
 quibusdam di- } ſum neruum (qui propriam colis ſub-
 citur. } ſtantiam conſtituit) implente.

**Sunt & parui quidam tumores in cute naſcentes, qui ad
 prædicta genera referuntur, ut**

**Parui tu-
 mores in cu-
 te naſcētes.** } **Achores,** } Pituitæ ſalſæ & aluminosæ ſoboles. Parua
 } in cute capitis vlcera, cū tumore modico.
Meduſæ ſimiles, } Ex his humor melleus effluit. Cum tu-
 more quodam & foraminibus plurimis
Fauilatinis. } conueniunt.

Tumo. præter natu.

Ad scir- { Myrmecia, } Verrucæ, quæ latiore sunt ba-
rhū per- { Acrochor- } si, & quasi sessiles. Latini for-
tinent { dones. } micantes verrucas appellant.
Pendiles verrucæ, & angustiore basi.

Psyraces, seu { Tumores parum supra summā cutem
psyracia, { eminentes, phlyctenis, hoc est bullis;
quæ ab igne excitantur, similes.

Epynictides. { Liuentes pustulæ, sabæ magnitudinem
non excedentes, noctu quidem magis,
quàm interdiu infestantes.

umores etiam sunt, sed non ex humoribus.

Epiplocele, { Cum omentum in scrotum descendit.

Enteroccele. { Intestinorum, ramex.
Hernia intestinalis vulgò.

Enteropiplocele, Cùm intestinum simul cū omento
in scrotum delabitur.

Cirsocele, { Vulgò hernia varicosa. Fit cū testis in-
regis tunicis ramex innascitur.

Bubonoccele, id { Fit rupto peritonæo, aut vulnerato
est, inguinis ra { iuxta inguen. Ad obliquos ventris
mex { musculos pertinet, & ad nerueam il-
lorum tenuitatem,

Exomphalorum eminē { Hic affectus ad transuersos
ria, cum umbilicus in de- { musculos pertinet, & nerueā
corè prominēt. { eorum tenuitatem.

Ex carne supercrescente fiunt.

Sarcoccele, { Tumor testium, Quàm caro inter tuni- *Tumores*
cas ipsorum incre/cit. *ex carne*

Epulides, { Superflua carnes ex inflammatione in ex- *supercre-*
tremo molari dente, cui dolor quandoque *scente.*
& febris iungitur.

Parulides, { Abscessuli circa gingiuas facti, qui nisi
soluti fuerint suppurantur.

Thymi, thymia, { Verruculae infra tenues, supra latio-
vel thyma. { res, capituli, id est, cacuminis floris
thymi, figuram verius quàm colore
representantes.

Polypi,

Genera diuiso Tum. præter natu. in lib. I.

Polypus, uel polypodes, id est multipedes. In naribus.

Abscessus. 6 Abscessus sunt, uel
Natura fluorem vincente,
Natura à fluore victa.
Hi toto genere præter naturam sunt.

Abscessuum, qui toto genere præter naturam sunt, materia,
Humores,
Solida corpora.

Vniuersa
hæc, tuni-
ca quædã
membra-
nosâ com-
prehendit.

Humor qui in abscessibus toto genere præ-
ter naturam continetur, alius est, u. l. u.
Lutum,
Cænum,
Oleum,
Vini fixum,
Vrina,
Melleus muccosusque succus.

Solida corpora in abscessibus inuenta sunt,
ueluti

Vngues,
Lapides,
Pili,
Pori,
Ossa,
Testæ,

Animalculæ, propè omnibus, quæ ex pu-
tredine generationem habent, simillima.

Frequentissima abscessuum genera sunt
tria, quorum natura ex nominibus constat,

Atheroma,
Meliceris,
Steatoma,

in

Eo puliculus quid si-
mile inuenitur.
Quo melli quid si-
mile reperitur.
Eo aliquid simile se-
uo visitur.

FINIS.

